

חדוֹא לכלכלהים

פרק 7 - חקירת פונקציה

תוכן העניינים

1	מושגי יסוד.
2	חקירת פולינום.....
3	חקירת פונקציה לוגריתמית.
6	חקירת פונקציה – שאלות כלליות.....
11	הוכחת אי שוויונות בעזרת חקירת פונקציה

הערות

1. בשאלות החקירה בפרק זה יש לחזור לפי השלבים הבאים:

- תחום הגדרה ורציפות.
- נקודות חיתוך עם הצירים.
- זוגיות ואי-זוגיות.
- אסימפטוטות אנכיות, אופקיות ומשופעת.
- תחומי עלייה וירידה.
- נקודות קיצון.
- תחומי קמירות וקעירות.
- נקודות פיתול.
- شرطוט סקיצה של גраф הפונקציה.

2. יש האומרים על פונקציה קמורה שהיא קעורה כלפי מעלה ועל פונקציה קעורה שהיא קעורה כלפימטה. אלה מינוחים שמקובלים בדרך כלל בתיכון.

3. ברוב המוסדות האקדמיים לומדים למצוא אסימפטוטה משופעת, שכוללת בתוכה גם את האפשרות לאסימפטוטה אופקית. יחד עם זאת, חלק מהמוסדות לומדים רק אסימפטוטה אופקית, ולכן בכל חקירה אני מוצא גם אסימפטוטה משופעת וגם אופקית. צפו בפתרון רק בחלק ברלוונטי עבורכם.

4. בחלק מהחקירות אזכיר בשאלת שאין צורך לעبور על כל שלבי החקירה. שימושם לב לזה.

5. אני ממליץ על תוכנה חינמית בשם Graph, שנייתן להוריד [כאן](#). בעזרתה תוכלו לשרטט כל פונקציה בקלות ולבדוק את תשובותיכם.

חקירת פולינום

שאלות

חקור את הפונקציות הבאות חקירה מלאה :

$$f(x) = x^4 - 2x^3 \quad (2)$$

$$f(x) = x(x-9)^2 \quad (1)$$

תשובות סופיות

(1) תחומי הגדרה : כל x . נקודות חיתוך עם ציר ה- y : 0, עם ציר ה- x : 0, 9.

נקודות קיצון : מינימום : (9, 108), מקסימום :

תחום עלייה : $x < 3$ or $x > 9$, ירידה : $3 < x < 9$.

תחום קמירות : $x < 6$, קעירות : $x > 6$.

נקודות פיתול : (6, 54).

(2) תחומי הגדרה : כל x . נקודות חיתוך עם ציר ה- y : 0, עם ציר ה- x : 0, 2.

נקודות קיצון : מינימום : $\left(1.5, \frac{-27}{16}\right)$


תחום עלייה : $x < 1.5$, ירידה : $x > 1.5$.

תחום קמירות : $0 < x < 1$, קעירות : $x > 1$.


נקודות פיתול : (0, 0), (1, -1).

גרפים

(2)



(1)



חקירת פונקציה לוגריתמית

שאלות

חקור את הפונקציות הבאות חקירה מלאה :

$$f(x) = \frac{\ln x}{x} \quad (1)$$

$$f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \quad (2)$$

$$f(x) = x \cdot \ln x \quad (3)$$

תשובות סופיות

(1) תחום הגדרה ורכיפות: לכל $x > 0$. זוגיות: כללית.
 נקודות חיתוך עם ציר ה- y : אין, עם ציר ה- x : 1.
 אסימפטוטה אנכית: הישר $x = 0$, משופעת ואופקית: הישר $y = x$.

נקודות קיצון: מקסימום $\cdot \left(e, \frac{1}{e} \right)$

תחום עלייה: $x < e^0$, ירידה: $x > e^0$.

נקודת פיתול: $\cdot \left(e^{1.5}, \frac{1.5}{e^{1.5}} \right)$

תחום קמירות: $0 < x < e^{1.5}$, קעירות: $x > e^{1.5}$.

(2) תחום הגדרה ורכיפות: לכל $x > 0$. זוגיות: כללית.

נקודות חיתוך עם ציר ה- y : אין, עם ציר ה- x : 1.

אסימפטוטה אנכית (חד-צדדית): הישר $x = 0$, משופעת ואופקית: הישר $y = x$.

נקודות קיצון: מקסימום $\cdot \left(e^2, \frac{2}{e} \right)$

תחום עלייה: $x > e^2$, ירידה: $x < e^2$.

$\cdot x > e^{\frac{8}{3}}$ תחום קמירות: $0 < x < e^{\frac{8}{3}}$, קעירות: $\cdot \left(e^{\frac{8}{3}}, \frac{8}{\sqrt{e^{\frac{8}{3}}}} \right)$. נקודת פיתול:

(3) תחום הגדרה ורכיפות: לכל $x > 0$. זוגיות: כללית.

נקודות חיתוך עם ציר ה- y : אין, עם ציר ה- x : 1.

אסימפטוטה אנכית: אין, משופעת: אין.


נקודות קיצון: מינימום $\cdot \left(e^{-1}, -e^{-1} \right)$.

תחום עלייה: $x > e^{-1}$, ירידה: $0 < x < e^{-1}$.


נקודת פיתול: אין. קמורה בכל תחום הגדרתה.

גרפים


(2)



(1)



(3)




חקירת פונקציה – שאלות כלליות

שאלות

- 1) נתונה הפונקציה $f(x) = ax^3 + x^2$, וידוע שהנקודה $x=1$ נקודת קיצון. מצאו את הקבוע a .
- 2) נתונה הפונקציה $f(x) = ax^3 + bx^2$, וידוע שהנקודה $(1,2)$ נקודת קיצון. מצאו את הקבועים a, b .
- 3) נתונה הפונקציה $f(x) = ax^3 + x^2$, וידוע שהנקודה $x=1$ נקודת פיתול. מצאו את הקבוע a .
- 4) נתונה הפונקציה $f(x) = ax^3 + bx^2$, וידוע שהנקודה $(1,2)$ נקודת פיתול. מצאו את הקבועים a, b .
- 5) נתונה הפונקציה $f(x) = ax^3 + x^2$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x=3$ הוא 33. מצאו את a .
- 6) נתונה הפונקציה $f(x) = ax^3 + bx^2$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $(3,9)$ הוא 12. מצאו את b .
- 7) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{ax^3 + x^2}{2x^3 + x + 6}$. ידוע שהישר $y = 4$ אסימפטוטה לגרף הפונקציה. מצאו את a .
- 8) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{ax^2 + bx + 4}{x}$. ידוע שהישר $y = 0.5x + 1$ אסימפטוטה לגרף הפונקציה. מצאו את a ואת b .

- 9) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 4}{x^2 + ax + 6}$.
 ידוע שהישר $x=1$ אסימפטוטה לגרף הפונקציה.
 מצאו את a .

שאלות 10-17 מתייחסות לגרף הפונקציה $f(x) = x^3 - 3x$



- 10) מהו מספר הפתרונות של המשוואה $f(x) = 5$?
- 11) מהו מספר הפתרונות של המשוואה $f(x) = 2$?
- 12) מהו מספר הפתרונות של המשוואה $f(x) = 0.5$?
- 13) עבור أيיה ערך של k , למשוואה $f(x) = k$ יש בדיקות פתרון אחד?
- 14) עבור أيיה ערך של k , למשוואה $f(x) = k$ יש בדיקות שני פתרונות?
- 15) עבור أيיה ערך של k , למשוואה $f(x) = k$ יש בדיקות שלושה פתרונות?
- 16) האם קיים ערך של k , עבורו למשוואה $f(x) = k$ אין פתרון?
- 17) מצאו את התחומים בהם הפונקציה חח"ע.
- 18) נתונה פונקציה $f(x)$ המקיימת $f'(2) = 4$.
 נגידר פונקציה חדשה $z(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$
 א. חשבו $z'(0.5)$.
 ב. נתון בנוסף כי f עולה. הוכחו כי z יורדת.

19) נתונה פונקציה $f(x)$ המקיים $f(1) = 2$, $f'(1) = e$

$$\text{נדיר פונקציה חדשה } z(x) = f^2(\ln x) + \frac{1}{x}$$

א. האם z עולה או יורדת בנקודת $x = e$?

ב. נתון בנוסף כי f שלילית וולגה.

מה ניתן לומר על תחומי העלייה והירידה של z ?

20) נתונה פונקציה $f(x)$ חיובית ויורדת.

$$\text{נדיר פונקציה חדשה } z(x) = \sqrt{f(x^2) + 4}$$

מי מהබאים בהכרח נכון?

א. z עולה לכל x .

ב. z יורדת לכל x .

ג. z עולה לכל $x > 0$.

ד. z יורדת לכל $x > 0$.

21) נתונה פונקציה $f(x)$, המקיים $f'(1) = e$

$$\text{נדיר פונקציה חדשה : } g(x) = x^2 + f(\ln x)$$

א. חשבו את $(e)'$.

ב. הוכיחו שהפונקציה g עולה בנקודת $x = e$.

$$\text{חסבו את הגבול} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(e+h) - g(e)}{h}$$

22) הפונקציה $f(x)$ היא אי-זוגית.

ידוע שנקודות החיתוך היחידה של $f(x)$ עם ציר ה- x היא ב- $0 = x$.

נדיר $g(x) = (f(x))^2$. איזו מבחן הטענות הבאות בהכרח לא נכונה:

א. אם f עולה בכל תחום הגדרתה אז $-g$ יש נקודות מינימום.

ב. אם f יורדת בכל תחום הגדרתה אז $-g$ יש נקודות מינימום.

ג. אם f עולה בכל תחום הגדרתה אז $-g$ אין נקודות קיצון.

23) הפונקציה $f''(x) = a \cdot f(x)$ מוגדרת וגזירה פעמיים לכל x ומקיים $f(x)$ לכל x כאשר $a < 0$.

איו מבין הטענות הבאות בהכרח לא נכונה:

- בתחום בו $f(x)$ שלילית, $f'(x)$ קמורה (קעורה כלפי מעלה).
- אם $f(x)$ חיובית בתחום מסוים אז $f'(x)$ יורדת באותו תחום.
- אם בתחום מסוים $f(x)$ עולה וחותכת את ציר x בנקודה $(0, n)$, אז שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $n = x$ הוא המקסימלי באותו תחום.
- אם לפונקציה $f(x)$ יש נקודת פיתול אז $f'(x)$ שלילית בכל תחום הגדרתה.

תשובות סופיות

$$a = -\frac{2}{3} \quad (1)$$

$$a = -4, b = 6 \quad (2)$$

$$a = -\frac{1}{3} \quad (3)$$

$$a = -1, b = 3 \quad (4)$$

$$a = 1 \quad (5)$$

$$a = \frac{2}{3}, b = -1 \quad (6)$$

$$a = 8 \quad (7)$$

$$a = \frac{1}{2}, b = 1 \quad (8)$$

$$a = -7 \quad (9)$$

$$1 \quad (10)$$

$$2 \quad (11)$$

$$3 \quad (12)$$

$$k < -2, k > 2 \quad (13)$$

$$k = \pm 2 \quad (14)$$

$$-2 < k < 2 \quad (15)$$

(16) לא

$$x < -1, -1 < x < 1, x > 1 \quad (17)$$

$$\text{ב. שאלת הוכחה.} \quad z'(0.5) = -16. \quad \text{א.} \quad (18)$$

(19) א. עולה.
ב. יורדת.

ד (20)

ג. שאלת הוכחה. א. $2e+1$. $2e+1$. (21)

ג (22)

ד (23)

הוכחת אי שוויונות בעזרת חקירת פונקציה

שאלות

הוכיחו את אי השוויונים הבאים לגבי התחום הרשום לידם :

$$(-\infty < x < \infty), \quad 8x^3 \leq 3x^4 + 6x^2 \quad (1)$$

$$\left(0 < x < \frac{\pi}{3} \right), \quad x < 2 \sin x \quad (2)$$

$$(x > 0), \quad \sqrt{x+1} < 1 + \frac{x}{2} \quad (3)$$

$$(x \geq 0), \quad \ln(x+1) \leq x \quad (4)$$

5) נתון כי f רציפה לכל $x \geq 0$, $f'(x) > 0$, וכן $f(0) = 0$.

הוכיחו כי לכל $x > 0$ מתקיים $f(x) - \frac{1}{2}(f(x))^2 < \ln(1 + f(x))$

לתשובות מלאות בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il