

פיזיקה 1א 0400111

פרק 8 - כוח גרא וכוח ציפה

תוכן העניינים

1	.תרגולים מסכמים
4	.תרגיל - כדור נזרק לבריכה
5	.כוח ציפה
6	.כוח גרא, הסבר ודוגמה עם צחון
(לא ספר)	.כוח סטוקס

תרגילים מסכימים:

שאלות:

1) כוח גורר עם חיכוך קינטי

- גוף בעל מסה M נע על מישור אופקי ב מהירות התחלה v_0 ימינה. בין הגוף והמשור יש חיכוך קינטי וקדם החיכוך הוא μ . בנוסף פועל על הגוף כוח התנגדות של האוויר $\alpha v - f$, α קבוע.
- מצא את משוואת הכוחות על הגוף.
 - מהי מהירות הגוף בכל רגע?
 - מה מיקום הגוף בכל רגע הנח כי ברגע $t = 0$ מיקום הגוף הוא x_0 .


2) רכבת עוצרת

- רכבת שמסתה 200 טון ומהירותה 30 מ'./שנ', מתחילה לבЛОם כאשר כוח עוצר $F = \frac{N \cdot s}{m} - 4000 - 600$ פועל עלייה.

כעבור איזה מרחק תעוצר הרכבת בתנאים האלה?

3) כוח גורר ריבועי ב מהירות

- ב מהירותים גבוהות, גודל כח החיכוך שפועל האוויר על כדור הוא: $F_d = kv^2$.
- מצאו את המהירות הסופית של כדור הנופל מגובה רב.
 - מהי תאוצת הכדור כאשר מהירותו שווה לחצי מהירותו התחלהית אם הכדור בדרכו לעלה?
 - מהי תאוצת הכדור כאשר מהירותו שווה לחצי מהירותו התחלהית אם הכדור בדרכו למטה?



4) כוח גורר מתכונתי ל מהירות בששית

- קליע בעל מסה m נורה מלוע רובה ועובד דרך בול עץ בעובי H המקובע במקום. בכניסה לבול העץ מהירות הקליע v_0 וביציאה v_1 .

ב מהלך התנועה בתוך העץ פועל על הקליע כוח מתכונתי ל מהירות בששית $f = -kv^3$, k קבוע.

נתון כי הקליע חודר לבול העץ במקביל לקרקע וכי ההשפעה של כוח הכביד על תנועת הקליע זניחה.

- א. מצא את מהירות הקליע כתלות בזמן בתוך בול העץ.
- ב. מהו מיקום הקליע כתלות בזמן בתוך בול העץ?
- ג. מהי מהירות הקליע בתוך הבול לאחר זמן אורך ביחס ל- $\frac{m}{kv_0^2}$
- ד. בטא את מהירות היציאה כתלות ב מהירות הכניסה, אורך הבול, מסת הקליע, ומקדם החיכוך.

5) צוללת

צוללת שمسתה 20 טון שטה בכיוון אופקי ב מהירות 10 מ"שנ".
ברגע מסוים, הצוללת מכבה את מנועה. מרגע זה פועל על הצוללת כוח עצירה
בנתoon בביטוי: $\hat{F} = -\hat{v}^2 g$, כאשר \hat{v} זה וקטור היחידה בכיוון התנועה.
זהו הכוח היחיד הפועל על הצוללת. הניחו כי בכיוון האנכי אין תנועה.
נתון כי 5 דקoot לאחר כיבוי המנוע מהירות הצוללת קטנה פי 4.
א. מהי מהירות הצוללת כפונקציה של הזמן?
ב. חשב את הקבוע \hat{g} .
ג. מהו המרחק שעברה הצוללת בחמש הדקות מרגע כיבוי המנוע?

6) סירה עם כוח גור אקספוננציאלי

סירה שמסתה 50 ק"ג החלה את תנועתה ב מהירות 5 מ"שנ' וモआת על ידי כוח
חיכוך הנתון בנוסחה: $\hat{F} = -2e^{0.5v} m$. יחידות המידה mks, v מהירות הגוף.
הנה שכוח החיכוך הוא הכוח היחיד הפועל על הסירה.
א. כמה זמן יעבור עד לעצירת הסירה?
ב. מהי מהירות הגוף בחצי מהזמן הנ"ל?

תשובות סופיות:

$$v(t) = \left(-\mu g + \left(\mu g + \frac{\alpha}{m} v_0 \right) e^{-\frac{\alpha}{m} t} \right) \frac{m}{\alpha} . \quad \text{ב} \quad \sum F_x = ma . \quad \text{א} \quad (1)$$

$$x(t) = \frac{m}{\alpha} \left((-\mu g)t + \left(\mu g + \frac{\alpha}{m} v_0 \right) \left(\frac{1}{-\frac{\alpha}{m}} \right) e^{-\frac{\alpha}{m} t} \right) + C , \quad C = x_0 + \left(\frac{m}{\alpha} \right)^2 \left(\mu g + \frac{\alpha}{m} v_0 \right) . \quad \lambda$$

$$x(t) \approx 6.1 \text{ km} \quad (2)$$

$$a = \frac{3}{4}g . \quad \text{ב} \quad a = \frac{5}{4}g . \quad \text{ב} \quad v = \sqrt{\frac{mg}{k}} . \quad \text{א} \quad (3)$$

$$x(t) = \frac{m}{k} \sqrt{\frac{2k}{m}} t + \frac{1}{v_0^2} - \frac{m}{kv_0} . \quad \text{ב} \quad v(t) = \frac{1}{\sqrt{\frac{2k}{m} t - \frac{1}{v_0^2}}} . \quad \text{א} \quad (4)$$

$$v(t) = \frac{1}{\frac{kH}{m} + \frac{1}{v_0}} = v_2 . \quad \text{ט} \quad v(t) \approx \frac{1}{\sqrt{\frac{2kt}{m}}} . \quad \lambda$$

$$\Delta x = 1.39 \cdot 10^3 \text{ m} . \quad \lambda = 20 \frac{\text{kg}}{\text{m}} . \quad \text{ב} \quad v(t) = \frac{1}{0.1 + 10^{-3}t} . \quad \text{א} \quad (5)$$


$$v\left(t = \frac{45.9}{2}\right) \approx 1.23 \frac{\text{m}}{\text{sec}} . \quad \text{ב} \quad t = 45.9 \text{ sec} . \quad \text{א} \quad (6)$$

כדור נזרק לבריכה:

שאלות:

1) כדור נזרק לבריכה

כדור נזרק לתוך בריכה עם מהירות ההתחלתית v_0 בזווית θ עם פני המים.
נתונים :



צמיגות המים - g.

רדיוויס הכדור - R.

מהירות ההתחלתית - v_0 .

צפיפות המים - ρ_w .

צפיפות הכדור - ρ_b .

א. רשמו את המשוואת התנועה של הכדור.

ב. מצאו את המהירות הסופית של הכדור.

ג. מצאו את העומק המקסימלי אליו יגיע הכדור אם $\rho_b < \rho_w$.

תשובות סופיות:

(1) א. משוואות התנועה הן : $-kv_x = m \frac{dv_x}{dt}$ ו- $C - kv_y = m \frac{dv_y}{dt}$

כאשר : $m = \rho_b \frac{4\pi R^3}{3}$, $C = (\rho_b - \rho_w)g \frac{4\pi R^3}{3}$, $k = 6\pi \eta R$

$$\text{ב. } v_{y\ final} = \frac{C}{k}, v_{x\ final} = 0$$

$$\text{ג. } y_{max} = \frac{mc}{k^2} \left[\frac{v_0 k}{C} \sin \theta - \ln \left(\frac{C}{C - kv_0 \sin \theta} \right) \right]$$

כוח ציפה

רקע

כוח ציפה – כוח הפועל על גוף בנוזל. כיוונו הפוך לכוח הכבוד.

$$F_b = \rho V g$$

כאשר ρ היא צפיפות הנוזל ו- V הוא נפח הגוף.

כוח סטוקס – כוח הפועל על כדור הנע בנוזל

$$\vec{F} = -6\pi\eta R\vec{v}$$


כאשר η היא צמיגות הנוזל, R הוא רדיוס הכדור ו- v הוא וקטור המהירות.

שאלות

1) שני כדורים קשורים בחוט בתוך המים

שני כדורים בעלי נפח זהה $V = 20 \text{ cm}^3$ קשורים בחוט זה לזה.

מניחים את ה כדורים במים ולאחר זמן רב רואים שהמערכת התייצבה כך שכדור 1 נמצא כולו מתחת למים וruk חצי מינפחו של כדור 2 שקע לתוך המים. ראה איור.



הmassה של כדור 1 גדולה פי 4 מזו של כדור 2.

א. מהי massה של כל כדור?

ב. מהי צפיפות massה של כל כדור?

תשובות סופיות

$$\rho_1 = 1.2 \frac{\text{gr}}{\text{c.m}^3}, \rho_2 = 0.3 \frac{\text{gr}}{\text{c.m}^3} \quad \text{ב.} \quad m_1 = 24 \text{ gr}, m_2 = 6 \text{ gr} \quad \text{א.} \quad (1)$$

כוח גרר, הסבר ודוגמה עם צנחן

רקע

כוח גרר הוא כוח מהצורה

$$\vec{F} = -k\vec{v}$$

כאשר \vec{v} היא מהירות הגוף ו- k הוא קבוע כלשהו.

שאלות



1) הסבר ודוגמה עם צנחן

צנחן קופץ ממטוס ופותח מצנחת.

נתון כי כוח החיכוך עם האוויר הוא: $\vec{F} = -k\vec{v}$.

א. מצא את משוואת התנועה של הצנחן.

ב. מצא את המהירות הסופית.

ג. מצא את המהירות כפונקציה של הזמן אם הנפילה התחילה מנוחה.

תשובות סופיות

$$v(t) = \frac{mg}{k} \left(1 - e^{-\frac{k}{m}t} \right) \text{ ג.} \quad v_{final} = \frac{mg}{k} \text{ ב.} \quad \sum F_y = ma_y \text{ א. (1)}$$