

סטודנטים יקרים

לפניכם ספר תרגילים בקורס מבוא להסתברות. הספר הוא חלק מקורס חדשני ורائع מסעוג בארץ בנושא זה, המועבר ברשות האינטרנט **.On-line**.

הקורס באתר כולל **פתרונות מלאים** בספר התרגילים, וכן את התיאוריה הרלוונטית לכל נושא ונושא.

הקורס כולם מוגש בסרטוני וידאו המלווה בהסבר קולי, כך שאתם רואים את התהליכיים בצורה מובנית, שיטית ו פשוטה, ממש כפי שנעשה בשיעור פרטי, **לדוגמה לחצו כאן**.

את הקורס בנה מר בرك קנדל, מרצה מובהק במוסדות אקדמיים שונים ובעל ניסיון עתיר בהוראת המקצוע.

از אם אתם עוסקים מיידי בעבודה, סובלמים מליקיות למידה, רוצים להציגין או פשוטओhbאים ללמידה בשקט בבית, אנחנו מזמינים אתכם לחווית לימודים יוצאת דופן וחדשה לחלוטין, היכנסו עכשיו לאתר

www.gool.co.il



אנו מאמלים לכם הצלחה מלאה בבחינות

צוות האתר GooL

גול, **בשביל התרגול...**

לפתרון מלא בסרטון וידאו היכנסו ל- www.GooL.co.il
כתב ופתר - ברק קנדל ©

תוכן

פרק 1 - בעיות בסיסיות בהסתברות	4
פרק 2 - פעולות בין מאורעות (חיתוך ואיחוד), מאורעות זרים ומכלים	9
פרק 3 - קומבינטוריקה - כלל המכפלה	20
פרק 4 - קומבינטוריקה- תמורה - סידור עצמים בשורה	24
פרק 5 - קומבינטוריקה - תמורה עם עצמים זהים	28
פרק 6 - קומבינטוריקה - דגימה סידורית ללא החזרה עם החזרה	31
פרק 7 - קומבינטוריקה - דגימה ללא סדר ולא החזרה	34
פרק 8 - קומבינטוריקה - דגימה ללא סדר עם החזרה	38
פרק 9 - קומבינטוריקה - שאלות מסכימות	43
פרק 10 - הסתברות מותנית - במרחב מדגם אחד	50
פרק 11 - הסתברות מותנית - מרחב לא אחד	53
פרק 12 - דיאגרמת עצים, נסחתה בייס ונסחתה ההסתברות השלמה	57
פרק 13 - תלות ואי תלות בין מאורעות	63
פרק 14 - שאלות מסכימות בהסתברות	67
פרק 15 - המשטנה המקרי הבודד - פונקציית ההסתברות	71
פרק 16 - המשטנה המקרי הבודד - תוחלת, שונות וسطית תקן	75
פרק 17 - המשטנה המקרי הבודד - טרנספורמציה לנארוית	79
פרק 18 - תוחלת ושונות של סכום משתנים מקרים	83
פרק 19 - התפליגויות בדידות מיוודאות - התפליגות בינומית	86
פרק 20 - התפליגויות בדידות מיוודאות - התפליגות גיאומטרית	91
פרק 21 - התפליגויות בדידות מיוודאות - התפליגות אחדה	95
פרק 22 - התפליגויות בדידות מיוודאות- התפליגות פואסונית	98
פרק 23 - התפליגויות בדידות מיוודאות - התפליגות היפרגאומטרית	102
פרק 24 - התפליגויות בדידות מיוודאות - התפליגותBINOMIAL	105
פרק 25 - קירוב פואסוני להתפליגות הבינומית	108
פרק 26 - המשטנה המקרי הרציף - שאלות מסכימות	111
פרק 27 - המשטנה המקרי הרציף- התפליגויות כלליות (שימוש באינטגרלים)	116
פרק 28 - התפליגויות רציפות מיוודאות- התפליגות מעירכית	125
פרק 29 - התפליגויות רציפות מיוודאות - התפליגות אחדה	129
פרק 30 - התפליגויות רציפות מיוודאות - התפליגות נורמלית	132
פרק 31 - טרנספורמציה על משתנה מקרי רציף	141
פרק 32- משתנה דו מימי בדיד - פונקציית הסתברות משותפת	144
פרק 33 - משתנה דו מימי בדיד - מתאם בין משתנים	149
פרק 34 - המשטנה המקרי הדו מימי - קומבינציות לנארוות	155
פרק 35 - קומבינציות לנארוות להתפליגות נורמלית	158
פרק 36 - מערכות חשמליות	162
פרק 37 - התפליגות מינימום ומקסימום	168
פרק 38 - אי שוויונים הסתברותיים	172

פרק 39 - התפלגות הדגימה - ממוצע המדגם ומשפט האבול המרביי	175
פרק 40 - התפלגות הדגימה- התפלגות סכום תציפות המדגם ומשפט	184
פרק 41 - התפלגות הדגימה- התפלגות מספר ההצלחות במדגם - הקרוב הנורמלי להתפלגות הבינומית	188
פרק 42 - התפלגות הדגימה - התפלגות פרופורציית ההצלחות במדגם	193

פרק 1 - בעיות בסיסיות בהסתברות

רקע:

ניסוי מקרי : תהליך לו כמה תוצאות אפשריות. התוצאה המתאפשרת נודעת רק לאחר ביצוע התהליך.
למשל : תוצאה בהטלה קובייה , מזג האוויר בעוד שבועיים .

מרחב מוגט : כלל התוצאות האפשרות בניסוי המקרי :

בホテלה קובייה : $\{1,2,3,4,5,6\}$
מזג האוויר בעוד שבועיים : { נאה, שרבי, מושלג, גשום, מעונן חלקית, אביך }

מאורע : נת קבוצה מתוק מרחב המדגם . מסומן באותיות :A,B,C,:.

בホテלה קובייה , למשל, לקבל לפחות 5 :

$B = \{2, 4, 6\}$ לקבלת תוצאה זוגית :

גודל מרחב המדגם : מספר התוצאות האפשרות במרחב המדגם :

בホテלה הקובייה : $|\Omega| = 6$

גודל המאורע : מספר התוצאות האפשרות במאורע עצמו .

בホテלה הקובייה : $|B| = 3$ $|A| = 2$

מאורע משלים : מאורע המכיל את כל התוצאות האפשרות במרחב המדגם פרט לתוצאות במאורע אותו הוא משלים :

בホテלה הקובייה : $\bar{B} = \{1, 3, 5\}$ $\bar{A} = \{1, 2, 3, 4\}$:

מרחב מדגם אחיד (סימטרי) : מרחב מדגם בו לכל התוצאות במרחב המדגם יש את אותה עדיפות , אותה סבירות למשל, קובייה הוגנת, אך לא כמו מזג האוויר בשבוע הבא.

הסתברות במרחב מודגם אחיד :

$$p(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

במרחב מודגם אחיד הסיכוי למאורע יהיה :

$$p(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{2}{6}$$

למשל, מה הסיכוי בהטלת קובייה לקבל לפחות 5?

$$p(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{3}{6}$$

מה הסיכוי בהטלת קובייה לקבל תוצאה זוגית?

הסתברות במרחב לא אחיד :

$$\frac{f}{n}$$

יותשבד לפי השכיחות היחסית :

לහلن התפלגות הציונים בכיתה מסוימת :

מספר התלמידים – השכיחות - f	הציון - X
2	5
4	6
8	7
5	8
4	9
2	10

א. מה ההסתברות שתלמיד אקראי שנבחר בכיתה קיבל את הציון 8?

$$\frac{f}{n} = \frac{2}{25} = 0.08$$

הסתברות למאורע משלים :

$$p(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

למשל, בדוגמה הקודמת הסיכוי לעبور את הבחינה יכול להיות מחושב לפי הסיכוי להיכשל :

$$p(A) = 1 - \frac{2}{25} = \frac{23}{25}$$

תרגילים:

1. מהאותיות E, F ו-G יוצרים מילה בת 2 אותיות לא בהכרח בת משמעות.
 - א. הרכיב את כל המילים האפשרות.
 - ב. רשום את המקרים למאורע :
 - A - במילה נמצאת האות E.
 - B - במילה האותיות שונות. - ג. רשום את המקרים למאורע \bar{A} .

2. מטילים זוג קוביות.
 - א. רשום את מרחב המדגם של הניסוי. האם המרחב מדגם הוא אחד?
 - ב. רשום את כל האפשרויות למאורעות הבאים :
 - A - סכום התוצאות 7.
 - C - מכפלת התוצאות 12. - ג. חשב את הסיכויים למאורעות שהוגדרו בסעיף ב.

3. בוחרים באקראי ספרה מבין הספרות 0-9.
 - א. מה ההסתברות שהספרה שנבחרה גדולה מ-5?
 - ב. מה ההסתברות שהספרה שנבחרה היא לכל היותר 3?
 - ג. מה ההסתברות שהספרה שנבחרה היא אי זוגית?

4. להלן התפלגות מספר מקלטיו הטלוויזיה שנספרו עבור כל משפחה בישוב מסוים :

מספר מקלטים	מספר משפחות
0	22
1	28
2	18
3	22
4	10

נבחרה משפחה באקראי מהישוב.

- א. מה ההסתברות שאין מקלטים למשפחה?
- ב. מה ההסתברות שיש מקלטים למשפחה?
- ג. מה ההסתברות שיש לפחות 3 מקלטים למשפחה?

5. להלן התרפלגות מספר המכוניות למשפחה בישוב "עדן" :

מספר מכוניות	מספר משפחות
0	20
1	40
2	100
3	30
4	10

נבחרה משפחה אקראיית מן היישוב.

א. מה ההסתברות שאין לה מכוניות?

ב. מה ההסתברות שבבעלות המשפחה לפחות 3 מכוניות?

ג. מה הסיכוי שבבעלונה פחות מ-3 מכוניות?

6. מטילים מטבע רגיל 3 פעמים. בצד אחד של המטבע מוטבע עץ ובצד השני פלי.

א. רשום את מרחב המודגם של הניסוי. האס המרחב מודגם הוא אחד?

ב. רשום את כל האפשרויות למאורעות הבאים:

A- התקבל פעם אחת עץ.

D- התקבל לפחות פעם אחת.

ג. מהו המאורע המשלים ל-D.

ד. חשבו את הסיכויים למאורעות שהוגדרו בסעיפים ב-ג.

פתרונותות:**שאלה 2**

$$\text{ג. חסוכי ל-} A : \frac{1}{6}$$

$$\text{חסוכי ל-} B : \frac{1}{9}$$

שאלה 3

א. 0.4

ב. 0.4

ג. 0.5

שאלה 4

א. 0.22

ב. 0.78

ג. 0.32


פרק 2 - פועלות בין מאורעות (חיתוך ואיחוד), מאורעות זרים ומכילים

רקע:

פעולת חיתוך :

נותנת את המשותף בין המאורעות הנחככים , חיתוך בין המאורע A למאורע B יסומן כך :

$$A \cap B$$



מדובר בתוצאות שנמצאות ב- A וגם ב- B.


$A = \{5, 6\}$ בהטלה קובייה , למשל, לקבל לפחות 5 :

$B = \{2, 4, 6\}$ לקבל תוצאה זוגית :

$$A \cap B = \{6\}$$

פעולת איחוד :

נותנת את כל האפשרויות שנמצאות לפחות באחת מהמאורעות. הסימן הוא : $A \cup B$



אשר נימצא ב- A או B. כלומר, לפחות אחד מהמאורעות קורה.

$A = \{5, 6\}$ בהטלה קובייה , למשל, לקבל לפחות 5 :

$B = \{2, 4, 6\}$ לקבל תוצאה זוגית :

$$A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$$


דוגמה (הפתרו נמצא בהקלטה)

סטודנט ניגש בסמסטר לשני מבחנים. מבחן בסטטיסטיקה ו מבחן בכלכלה. ההסתברות שלו לעبور את המבחן בסטטיסטיקה הוא 0.9. ההסתברות שלו לעبور את המבחן בכלכלה הוא 0.8. ההסתברות לעبور את המבחן בסטטיסטיקה ובכלכלה היא 0.75.

- א. מה ההסתברות שלו לעبور את המבחן בסטטיסטיקה בלבד?
- ב. מה ההסתברות שלו להיכשל בשני המבחנים?
- ג. מה ההסתברות לעبور לפחות מבחן אחד?

נוסחת החיבור לשני מאורעות :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



חוקי דה מורגן לשני מאורעות:

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

$$P(A \cap B) = 1 - P(\bar{A} \cup \bar{B})$$


$$P(A \cup B) = 1 - P(\bar{A} \cap \bar{B})$$

שיטת ריבוע הקסם :

השיטה רלבנטית רק אם יש שני מאורעות במקביל בדומה לתרגיל הקודם :

	\bar{A}	A	
B	$P(\bar{A} \cap B)$	$P(A \cap B)$	$P(B)$
\bar{B}	$P(\bar{A} \cap \bar{B})$	$P(A \cap \bar{B})$	$P(\bar{B})$
	$P(\bar{A})$	$P(A)$	1

מאורעות זרים : מאורעות שאין להם מהמשותף : לא יכולים להתרחש בו זמנית.



$$A \cap B = \{\}$$

$$P(A \cap B) = 0$$


$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

למשל , בהטלה קובייה

$$A = \{5, 6\} \quad \text{לקבל לפחות 5 :}$$

$$B = \{3\} \quad \text{לקבל 3 :}$$

$$A \cap B = \{\}$$

מאורעות מכילים :

מאורע A מכיל את מאורע B כל התוצאות שנמצאות ב- B מוכילות בתחום המאורע- A .

$$B \subset A$$

$$A \cap B = B$$

$$A \cup B = A$$

$$P(A \cap B) = P(B)$$

$$P(A \cup B) = P(A)$$

למשל :

$$A = \{2, 4, 6\}$$

$$B = \{2, 4\}$$

תרגילים:

1. מהאותיות E, F ו-G יוצרים מילה בת 2 אותיות לא בהכרח בת משמעות.
נגידר את המאורעות הבאים :
- E - במילה נמצאת האות E.
 - F - במילה אותיות שונות.
 - A. רשום את כל האפשרויות לחיתוך A עם B.
 - B. רשום את כל האפשרויות לאיחוד של A עם B.
2. תלמיד ניגש בסMASTER לשני מבחנים מבחן בכלכלה ומבחן בסטטיסטיקה. נגידר את המאורעות הבאים :
- A - עברו את המבחן בסטטיסטיקה.
 - B - עברו את המבחן בכלכלה.
- העזר בפעולות חיתוך, איחוד ומשלים בלבד כדי להגידר את המאורעות הבאים וסמן בדיאגרמת ווּן את השטח המתאים :
- A. התלמיד עבר רק את המבחן בכלכלה.
 - B. התלמיד עבר רק את המבחן בסטטיסטיקה.
 - C. התלמיד עבר את שני המבחנים.
 - D. התלמיד עבר לפחות אחד.
 - E. התלמיד נכשל בשני המבחנים.
 - F. התלמיד נכשל בכלכלה.
3. נתבקשתם לבחור ספרה באקראי. נגידר את A להיות הספרה שנבחרה היא זוגית. נגידר את B להיות הספרה שנבחרה קטנה מ-5.
- A. רשמו את כל התוצאות למאורעות הבאים :
- $A =$
 $B =$
 $\bar{B} =$
 $A \cap B =$
 $A \cup B =$
- ב. חשבו את ההסתברויות לכל המאורעות מהסעיף הקודם.

4. נסמן ב- Ω את מרחב המדגם וב- ϕ קבוצה ריקה.

נתון כי A הינו מאורע בתחום מרחב המדגם.

להלן מוגדרים מאורעות שפתרונותם הוא Ω או ϕ או A .

קבע עבור כל מאורע מה הפתרון שלו.

$$\bar{A}$$

$$A \cap \phi$$

$$A \cup \phi$$

$$A \cap \Omega$$

$$A \cup \Omega$$

$$A \cap \bar{A}$$

$$\bar{\phi}$$

$$A \cup \bar{A}$$

5. הוגדרו המאורעות הבאים :

A = אדם שגובהו מעל 1.7 מטר

B = אדם גובהו מתחת ל- 1.8 מטר

קבע את גובהם של האנשים הבאים :

$$A \cap B$$

$$A \cup B$$

$$\bar{A} \cap B$$

$$\bar{A} \cup \bar{B}$$

$$\bar{A}$$

6. נגידר את המאורעות הבאים :

- A- אדם דובר עברית.
- B- אדם דובר ערבית.
- C- אדם דובר אנגלית.

השתמש בפעולות איחוד, חיתוך והשלמה לתיאור המאורעות הבאים :

א. אדם דובר את כל שלוש השפות.

ב. אדם דובר רק עברית.

ג. אדם דובר לפחות שפה אחת מתוך השפות הללו.

ד. אדם איינו דובר אנגלית.

ה. קבוצת התלמידים דוברי 2 שפות בדיק (מהשפות הניל').

7. שתי מפלגות רצות לכנסת הבאה. מפלגת "גדר" תעבור את אחוז החסימה בהסתברות של 0.08. מפלגת עתיד תעבור את אחוז החסימה בהסתברות של 0.20. בהסתברות של 76% שתי המפלגות לא תעבורנה את אחוז החסימה.

א. מה ההסתברות שלפחות אחת מהמפלגות תעבור את אחוז החסימה?

ב. מה ההסתברות שתשתי המפלגות תעבורנה את אחוז החסימה?

ג. מה ההסתברות שרק מפלגות "עתיד" תעבור את אחוז החסימה?

8. במקומות העבודה מסויים 40% מהעובדים הם גברים. כמו כן 20% מהעובדים הם אקדמיים. 10% מהעובדים הין נשים אקדמיות.

א. איזה אחוז מהעובדים הם גברים אקדמיים?

ב. איזה אחוז מהעובדים הם גברים או אקדמיים?

ג. איזה אחוז מהעובדים הם נשים לא אקדמיות?

9. הסיכוי של מניה A לעלות הנו 0.5 ביום מסוים והסיכוי של מניה B לעלות ביום מסוים הנו 0.4. בסיכוי של 0.7 לפחות מהמניות תעליה ביום מסוים. חשב את ההסתברויות הבאות לגבי שתתי המניות הללו ביום מסוים :

א. שתתי המניות תעלנה.

ב. שאף אחת מהמניות לא תעלנה.

ג. שמניה A בלבד תעללה.

10. מטילים זוג קופיות אדומה ושחורה. נגידר את המאורעות הבאים :

A-בקופייה האדומה התקבלה התוצאה 4 ובשחורה 2.

B-סכום התוצאות משתי הקופיות 6.

C-מכפלת התוצאות בשתי הקופיות 10.

א. האם A ו-B מאורעות זרים?

ב. האם המאורע B מכיל את המאורע A?

ג. האם A ו-C מאורעות זרים?

ד. האם A ו-C מאורעות משלימים?

11. עברו המאורעות A ו-B ידועות ההסתברויות הבאות :

$$p(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0.1 \quad p(B) = 0.3 \quad p(A) = 0.6$$

א. האם A ו-B מאורעות זרים?

$$p(\bar{A} \cap B)$$

12. מטבח הוטל פעמיים. נגידר את המאורעות הבאים :

A-קיבלו עץ בהטלה הראשונה.

B-קיבלו לפחות עץ אחד בשתי ההטלות.

איזו טענה נכונה?

א. A ו- B מאורעות זרים.

ב. A ו- B מאורעות משלימים.

ג. B מכיל את A.

ד. A מכיל את B.

13 . בהגרלה חולקו 100 כרטיסים על 3 מהם רשום חופשה ועל 2 מהם רשום מחשב שאר הkartisim ריקים. אדם קיבל כרטיס אקראי.

א. מה הסיכוי לזכות בחופשה או במחשב? האם המאורעות הללו זרים?

ב. מה ההסתברות לא לזכות בפרס?

$$P(A) = 0.3$$

$$P(B) = 0.25$$

$$P(A \cup B) = 0.49$$

א. חשב את הסיכוי ל-

ב. האם A ו- B מאורעות זרים?

ג. מה ההסתברות שرك A יקרה או רק B יקרה?

.15 $2 \cdot P(B \cap \bar{A}) = P(A \cap \bar{B}) = P(\bar{A} \cap \bar{B})$: נתנו ש A ו- B מאורעות זרים. מה הסיכוי למאורע A ומה ההסתברות למאורע B ?

.16 קבע אילו מהטענות הבאות נכונות:

א. $A \cap B = B \cap A$

ב. $\overline{A \cup B} = A \cap \bar{B}$

ג. $A \cap B \cap C = A \cap B \cap (C \cup B)$

ד. $\overline{A \cap B \cap C} = \bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}$

.17 נתנו ש $P(B)=0.2$ ו- $P(A)=0.3$ – ו- A ו- B מאורעות במרחב מדגם. מה הסיכוי ל-

א. האם יתכן ש- $p(A \cup B) = 0.4$?

ב. האם יתכן ש- $p(A \cup B) = 0.6$?

ג. אם A ו- B זרים מה הסיכוי ל-

ד. אם A מכיל את B מה הסיכוי ל-

- .18. מתוך אזרחי המדינה הבוגרים ל- 30% חשבו בבנק הפעלים. ל- 28% חשבו בבנק לאומי ול- 15% חשבו בבנק מזרחי. כמו כן נתנו כי 6% מחזיקים חשבו בבנק לאומי ובבנק הפעלים. ל- 5% חשבו בבנק פועלים ומזרחי. ול- 4% חשבו בבנק לאומי ומזרחי. כמו כן ל- 1% מהאוכלוסייה הבוגרת חשבו בנק בשלושת הבנקים יחד.
- מה אחוז האזרחים להם חשבו בבנק לאומי בלבד?
 - מה ההסתברות שאזרח כלשהו יחויק חשבו בנק פועלים ולאומי אבל לא בנק מזרחי?
 - מה ההסתברות שלאזרח יהיה חשבו בפועלים או במזרחי אבל לא בנק לאומי?
 - מה אחוז האזרחים שיש להם חשבו בנק אחד בלבד?
 - מה אחוז האזרחים שיש להם לבדוק חשבו בשני בנקים בלבד?
 - מה ההסתברות שלאזרח בוגר אין חשבו בנק אף אחד מהבנקים הללו?
 - לפחות אחוז מהאזורים יש חשבו בנק לפחות אחד מהבנקים הללו?

- .19. חברת מסויימת פרסמה את הנתונים הבאים לגבי האזרחים מעל גיל 21. הנתונים שהתקבלו היו : 40% מהאנשים מחזיקים כרטיס "ויזה", 52% מחזיקים כרטיס "ישראלכרט", 20% מחזיקים כרטיס "אמריקן אקספרס", 15% מחזיקים כרטיס ויזה וגם ישראכרט, 8% מחזיקים כרטיס ישראלכרט וגם אמריקן אקספרס ו- 7% מחזיקים כרטיס ויזה וגם אמריקן אקספרס. כמו כן, 13% לא מחזיקים באף אחד שלושת הcredיטיסים הנ"ל.
- מה אחוז מחזיקי שלושת כרטיס האשראי גם יחד?
 - מה אחוז מחזיקי ישראלכרט וויזה אך לא את אמריקן אקספרס?
 - מה אחוז מחזיקי כרטיס אחד בלבד?

$$p(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A) - P(B) + P(A \cap B) \quad .20. \text{ הוכח :}$$

- .21. $A \cup B$ מאורעות במרחב המודגם האם נכוון לומר שהסיכוי שיתறחש בבדיקה מאורע אחד הוא : $P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$

פתרונותות:**שאלה 7**

- א. 0.24
ב. 0.04
ג. 0.16

שאלה 8

- א. 10%
ב. 50%
ג. 50%

שאלה 9

- א. 0.2
ב. 0.3
ג. 0.3

שאלה 10

- א. לא.
ב. כן.
ג. כן.
ד. לא.

שאלה 11

- א. כן
ב. 0.3

שאלה 12

התשובה הנכונה ג

שאלה 13

- א. 0.05
ב. 0.95

שאלה 14

- א. 0.06
ב. לא זרים
ג. 0.43

שאלה 18

- א. 0.19.
ב. 0.05.
ג. 0.31.
ד. 0.46.
ה. 0.12.
ו. 0.41.
ז. 0.59.

פרק 3 - קומבינטוריקה - כלל המכפלה

רקע:

כלל המכפלה:

כלל המכפלה הוא כלל שבאמצעותו אפשר לחשב את גודל המאורע או גודלו של מרחב המדגמים.

אם לתחילה יש k שלבים : n_1 אפשרויות לשלב הראשון , n_2 אפשרויות לשלב השני ... n_k אפשרויות לשלב k :

מספר האפשרויות לתחילה כולם יהיה : $n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 \cdots n_k$

למשל, כמה אפשרויות יש למשחק בו מטילים קובייה וגם מטבע? (הסביר בהקלטה)

למשל, כמה לווחיות רישוי בני 5 תווים ניתן ליצור כאשר התו הראשון הוא אות אנגלי והיתר ספרות? (הסביר בהקלטה)

תרגילים:

- .1. חשבו את מספר האפשרויות לתהליכיים הבאים :
- הטלת קובייה פעמיים.
 - מספר תלת ספרתי.
 - בחירה בין ובת מכתה שיש בה שבעה בניים ועשר בנות.
 - חלוקת שני פרסים שונים לעשרה אנשים שונים כאשר אדם לא יכול לקבל יותר מפרס אחד.
- .2. בمساعدة מציעים ארוחה עסקית. בארוחה עסקית יש לבחור מנה ראשונה, מנה עיקרית ושתייה. האופציות למנה ראשונה הן : סלט ירקות, סלט אנטייפסטי ומרק היום. האופציות למנה עיקרית הן : סטיק אנטרכוט, חזז עוף בגריל, לוזניה בשנית ולוזניה צמחונית. האופציות לשתייה הן : קפה, תה וليمונדה.
- כמה ארוחות שונות ניתן להרכיב בעזרת התפריט הזה?
 - אדם מזמין ארוחה אקראיית. חשב את ההסתברויות הבאות :
 - בארוחה סלט ירקות, לוזניה בשנית וליימונדה.
 - בארוחה סלט, לוזניה וטה.
- .3. בוחרים באקראי מספר בין חמיש ספרות. חשבו את ההסתברויות הבאות :
- המספר הוא זוגי.
 - במספר כל הספרות שוונות.
 - במספר כל הספרות זהות.
 - במספר לפחות שתי ספרות שוונות.
 - במספר לפחות שתי ספרות זהות.
 - המספר הוא פליינדרום (מספר הנקרא מימין ומשמאלו באותה צורה).
- .4. חמישה אנשים אקראיים נכנסו למעלית בבניין בן 8 קומות. חשבו את ההסתברויות הבאות :
- כולם ירדו בקומת החמישית?
 - כולם ירדו באותו קומה?
 - כולם ירדו בקומת אחרת?
 - ערן ודני ירדו בקומת הששית והיתר בשאר הקומות?

5. במלגה חמישה עשר חברי כניסה. יש לבחור שלושה חברי כניסה לשילושה תפקידים שונים. בכמה דרכים ניתן לחלק את התפקידים אם :

א. חבר כניסה יכול למלא יותר מ תפקיד אחד.

ב. חבר כניסה לא יכול למלא יותר מ תפקיד אחד.

6. מטילים קובייה 4 פעמים.

א. מה ההסתברות שכל התוצאות תהיינה זהות?

ב. מה ההסתברות של התוצאות תהיינה שונות?

ג. מה ההסתברות שלפחות שתי תוצאות תהיינה זהות?

ד. מה ההסתברות שלפחות שתי תוצאות תהיינה שונות?

7. יש לייצור מילה בת חמיש אותיות לא בהכרח עם משמעותיות מסוימת ה- ABC (26 אותיות) בת 5 אותיות.

א. מה ההסתברות שבמילה שנוצרה אין אותיות D, A ו L?

ב. מה ההסתברות שבמילה שנוצרה כל האותיות זהות?

ג. מה ההסתברות שבמילה שנוצרה לפחות שתי אותיות שונות זו מזו?

ד. מה ההסתברות שהמילה היא פלינדרום (מילה אשר ממשאלليمין, ומימין לשמאן נקראת אותו הדבר).

8. יוצרים קוד עם 2 ספרות (モוטר לחזור על אותה ספרה בקוד). חשבו את ההסתברויות הבאות : (בטאו את תשובותיכם באמצעות a)

א. בקוד אין את הספרה 5.

ב. בקוד מופיעה הספרה 3.

ג. בקוד לא מופיעות ספרות אי זוגיות.

9. במשחק מזל יש למלא טופס בו ח משבצות. כל משבצת מסומנת בסימון V או בסימון X. בכמה דרכים שונות ניתן למלא את טופס המשחק המזל?

פתרונות: **שאלה 2**

- A. 36
B. 1/36 .1
C. 1/9 .2

 שאלה 1

- A. 36
B. 900
C. 70
D. 90

 שאלה 4

- A. 0.00003
B. 0.00024
C. 0.20508
D. 0.01047

 שאלה 3

- A. 0.5
B. 0.3024
C. 0.0001
D. 0.9999
E. 0.6976
F. 0.01

 שאלה 6

- A. 1/216
B. 5/18
C. 13/18
D. 215/216

 שאלה 5

- A. 3,375
B. 2,730

 שאלה 9

$$2^n$$

 שאלה 7

- A. 0.5417
B. $\frac{1}{26^4}$
C. 0.0015

פרק 4 - קומבינטוריקה - תמורה - סידור עצמים בשורה

רקע:

تمורה:

מספר האפשרויות לסדר n עצמים שונים בשורה :

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (n-1) \cdot n$$

$$0! = 1$$

למשל , בכמה דרכים שונות ניתן לסדר את האותיות a,b,c,d ? (הਪתרון בהקלטה)

למשל , בכמה דרכים שונות ניתן לסדר את האותיות a,b,c,d , כך שהאותיות b,a יהיו ברצף?

(הਪתרון בהקלטה)

למשל , בכמה דרכים שונות ניתן לסדר את האותיות a,b,c,d , כך שהאותיות b,a יופיעו בתור

הרצף ba ? (הপתרון בהקלטה)

תרגילים:

1. חשבו בכמה אופנים :
 - א. אפשר לסדר 4 ספרים שונים על מדף?
 - ב. אפשר לסדר חמישה חילילים בטור?

2. סיידרו באקראי 10 דיסקים שונים על מדף שמתוכם שניים בשפה העברית.
 - א. מה ההסתברות שהדיסקים בעברית יהיו צמודים זה לזה?
 - ב. מה ההסתברות שהדיסקים בעברית לא יהיו צמודים זה לזה?
 - ג. מה ההסתברות שני הדיסקים בעברית יהיו כל אחד בקצת השני של המדף?

3. בוחנים 5 בניים ו-4 בנות בכיתה ומדרגים אותם לפי הציון שלהם בבחינה. נניח שאין תלמידים להם אותו ציון.
 - א. מהו מספר הדירוגים האפשריים?
 - ב. מהו מספר הדירוגים האפשריים, אם מדרגים בניים ובנות בנפרד?

4. מסדרים 10 ספרים שונים על מדף.
 - א. בכמה אופנים ניתן לסדר את הספרים על המדף?

שני ספרים מתוך ה-10 הם ספרים בסטטיסטיקה.

 - ב. מה ההסתברות שאם נסדר את הספרים באקראי, הספרים בסטטיסטיקה יהיו צמודים זה לזה?
 - ג. מה ההסתברות שהספרים בסטטיסטיקה לא יהיו צמודים זה לזה?
 - ד. מה ההסתברות שהספרים בסטטיסטיקה יהיו בקצת המדף (כל ספר בקצת אחר)?

5. אדם יצר בגן שלו פלייליסט (רשימת השמעה) של 12 שירים שונים. 4 בשפה העברית, 5 באנגלית ו-3 בצרפתית. האדם הרץ את הפלייליסט באקראי.
 - א. מה ההסתברות שכל השירים באנגלית יופיעו כשירים הראשונים במקשאה אחרת?
 - ב. מה ההסתברות שכל השירים באנגלית יופיעו ברכז (לא חובה ראשונים)?
 - ג. מה ההסתברות שהשירים באותה השפה יופיעו ברכז (כלומר כל השירים באנגלית ברכז, כל השירים בעברית ברכז וכן גם השירים בצרפתית)?

- . 6. 4 בנים ו-4 בנות התיישבו באקראי בשורת קולנוע בכיסאות 8-1.
- א. מה ההסתברות שיושי ומיכל לא ישבו זה לצד זה?
 - ב. מה ההסתברות שהבניים יתיישבו במקומות האיזוגיים?
 - ג. מה ההסתברות שכל הבנים ישבו זה לצד זה והבנות תשנה זו לצד זו?
 - ד. מה ההסתברות שהבניים ישבו זה לצד זה והבנות תשנה זו לצד זו?

פתרונותות : **שאלה 1**

- א. 24
ב. 120

 שאלה 2

- א. 0.2
ב. 0.8
ג. 0.022

 שאלה 3

- א. 362,880
ב. 2,880

 שאלה 4

- א. 3,628,800
ב. 0.2
ג. 0.8
ד. $\frac{1}{45}$

 שאלה 5

- א. $\frac{1}{792}$
ב. $\frac{1}{99}$
ג. $\frac{1}{4620}$

 שאלה 6

- א. 0.75
ב. 0.014
ג. $\frac{1}{14}$
ד. $\frac{1}{35}$

פרק 5 - קומבינטוריקה - תמורה עם עצמים זהים

רקע:

תמורה עם חוזרות :

אם יש בין העצמים שיש לסדר עצמים זהים יש לבטל את הסידור הפנימי שלהם על ידי חלוקה בסידורים הפנימיים שלהם.

מספר האופנים לסדר n עצמים בשורה , ש- n_1 מהם זהים מסוג 1 , n_2 זהים מסוג 2, ..., n_r זהים מסוג r :

$$\frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_r!}$$

למשל ,

כמה מילימס ניתן ליצור מכל האותיות הבאות : W W T T K K ? (תשובה בהקלטה)

תרגילים:

1. במשחק יש לצבע שתי משבצות מתוך המשבצות הבאות :



בכמה דרכים שונות ניתן לבצע את הצביעה?

2. בכמה אופנים שונים אפשר לסדר בשורה את האותיות ב ע ע ב ע ג ?

3. בבית נורות מקום ל-6 נורות. בחרו שתי נורות אדומות, שתי נורות צהובות ושתן נורות כחולות.
כמה דרכים שונות יש לסדר את הנורות?

4. רוצים ליצור מספר מכל הספרות הבאות : 1,2,2,2,6
כמה מספרים ככל אפשר ליצור?

5. במשחק בול פגיעה יש 10 משבצות, אדם צובע 4 משבצות מתוך ה-10. המשתנה השני צריך לנחש אילו 4 משבצות נצבעו. מה ההסתברות שבניחסו אחד יהיה בול פגעה?

6. כמה אותות שונים , שכל אחד מורכב מ 10 דגמים שונים ניתן ליצור אם 4 דגמים הם לבנים , 3 כחולים , 2 אדומים ואחד שחור. דגמים שווי צבע זהים זה לזה לחלוtein.

פתרונות:

90 .3

20 .4

$$\frac{1}{210} .5$$

12,600 .6

פרק 6 - קומבינטוריקה - דגימה סידורית ללא החזרה ועם החזרה

רקע:

מבחן סדור בדגם עם החזרה

מספר האפשרויות בדגם k עצמים מתוך n עצמים שונים כאשר הדגם היא עם החזרה והמבחן סדור הוא : n^k .

למשל, בוחרים שלושה תלמידים מתוך עשרה ליצג ועד בו תפקידים שונים, תלמיד יכול למלא יותר מתפקיד אחד. כמה ועדיים שונים ניתן להרכיב?

$$n = 10$$

$$k = 3$$

$$10^3 = 1,000$$

מבחן סדור ללא החזרה

מספר האפשרויות בדגם k עצמים שונים מתוך n עצמים שונים ($n \geq k$) כאשר המדגם סדור ואין החזרה של עצמים נדגים הינו :

$${(n)}_k = n(n-1)(n-2) \cdots (n-(k-1)) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

למשל, שלושה תלמידים נבחרים מתוך 10 ליצג ועוד בו תפקידים שונים. תלמיד לא יכול למלא יותר מתפקיד אחד.

$$\frac{10!}{7!} = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$$

תרגילים:

1. במפלגה 20 חברים כניסה, מעוניינים לבחור שלושה חברים כניסה לשותה שלושה תפקידים שונים.
 א. חבר כניסה יכול למלא יותר מ תפקיד אחד. כמה קומבינציות ישן לחלוקת התפקידים?
 ב. חבר כניסה לא יכול למלא יותר מ תפקיד אחד. כמה קומבינציות יש לחלוקת התפקידים?

2. במשחק מזל יש 4 משבצות ממושפרות מ-D A עד (A עד D). בכל משבצת יש למלא ספרה (9-0). הזוכה הוא זה שניחס נכונה את כל הספרות בכל המשבצות בהתאם.
 א. מה ההסתברות לזכות המשחק?
 ב. מה ההסתברות שבאף משבצת לא תהיה את הספרה 3 במספר הזוכה?
 ג. מה ההסתברות שהתוכאה 4 תופיע לפחות פעם אחת במספר הזוכה?

3. קבוצה מונה 22 אנשים, מה ההסתברות שלפחות לשניים מהם יהיה יום הולדת באותו התאריך?

4. שלושה אנשים קבעו להיפגש במלון הילטון בסינגפור. הבעה היא שבסינגפור ישם 5 מלונות הילטון.
 א. מה ההסתברות שככל השלושה ייפגשו?
 ב. מה ההסתברות שככל אחד יגיע לבית מלון אחר?

5. בכיתה 40 תלמידים. מעוניינים לבחור חמישה מהם לוועד כיתה. בכמה דרכים ניתן להרכיב את הוועד אם:
 א. בוועד 5 תפקידים שונים ותלמיד יכול למלא יותר מ תפקיד אחד.
 ב. בוועד 5 תפקידים שונים ותלמיד לא יכול למלא יותר מ תפקיד אחד.

פתרונותות :**שאלה 1 :**

א. 8000

ב. 6840

שאלה 2 :

א. 0.0001 .

ב. 0.6561 .

ג. 0.3439

שאלה 3 :

0.476

שאלה 4 :

א. 0.04 .

ב. 0.48 .

פרק 7 - קומבינטוריקה - דוגמה ללא סדר ולא חוזרת

רקע:

مثال לא סדר בדוגמה ללא חוזרת

מספר האפשרויות לדגום k עצמים שונים מתוך n עצמים שונים כאשר אין משמעות
לסדר העצמים הנדתיים ואין חוזרת:

$$\frac{n!}{(n-k)!k!} = \binom{n}{k} = \frac{(n)_k}{k!}$$

דוגמה

מתוך 10 תלמידים יש לבחור שלושה נציגים לוועד ללא תפקידים מוגדרים:

$$\binom{10}{3} = \frac{10!}{7!3!} = 120$$

הערות

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} .1$$

$$\binom{n}{n-1} = \binom{n}{1} = n .2$$

$$\binom{n}{n} = \binom{n}{0} = 1 .3$$

תרגילים:

1. בכיתה 15 בנות ו-10 בניים. יש לבחור 5 תלמידים שונים מהכיתה לנציגות הכיתה. בכמה דרכים אפשר להרכיב את הנציגות אס-

 - א. אין שום הגבלה לבחירה.
 - ב. מעוניינים ש-3 בנות ו-2 בניים ירכיבו את המשלחת.
 - ג. לא יהיו בניים במשלחת.

2. סטודנט מעוניין לבחור 5 קורסי בחירה בסמסטר זה. לפני רשימה של 10 קורסים לבחירה :
 - 5 במקצועות מדעי הרוח.
 - 3 במקצועות מדעי החברה.
 - 2 מתחומי המתמטיקה.
 - א. כמה בחירות שונות הוא יכול ליצור לעצמו?
 - ב. כמה בחירות יש לו בהן 3 קורסים הם מדעי הרוח?
 - ג. כמה בחירות יש לו אם 2 מהן לא מדעי הרוח?
 - ד. כמה בחירות יש לו אם 2 מדעי הרוח, 2 מדעי החברה ו-1 מתמטיקה?
3. בכיתה 30 תלמידים מתוכם 12 תלמידים ו-18 תלמידות. יש לבחור למשלחת 4 תלמידים מהכיתה. התלמידים נבחרים באקראי.
 - א. מה ההסתברות שהמשלחת תורכב רק מבנות?
 - ב. מה ההסתברות שבמשלחת תהיה רק בת אחת?
 - ג. מה ההסתברות שבמשלחת תהיה לפחות בת אחת?
4. במשחק הלווטו יש לבחור 5 מספרים מתוך 45. המספרים הם 1-45.
 - א. מה ההסתברות שבמספר הזוכה כל המספרים הם זוגיים?
 - ב. מה ההסתברות שבמספר הזוכה יש לכל היותר מספר זוגי אחד?
 - ג. מה ההסתברות שבמספר הזוכה לפחות פעם אחת יש מספר זוגי?
 - ד. מה ההסתברות שבמספר הזוכה כל המספרים גדולים מ-30?

5. בחפיית קלפים ישנו 52 קלפים : 13 בצבע שחור בצורת עלה, 13 בצבע אדום בצורת לב, 13 בצבע אדום בצורת יהלום ו- 13 בצבע שחור בצורת תלתן. מכל צורה (מתוך ה-4) יש 9 קלפים שמספרם 10-2, שאר הקלפים הם ; נסיך, מלכה, מלך ואס (בעצם מדובר בקופסת קלפים רגילה ללא גייר). שני אנשים משחקים פוקר. כל אחד מקבל באקראי 5 קלפים (לא החזרה).

- א. מה ההסתברות שעוזד יקבל את כל המלכים וערן את כל המלכות?
- ב. מה ההסתברות שאחד השחקנים קיבל את הקלף אס-לב?
- ג. מה ההסתברות שעורך קיבל קלפים שחורים בלבד וועוד קיבל שני קלפים שחורים בדיק?
- ד. מה ההסתברות שעורך קיבל לפחות 3 קלפים שהם מספר (אס או נסיך)?

- 6. במכלה 4 מסלולי לימוד. בכל מסלול לימוד 5 מזוכירות. יש ליזור ועוד של 5 מזוכירות מתוך כלל המזוכירות במכלה. יוצרים ועוד באופן אקראי. חשבו את ההסתברויות הבאות :

 - א. כל המזוכירות בוועד יהיו ממסלול "מדעי ההתנהגות".
 - ב. כל המזוכירות בוועד יהיו מאותו המסלול.
 - ג. מכל מסלול תבחר לפחות מזכירה אחת.

- 7. הוכח כי :
$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

- 8. 2 בנינים ו- 2 בנות מתחלקים ל-2 קבוצות.

 - א. בכמה דרכים שונות ניתן לבצע את החלוקה אם שתי הקבוצות צריכות להיות שוות בגודלן ויש בכל קבוצה מספר שווה של בנינים ובנות?
 - ב. בכמה דרכים ניתן לבצע את החלוקה אם יש מספר שווה של בנינים ובנות בכל קבוצה אבל הקבוצות לא בהכרח בגודל שווה.

פתרונותות: **שאלה 2**

- א. 252
ב. 100
ג. 100
ד. 60

 שאלה 1

- א. 53,130
ב. 20,475
ג. 3003
ד.

 שאלה 4

- א. 0.02
ב. 0.187
ג. 0.972
ד. 0.00246

 שאלה 3

- א. 0.1117
ב. 0.1445
ג. 0.9819

 שאלה 8

$$\binom{2n}{n}^2 \cdot \text{א.}$$

$$\sum_{i=1}^n \binom{2n}{i}^2 \cdot \text{ב.}$$

 שאלה 6

$$6.45 \cdot 10^{-5} \cdot \text{א.}$$

$$2.58 \cdot 10^{-4} \cdot \text{ב.}$$

$$0.3225 \cdot \text{ג.}$$

פרק 8 - קומבינטוריקה - דוגמה ללא סדר ועם החזרה

רקע:

מספר האפשרויות לבחור k עצמים (לא בהכרח שונים) מתוך n עצמים שונים ללא חשיבות
לסדר העצמים הנדתיים ועצם יכול להיבחר יותר מפעם אחת :

$$\binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}$$

למשל,
בכמה דרכים שונות ניתן לחלק 4 כדורים זהים לשלווה תאימים שבכל תא יש מקום ליותר
מכדור אחד (פתרון והסביר הרעיון בהקלטה)

סיכום כללי של המקרים האפשריים לדוגמה:

מספר האפשרויות לבחירת k עצמים מתוך אוכלוסייה של n עצמים שונים			
ביצוע הדוגמה	ללא התחשבות בסדר הבחירה	עם התחשבות בסדר הבחירה	
$\binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}$		n^k	עם החזרה
$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$		$(n)_k = \frac{n!}{(n-k)!}$	ללא החזרה

תרגילים:

1. בכמה דרכים יש להכנס 8 כדורים זהים לחמשה תאים כאשר תא יכול להכיל יותר מכדור אחד?

2. בכמה אופנים ניתן להכנס 5 מחרבות זהות ל – 3 תיקים שונים?

3. בכמה אופנים ניתן להכנס 8 כדורים לתוכן 3 תאים שונים כאשר –
 א. ה כדורים זהים.
 ב. ה כדורים שונים זה מהז.

4. בכמה דרכים יש לסדר 10 משחקים ב 4 מגירות כאשר:
 א. המשחקים שונים זה מהז.
 ב. משחקים זהים זה לזה.

5. מהו מספר הפתרונות השלימים האי שליליים למשווה הבאה: $X_1 + X_2 = 3$

6. מהו מספר הפתרונות השלימים האי שליליים למשווה הבאה :

$$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 = 20$$

7. במכירה פומבית הוצגו 4 פריטי זהב זהים לחולטן . על קניית היצירות התחרו 3 אספנים.
 אספן יוכל היה לרכוש יותר ממפריט אחד. בהנחה וכל הפמותים נמכרו כמה אפשרויות מכירה לאספנים השונים ישן?

8. נתונות האותיות A , B , C ו- D רוצים לבחור שתי אותיות מתוך קבוצת האותיות הללו
 כאשר מותר לבחור אותה אות יותר מפעם אחת אבל אין חשיבות לסדר האותיות שנבחרו.
 כמה דרכים ישן לבחירה?

9. במשחק הלווטו החדש יש לבחור 4 מספרים מתוך המספרים 1 - 20 . אין חשיבות לסדר
 הפנימי של המספרים , אלא רק לגłów אילו מספרים עלו בגורל. מה הסיכוי לגłów את
 המספרים שעלו בגורל אם :

- א. אסור לבחור את אותו מספר יותר מפעם אחת.
- ב. מותר לחזור על אותו מספר יותר מפעם אחת.

10. ישם 5 כדורים להכניס ל-6 תאים . חשבו את מספר האפשרויות להכנסת ה כדורים כאשר :

- .א. ה כדורים שונים ותא יכול להכיל יותר מ כדור אחד.
- .ב. ה כדורים זהים ותא יכול להכיל יותר מ כדור אחד.
- .ג. ה כדורים שונים ותא לא יכול להכיל יותר מ כדור אחד.
- .ד. ה כדורים זהים ותא לא יכול להכיל יותר מ כדור אחד.

11. ישם A כדורים להכניס ל-ח תאים (k<h) . חשבו את מספר האפשרויות להכנסת ה כדורים כאשר :

- .א. ה כדורים שונים ותא יכול להכיל יותר מ כדור אחד.
- .ב. ה כדורים זהים ותא יכול להכיל יותר מ כדור אחד.
- .ג. ה כדורים שונים ותא לא יכול להכיל יותר מ כדור אחד.
- .ד. ה כדורים זהים ותא לא יכול להכיל יותר מ כדור אחד.

פתרונותות:**שאלה 1**

495

שאלה 2

21

שאלה 3

א. 45

ב. 6561

שאלה 4א. 4^{10}

ב. 286

שאלה 5

4

שאלה 6

1771

שאלה 7

15

שאלה 8

10

שאלה 9

א. 1/4,845 .

ב. 1/8,855 .

שאלה 10

א. 7776

ב. 252

ג. 720

ד. 6

שאלה 11

$$\binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1} \quad .\text{א}$$

$$(n)_k = \frac{n !}{(n-k) !} \quad .\text{ב}$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n !}{k ! (n-k) !} \quad .\text{ג}$$

פרק 9 - קומבינטוריקה - שאלות מסכימות

1. בכיתה 40 תלמידים. מעוניינים לבחור חמישה מהם לוועד כיתה. בכמה דרכים ניתן להרכיב את הוועד אם :
- בוועד 5 תפקידים שונים ותלמיד יכול למלא יותר מתפקיד אחד.
 - בוועד 5 תפקידים שונים ותלמיד לא יכול למלא יותר מתפקיד אחד.
 - אין תפקידים שונים בוועד.
2. במשרד 30 עובדים, יש לבחור ארבעה עובדים לשלחת לחו"ל. בכמה דרכים ניתן להרכיב את המשלחת ?
- בשלחת ארבע ממשימות שונות שיש למלא וכל עובד יכול למלא יותר ממשימה אחת.
 - כמו בסעיף א. רק הפעם עובד לא יכול למלא יותר ממשימה אחת.
 - מעוניינים לבחור ארבעה עובדים שונים לשלחת שבה כולל אותו התפקיד.
3. מעוניינים להרכיב קוד סודי. הקוד מורכב מ-2 ספרות שונות ו-3 אותיות שונות באנגלית (26 אותיות אפשריות).
- כמה קודים שונים ניתן להרכיב?
 - כמה קודים שונים ניתן להרכיב אם הקוד מתחילה בספרה ונגמר בספרה?
 - כמה קודים ניתן להרכיב אם הספרות חייבות להיות צמודות זו לזו?
 - בכמה קודים הספרות לא מופיעות ברכף?
4. בארון 4 מגירות. ילד התבקש ע"י אימנו לסדר 6 משחקים בארון. הילד מכניס את המשחקים באקראי למגירות השונות. כל מגירה יכולה להכיל גם את כל המשחקים יחד.
- מה ההסתברות שהילד יכניס את כל המשחקים למגירה העליונה?
 - מה ההסתברות שהילד יכניס את כל המשחקים לאחת מגירות?
 - מה ההסתברות שה"דומינו" יוכנס למגירה העליונה ויתר המשחקים לשאר המגירות.
 - מה ההסתברות שה"דומינו" לא יוכנס למגירה העליונה?

5. בעיר מסוימת מותמודדות למועצה העיר 4 מפלגות שונות: "הירוקים", "קדימה", "העבודה" ו"הליקוד". 6 אנשים אינם יודעים למי להצביע, ולכן בוחרים באקראי מפלגה כלשהי.

- א. מה ההסתברות שכל ה-6 יבחרו אותה מפלגה?
- ב. מה ההסתברות שmplגת ה"ירוקים" לא תקבל קולות?
- ג. מה ההסתברות שmplגת ה"ירוקים" תקבל בדיקון 3 קולות וכל מפלגה אחרת תקבל קול 1 בלבד?
- ד. מה ההסתברות שmplגת ה"ירוקים" תקבל 2 קולות, MPLגת "העבודה" תקבל 2 קולות ומפלגת "הליקוד" תקבל 2 קולות?

6. 5 חברים נפגשו הם רצו לראות סרט. באפשרותם ספריה המונה 8 סרטים שונים. כל אחד התבקש לבחור סרט באקראי.

- א. מה ההסתברות שכולם יختارו את אותו הסרט?
- ב. מה ההסתברות שכולם יختارו את "הנוסע השמייני"?
- ג. מה ההסתברות שכל אחד יבחר סרט אחר?
- ד. מה הסיכוי שלפחות שניים יختارו את אותו הסרט?
- ה. מה ההסתברות שיוסי וערן יختارו את "הנוסע השמייני" וכל השאר סרטים אחרים?
- ו. מה ההסתברות שהנוסע השמייני לא יבחר על ידי אף אחד ממחברים?
- ז. לקחו את 8 הסרטים וייצרו מהם רשימה. נתנו给她רשימה 3 סרטים אימה, מה ההסתברות שהרשימה שנוצרה יופיעו 3 סרטים האימה בראצף?

7. בקבוצה 10 אנשים. יש ליצור שתי וועדות שונות מתוך הקבוצה: אחת בת 4 אנשים, השנייה בת 3 אנשים. כל אדם יכול לבחור רק לוועדה אחת. חשבו את מס' הדרכים השונות ליצור הוועדות הללו כאשר:


- א. אין בוועדות תפקידים.
- ב. בכל וועדה יש תפקיד אחד של אחראי הוועדה.
- ג. בכל וועדה כל התפקידים שונים.

8. גברים ו-3 נשים מתיישבים על כסאות בשורה של כסאות תיאטרון. בכל שורה 10 כסאות.

בכמה דרכים שונות ניתן לבצע את ההשבה:

- לא הגבלה.
 - כל הגברים ישבו זה ליד זה וגם כל הנשים תשכנה זו ליד זו.
 - שני גברים בקצת אחד ושני הגברים האחרים בקצת שני.
9. בהגלה ישנים 10 מספרים מ-1 עד 10. בוחרים באקראי 5 מספרים. מה ההסתברות שהמספר 7 הוא השני בגודלו מבין המספרים שנבחרו?
10. 6 אנשים עלו לאוטובוס שעוצר ב-10 תחנות. כל אדם בוחר באופן עצמאי ואקראי באיזו תחנה לרדת.
- מה ההסתברות שכל אחד יורד בתחנה אחרת?
 - מה ההסתברות שבdryok 3 ירדו בתחנה החמישית?
 - מה ההסתברות שרונית תרד בתחנה השנייה והשאר לא?
 - מה ההסתברות שכולם ירדו בתחנות 5,6 ולפחות אחד בכל אחת מהתחנות הללו?

11. ברכבת 4 מקומות ישיבה עם כיוון הנסיעה ו-4 מקומות ישיבה נגד כיוון הנסיעה. 4 זוגות התיישבו במקומות אלו באקראי.



- בכמה דרכים שונות ניתן להתיישב?
- מה ההסתברות שהזוג כהן ישבו זה לצד זה עם כיוון הנסיעה?
- מה ההסתברות שהזוג כהן ישבו זה לצד זה?
- מה ההסתברות שהזוג כהן ישבו כל אחד ליד החלון? (בכל שורה יש חלון).
- מה ההסתברות שהזוג כהן יישבו כך שכל אחד בכיוון נסעה מנוגד?
- מה ההסתברות שהזוג כהן יישבו אחד מול השני פנים מול פנים.
- מה ההסתברות שכל הגברים ייסעו עם כיוון הנסיעה וכל הנשים תשכנה נגד כיוון הנסיעה?
- מה ההסתברות שכל זוג ישב אחד מול השני?

12. סיסמא מורכבת מ-5 תווים, תווים אלו יכולים להיות ספרה (0-9) והאותיות ABC (26 אותיות).

כל TWO יכול לחזור על עצמו יותר מפעם אחת.

א. כמה סיסמאות שונות יש?

ב. כמה סיסמאות שונות יש לבדוק כל התווים שונים?

ג. כמה סיסמאות שונות יש לבדוק לפחות ספרה אחת ולפחות אותה אחת?

13. מtower קבוצה בת CH אנשים רוצים לבחור 3 אנשים לוועדה. בכמה דרכים שונות ניתן לבצע את הבחירה? בטא את תשובתך באמצעות CH.

א. בוועדה אין תפקידים ויש לבחור 3 אנשים שונים לוועדה.

ב. בוועדה תפקידים שונים. וכל אדם לא יכול למלא יותר מ תפקיד אחד.

ג. בוועדה תפקידים שונים ואדם יכול למלא יותר מ תפקיד אחד.

14. שני אנשים מטילים כל אחד מטבע CH פעמים.

בטא באמצעות CH את הסיכוי שלכל אחד מהם אותו מספר פעמים של התוצאה "ראש".

15. יוצרים קוד עם CH ספרות (מותר לחזור על אותה ספרה בקוד). חשבו את ההסתברויות הבאות:

(בטאו את תשובותיכם באמצעות CH).

א. בקוד אין את הספרה 5.

ב. בקוד מופיעה הספרה 3.

ג. בקוד לא מופיעות ספרות אי זוגיות.

פתרונותות:**שאלה 1**

- א. 102,400,000
 ב. 78,960,960
 ג. 658,0088

שאלה 2

- א. 810,000
 ב. 657,720
 ג. 27,405

שאלה 3

- א. 14,040,000
 ב. 1,404,000
 ג. 5,616,000
 ד. 8,424,000

שאלה 4

- א. 0.00024
 ב. 0.00098
 ג. 0.05933
 ד. 0.75000

שאלה 5

- א. 0.00098
 ב. 0.17798
 ג. 0.02929
 ד. 0.02197

שאלה 6

$$\frac{1}{4096} \text{ נ.}$$

$$\frac{1}{32,768} \text{ ב.}$$

0.205 נ.

0.795 ד.

0.0105 ה.

0.5129 ג.

0.1071 ז.

שאלה 7

4200 א.

50,400 ב.

604,800 ג.

שאלה 8

604,800 א.

2,880 ב.

2,880 ג.

שאלה 9

0.238

שאלה 10

0.1512 א.

0.014 ב.

0.059 ג.

$$\frac{62}{10^6} \text{ ד.}$$

שאלה 11

- א. 40,320
 ב. 0.1071
 ג. 0.2142
 ד. 0.0357
 ה. 0.5714
 ו. 0.1429
 ז. 0.0143
 ח. 0.0095

שאלה 14

$$\frac{1}{4^n} \cdot \sum_{i=0}^n \binom{n}{i}^2$$

פרק 10 - הסתברות מותנית - במרחב מדגם אחיד

רקע:

לעתים אנו צריכים לחשב הסתברות למאורע כלשהו כאשר ברשותנו אינפורמציה לגבי מאורע אחר. הסתברות מותנית הינה סיכוי להתרחשות מאורע כלשהו אשר ידוע שמאורע אחר התרחש/ לא התרחש.

הסתברות של A בהינתן ש B כבר קרה:

$$P(A|B)$$

$$P(A|B) = \frac{|A \cap B|}{|B|} \quad \text{כשמדובר המדגם אחיד:}$$

למשל, (פתרוון בהקלטה)

מיטלים קופייה.

נדיר :

A – התוצאה זוגית.

B – התוצאה גדולה מ-3.

נרצה לחשב את :

$$P(A|B)$$

תרגילים:

1. נבחרה ספרה זוגית באקראי. מה הסיכוי שהספרה גדולה מ-6?
2. יוסי הטיל קובייה. מה הסיכוי שקיבל את התוצאה 4 אם ידוע שההתוצאה שהתקבלת זוגית?
3. מטילים צמדקוביות.
נגיד:

$$A = \text{סכום התוצאות בשתי ההצלות הינו } 7$$

$$B = \text{מכפלת התוצאות } 12$$

$$P(A|B)$$
 חשבו את
4. הוTEL מטבח פומיים. ידוע שהתקבל לכל היוטר ראש אחד, מה הסיכוי שהתקבלו שני ראשי?
5. אדם הטיל זוג קובייות והתקבלו שמתוארכות זהות. מה הסיכוי שלפחות אחת התוצאות 5?
6. אדם הטיל זוג קובייות והתקבל לפחות פעם אחת 4. מה הסיכוי שאחת התוצאות 5?
7. נבחרה משפחה בת שני ילדים. ידוע שאחד הילדים בן. מה ההסתברות שבמשפחה שני בניים בקרב הילדים?
8. נבחרה משפחה בת שלושה ילדים. נתון שהילד האמצעי בן. מה הסיכוי שיש בנות בקרב הילדים?

השאלות הבאות משלבות קומבינטוריקה:

9. בכיתה 6 בניים ו-7 בנות. נבחרו ארבעה ילדים מהכיתה.
אם ידוע שנבחרו 2 בניים ושתי בנות, מה הסיכוי שאלאך לא נבחר?
10. חמישה חברים יצאו לבית קולנוע והתיישבו זה ליד זה באקראי בכיסאות מס' 5 עד 9.
אם ידוע שענן ודין התיישבו זה ליד זה. מה ההסתברות שהם יושבים בכיסאות מס' 6 ו-7?

פתרונותות: **שאלה 1**

0.2

 שאלה 2

1/3

 שאלה 3

0.5

 שאלה 4

0

 שאלה 5

1/6

 שאלה 6

2/11

 שאלה 7

1/3

 שאלה 8

3/4

 שאלה 9

2/3

 שאלה 10

1/4

פרק 11 - הסתברות מותנית - מרחב לא אחד

רקע:

הסיכוי שמאורע A יתרחש בהינתן ש – מאורע B כבר קרה :

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

במונח : הסיכוי לחיתוך של שני המאורעות זה הנשאל וזה הנתון שהתרחש.
במכנה : הסיכוי למאורע נתון שהתרחש :

למשל,

נלקחו משפחות שיש להם שתי מכוניות. ל- 30% מהמשפחות הללו המכונית הישנה יותר היא מתוצרת אירופה ואצל 60% מהמשפחות הללו המכונית החדשה יותר מתוצרת אירופה. כמו כן 15% מהמשפחות הללו שתי המכוניות הן מתוצרת אירופאיות.
אם המכונית הישנה של המשפחה היא אירופאית, מה ההסתברות שגם המכונית החדשה אירופאית? (פתרוון בקהלטה)

תרגילים:

- .1. תלמיד ניגש בסמסטר שני מבחנים מבחן בכלכלה ומבחן בסטטיסטיקה: נגיד את המאوروות הבאים : A- עבר את המבחן בסטטיסטיקה. B- לא עבר את המבחן בכלכלה. כמו כן נתון שהסיכוי לעבור את המבחן בכלכלה הנו 0.8 והסיכוי לעבור את המבחן בסטטיסטיקה הנו 0.9. הסיכוי לעبور את שני המבחנים הנו 0.75. חשבו את הסיכויים למאوروות הבאים :
- התלמיד עבר בסטטיסטיקה , מה ההסתברות שהוא עבר בכלכלה?
 - התלמיד עבר בכלכלה , מה ההסתברות שהוא עבר בסטטיסטיקה?
 - ה תלמיד עבר בכלכלה , מה ההסתברות שהוא נכשל בסטטיסטיקה?
 - ה תלמיד נכשל בסטטיסטיקה מה ההסתברות שהוא נכשל בכלכלה?
 - ה. התלמיד עבר לפחות מבחן אחד מה ההסתברות שהוא יעבור את שני המבחנים?
- .2. במדינה שתי חברות טלפונים סלולריי "سوفט" ו"בל". 30% מההתושבים הבוגרים רשומים אצל חברת "בל". 60% מההתושבים הבוגרים רשומים אצל חברת "سوفט". 15% מההתושבים הבוגרים אין טלפון סלולרי בכלל.
- איזה אחוז מההתושבים הבוגרים רשומים אצל שתי החברות?
 - נבחר אדם רשום אצל חברת "سوفט", מה ההסתברות שהוא רשום גם אצל חברת "בל"?
 - אם אדם לא רשום אצל חברת "בל", מה ההסתברות שהוא כן רשום בחברת "سوفט"?
 - אם אדם רשום אצל חברת בלבד, מה ההסתברות שהוא רשום בחברת "سوفט"?
- .3. במלילה שני חניונים: חניון קטן וחניון גדול. בשעה 00:08 יש סיכוי של 60% שבחניון הגדל יש מקום, סיכוי של 30% שבחניון הקטן יש מקום וסיכוי של 20% ששני החניונים יש מקום.
- מה ההסתברות שיש מקום בשעה 00:08 רק בחניון הגדל של המלילה?
 - ידוע שבחניון הקטן יש מקום בשעה 00:08, מה הסיכוי שבחניון הגדל יש מקום?
 - אם בשעה 00:08 בחניון הגדל אין מקום, מה ההסתברות שבחניון הקטן יהיה מקום?
 - נתון שלפחות באחד מהחניונים יש מקום בשעה 00:08, מה ההסתברות שבחניון הגדל יש מקום?
- .4. נלקחו 200 שכירים ו-100 עצמאיים, מתוך השכירים 20 הם אקדמיים, מתוך העצמאיים 30 הם אקדמיים.
- בנו טבלת שכיחות משותפת לנוטונים.
 - נבחר אדם אקרי מהי ההסתברות שהוא שכיר?
 - מה ההסתברות שהוא שכיר ולא אקדמי?
 - מה ההסתברות שהוא שכיר או אקדמי?
 - אם האדם שנבחר הוא עצמאי מהי ההסתברות שהוא אקדמי?
 - אם הבן אדם שנבחר הוא לא אקדמי, מה ההסתברות שהוא שכיר?

- .5. חברת מסויימת פרסמה את הנתונים הבאים לגבי האזרחים מעל גיל 21 :
- הנתונים שהתקבלו היו : 40% מהגברים מחזיקים כרטיס "ויזה", 52% מחזיקים כרטיס "ישראלכרט", 20% מחזיקים כרטיס "אמריקן אקספרס", 15% מחזיקים כרטיס ויזה וגם ישראלכרט, 8% מחזיקים כרטיס ישראלכרט וגם אמריקן אקספרס ו- 7% מחזיקים כרטיס ויזה וגם אמריקן אקספרס. כמו כן, 5% מחזיקים בכל שלושת הcredיטיסים הנ"ל.
- א. אם לאדם יש ויזה, מה הסיכוי שאין לו כרטיס ישראלכרט?
- ב. אם לאדם שני כרטיסי אשראי, מה הסיכוי שאין לו כרטיס ישראלכרט?
- ג. אם לאדם לפחות כרטיס אשראי אחד, מה הסיכוי שאין לו כרטיס ישראלכרט?

פתרונות: **שאלה 1**

- א. 0.833
 ב. 0.9375
 ג. 0.0625
 ד. 0.5
 ה. 0.789

 שאלה 2

- א. 5%
 ב. 0.0833
 ג. 0.786
 ד. 0.6875

 שאלה 3

- א. 0.4
 ב. $\frac{2}{3}$
 ג. 0.25
 ד. $\frac{6}{7}$


פרק 12 - דיאגרמת עצים, נוסחות בייס ונוסחת ההסתברות השלמה

רקע:

נשתמש בשיטה זו כאשר יש תרגיל שבו התרחשויות המאורעות היא בשלבים, כך שכל תוצאה של כל שלב תלולה בשלב הקודם, פרט לשלב הראשון :

למשל, בחברה מסוימת 10% מוגדרים בכירים והיתר מוגדרים זוטרים. מבין הבכירים 70% הם אקדמיים ומ בין הזוטרים 20% הם אקדמיים.

נشرط עז שיתאר את הנתונים, השלב הראשון של העז אינו מותנה בכללם ואילו השלב השני מותנה בשלב הראשון.



כדי לקבל את הסיכוי לענף מסוים נכפיל את כל ההסתברויות על אותו ענף.

נבחר אדם באקראי מאותה חברה.

א. מה הסיכוי שהוא בכיר אקדמי ?

$$0.1 \times 0.7 = 0.07$$

ב. מה הסיכוי שהוא זוטר לא אקדמי ?

$$0.9 \times 0.8 = 0.72$$

כדי לקבל את הסיכוי לכמה ענפים נחבר את הסיכויים של כל ענף (רק אחרי שבתווך הענף הכפלו את ההסתברויות)

ג. מה הסיכוי שהוא אקדמי ?

$$0.1 \cdot 0.7 + 0.9 \cdot 0.2 = 0.25$$

ד. נבחר אקדמי מה ההסתברות שהוא עובד יותר ?

מדובר כאן על שאלת ההסתברות מותנה ולכן נשתמש בעיקרו של הסתברות מותנה

$$P(zutar | academay) = \frac{0.9 \cdot 0.2}{0.25} = \frac{0.18}{0.25} = 0.72$$

נוסחת ההסתברות השלמה

B מאורע כלשהו, A_1, \dots, A_n חלוקה מצחיה של Ω .

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(B/A_i) \text{ אזי :}$$

נוסחת בייס

$$P(A_j / B) = \frac{P(A_j)P(B/A_j)}{\sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(B/A_i)}$$

תרגילים:

1. בשקיית סוכריות 4 סוכריות תות ו-3 לימון. מוצאים באקראי סוכריה אם היא בטעם תות אוכלים אותה ומוצאים סוכריה נוספת, אך אם היא בטעם לימון מחזירים אותה לשקיית ומוצאים סוכריה נוספת.
- מה ההסתברות שהסוכריה הראשונה שהוצאה בטעם תות והשנייה בטעם לימון?
 - מה ההסתברות שהסוכריה השנייה בטעם לימון?
2. באוכלוסייה מסוימת 30% הם ילדים, 50% בוגרים והיתר קשישים. לפי נתוני משרד הבריאות הסיכוי שילד יחל בשפעת משך החורף הוא 80%, הסיכוי שמבוגר יחל בשפעת משך החורף הוא 40% והסיכוי שקשיש יחל בשפעת משך החורף הוא 70%.
- איזה אחוז מהאוכלוסייה הינו קשישים שלא יחלו בשפעת משך החורף?
 - מה אחוז האנשים שיחלו בשפעת משך החורף?
 - נבחר אדם שחל במשך החורף בשפעת, מה ההסתברות שהוא קשיש?
 - נבחר ילד, מה ההסתברות שהוא לא יחל ב.splitext משך החורף?
3. בצד א' 5 כדורים כחולים ו-5 כדורים אדומים. בצד ב' 6 כדורים כחולים ו-4 כדורים אדומים. בוחרים באקראי כד', מוצאים ממנו כדור ומבליל להחזירו מוצאים כדור נוסף.
- מה ההסתברות שני ה כדורים שייצאו יהיו בצבעים שונים?
 - אם ה כדורים שהוצאו הם בצבעים שונים, מה ההסתברות שהכדור השני שהוצאה יהיה בצבע אדום?
4. חברת סלולר מסוגת את לקוחותיה לפי 3 קבוצות גיל: נוער, בוגרים ופנסיונרים. נתון כי: 10% מה לקוחות בני נוער, 70% מה לקוחות בוגרים והיתר פנסיונרים. מתוך בני הנוער 90% מחזיקים בסמארט-פון, מתוך האוכלוסייה הבוגרת ל- 70% יש סמארט-פון ומוצע אוכלוסיית הפנסיונרים 30% מחזיקים בסמארט-פון.
- איזה אחוז מלקוחות החברה הם בני נוער עם סמארט-פון?
 - נבחר לקוח אקראי ונ/icon שיש לו סמארט-פון. מה ההסתברות שהוא פנסיון?
 - אם לקוח אין סמארט-פון, מה ההסתברות שהוא לא בן נוער?

5. כדי להתקבל למקומות העבודה יש לעבור שלושה מבחנים. המבחנים הם בשלבים, ככלומר אם נכשלתם בבחן מסוים איינכם ניגשים לבחן הבא אחריו.

70% מהמועמדים עברו את המבחן הראשון.
מתוכם 50% עברו את המבחן השני.

מבין אלה שעורבים את המבחן השני 40% עברו את המבחן השלישי.
א. מה ההסתברות להתקבל לעבודה?

ב. מועמד לא התקבל לעבודה. מה ההסתברות שהוא נכשל בבחן הראשון?
ג. מועמד לא התקבל לעבודה. מה ההסתברות שהוא עבר את המבחן השני?

6. משרד הבריאות פרסם את הנתונים הבאים:

מתוך אוכלוסיית הילדים והנוער 80% חולמים בשפעת בזמן החורף.
מתוך אוכלוסיית המבוגרים (עד גיל 65) 60% חולמים בשפעת בזמן החורף.

30% מההתושבים הם ילדים ונעור.
50% הם מבוגרים.
היתר קשישים.

כמו כן נתון ש 68% מהאוכלוסייה תחלה בשפעת בחורף.

א. מה אחוז החולמים בשפעת בקרב האוכלוסייה הקשישה?

ב. נבחר אדם שלא חלה בשפעת, מה ההסתברות שהוא לא קשיש?

7. רדאר שנמצא על החוף צריך לקלוט אנייה הנמצאת ב-1 מ- 4 האזוריים: A B C D.

אם אנייה נמצאת באזור A הרדאר מזהה אותה בסיכוי 0.8, סיכוי זה פוחת ב-0.1 בכל שהאנייה מתקדמת באזור.

כמו כן שבנסיבות חצי אנייה נמצאת באזור D, בהסתברות 0.3 באזור C, באזור B היא נמצאת בסיכוי 0.2, אחרת היא נמצאת באזור A.

א. מה הסיכוי שהאנייה תתגלה ע"י הרדאר?

ב. אם אנייה התגלתה ע"י הרדאר, מה ההסתברות שהיא נמצאת באזור C?

ג. אם אנייה התגלתה ע"י הרדאר, מה הסיכוי שהיא לא נמצאת באזור B?

8. סימפטום X מופיע בהסתברות של 0.4 במחלה A, בהסתברות של 0.6 במחלה B ובהסתברות של 0.5 במחלה C.

סימפטום X מופיע אך ורק במקרים הלו, אדם לא יכול לחולות ביותר ממחלה אחת מבין המחלות הלו.

לקליניקה מגיעים אנשים כדלקמן:

8% חולים במחלה A, 10% במחלה B, 2% במחלה C והיתר בריאים. כמו כן נתון שבמחלה A,

סימפטום X מתגלה בסיכוי של 80%. במקרה C, הסימפטום מתגלה בסיכוי של 90% בכל מקרה.

A. מה ההסתברות שאדם הגיע לקליניקה וגילו אצלו את סימפטום X?

B. אם התגלה אצל אדם סימפטום X, מה ההסתברות שהוא חולה במחלה A?

C. אם לאדם יש את סימפטום X, מה ההסתברות שהוא חולה במחלה A?

D. אם לא גילו אצל אדם את סימפטום X, מה ההסתברות שהוא בריא?

9. סטודנט ניגש למבחן אמריקאי. הסיכוי שהוא יודע לשאלת מסויימת את התשובה הוא $\frac{1}{3}$, אם הוא לא יודע את התשובה הוא מוחש. בכל מקרה הוא עונה על השאלה.

נתון שלשלה יש 3 תשובות אפשריות.

אם הסטודנט ענה נכון על השאלה, מה הסיכוי שהוא ידע אותה?

10. אדם משחק נגד שני מתמודדים, רוניית ודולב. האדם צריך לשחק שלושה משחקים ויש לו לבחור Aiiza סדר משחקים עדיף לו:

A. Dolb, Ronit, Dolb

B. Ronit, Dolb, Ronit

בכל משחק מישחו חייב לנצח (אין תיקו). האדם ינצח בתורניר רק אם ינצח בשני משחקים ברציפות. נתון שדולב שחקן טוב יותר מאשר רוניית. Aiiza אפשרות עדיפה יותר על האדם כדי לנצח בתורניר?

פתרונותות: **שאלה 1**

א. 2/7

ב. 23/49

 שאלה 2

א. 6%

ב. 58%

ג. 0.241

ד. 0.2

 שאלה 3

א. 0.544

ב. 0.5

 שאלה 4

א. 9%

ב. 0.09375

ג. 0.9722

 שאלה 8

א. 0.0886

ב. 0.2889

ג. 0.3137

ד. 0.8778

 שאלה 9

$$\frac{kp}{1 + (k-1)p}$$

 שאלה 10

אפשרות אעדיפה

פרק 13 - תלות ואי תלות בין מאורעות

רקע:

אם מתקיים ש : $P(B | A) = p(B)$ נגיד שמאורע B בלתי תלוי ב- A.

הדבר גורר גם ההפק $P(A | B) = p(A)$ כלומר A אינו תלוי גם ב- B.

כשהמאורעות בלתי תלויים מתקיים ש : $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

הוכחה לכך :

$$P(A / B) = P(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

נשתמש בנוסחאות של מאורעות בלתי תלויים רק אם נאמר במדויק שהמאורעות בלתי תלויים בתרגיל או שמההקשר אפשר להבין ללא צל של ספק שהמאורעות בלתי תלויים.

למשל,

חוקר מבצע שני ניסויים בלתי תלויים הסיכוי להצלחה בניסוי הראשון הוא 0.7 והסיכוי להצלחה בניסוי השני הוא 0.4.

א. מה הסיכוי להצלחה בשני הניסויים יחדיו?

כיוון שהמאורעות הללו בלתי תלויים :

$$p(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 0.7 \cdot 0.4 = 0.28$$

ב. מה הסיכוי להיכשל בשני הניסויים ?

$$p(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}) = (1 - 0.7)(1 - 0.4) = 0.18$$
באופן דומה :

הרחבה: אי תלות בין n מאורעות

ב. מאורעות A_1, \dots, A_n הם בלתי תלויים אם ורק אם :

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = \prod_{i=1}^n P(A_i)$$

תרגילים:

1. נתון :

$$p(A) = 0.2$$

$$P(B) = 0.5$$

$$P(A \cup B) = 0.6$$

האם המאורעות הללו בלתי תלויים?

2. תלמיד ניגש לשני מבחנים שהצלחתם לא תלوية זו בזו. הסיכוי שלו להצליח ב מבחן הראשון הוא 0.7 והשני 0.4.
- מה הסיכוי להצלחה בשני המבחנים יחד?
 - מה הסיכוי שנכשל בשני המבחנים?

3. במדינה מסוימת 8% אבטלה, נבחרו באקראי שני אנשים מהמדינה.
- מה ההסתברות ששניהם מובטלים?
 - מה ההסתברות שלפחות אחד מהם מובלט?

4. מוצר צריך לעבור בהצלחה ארבעה בדיקות בלתי תלויות לפני שיוקו, לאחרת הוא נפסל ולא יוצא לשוק. הסיכוי לעبور בהצלחה כל אחת מהבדיקות הוא 0.8. בכל מקרה מבוצעות כל 4 הבדיקות.
- מה הסיכוי שהמוצר יפסל?
 - מה ההסתברות שהמוצר יעבור בהצלחה לפחות בדיקה אחת?

5. מדינה מסוימת 8% אבטלה, נבחרו באקראי חמישה אנשים מהמדינה.
- מה ההסתברות שכולם מובטלים במדגם?
 - מה ההסתברות שלפחות אחד מהם מובלט?

6. עבור שני מאורעות A ו- B המוגדרים על אותו מרחב מדגם נתון ש : $P(A \cup B) = 0.9$. האם A ו- B מאורעות בלתי תלויים? $P(A|B) = 0.6$, $P(A \cap \bar{B}) = 0.3$

7. הוכיח את

$$P(A/B) = P(B/A)$$

א. $P(A) = P(B)$

8. קבע אילו מהטענות הבאות נכונות. נמק!

- א. אם $p(A \cup B) = p(A) \cdot p(B)$ אזי המאורעות בלתי תלויים.
- ב. מאורע A כולל במאורע B. $p(A/B) < p(A) < p(B) < 1$, $P(A) > 0 < 1$ לכן.
- ג. A ו- B מאורעות זרים שסיכוייהם חיובים שכן הם מאורעות תלויים.
- ד. A ו- B מאורעות תלויים שסיכוייהם חיובים שכן A ו- B מאורעות זרים.
- ה. $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A) - P(B)$ שכן A ו- B מאורעות זרים.

פתרונותות : **שאלה 1**

כנ

 שאלה 2

- א. 0.28
ב. 0.18

 שאלה 3

- א. 0.0064
ב. 0.1536

 שאלה 4

- א. 0.5904
ב. 0.9984

 שאלה 8

- א. לא נכון
ב. לא נכון
ג. נכון
ד. לא נכון
ה. נכון

פרק 14 - שאלות מסכימות בהסתברות

1. נלקחו משפחות שיש להם שתי מכוניות. ל- 30% מהמשפחות הללו המכונית הישנה יותר היא מתוצרת אירופה ואצל 60% מהמשפחות הללו המכונית החדשה יותר מתוצרת אירופה. כמו כן 15% מהמשפחות הללו שתי המכוניות הן מתוצרת אירופאית.
- א. מה ההסתברות שמשפחה אקראייה בת שתי מכוניות תהיה ללא מכוניות מתוצרת אירופאית?
- ב. מה ההסתברות שלפחות מכונית אחת תהיה אירופאית?
- ג. ידוע שלמשפחה יש מכונית אירופאית. מה ההסתברות שرك המכונית החדשה שלה היא מתוצרת אירופאית?
- ד. אם המכונית הישנה של המשפחה היא אירופאית, מה ההסתברות שגם החדש אירופאי?
2. במדינת "שומקס" 50% מהחלב במרקולים מיוצר במחלבה א' ו- 40% במחלבה ב' והיתר במחלבה ג'. 3% מתוצרת מחלבה א' מגיעה חמוצה למרקולים ואילו במחלבה ב' 10%. כמו כן ידוע שבמדינת "שומקס" בסך הכל 7.5% מהחלב חמוץ.
- א. איזה אחוז מהחלב שmagiu למרקול ממחלבה ג' חמוץ?
- ב. אם נרכש חלב חמוץ במרקול. מה הסיכוי שהוא יוצר במחלבה ג'?
- ג. ברכישת חלב נימצא שהוא אינו חמוץ. מה הסיכוי שהוא יוצר במחלבה א'?
- ד. האם המאורעות: "חלב חמוץ" ו- "יוצר במחלבה א'" בלתי תלויים?
3. רוני ורונה יצאו לבנות במרקז בילויים עם מספר אפשרויות בילוי:
- בהתברות של 0.3 הם ייצאו לבואלינג
בהתברות של 0.5 הם ייצאו לבית קפה
בהתברות של 0.7 הם יוצאו לפחות אחד מהם, באולינג/קפה.
- א. מה ההסתברות שהם יצאו רק לבואלינג?
- ב. האם המאורעות "lezat lebaoling" ו- "lezat libet kafe" זרים?
- ג. האם המאורעות "lezat lebaoling" ו- "lezat libet kafe" תלויים?
- ד. מה ההסתברות שיום אחד הם יצאו רק לבואלינג וביום לאחר מכן לא יצאו אף אחד מהמקומות?

.4 70% מהנבחנים בסטטיסטיקה עוברים את מועד א'. כל מי שלא עבר את מועד א' ניגש לعشות מועד ב', מתוכם 80% עוברים אותו. מבין אלה שנכשלים בשני המועדים 50% נרשמים לקורס מחדש, והיתר פורשים מהתוואר.

א. מה הסיכוי שסטודנט אקראי עבר את הקורס?

ב. אם סטודנט אקראי עבר הקורס, מה הסיכוי שעבר במועד ב'?

ג. מה אחוז הסטודנטים שפורשים מהתוואר?

ד. נבחרו 2 סטודנטים אקראים רוני וינאי, מה ההסתברות שרונית עברה במועד א' ושינאי עבר במועד ב'?

.5 באוכלוסייה מסוימת 40% הם גברים והיתר הן נשים. מבין הגברים 10% מובטלים. בסך הכל 13% מהאוכלוסייה מובטלת.

א. מה אחוז האבטלה בקרב הנשים?

ב. נבחר אדם מובטל, מה ההסתברות שהוא אישה?

ג. נגדיר את המאורעות הבאים:

A- נבחר אדם מובטל

B- נבחר גבר

האם המאורעות הללו זרים? ואם הם בלתי תלויים?

.6 בתיבה 10 מטבעות, מתוכם 7 מטבעות רגילים (ראש, זנב) ו-3 מטבעות שבשני צדדים טבע ראש. אדם בוחר באקראי מטבע ומטייל אותו פעמיים. נסמן ב-A את הנטלה הראשונה ראש, ב-B את הנטלה השנייה ראש.


א. חשבו את הסיכויים למאורעות A ו-B.

ב. האם המאורע A ו-B בלתי תלויים?

ג. ידוע שבנטלה הראשונה התקבל ראש, מה ההסתברות שהמטבע שהוטל הוא מטבע הוגן?

- .7. עורך מעוניין למכור את רכבו, הוא מפרשם מודעה באינטרנט ומודעה בעיתון. מבין אלה שמעוניינים לרכוש רכב מסוים 30% יראו את המודעה באינטרנט, 50% יראו את המודעה בעיתון ו-72% יראו את המודעה לפחות מהמדיות.
- מה אחוז האנשים מאלה שמעוניינים לרכוש רכב מסוים יראו את 2 המודעות?
 - אם אדם ראה את המודעה באינטרנט, מה ההסתברות שהוא לא ראה את המודעה בעיתון?
 - האם המא/orות: "לראות את המודעה באינטרנט" ו"לראות את המודעה בעיתון" בלתי תלויים?
 - אם שראה את המודעה באינטרנט בלבד יתקשר לעורך בהסתברות של 0.7, אם הוא ראה את המודעה בעיתון בלבד הוא יתקשר לעורך בהסתברות של 0.6. ואם הוא ראה את שתי המודעות הוא יתקשר לעורך בהסתברות של 0.9.
- מה ההסתברות שאדם המעוניין לרכוש רכב מסוים יתקשר לעורך?
 - אדם המעוניין לרכוש רכב מסוים התקשר לעורך. מה ההסתברות שהוא ראה את שתי המודעות?

.8. נתונה המערכת החשמלית הבאה :



כל יחידה עובדת באופן בלתי תלוי ובהסתברות $\frac{1}{3}$.

כדי שהמערכת תפעל צריך לעبور זרם מהנקודה A לנקודה B.

הוכח שהסיכוי שהמערכת תפעל :

$$P + (1-P)(2P - P^2)^2$$

פתרונות: **שאלה 1**

- א. 0.25
 ב. 0.75
 ג. 0.6
 ד. 0.5

 שאלה 2

- א. 0.2
 ב. 0.267
 ג. 0.524
 ד. המאורעות תלויים.

 שאלה 3

- א. 0.2
 ב. המאורעות אינם זרים.
 ג. המאורעות הללו תלויים.
 ד. 0.06

 שאלה 4

- א. 0.94
 ב. 0.255
 ג. 0.03
 ד. 0.168

 שאלה 5

- א. 15%
 ב. 0.692
 ג. לא זרים ותלויים.

 שאלה 6

- א. 0.65
 ב. A ו-B תלויים.

ג. 0.5384

 שאלה 7

- א. 8%
 ב. 0.733
 ג. תלויים.
 ד. 0.478 .1
 0.15 .2

פרק 15 - המשטנה המקרי הבודד - פונקציית ההסתברות


רקע:

משטנה מקרי בודד : הנה משטנה היכול לקבל כמה ערכים בוודדים בהסתברויות שונות. מתארים את המשטנה המקרי על ידי פונקציית הסתברות.

פונקציית הסתברות : פונקציה המתאימה לכל ערך אפשרי של המשטנה את ההסתברות שלו.

סכום ההסתברויות על פונקציית ההסתברות חייב להיות 1.

למשל, בקזינו יש רולטה כמפורטה בשרטוט :



אדם מסובב את הרולטה וזוכה בסכום הרשום על הרולטה בש"ח. בנו את פונקציית ההסתברות של סכום הזכיה במשחק בודד (פתרון בהקלטה).

תרגילים:

1. ידוע שבইישוב מסוים התפלגות מספר המכוניות למשפחה הוא:
 50 משפחות אין מחזיקות במכונית.
 70 משפחות עם מכונית אחת.
 60 משפחות עם 2 מכוניות.
 20 משפחות עם 3 מכוניות.
 בוחרים באקראי משפחה מהיישוב, נגידר את X להיות מספר המכוניות של המשפחה שנבחרה.
 בנו את פונקציית ההסתברות של X.
2. מהאותיות A,B,C,D,E יוצרים קוד ذو תווים.
 א. כמה קודים ניתן ליצור?
 ב. רשמו את כל הקודים האפשריים
 ג. נגידר את X להיות מספר הפעמים שהאות B מופיעה בקוד, בנו את פונקציית ההסתברות של X.
3. תלמיד ניגש בסמסטר לשני מבחנים מבחן בכלכלת ו מבחן בסטטיסטיקה. כמו כן נתון שהסיכוי לעبور את המבחן בכלכלת הנז 0.8 והסיכוי לעبور את המבחן בסטטיסטיקה הנז 0.9. הסיכוי לעبور את שני המבחנים הנז 0.75. יהיו X מספר המבחנים שהסטודנט עבר. בנה את פונקציית ההסתברות של X.
4. הסיכוי לזכות במשחק מסוים הינו 0.3. אדם משחקים את המשחק עד אשר הוא מנצח אך ככל מקרה הוא לא משחקים את המשחק יותר מ – 4 פעמים. נגידר את X להיות מספר הפעמים שהוא שיחק את המשחק. בנה את פונקציית ההסתברות של X.
5. חברת ניהול פרויקטים מנהלת 3 פרויקטים במקביל. הסיכוי שפרויקט Ai יצליח הינו 0.7. הסיכוי שפרויקט Bi יצליח הינו 0.8. הסיכוי שפרויקט Gi יצליח הינו 0.9. נתון שההצלחה כל פרויקט בלתי תלויה זו בזו. נגידר את X להיות מספר הפרויקטים שיעלץו. בנה את פונקציית ההסתברות של X.

. 6. להלן פונקציית הסתברות של משתנה מקרי

כלשהו :

$$P(X = k) = \frac{k}{A}$$

$$k = 1, 2, \dots, 4$$

מצא את ערכו של A.

. 7. בgan ילדים 8 ילדים מתוכם 5 בניים ו-3 בנות. בוחרים באקראי 3 ילדים להשתתף בהצגה. נגדיר

את X כמספר הבנים שנבחרו להצגה. בנו את פונקציית ההסתברות של X.

. 8. בסקר שנערך בדקו בקרב אנשים האם הם צופים במהדורות חדשות של ערוצים 1, 2, 10, 1, 2, 10.

להלן הנתונים :

20% צופים בערוץ 2.

8% צופים בערוץ 1.

10% צופים בערוץ 10.

כמו כן נתון ש 1% צופים בשלושת המהדורות גם יחד.

10% צופים בשתי המהדורות מתוך השלושה.

נגדיר את X להיות מספר המהדורות מבין 3 המذוברות ש读懂 אקראי צופה. בנו

את פונקציות ההסתברות של X.

פתרונות **שאלה 3**

2	1	0	x
0.75	0.20	0.05	$P(x)$

 שאלה 4

4	3	2	1	x
0.343	0.147	0.21	0.3	$P(x)$

 שאלה 5

3	2	1	0	X
0.504	0.398	0.092	0.006	$P(x)$

 שאלה 6

10

פרק 16 - המשטנה המקרי הבדיקה - תוחלת, שונות וסטיית תקן

רקע:

$$\boxed{E(X) = \sum_i x_i P(x_i) = \mu}$$

$$V(X) = \sum_i (x_i - \mu)^2 P(x_i) = \sum_i x_i^2 P(x_i) - \mu^2 = \sigma^2$$


תוחלת – ממוצע של פונקציית ההסתברות, אם נבצע את התהליך אינסוף פעמים כמו בדוגמה

נקבל. התוחלת היא צפי של המשטנה המקרי.

שונות – תוחלת ריבועי הסטיות מהתוחלת – נותן אינדיקציה על הפיזור והסיכון של פונקציית ההסתברות.

סטיית תקן – שורש של השונות. – הפיזור הממוצע הצפוי סביב התוחלת.

למשל, בקזינו רולטה כמורהה בשרטוט:



אדם מסובב את הרולטה וזוכה בסכום הרשום על הרולטה בש"ח.

30	20	10	x
0.5	0.25	0.25	P(x)

$$E(X) = 10 \cdot 0.25 + 20 \cdot 0.25 + 30 \cdot 0.5 = 22.5 = \mu$$

$$V(X) = \sum_i (x_i - \mu)^2 P(x_i) = (10 - 22.5)^2 \cdot 0.25 + (20 - 22.5)^2 \cdot 0.25 + (30 - 22.5)^2 \cdot 0.5 \\ = 68.75 = \sigma^2$$

כדי לחשב את סטיית התקן נוציא שורש לשונות:

$$\sigma_x = \sqrt{V(X)} = \sqrt{68.75} = 8.29$$

תרגילים:

1. אדם משחק במשחק מזל. נגדיר את X להיות סכום הזכיה. להלן פונקציית ההסתברות של X :

40	20	0	-30	X
0.2	0.3	0.1	0.4	$p(X)$

מהי התוחלת, השונות וסטיית התקן של X ?

2. בישוב מסוים שני סניפי בנק, בנק פופולרי ובנק לאומי. מתוך האוכלוסייה הבוגרת בישוב ל-50% חשבו נון בסניף הפופולרים של היישוב. ל-40% חשבו נון בסניף הלאומי של היישוב. ל-20% מהתושבים הבוגרים אין חשבו נון בנק בישוב. יהיו X מס' סניפי הבנק שלבוגר בישוב יש חשבו.

חשב את $E(X)$

3. ידוע של- 20% מהמשפחות יש חיבור לווייני בبيתם. בסקר אDEM מחפש לראיין משפחה המחוורת ללויין. הוא מטלפון לאקרים למשפחה וממשיך עד אשר הוא מגיע למשפחה המחוורת ללויין. בכל מקרה הסוקר לא יתקשר ליותר מ-5 משפחות.

נגדיר את X להיות מספר המשפחות שאליין האDEM יתקשר.

א. בנו את פונקציית ההסתברות של X .

ב. חשבו את התוחלת וסטיית התקן של X .

4. לאדם צורו מפתחות. בצרור 5 מפתחות אשר רק אחד מתאים לדלת של ביתו. האדם מנסה את המפתחות באופן מקרי. לאחר שניסה מפתח מסוים הוא מוציא אותו מהצרור כדי לא להשתמש בו שוב. נסמן ב- X את מספר הניסיונות עד שהדלת תפתח.

א. בנה את פונקציית ההסתברות של X .

ב. חשב את התוחלת והשונות של X .

5. נתונה פונקציית ההסתברות של המשתנה המקרי X :

8	6	4	2	x
0.2		0.3		$P(x)$

$$\text{כמו כן נתנו ש: } E(X) = 4.2$$

א. מצא את ההסתברויות החסרות בטבלה.

ב. חשב את $V(X)$.

6. משתנה מקרי בדיד מקבל את הערכים 5 ו 0. נתון שהתוחלת של המשתנה 0 ושהשונות היא 10. מצא את פונקציית ההסתברות.

7. להלן התפלגות של המשתנה מקרי X .

X	P
1	$\frac{1}{4}$
3	$\frac{1}{2}$
K	$\frac{1}{4}$

מהו הערך K שייתן ערך מינימלי לשונות של X .

פתרונותות: שאלה 1

תוחלת : 2 שונות : 796

 שאלה 3

ב . תוחלת : 3.36 סטיית תקן : 1.603

 שאלה 4

א.

5	4	3	2	1	x
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	P(x)

ב . תוחלת : 3

שונות 2

 שאלה 5

א.

8	6	4	2	x
0.2	0.1	0.3	0.4	P(x)

ב . 5.16

 שאלה 6

5	0	-5	x
0.2	0.6	0.2	P(x)

 שאלה 7

2.33

פרק 17 - המשטנה המקורי הבדיקה - טרנספורמציה ליניארית

רקע

מצב שבו מבצעים הכפלת קבועה או הוספה של קבוע על המשטנה המקורי. (כולל גם חילוק של קבוע וחיסורו של קבוע)

$$Y = aX + b \quad \text{אם}$$

zioni :

$$E(Y) = aE(X) + b$$

$$V(Y) = a^2 \cdot V(X)$$

$$\sigma_Y = |a| \sigma_x$$

שלבי העבודה:

1. נזזה שמדובר בטרנספורמציה ליניארית (שינוי קבוע לכל התוצאות).
2. נרשום את כלל הטרנספורמציה לפי נתוני השאלה.
3. נפשט את הכלל ונזזה את ערכי a ו b .
4. נציב בנוסחאות שלעיל בהתאם לממדים שנשאלים.

דוגמה - הרולטה:

בשימוש לנatoi שאלת הרולטה נתון שעלות השתתפות במשחק 15 נס מחי התוחלת והשונות של הרווח במשחק ?

פתרון (בהקלטה)

чисבנו קודם :

$$E(X) = 22.5 = \mu$$

$$V(X) = 68.75 = \sigma^2$$

תרגילים:

1. סטודנט ניגש ל- 5 קורסים הסמסטר. נניח שכל קורס שסטודנט מסיים מזכה אותו ב-4 נקודות אקדמיות. חשב את התוחלת והשונות של סך הנקודות שיצבור הסטודנט כאשר נתון שתוחלת מספר הקורסים שישים היא 3.5 עם שונות 2.
2. תוחלת סכום הזכיה במשחק מזל הינו 10 עם שונות 3 הוחלט להכפיל את סכום הזכיה במשחק. עלות השתתפות במשחק הינה 12 . מה התוחלת ומה השונות של הרווח במשחק?
3. תוחלת של משתנה מקרי הינה 10 וסטיית התקן 5 . הוחלט להוסיף 2 למשתנה ולאחר מכן לעלות אותו ב-10%. מהי התוחלת ומהי סטיית התקן לאחר השינוי?
4. X הינו משתנה מקרי. כמו כן נתון ש- $E(X) = 4$ ו- $V(X) = 3$. $Y = 7 - X$ חשב את: $E(Y)$ ו- $V(Y)$.
5. אדם החליט לבטח את רכבו, שוויו רכבו 100,000 ₪. להלן התוצאות האפשרות והסתברותן :
 בהסתברות של $1/1000$ תהיה תביעה טוטאלוסט (כל שווי הרכב).
 בהסתברות של 0.02 תהיה תביעה בשווי מחצית משווי הרכב.
 בהסתברות של 5% תהיה תביעה בשווי רביע משווי הרכב.
 אחרת אין תביעה בכלל.
 החברה מאפשרת תביעה אחת בשנה.
 נסמן ב- X את גובה התביעה השנתית באלפי ₪
 א. בנו את פונקציית ההסתברות של X .
 ב. חשבו את התוחלת והשונות של גובה התביעה.
 ג. פרמיית הביטוח היא 4,000 ₪, מהי התוחלת ומהי השונות של רווח חברת הביטוח לביטוח הרכב הנייל?

6. יהיו X מספר התשובות הנכונות ב מבחון בו 10 שאלות. פונקציית ההסתברות של X נתונה בטבלה הבאה :

10	9	8	7	6	5	X
		0.3	0.2	0.2	0.1	$P(x)$

כמו כן נתון ש צפוי מספר התשובות הנכונות בבחינה הוא 7.35.

- א. השלימו את פונקציית ההסתברות.
- ב. חשבו את השונות מספר התשובות הנכונות בבחינה.
- ג. הציון בבחינה מחושב באופן הבא : כל שאלה נcona מזכה ב-10 נקודות. לכל שאלה שגויותיה, מופחתת נקודה. מהי התוחלת ומה השונות של הציון בבחינה?

7. להלן פונקציית הסתברות של משתנה מקרי כלהלן :

$$P(X = k) = \frac{k}{A}$$

$$k = 1, 2, \dots, 4$$

- א. מצא את ערכו של A .
- ב. חשב את התוחלת והשונות של המשתנה הנחקר.
- ג. חשב את $E(X^3)$

ד. חשב את התוחלת והשונות של המשתנה הבא : $\frac{X}{2} - 4$

פתרונות: **שאלה 1 :**

תוחלת : 14 שונות : 32

 שאלה 2 :

תוחלת : 8 שונות : 12

 שאלה 3 :

תוחלת : 13.2

סטיית תקן : 5.5

 שאלה 4 :

תוחלת : 3

שונות : 3

 שאלה 6 :ב. $V(X) = 1.8275$ **שאלה 7 :**א. $10 = A$

$$E(X) = 3 \quad .ב.$$

$$V(X) = 1$$

$$E(X^3) = 35.4 \quad .ג.$$

$$V(X^3) = 616.84$$

$$E(y) = -2.5 \quad .ד.$$

$$V(y) = 0.25$$

פרק 18 - תוחלת וסוגות של סכום משתנים מקרים

רקע:

אם X_1, X_2, \dots, X_n משתנים מקרים אזי:

$$E(T) = E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n)$$

אם X_1, X_2, \dots, X_n משתנים מקרים בלתי תלויים בזוגות, אזי:

$$V(T) = V(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n)$$

למשל,

אדם משחק בשני משחקי מזל בלתי תלויים. תוחלת סכום הזכיה של המשחק הראשון היא 7 עם סטיית תקן 3. תוחלת סכום הזכיה של המשחק השני היא 2. עם סטיית תקן 4. מה התוחלת ומהי השונות של סכום הזכיה הכולל של שני המשחקים יחד?

תרגילים:

1. הרווח ממניה א' הוא עם תוחלת של 5 ושונות 10. הרווח ממניה ב' הוא עם תוחלת של 4 ושונות 5. ידוע שההשकעות של שתי המניות בלתי תלויות זו בזו.

מה התוחלת והשונות של הרווח הכולל מהשקעה בשתי המניות יחד?

2. X ו-Y הם משתנים בלתי תלויים, סטיית התקן של X היא 3. סטיית התקן של Y היא 4. מהי סטיית התקן של $Y+X$?

3. אדם משחק בשני משחקים מזל בלתי תלויים זה בזה :

X = סכום הזכיה במשחק הראשון.

Y = סכום הזכיה במשחק השני.

נתון :

$$\sigma(X) = 3 \quad E(x) = 10$$

$$\sigma(Y) = 4 \quad E(y) = 12$$

מהי התוחלת ומהי סטיית התקן של סכום הזכיה בשני המשחקים?

4. ברולטה הסיכוי לזכות ב- 30 לפ הוא חצי וב-10 לפ רבע כך גם ב- 20 לפ . מה היא התוחלת והשונות של סכום הזכיה הכולל לאדם המשחק ברולטה 4 פעמים.

5. נתון משתנה מקרי בעל פונקציית ההסתברות הבאה :

$$P(X = K) = \frac{A}{K-1} \quad K = 2, 3, 4, 5$$

0 אחרת

א. מצא את ערכו של A.

ב. חשב את התוחלת והשונות של X.

ג. נלקחו כ משתנים מקרים בלתי תלויים מההתפלגות הניל. בטאו באמצעות כ את תוחלת והשונות של סכום המשתנים.

פתרונותות: **שאלה 1**

תוחלת : 9

שונות : 15

 שאלה 3

תוחלת: 22

סטיית תקן : 5

 שאלה 4

תוחלת : 90

שונות : 275

 שאלה 5

$$A = \frac{12}{25} = 0.48$$

.א

ב. תוחלת 2.92

שונות 1.1136

ג. תוחלת 2.92

שונות 1.1136

פרק 19 - התפלגויות בדידות מיוחדות - התפלגות בינומית

רקע:

נגידר את המושג ניסוי ברנולי:
ניסוי ברנולי הנה ניסוי שיש לו שתי תוצאות אפשריות: "הצלחה" ו"כשלון" כמו: מוצר פגום או תקין אדם עובד או מובטל עץ או פלי בהטלת מטבע וכדומה.

בחתפלגות בינומית חוזרים על אותו ניסוי ברנולי n פעמים באופן בלתי תלוי זה בזה.
מגדירים את X להיות מספר ההצלחות שהתקבלו בסך הכל.
נסמן ב k את הסיכוי להצלחה בניסוי בודד וב p את הסיכוי לכישلون בניסוי בודד.

$$\text{ואז נגיד ש: } X \sim B(n, p)$$

פונקציית ההסתברות של } X

$$k = 0, 1, 2, \dots, n; P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad \text{לכל}$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad ; \quad n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 1 \quad ; \quad 0! = 1$$

לבודל: $\binom{n}{k}$ ניתן לחשב באמצעות המחשבון.

$$\text{תוחלת: } E(X) = np$$

$$\text{שונות: } V(X) = npq$$

שימושו לב כדי לזהות שמדובר בחתפלגות בינומית צריכים להתקיים כל התנאים הבאים:

- 1) חוזרים על אותו ניסוי ברנולי באופן בלתי תלוי זה בזה.
- 2) חוזרים על הניסוי תפעמיים.
- 3) X – מוגדר במספר ההצלחות המתקבלות בסך הכל.

דוגמיה : (פתרונות בהקלטה)

במדינה מסוימת ל- 80% מההתושבים יש רישיון נהיגה. נבחרו 10 תושבים אקראיים מהמדינה.

א. מהי ההסתברות שבדיווק ל- 9 מהם יש רישיון נהיגה?

ב. מה ההסתברות שלפחות ל- 9 מהם יש רישיון נהיגה?

ג. מהי התוחלת ומהי סטיית התקן של מספר התושבים שנדרגו ושיש להם רישיון נהיגה?

תרגילים:

1. במדינה 10% מהאוכלוסייה מובטלה. נבחרו 5 אנשים באקראי מאותה אוכלוסייה. נגידר את X להיות מספר המובטלים שהתקבלו במדגם.

א. מהי התפלגות של X?

ב. מה ההסתברות שהיא בדיקן מובטל אחד?

ג. מה ההסתברות שכולם יעבדו במדגם?

ד. מה ההסתברות שלושה יעבדו במדגם?

ה. מה ההסתברות של לפחות אחד יהיה מובטל?

ו. מה תוחלת ומהי השונות של מספר המובטלים במדגם?

2. על פי נתוני משרד התקשורת ל-70% מהאוכלוסייה יש סמארט-פון. נבחרו 10 אנשים באקראי. נגידר את X כמספר האנשים שנדרגו עם סמארט-פון.

א. מהי התפלגות של X? הסבירו.

ב. מה ההסתברות שבמדגם ל-8 אנשים יש סמארט-פון?

ג. מה ההסתברות שבמדגם לפחות ל-9 יהיו סמארט-פון?

ד. מה תוחלת וסטיית התקן של מספר האנשים שנדרגו ולהם סמארט-פון?

3. בבית הימורים יש שורה של 6 מכונות מזל מאותו סוג. משחק במכונית מזל כזו עולה 5 ש". ההסתברות לזכות ב-20 ש"ח, בכל אחת מהמכונות היא 0.1 וההסתברות להפסיד את ההשקעה היא 0.9 בכל מכונה. מהר נכנס לבית הימורים ומכניס 5 ש"ח לכל אחת מ-6 המכונות.

א. מה ההסתברות שיפסיד בכל המכונות?

ב. מה ההסתברות שיזכה בדיקן בשתי מכונות?

ג. מה ההסתברות שיזכה ביותר כסף מה- 30 ש"ח שהשקייע?

ד. מה תוחלת וסטיית התקן של הרוחות נטו של המהמר (הזכויות בניכוי ההשקעה)?

4. במדינה מסוימת התפלגות ההשכלה בקרב האוכלוסייה מעל גיל 30 היא כזו:

השכלה	نمוכה	תיכונית	תואר I	תואר II ומעלה
פרופורציה	0.1	0.6	0.2	0.1

נבחרו 20 אנשים אקריםים מעל גיל 30 מהמדינה הניל.

א. מה ההסתברות ש-5 מהם אקדמיים?

ב. מה תוחלת של מס' בעלי ההשכלה הנמוכה?

5. במכלה מסוימת 20% מהסטודנטים גרים בת"א. מבין הסטודנטים שגורים בת"א 30% מגיעים ברכבים וمبין הסטודנטים שלא גרים בת"א 50% מגיעים ברכבים למכלה.
- א. השומר בשער המכלה בודק לכל סטודנט את תיקו בהיכנסו למכלה. מה ההסתברות שבקרוב 5 סטודנטים שנבדקו ע"י השומר רק 1 מותוכם הגיע למכלה ברכבו?
- ב. בהמשך לסייע הקודם מה ההסתברות שרוב הסטודנטים בקרוב ה-5 הגיעו למכלה ברכבו?
6. ב מבחן אמריקאי 20 שאלות. סטודנט ניגש לבחון והסıcıוי שהוא יודע שאלה היא 0.8. אם הוא לא יודע הוא מוחש את התשובה. לכל שאלה 4 תשובות אפשריות שרק אחת מהן נכונה.
- א. מה הסיכוי לענות על שאלה מסוימת נכונה?
- ב. מה הסיכוי שייננה נכונה על בדיקת 16 שאלות?
- ג. על כל שאלה שעננה נכון התלמיד מקבל 5 נקודות, על כל שאלה שגגה מופחתת נקודה, מה התוחלת ומהי השונות של ציון התלמיד?
7. 5% מקו היוצר פגום. המוצרים נארזים בתוך קופסת קרוטון. בכל קופסה 10 מוצרים שונים. הקופסאות נארזות בתוך מכולה. בכל מכולה 20 קופסאות.
- א. מה ההסתברות שב קופסה אקראית לפחות מוצר אחד?
- ב. מה התוחלת ומהי סטיית התקן של מספר הקופסאות במכולה בהן לפחות מוצר אחד?
8. מטילים מטבח הוגן 5 פעמים. נגדיר את X – מספר הפעמים שהתקבל עז. חשבו את $E(x^2)$.

פתרונות : **שאלה 7 :**

- | | |
|-------------------|-------------------|
| א. 0.401 | ב. 0.2335 |
| ב. תוחלת : 8.025 | ג. 0.1493 |
| סטיית תקן : 2.193 | ד. תוחלת : 7 |
| | סטיית תקן : 1.449 |

 שאלה 8 :

7.5

 שאלה 3 :

- | | |
|-----------|--------------------|
| א. 0.5314 | ב. 0.0984 |
| ג. 0.1143 | ד. תוחלת : -18 |
| | סטיית תקן : 14.697 |

 שאלה 4 :

- | | |
|-----------|------|
| א. 0.1789 | ב. 2 |
|-----------|------|

 שאלה 5 :

- | | |
|-----------|-----------|
| א. 0.1956 | ב. 0.4253 |
|-----------|-----------|

 שאלה 6 :

- | | |
|----------------------|----------|
| א. 0.85 | ב. 0.182 |
| ג. תוחלת : 82 נקודות | |
| שונות : 91.8 נקודות | |

פרק 20 - התפלגיות בדיזות מיוחדות - התפלגות גיאומטרית

רקע:

חוורים באופן בלתי תלוי על אותו ניסוי ברנולי.
 X – מוגדר להיות מספר הניסויים שבוצעו עד ההצלחה הראשונה כולל.
 נסמן ב k את הסיכוי להצלחה בניסוי בודד וב- q את הסיכוי לכשלון בניסוי בודד.

$$X \sim G(p)$$

פונקציית ההסתברות:

$$k = 1, 2, \dots \infty \quad P(X = k) = p q^{k-1}$$

$$E(X) = \frac{1}{p} \quad : \quad \text{תוחלת}$$

$$V(X) = \frac{q}{p^2} \quad : \quad \text{שונות}$$

תכונות חשובות :

אם X מתפלג על פי התפלגות גיאומטרית, אז X בעל תכונת חוסר זיכרון, דהיינו,
 $P(X = n+k) / X > k) = P(X = n)$
 $P(X > k) = q^k$

דוגמה: (פתרון בהקלטה)

- בכד 10 כדורים יש - 3 מהם י록ים. אדם מוציא באקראי כדור אחר כדור עד שבידו כדור י록. ההוצאה היא עם החזרת הכדור לכד בכל פעם מחדש.
 א. מהי התפלגות של מספר הcadורים שהוציאו?
 ב. מה ההסתברות שהוציאו בדיק 5 כדורים?
 ג. מה ההסתברות שהוציאו יותר מ 5 כדורים?
 ד. אם הוציאו יותר מ - 3 כדורים . מה הסיכוי שהוציאו בדיק 5 כדורים?
 ה. מה התוחלת וסטיית התקן של מספר הcadורים שהוציאו?

תרגילים:

1. קו ייצור המוני מייצר מוצרים כך ש 5% מהם פגומים. איש בקרת איכות דוגם באופן מקרי מוצרים מקו הייצור עד אשר בידו מוצר פגום.
חשבו את ההסתברויות הבאות:
 א. שידגום 3 מוצרים.
 ב. שידגום 4 מוצרים.
 ג. שידגום 5 מוצרים.
 ד. שידגום יותר מ-7 מוצרים.
 ה. שידגום לא פחות מ-8 מוצרים.
2. צילום שבוצע במכון הרנטגן "RAY-X" יתקבל תקין בהסתברות של 0.9. אדם נכנס למכון כדי להצטלם. הוא יצא מהמכון רק כאשר יש בידו תצלום תקין.
 א. מה ההסתברות שיצטלם בסך הכל 3 פעמים?
 ב. מה ההסתברות שהצטלם יותר מ-4 פעמים?
 ג. מה התוחלת ומה השונות של מספר הצלומים שייבצע?
 ד. כל צילום עולה למכון 50 נק. אדם משלם על צילום תקין 100 נק. מה התוחלת ומה השונות של רווח המכון מאדם שהגיע להצטלם?
3. מטילים מטבע עד אשר מתקבלת התוצאה "עץ".
 א. מה ההסתברות להטיל את המטבע לכל היוטר 10 פעמים?
 ב. מה ההסתברות להטיל את המטבע לכל היוטר 5 פעמים אם ידוע שהמטבע הוTEL לפחות 3 פעמים?
 ג. אם ידוע שבשתי הטלות הראשונות התקבלה התוצאה "פלוי" מה ההסתברות שהאדם הטיל את המטבע 7 פעמים?
 ד. מה תוחלת מספר הפעמים שהתקבלת התוצאה "פלוי"?
4. 30% מהמכוניות בארץ הן בצביע לבן. בכל יום כניסה לחניון 10 מכוניות אקריאות.
 א. מה ההסתברות שביום מסוים בדיקת מחצית מהמכוניות בחניון יהיו לבנות?
 ב. מה תוחלת מספר הימים שייעברו מהיומם הראשון מחצית מהמכוניות בחניון יהיו לבנות?

5. אדם משחק במשחק מזל עד אשר הוא מפסיד. הכספי הוא שি�יחק את המשחק 10 פעמים.
מה הסיכוי להפסיד במשחק בודד?

- א. מה ההסתברות שישחק את המשחק בדיק 6 פעמים?
 - ב. מה ההסתברות שישחק את המשחק לכל היותר 12 פעמים?
 - ג. ידוע שהאדם שיחק את המשחק יותר מ-6 פעמים, מה ההסתברות ששיחק את המשחק בדיק 10 פעמים?
 - ד. מהי סטיית התקן של מספר הפעמים שישחק את המשחק?
-
-
6. במאפייה מייצרים עוגת גבינה ועוגת שוקולד שנארזות באריזות אוטומות. 40% מהעוגות הן עוגות גבינה והיתר עוגות שוקולד. התווית על האריזה מודבקת בשלב מאוחר יותר של הייצור. אדם נכנס למפעל ובוחר באקראי עוגה.
- א. מה ההסתברות שייאכל לבחור 5 עוגות עד שקיבל עוגות שוקולד?
 - ב. אם הוא דגם פחות מ-7 עוגות עד שיקבל עוגת שוקולד, מה ההסתברות שבפועל הוא דגם יותר מ-4 עוגות?
 - ג. האדם דוגם עוגות עד אשר הוא מוצא עוגת שוקולד ידוע שעוגת גבינה עולה לייצור 50 שקלים ועוגת שוקולד 30 שקלים. מהי התוחלת ומהי השונות של עלות הייצור הכוללת של העוגות שדגם?
 - ד. בהמשך לסעיף הקודם, מהי התוחלת ומהי סטיית התקן של מספר עוגת הגבינה שדגם האדם?

פתרונות: **שאלה 2 :**

- א. 0.009
 ב. 0.0001
 ג. תוחלת : 1.111
 ד. 0.1234:
 ה. תוחלת : 44.4
 ו. שונות : 308.5

 שאלה 3 :

- א. 0.999
 ב. 0.875
 ג. 0.03125
 ד. 1 .7

 שאלה 4:

- א. 0.1029
 ב. 9.72

 שאלה 5:

- א. 0.06
 ב. 0.7176
 ג. 0.0729
 ד. 9.487 ממשחקים

 שאלה 6 :

- א. 0.015
 ב. 0.0215
 ג. תוחלת $2777\frac{7}{9}$, שונות $63\frac{1}{3}$,
 ד. תוחלת $1.054\frac{2}{3}$, שונות

פרק 21 - התפלגויות בדידות מיוחדות - התפלגות איחידה

רקע:

התפלגות זו הינה התפלגות שבה לכל תוצאה יש את אותה הסתברות.
העריכים המתקבלים בהתפלגות הם החל מ- a ועד b בקפיצות של אחד.

$$X \sim U(a, b)$$

פונקציית ההסתברות:

$$P(X = K) = \frac{1}{b-a+1}$$

$$K = a, a+1, \dots, b$$

$$\text{תוחלת: } E(X) = \frac{a+b}{2}$$

$$\text{שונות: } V(X) = \frac{(b-a+1)^2 - 1}{12}$$

דוגמה: (פתרון בהקלטה)

אדם בוחר מספר אקראי בין 1 ל-100 כולל. מהי פונקציית ההסתברות של המספר ומה הצפי שלו?

תרגילים :

- .1. במשחק הלווטו 45 כדורים ממושפרים מ- 1 ועד 45 . נתבונן במשתנה X המספר של הcador הראשון שנשלף על ידי המכונה.
- чисבו את $P(X = 2)$
 - чисבו את $P(X \leq 30)$
 - чисבו את $P(X > 4 | X \leq 10)$
 - чисבו את $P(X = k)$
- .2. קוסם מבקש לבחור מספר שלם אקראי בין 1 ל- 100. בהנחה שאין כאן מניפולציות של הקוסם.
- מהי התוחלת ומהי סטיית התקן של המספר שיבחר?
 - הקוסם ביקש משישה אנשים לבחור מספר :
 - מה ההסתברות שלושה מהם יבחרו מספר גדול מ- 80?
 - מה התוחלת ומהי סטיית התקן של סכום המספרים שהאנשים בחרו? - יהי X התוצאה בהטלה קובייה.
 - מהי ההתפלגות של X ?
 - מה התוחלת של X ?
 - קובייה הוטלה 4 פעמים . מה התוחלת ומה השונות של סכום התוצאות ב- 4 הטלות?
- .4. בcad 10 כדורים שرك אחד צבע אדום. אדם מוציא כדור ללא החזרה עד אשר מתקבל הcador האדום. מה התוחלת ומהי השונות של מספר הcadורים שהוציאו?
- .5. יש לבחור מספר אקראי בין 1 ל- 50 כולל.
- מה הסיכוי שהמספר 4 יבחר?
 - מה הסיכוי שהמספר שיבחר גדול מ- 20 ?
 - אם נבחר מספר גדול מ- 20 מה ההסתברות שהוא קטן מ- 28?
- .6. הוכח שאם $E(X) = \frac{a+b}{2}$ אז מתקאים ש : $X \sim U(a,b)$

פתרונות: **שאלה 1 :**

$$\frac{1}{45} \text{ א. תשובה :}$$

$$\frac{30}{45} \text{ ב. תשובה :}$$

$$0.6 \text{ ג. תשובה :}$$

 שאלה 2

$$50.5 \text{ א. תוחלת :}$$

$$28.87 \text{ סטיית התקן :}$$

$$0.08192 \text{ ב. 1. תשובה :}$$

$$70.71 \text{ ב. 2. תוחלת : 303 סטיית התקן :}$$

 שאלה 4 :

$$5.5 \text{ תוחלת}$$

$$8.25 \text{ שונות}$$

פרק 22 - התפלגויות בדידות מיוחדות- התפלגות פואסונית

רקע:

התפלגות פואסונית היא התפלגות שמאפיינית את מספר האירועים שתרחשים ביחידת זמן. λ - פרמטר המאפיין את התפלגות הניל. הפרמטר מייצג את קצב האירועים ביחידת זמן. ככלומר, כמו בממוצע אירועים קוראים ביחידת זמן.

$$X \sim pois(\lambda)$$

התפלגות פואסונית חייבת להופיע כנתון בשאלת וכאן לא יהיה צורך לזרזזה .

פונקציית הסתברות של התפלגות הפואסונית נתונה:

$$P(X = K) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^K}{K!}$$

$$K = 0, 1, 2, \dots \infty$$

התוחלת והשונות של התפלגות:

$$E(X) = V(X) = \lambda$$

תכונות מיוחדות של התפלגות:

- בחתפלגות זו הפרמטר λ פורפורציוני לאינטראול הזמן שעליו דנים.
- אינטראולי זמן לא חופפים בלתי תלויים זה זהה.

דוגמה : (פתרון בהקלטה)

במועד טלפוני מתקבלות פניות בקצב של 5 פניות לדקה. מספר הפניות בדקה מתפלג פואסונית.

- א. מה ההסתברות שבדקה כלשהי תתקבל פנייה 1?
- ב. מה ההסתברות שבשתי דקות יגיעו 12 פניות?
- ג. מה ההסתברות שבדקה אחת תגיע פנייה 1 ובשתי דקות שלאחר מכן 12 פניות?
- ד. מה התוחלת וסטיית התקן של מספר הפניות בדקה?

תרגילים:

1. במקד טלפוני מתפלגות פניות בקצב של 5 פניות לדקה. מספר הפניות בדקה מתפלג פואסונית.
- מה ההסתברות שבדקה מתקבלת פניה ?
 - מה ההסתברות שבדקה מתקבלת לפחות פניה ?
 - מה ההסתברות שבדקה יתקבלו לכל היותר 2 פניות ?
 - מה שונות ממוצע הפניות בדקה ?
2. ממוצע הטעויות לעיתון מטופל פואסונית עם ממוצע של 4 טעויות לעמוד. בחלוקת מסויים של עיתון ישנים 5עמודים.
- מה ההסתברות שבחלק זה בדיק 18 טעויות ?
 - אם לעמוד הראשון אין טעויות, מה ההסתברות שבסך הכל בכול החלק ישן 15 טעויות ?
 - אם בחלק של העיתון נמצא בסך הכל 18 טעויות, מה ההסתברות ש-5 מהן לעמוד הראשון ?
3. ממוצע תאונות הדרכים הקטלניות במדינת ישראל מטופל פואסונית עם סטיית תקן של 2 תאונות בשבוע.
- מה תוכלת ממוצע התאונות בשבוע ?
 - מיי ההסתברות שהחודש (הנה שבchodש יש 4 שבועות) יהיה בדיק שבוע אחד בו יהיו 3 תאונות דרכים קטלניות ?
4. לחנות AMPM השכונתי ממוצע הליקוחות שנכנסים מטופל פואסונית עם ממוצע של 2 ליקוחות לדקה.
- מה ההסתברות שבדקה כלשהי יהיו בדיק 3 ליקוחות ?
 - מה ההסתברות שבדקה כלשהי יגיע לפחות ליקוח אחד ?
 - מה ההסתברות שבדקה כלשהי יהיו לכל היותר שני ליקוחות ?
 - מיי התוכלת ומה סטיית התקן של ממוצע הליקוחות שנכנסים לחנות בדקה ?
5. ממוצע הלידות בבית חולים מסוים מטופל פואסונית עם תוכלת של 8 לידות ביום.
- מיי ההסתברות שביום א' נולדו 10 תינוקות וביום ב' נולדו 7 תינוקות ?
 - מיילדת עובדת במשמרות של 8 שעות. מיי ההסתברות שבמשמרת שלה נולדו 3 תינוקות ?
 - מיי תוכלת של ממוצע הימים בשבוע בהם נולדים ביום עשרה תינוקות ?

. 6. במערכת אינטרנט לשילום חשבונות, מספר החשבונות המשולמים בשעה מתפלג פואסונית עם תוחלת של 30.

- א. כמה שעות צפויות לעבור עד אשר תתקבל שעה עם בדיק 33 חשבונות?
- ב. בין השעה 00:08 ל-20:08 היו 18 חשבונות, מה ההסתברות שבין 00:08 ל-10:08 היו בדיק 6 חשבונות?

פתרונות:**שאלה 1:**

- א. 0.0337
 ב. 0.9933
 ג. 0.1246
 ד. 5

שאלה 2:

- א. 0.084
 ב. 0.099
 ג. 0.151

שאלה 3:

- א. 4
 ב. 0.407

שאלה 5:

- א. 0.2388
 ב. 0.2196
 ג. 0.6948

שאלה 6:

- א. 16.7
 ב. 0.0708

פרק 23 - התפלגות בדיזוט מיוחדות - התפלגות היפרגאומטרית

רקע:

נתונה אוכלוסייה המכילה N פריטים, מתוכה D פריטים בעלי תכונה מסוימת- פריטים אלה נקראים "מיוחדים".

בוחרים מאותה אוכלוסייה n פריטים ללא החזרה.

X - מוגדר להיות מספר הפריטים ה"מיוחדים" שנdagmo.

משתנה מקרי היפרגאומטרי עם הפרמטרים (n, D, N) יסומן על ידי: $(n \sim H(N, D, N))$.

פונקציית ההסתברות של ההתפלגות:

$$P(X = k) = \frac{\binom{D}{k} \binom{N-D}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

התוחלת של ההתפלגות:

$$E(X) = n \cdot \frac{D}{N}$$

השונות של ההתפלגות:

$$V(X) = n \cdot \frac{D}{N} \cdot \left(1 - \frac{D}{N}\right) \cdot \frac{N-n}{N-1}$$

דוגמה : (הפתרוון בהקלטה)

בכיתה 40 תלמידים מתוכם 10 בנות והשאר בניים. בוחרים קבוצה של ארבעה תלמידים שיסיעו לשלחת .

א. כיצד מספר הבנים במשלחת מתפלג?

ב. מה התוחלת ומהי השונות של מספר הבנים במשלחת?

ג. מה הסיכוי שבמשלחת יהיו 3 בניים?

תרגילים:

1. בצד 5 כדורים אדומים ו-4 כדורים ירוקים. מוצאים באקראי שלושה כדורים מהצד.
 - א. בנו את פונקציית ההסתברות של מספר ה כדורים האדומים שהווצה בטבלה.
 - ב. חשבו את התוחלת והשונות של מספר ה כדורים האדומים שהווצה. פעמיות פונקציית ההסתברות ופעם מתוך הנוסחאות להתפלגות היפרגאומטרית.
 - ג. מה הייתה התוחלת והשונות של מספר ה כדורים האדומים אם ההוצאה הייתה עם החזרה?

2. בחידון 10 שאלות משלושה תחומיים שונים: 3 בתחום הספורט, 4 בתחום הבידור והיתר בתחום המדעים. משתף בחידון שלפ' באקראי 4 שאלות. נגידר את X להיות מספר השאלות מתחום הספורט שנשלפו.
 - א. בנו את פונקציית ההסתברות של X בנוסחה ולא בטבלה.
 - ב. מה התוחלת וסטיית התקן של X?
 - ג. חשבו את ההסתברות הבאה: $P(X = 2 | X > 1)$

3. זהה בסעיפים הבאים את התפלגות וחשב לכל התפלגות את התוחלת והשונות:

נדגמו 6 אנשים מתוך אוכלוסייה שבה 60% בעלי רישיון נהיגה.
אנו מתעניינים במספר האנשים שנdagmo עם רישיון נהיגה.

 - א. האוכלוסייה גדולה מאד.
 - ב. האוכלוסייה בת 10 אנשים.

4. בארגון עובדים 7 מהנדסים, 3 טכנאים ו- 5 הנדסאים. בוחרים באופן מקרי משלחת של 4 עובדים לכנס במדריד.
 - א. מהי ההסתברות שייבחרו רק מהנדסים?
 - ב. מה תוחלת מספר הטכנאים שייבחרו?

פתרונות: **שאלה 2**

ב. תוחלת : 1.5
0.748 סטיטית תקן :

ג. 0.9

 שאלה 1

ב. תוחלת : $\frac{5}{9}$ 1 $\frac{2}{3}$ שונות :

ג. תוחלת : $\frac{20}{27}$ 1 $\frac{2}{3}$ שונות :

פרק 24 - התפלגות בדיזות מיוחדות - התפלגות בינומית שלילית

רקע:

בהתפלגות זו חוזרים על אותו ניסוי ברנולי בזזה אחר זה באופן בלתי תלוי עד אשר מצליחים בפעם ה- r ית.

X- מספר החזרות עד שהתקבלו r הצלחות.

$$X \sim NB(r, p)$$

פונקציית ההסתברות:

$$P(X = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}$$

$$k = r, r+1, \dots, \infty$$

התוחלת:

$$E(X) = \frac{r}{p}$$

השונות:

$$V(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

דוגמה: (פתרון בהקלטה)

מטילים קובייה עד אשר מקבלים 3 פעמים תוצאה שהיא גדולה מ-4.

- א. מה הסיכוי להטיל את הקובייה 6 פעמים?
- ב. מה תוחלת ושונות מספר הפעמים שנטיל את הקובייה?

תרגילים:

1. בגד 4 כדורים שחורים ו-6 כדורים לבנים. אדם מוציא כדור באקראי פעם אחר פעם ומחזיר בין הוצאה להוצאה את הכדור. נסמן ב- X את מספר ה כדורים שהוא הוציא עד אשר הוא קיבל 2 כדורים לבנים בסך הכל אך לא בהכרח ברצף.
- חשבו את $P(X = 2)$
 - חשבו את $P(X = 3)$
 - חשבו את $P(X = 4)$
 - חשבו את $P(X = k)$
2. הסיכוי לזכות במשחק מזל הוא 0.4. אדם משחקים במשחק ומפסיק ברגע שהוא ניצח פעמיים (לא בהכרח ברצף).
- מה הסיכוי שישחק פעמיים?
 - מה הסיכוי שישחק 3 פעמיים?
 - מה הסיכוי שישחק 4 פעמיים?
 - מה הסיכוי שישחק 5 פעמיים?
 - מה הסיכוי שישחק K פעמיים?
3. הראה שההתפלגות הגאומטרית היא מקרה פרטי של ההתפלגות הבינומית השילילית.
4. מטילים מטבע שוב ושוב עד אשר מקבלים שלוש פעמים עץ בסך הכל.
- בנו את פונקציית ההסתברות של מספר ההצלחות הכוללות.
 - מהי התוחלת ומהי השונות של מספר ההצלחות הכוללות?
 - חווריות על התהילה שלעיל 5 פעמים. מה ההסתברות שפעמיים מתוך ה-5 חוזרות נאלץ להטיל את המטבע בדיק 4 פעמים?
5. יהיה X_{i_1} מספר החזרות עד ההצלחה הראשונה בניסיונות ברנוליים בלתי תלויים זה בזה כאשר $i=1,2,\dots$.
 הוכיח שתוחלת והשונות של $\sum_{i=1}^n X_{i_1}$ זהה לתוחלת והשונות של ההתפלגות הבינומית השילילית ($NB(n, p)$).

פתרונות: **שאלה 4**

- ב. תוחלת: 6 שונות: 6
ג. 0.1886

 שאלה 1

- א. 0.36
ב. 0.288

פרק 25 - קירוב פואסוני להסתברות הבינומית

רקע:

אם $X \sim B(n, p)$ עבור n גדול ו- k קטן ניתן לקרב את ההסתברות להיות פואסונית כאשר

$$\lambda = np$$

כasher פונקציית ההסתברות של ההסתברות הפואסונית כזכור היא :

$$p(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}$$

הערה : יש הטוענים כי n 'גדול' ו- k 'קטן' משמעו : $np \geq 10$ ו- $p \leq 0.1$.

דוגמה : (פתרונו בהקלטה)

בקו ייצור המוני 10% מהמוצרים כחולים . בוחרים באקראי 20 מוצרים מקו הייצור .
חשבו את ההסתברות שמתוך המוצרים שיבחרו בדיק 1 יהיה כחול .
פעם לפי ההסתברות הבינומית ופעם לפי הקירוב הפואסוני .

תרגילים:

1. במדינת שומקום 10% מהאוכלוסייה מובטלת . נדגו 10 תושבים אקרים מאותה מדינה. חשבו את הסיכוי שבמדגם יהיה לכל היותר מובטל אחד. השוו את התוצאה לקירוב הפואסוני.

2. מקו ייצור המוני נדגו 1000 מוצרים. ידוע ש- 5% מהמוצרים בכו הייצור פגומים. מה הסיכוי שבמדגם יתקבלו 45 מוצרים פגומים?

3. 1% מההתושבים באוכלוסייה גدولת חולמים במחלה מסוימת . בסניף קופת חולמים נרשמו 2000 תושבים אקרים. חשב לפי הקירוב הפואסוני שבdiock 18 מהם יהיו חולמים.

4. בעיר ניו יורק ישנים כתשעה מיליון תושבים מתוכם 900 אלף אסיאתים . מה בקירוב ההסתברות שמתוך 100 תושבים אקרים לפחות שני אסיאתים?

פתרונות:**שאלה 1:**

ללא קירוב 0.7361 עם קירוב : 0.7358

שאלה 2:

0.0458

שאלה 3:

0.0844

שאלה 4:

0.9995

פרק 26 - המשטנה המקרי הבדיקה - שאלות מסכימות

תרגילים:

1. נתון ש :

$$X \sim B(4, \frac{1}{2})$$

$$Y \sim B(10, \frac{1}{4})$$

א. חשב את התוחלת וסטיית התקן של X .

ב. $W = 2X - 4$, חשב את התוחלת וסטיית התקן של W .

ג. $T = X + Y$, חשב את התוחלת של T . האם ניתן לדעת מה סטיית התקן של T ?

2. עורך משחק בקזינו בשתי מכונות הימורים. משחק אחד בכל מכונה (במכונה א' ובמכונה ב'). הסיכוי

שלו לניצח במשחק במכונה א' הינו 0.08 והסיכוי שלו לניצח רק במכונה א' הינו 0.05. הסיכוי שלו להפסיד בשני המשחקים ביום מסוים הוא 0.88.

א. מה הסיכוי שעורן ניצח בשני המשחקים?

ב. מה התוחלת ומהי השונות של מספר הניצחונות של עורך?

ג. אם עורך נכנס לקזינו 5 פעמים ובכל פעם שיחק את שני המשחקים, מה ההסתברות שעורן ינצח בשני המשחקים בדיק פעם אחת מתוך חמישה פעמים?

3. לאדם צורר מפתחות. לצורך 5 מפתחות אשר רק אחד מתאים לדלת של ביתו. האדם מנסה את המפתחות באופן מקרי. לאחר שניסיה מפתח מסוים הוא מוציא אותו מהצרור כדי לא להשתמש בו

שוב. נסמן ב- X את מספר הניסיונות עד שהדלת תפתח.

א. בנה את פונקציית ההסתברות של X .

ב. חשב את התוחלת והשונות של X .

ג. כל ניסיון לפתח הדלת אורך חצי דקה. מה התוחלת ומה השונות של הזמן הכללי לפתיחה הדלת?

4. מספר התקלות בשידור "בערוץ 1" מתפלג פואסונית בקצב של 6 התקלות ביום.

א. מה ההסתברות שביום מסוים הייתה לפחות תקלת אחת?

ב. מה ההסתברות שבשבוע (7 ימי שידור) יהיו בדיק 6 ימים לפחות תקלת אחת?

ג. מה תוחלת מספר הימים שייעברו מהיום ועד היום הראשון בו לפחות תהיה תקלת אחת?

5. בעל חנות גודלה בקנינו שם לב ש- 40% מהמטופרים בחנותו נרכשים עבור ילדים, 35% נרכשים עבור נשים ו- 25% נרכשים עבור גברים. 10% מהמטופרים הנרכשים עבור ילדים הם מתוצרת חוץ, וכך גם 60% מהמטופרים הנרכשים עבור נשים ו- 50% מלאה הנרכשים עבור גברים.

א. מה ההסתברות למכור בחנות זו מוצר מתוצרת חוץ?

ב. יהיו X - מספר המטופרים שימכרו בחנות זו מפתחת ביום א' בובוקר, עד (וכול) שלראשונה יימכר מוצר מתוצרת הארץ. מהי פונקציית ההסתברות של X?

ג. מהי תוחלת מס' המטופרים מתוצרת חוץ שימכרו, עד שלראשונה יימכר מוצר מתוצרת הארץ?

ד. ביום ב' נמכרו בחנות 7 מוצרים. מה ההסתברות שבדיווק 3 מהם הם מתוצרת חוץ?

6. חברת הפקות של סרטים הפיקה 3 סרטים, אשר הופקו לטלוויזיה המקומית. חברת ההפקות מנסה למכור את הסרטים הללו לחו"ל.

להלן ההסתברויות למכירת הסרטים לחו"ל:

הסרט "הצבאי" יימכר לחו"ל בסיכון של 0.6.

הסרט "עלולים לא" יימכר לחו"ל בסיכון של 0.7.

הסרט "ሞות פתאומי" יימכר לחו"ל בסיכון של 0.2.

ידוע כי כל סרט עלה להפקה חצי מיליון שקלים. כמו כן, כל סרט הביא להכנסה של 200,000,000 שקלים מטהלויזיה המקומית. במידה וסרט יימכר לחו"ל, כל סרט יימכר ב-500,000 שקלים.

א. בנו את פונקציית ההסתברות של מספר הסרטים שיימכרו לחו"ל.

ב. מהי התוחלת והשונות של מספר הסרטים שיימכרו?

ג. מהי התוחלת ומהי סטיית התקן של הרוח (במאות אלפי שקלים) של חברת ההפקה?

7. במפעל מייצרים סוכריות כך ש 20% מהסוכריות בטעם תות. הייצור הוא ייצור המוני. שאר הסוכריות בטעמים שונים, השיקיות נארזות ובכל שקית בדיק 5 סוכריות.

א. נבחרה שקית ונמצא שבשקית פחות מ- 3 סוכריות אדומות. מה ההסתברות שבשקית סוכריה אדומה אחת?

ב. בוחרים באקראי شكית אחר شكית בטירה למצוא شكית ללא סוכריות אדומות. מה ההסתברות שייאלצו לדגום יותר מ-6 شكיות?

8. מבחו בניי משני חלקים. בחלק א' 10 שאלות ובחלק ב' 10 שאלות. תלמיד התכוון רק לחלק א' של המבחן ובחalk זה בכל שאלה יש סיקוי של 0.8 שיענה נכון, בחלק השני לכל שאלה יש 4 תשובות כשרק אחת נכונה. בחלק זה הוא מנתש את התשובות.

א. מהי ההסתברות שבחלק הראשון הוא יענה נכון על 7 שאלות בדיקות?

ב. מהי ההסתברות שבחלק השני הוא יענה נכון על לפחות מ-3 שאלות?

ג. מה התוחלת ומה השונות של מספר התשובות הנכונות בחלק הראשון?

ד. מהי התוחלת ומהי השונות של מספר התשובות הנכונות בבדיקה כולה?

9. יהיו X משתנה מקרי המקיים $E(X) = 2$ ו- $V(X) = 1$. חשב $E(X^2)$.

10. הסיכוי לעبور מבחן הנהיגה הינו P . בוחרים באקראי ארבעה נבחנים. ההסתברות שניים מהם

יעברו את מבחן הנהיגה גבוהה פי 3/8 מהסיכוי שכל הארבעה יעברו את המבחן.

א. חשבו את ערכו של P .

תלמיד ניגש לבחינה עד אשר הוא עבר אותה.

ב. מה ההסתברות שיעבור את מבחן הנהיגה רק ב מבחן הרביעי?

ג. מה ההסתברות שייאלץ לגשת לפחות לחמשה מבחנים בסך הכל?

ד. מה התוחלת ומהי השונות של מספר המבחנים שבהם יכשל?

ה. ידוע שהתלמיד ניגש לשולשה מבחנים ועדין לא עבר. מה ההסתברות שבסוףו של דבר יעבור ב מבחן הנהיגה החמישי?

11. רובוט נמצא בנקודה 0 על ציר המספרים. הרובוט מבצע χ צעדים ובכל צעד הוא נע בסיכוי P ימינה ביחידת אחת ובסיכוי $P-1$ שמאה ביחידת אחת. נסמן ב- X את המספר עליו עומד הרובוט לאחר χ צעדים. רשמו את פונקציית ההסתברות של X באמצעות P ו- χ .

12. למטרע יש סיכוי P לקבל את התוצאה ראש. מטילים את המטרע. אם יוצא ראש בפעם הראשונה מפסידים שקל ומפסידים את המשחק. אחרת, ממשיכים לזרוק וזוכים במספר שקלים לפי מספר הפעמים שהטלו את המטרע מההתחלת ועד שהתקבל ראש.

א. בנו את פונקציית ההסתברות של רוחם המשחק (באמצעות P).

ב. בטאו את תוחלת הרוחם באמצעות P .

ג. לאילו ערכי P המשחק כדאי?

פתרונות: **שאלה 1:**

א. תוחלת: 2

סטטיסטית תקן: 1

ב. תוחלת: 0

סטטיסטית תקן: 2

ג. תוחלת: 4.5

סטטיסטית תקן: לא ניתן

 שאלה 2:

א. 0.03

ב. תוחלת: 0.15, שונות: 0.1875

ג. 0.1328

 שאלה 3:

א.

5	4	3	2	1	x
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	P(x)

ב. תוחלת: 3

שונות: 2

ג. תוחלת: 1.5

שונות: 0.5

 שאלה 4:

א. 0.9975

ב. 0.0172

ג. 1.0025

שאלה 5 :

- א. 0.375
ג. 0.6
ד. 0.282

 שאלה 6 :

- ב. תוחלת : 1.5
שונות : 0.61
ג. תוחלת : 0
סטיית תקן : 4.68

 שאלה 7 :

- א. 0.4348
ב. 0.0923

 שאלה 8 :

- א. 2.013
ב. 0.5256
ג. תוחלת : 8
שונות : 1.6
ד. תוחלת : 10.5 :
שונות : 3.475

 שאלה 9 :

10

 שאלה 10 :

- א. 0.6
ב. 0.0384
ג. 0.0256
ד. תוחלת : 0.67
שונות : 1.11
ה. 0.24

 שאלה 12 :

$$\frac{1-2p^2}{p} \text{ ב}$$

$$0 < p < \sqrt{\frac{1}{2}} \text{ ג}$$

פרק 27 - המשטנה המקרי הרציף - התפלגויות כלליות (שימוש באינטגרלים)

רקע:

בפרק זה עוסק בהתפלגות של משתנים מקרים רציפים (גובה אדם אكري, זמן תגובה וכו').
משתנים רציפים הם משתנים שבתחום מסוים מקבלים רצף אינסופי של ערכים אפשריים בינו לבין
למשתנים בדים.

נתאר את המשטנה המקרי הרציף על ידי פונקציה הנראית פונקציית צפיפות. באופן כללי נסמן
פונקציית צפיפות של משתנה רציף כלשהו ב $f(x)$.
השיטה שמתוחת לפונקציית הצפיפות נותנת את ההסתברות.
פונקציית צפיפות חייבת להיות לא שלילית והשיטה הכלול שמתוחת לפונקציה יהיה תמיד 1.

פונקציית התפלגות מצטברת:

$$F(t) = p(X \leq t) = \int_{-\infty}^t f(x)dx$$

כמו כן :

$$p(a < X < b) = F(b) - F(a) \quad p(X > t) = 1 - F(t)$$

תוחלת של משתנה רציף :

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} X \cdot f(x)dx = \mu$$

שונות של משתנה רציף :

$$V(X) = \int_{-\infty}^{\infty} X^2 \cdot f(x)dx - \mu^2 = \sigma^2$$

תוחלת של פונקציה של X :

$$E(g(x)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx$$

אחוזונים :

האחוזון ה- P הוא ערך (נסמן אותו : x_p) שהסיכוי ליפול מתחתיו הוא P . כלומר :

$$p(X \leq x_p) = p$$

ריענון מתמטי:נוסחאות לחישוב שטחים:

$$\text{שטח משולש: גובה (h) כפול הבסיס (a) חלקי 2 : } S_{triangle} = \frac{h \cdot a}{2}$$

$$\text{שטח מלבן: אורך (a) כפול רוחב (b) : } S_{rectangle} = a \cdot b$$

משוואת קו ישר:

$$\begin{aligned} y &= mx + n \\ m &= \text{שיפוע}. \\ n &= \text{نקודת החיתוך עם ציר ה}-y. \end{aligned}$$

$$m = \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1} : (X_1, Y_1), (X_2, Y_2) : \text{שיפוע של ישר העובר דרך שתי נקודות :}$$

משוואת ישר שעובר דרך נקודה ספציפית (X_1, Y_1) ושיפועו ידוע m :

$$y - Y_1 = m(x - X_1)$$

נוסחאות - אינטגרלים

$$\int adx = ax + c$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c \quad n \neq -1$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + c$$

$$\int e^x dx = e^x + c$$

$$\int k^x dx = \frac{k^x}{\ln k} + c$$

$$\int \cos x dx = \sin x + c$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + c$$

$$\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + c$$

$$\int \cot x dx = \ln |\sin x| + c$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + c$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + c$$

$$\int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + c \quad n \neq -1$$

$$\int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \ln |ax+b| + c$$

$$\int e^{ax+b} dx = \frac{1}{a} e^{ax+b} + c$$

$$\int k^{ax+b} dx = \frac{1}{a} \frac{k^{ax+b}}{\ln k} + c$$

$$\int \cos(ax+b) dx = \frac{1}{a} \sin(ax+b) + c$$

$$\int \sin(ax+b) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax+b) + c$$

$$\int \tan(ax+b) dx = -\frac{1}{a} \ln |\cos(ax+b)| + c$$

$$\int \cot(ax+b) dx = \frac{1}{a} \ln |\sin(ax+b)| + c$$

$$\int \frac{1}{\cos^2(ax+b)} dx = \frac{1}{a} \tan(ax+b) + c$$

$$\int \frac{1}{\sin^2(ax+b)} dx = -\frac{1}{a} \cot(ax+b) + c$$

$$\int \frac{1}{\cos x} dx = \ln \left| \frac{1}{\cos x} + \tan x \right| + c$$

$$\int \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \left(\frac{x}{a} \right) + c$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin \left(\frac{x}{a} \right) + c$$

$$\int \frac{1}{\sin x} dx = \ln \left| \frac{1}{\sin x} - \cot x \right| + c$$

$$\int \frac{1}{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + c$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + c$$

$$\int \frac{f'}{f} dx = \ln |f| + c$$

$$\int e^f \cdot f' dx = e^f + c$$

$$\int \sin f \cdot f' dx = -\cos(f) + c$$

$$\int \sqrt{f} \cdot f' dx = \frac{2}{3} f^{\frac{3}{2}} + c$$

$$\int f \cdot f' dx = \frac{1}{2} f^2 + c$$


$$\int \cos f \cdot f' dx = \sin(f) + c$$

$$\int \frac{f'}{\sqrt{f}} dx = 2\sqrt{f} + c$$

$$\int u \cdot v' dx = u \cdot v - \int u' \cdot v dx$$

תרגילים:

1. X הינו משתנה רציף עם פונקציה צפיפות כמפורט בשרטוטו :



א. מצא את ערכו של c .

ב. בנה את פונקציית ההתפלגות המיצטברת.

ג. חשבו את ההסתברויות הבאות :

$$P(x < 4) \quad .1$$

$$P(x > 1.5) \quad .2$$

$$P(1.5 < x < 5) \quad .3$$

$$P(5 < x < 10) \quad .4$$

ד. מצא את החזיון של המשתנה.

2. נתון משתנה מקרי רציף X שפונקציית הצפיפות שלו היא :

$$f(x) = \begin{cases} cx & 0 \leq x \leq b \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$


$$\text{ידעו ש- } P(0 < X < 1) = 1/4$$

א. מצאו במפורש את פונקציית הצפיפות של X .


ב. מצאו את החזיון של X .

ג. מה הסיכוי ש- X קטן מ- 0.5 ?

3. נתונה פונקציה צפיפות של משתנה מקרי Y :




- א. מצאו את c .
 - ב. מצאו את פונקציית ההתפלגות המצטברת של Y .
 - ג. חשבו את ההסתברויות: $P(Y > 4)$, $P(7.5 \leq Y \leq 15.5)$, $P(Y \leq 3.0)$, $P(Y = 7.0)$.
 - ד. מצאו את העשירון התחתיו $y_{0.1}$, הרביעון התחתיו $y_{0.25}$ והחציון של Y . הסיקו מהו העשירון עליון $y_{0.9}$.
4. נתונה פונקציית צפיפות של משתנה מקרי X :



- א. מצאו ערך c שעבורו תתקבל פונקציית צפיפות.
- ב. מצאו את פונקציית ההתפלגות המצטברת.
- ג. חשבו את ההסתברויות הבאות: $P(1.0 < X \leq 5.0)$, $P(X \geq -2.0)$, $P(X \geq 4)$.

5. נתונה פונקציית הצפיפות הבאה :



א. מה ערכו של C ?

ב. מצא אינטראול (תחום) סימטרי סביב הערך 5 שהסיכוי ליפול בו הינו 0.5

6. נתונה פונקציית צפיפות $f(X) = \frac{2}{x}$ פונקציה זו מוגדרת מ-1 ועד K .

א. מצא את ערכו של K .

ב. בנה את פונקציית ההסתפלגות המיצטברת.

ג. חשב את הסיכוי ש X לפחות 1.5.

ד. מצא את העשירון התיכון של ההסתפלגות.

ה. מה התוחלת של X ?

7. נתונה פונקציית צפיפות הבאה : $f(X) = AX^2(10 - X)$ $0 < X < 10$ A הינו קבוע חיובי.

א. מצא את A .

ב. חשב את $P(X > 5 | X > 2)$.

ג. מה התוחלת ומהי השונות של X ?

$f(x) = 0.5 \cdot e^{2x}$ 8. פונקציית הצפיפות של משתנה מקרי רציף X :
 $-\infty \leq X \leq \ln(c)$


א. מצא את ערכו של c .

ב. מצא את פונקציית ההסתפלגות המיצטברת של ההסתפלגות.

ג. חשב $P(X > 0)$.

ד. מהו הרבעון העליון של ההסתפלגות?

9. נתונה פונקציית הצפיפות הבאה של משתנה מקרי X :



א. רשם את נוסחת פונקציית הצפיפות.

ב. בנה את פונקציית ההסתברות המצטברת.

ג. מצא את החזיון של ההסתברות.

ד. חשב את התוחלת והשונות של המשתנה.

ה. חשב את $E(X^3)$

10. בפעל מייצרים מוצר A. זמן תחיליק הייצור של המוצר בשעות הוא בעל פונקציית הצפיפות
הבא:

$$f(x) = 6x(1-x) \quad 0 \leq x \leq 1$$

א. מה ההסתברות שזמן הייצור של מוצר A אקראי יהיה קטן מ 20 דקות?

ב. מה ההסתברות שזמן הייצור של מוצר A אקראי יהיה בדיק חצי שעה?

ג. נבחרו חמישה מוצרים אקראים מסווג A. מה תוחלת מספר המוצרים שזמן הייצור
שליהם יהיה גדול מ 20 דקות?

11. זמן ההמתנה בדקות של לקוח בתור למכונית השכונית מתפלג עם פונקציית ההסתברות
המצטברת הבאה:

$$F(t) = 1 - e^{-0.2t}$$

א. שרטט את פונקציית ההסתברות המצטברת.

ב. מה הסיכוי שזמן ההמתנה יהיה לפחות רבע שעה?

ג. אם חיכיתי בתור כבר 10 דקות מה ההסתברות שאאלץ לחכות בסך הכל פחות מربع
שעה?

ד. מהו הזמן ש 90% מהלkyות מרכיבים מתחתיו?

12. פונקציית הצפיפות של משתנה מקרי נתונה על ידי הנוסחה הבאה :

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < 4 \\ bx - 4b & 4 \leq x \leq 5 \\ b & 5 < x \leq 6 \\ 0 & x > 6 \end{cases}$$

- א. מצאו את b .
- ב. חשבו את התוחלת של X .
- ג. Y הוא משתנה אינדייקטור המקבל את הערך 1 אם X קטן מ-5. מהי השונות של Y ?

13. נתונה פונקציית הצפיפות הבאה :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{4} & 1 \leq x \leq 2 \\ kx & 2 < x \leq 3 \end{cases}$$

- א. מצאו את ערכו של K .
- ב. מצאו את פונקציית ההתפלגות המצטברת.
- ג. חשבו $p(X > 2.5)$

14. להלן משתנה מקרי בעל פונקציית צפיפות הבאה :

$$f(x) = \frac{1}{b-a}$$

$$a \leq x \leq b$$

- א. מצא את פונקציית ההתפלגות המצטברת.
- ב. חשב את התוחלת והשונות של ההתפלגות.

$$\text{ג. מצא את התוחלת של } \frac{1}{X}$$

פתרונות: שאלה 2 :

- a. $b=2 \ c=0.5$
 b. 1.41
 c. 0.0625

 שאלה 1 :

$$3\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{16}$$

 שאלה 4 :

a. 10

 שאלה 3 :

a. 0.2

ג. $0.32, 0.125, 0.18, 0$

ד. העשרון התיכון : 2.24

הרביעון התיכון : 3.54

החציון : 5

העשרון העליון : 7.76

 שאלה 6 : שאלה 5 :

a. $C=0.2$

$$5 \pm 1.46$$

$$\frac{1}{e^2}$$

g. 0.189

d. 1.051

h. 1.297

 שאלה 8 :

a. 2

g. 0.75

d. 0.549

 שאלה 7 :

a. 0.0012

b. 0.7067

c. תוחלת : 6, שונות : 4

שאלה 9 :**שאלה 10 :**

$$\frac{7}{27}$$

א.

$$2\frac{2}{3}$$

ג. 0.6927 ד. 2.625 שונות :

ב.
0
 3.704

ה. 23.4375

שאלה 12 :

$$\frac{2}{3}$$

א.

ב. 5.22

$$\frac{2}{9}$$

ג.

שאלה 11 :

ב. 0.0498

ג. 0.6321

ד. 11.51

שאלה 14 :

ב. תוחלת :

$$E(X) = \frac{a+b}{2}$$

שאלה 13 :

$$\frac{1}{6}$$

א.

ג. 0.229

השונות :

$$V(x) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

פרק 28 - התפלגויות רציפות מיוחדות - התפלגות מעריכית

רקע:

התפלגות זו היא התפלגות רציפה המאפיינת את הזמן עד להתרחשות מסוימת.
ג- הוא ממוצע מספר האירועים המתרחשים ביחידת זמן (אותו פרמטר מההתפלגות ה بواسונית).

$$\lambda > 0 \quad \text{כאשר} \quad X \sim \exp(\lambda)$$

התפלגות זו צריכה להיות נתונה בתרגיל או שיאמר שמספר האירועים ביחידת זמן מתפלג بواسונית וזו הזמן עד התרחשות המאורע הבא מתפלג מעריכית.

פונקציית הצפיפות של התפלגות היא :

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \quad \text{לכל } x \geq 0$$

פונקציית התפלגות המסתברת היא :

$$F(t) = p(X \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

התוחלת:

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

השונות:

$$V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

- להתפלגות זו יש תכונת חוסר הזיכרון : $P(X > a + b | X > a) = P(X > b)$

דוגמה : (פתרון בהקלטה)

- אורך חי סוללה מתפלג מעריכית עם תוחלת של 8 שעות.
- א. מה ההסתברות שסוללה תחזיק מעמד פחות מ- 9 שעות?
 - ב. מה סטיית התקן של אורך חי הסוללה?
 - ג. אם סוללה כבר חיה מעל שעתיים, מה הסיכוי שהיא תחיה מעל 7 שעות בסך הכל?

תרגילים:

1. הזמן שלוקח במערכת עד שתתקלה מתרחשת מתפלג מעריכית עם תוחלת של 0.5 שעה.

- א. מה הסתברות שהתקלה הבאה תתרחש תוך יותר מ-0.5 שעה?
- ב. מה ההסתברות שהתקלה הבאה תתרחש תוך פחות משעה?
- ג. מצא את הזמן החזיוני להתרחשות תקלה במערכת.

2. הזמן שעובר בכיביש מסוים עד להתרחשות תאונה מתפלג מעריכית עם תוחלת של 24 שעות.

- א. מהי סטיית התקן של הזמן עד להתרחשות תאונה?
- ב. מה ההסתברות שהטאונה הבאה תתרחש תוך פחות מיממה?
- ג. מהי ההסתברות שהטאונה הבאה תתרחש תוך לפחות יומיים?


3. משך הזמן X (בדיקות) שסטודנטים עובדים רצוף על מחשב מתפלג מעריכית עם תוחלת של 30 דקות.

- א. מה הסיכוי שעבודת סטודנט על המחשב תארך לפחות מרבע שעה?
- ב. מה הסיכוי שעבודת סטודנט על המחשב תארך בין רביע שעה לחצי שעה?
- ג. אם סטודנט עובד על המחשב כבר יותר מ- 10 דקות, מה ההסתברות שימושו כל עובdotgo עליה על 30 דקות?
- ד. מהו הזמן שבסיכון של 90% הסטודנט יעבד פחות ממנו?

4. בממוצע מגיעים לחדר מיוון 4 חולים בשעה בזורם פואסוני.

- א. שולח המזכירה הגיעה לחדר המיוון. מה ההסתברות שזמן המתנה שלה לחולה הבא יהיה יותר מ- 20 דקות?
- ב. אם שולח המתינה יותר מרבע שעה לחולה הבא. מה ההסתברות שתמתין בסך הכל יותר מחצי שעה?
- ג. מה ההסתברות שבין החולה הראשון לשני יש להמתין יותר מרבע שעה ובין החולה השני לשישי יש להמתין פחות מרבע שעה?

5. מערכת חשמלית כוללת 4 רכיבים אלקטרוניים זהים הפעלים במקביל כמפורט בשרטוט:



על מנת שהמערכת תפעל בצורה תקינה נדרש שלפחות אחד מהמרכיבים יהיה תקין.

אורך החיים של כל רכיב מתפלג מעריכית עם ממוצע של 100 שעות.

א. מה ההסתברות שהמערכת תפעל בצורה תקינה במשך 100 שעות לפחות?

ב. מעוניינים להוסיף במקביל עוד רכיב למערכת. עלות הוספה רכיב היא K ש. כמו כן אם

המערכת עבדה פחות מ-100 שעות נגרם הפסד של A ש.

מה התנאי שבו יהיה כדי להוסיף את הרכיב למערכת?

פתרונותות: **שאלה 1 :**

- א. 0.368
 ב. 0.865
 ג. 0.347

 שאלה 2 :

- א. 24 שעות
 ב. 0.632
 ג. 0.135

 שאלה 3 :

- א. 0.393
 ב. 0.239
 ג. 0.513
 ד. 69.08

 שאלה 4 :

- א. 0.264
 ב. 0.368
 ג. 0.233

 שאלה 5 :

- א. 0.8403
 ב. K > 0.0588

פרק 29 - התפלגיות וציפיות מיוחדות - התפלגות אחידה

רקע:

זו התפלגות שפונקציית הצפיפות שלה קבועה בין a לבין b.

$$X \sim U(a, b)$$

פונקציית הציפיות:

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \quad a \leq x \leq b$$

פונקציית ההתפלגות המצטברת:

$$F(t) = \frac{t-a}{b-a}$$

התוחלת:

$$E(X) = \frac{a+b}{2}$$

השונות:

$$V(x) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

דוגמה: (הਪתרוון בהקלטה)

X- משתנה מקרי רציף המתפלג באופן אחיד בין 20 ל- 40 .

- א. מה הסיכוי ש- X קטן מ-25?
- ב. מה התוחלת והשונות של X?

תרגילים:

1. משך (בדיקות) הפסקה בשיעור, X , מתפלג $U(13, 16)$.
 - א. מהי התוחלת ומהי סטיית התקן של משך הפסקה?
 - ב. מהי ההסתברות שהפסקה תמשך יותר מ- 15 דקות?
 - ג. מהי ההסתברות שימוש הפסקה יסטה מהתוחלת בפחות מדקה?

2. רכבת מגיעה לתחנה בשעות היום כל עשר דקות. אדם הגיע לתחנה בזמן אקראי.
 - א. הסביר כיצד מתפלג זמן החמתנה לרכבת?
 - ב. אם זמן החמתנה לרכבת ארוך יותר מ-5 דקות, מהי ההסתברות שבסך הכל האדם ימתין לרכבת פחות מ- 8 דקות?
 - ג. מה תוחלת מס' הימים שייעברו עד הפעם הראשונה שהאדם ימתין לרכבת יותר מ-9 דקות?

3. מכונה אוטומטית ממלאת גביעי גלידה. משקל הגלידה לגבייע מתפלג אחד בין 100-110 גרם (המשקל הוא של גלידה ללא הגביע).
 - א. מה ההסתברות שימוש הגלידה בגביע יהיה מעל 108 גרם?
 - ב. נתון שהגלידה בגביע עם משקל נמוך מ-107 גרם. מה ההסתברות שימוש הגלידה יהיה מעל 105 גרם?
 - ג. מה העשירון העליון של משקל הגלידה בגביע?

פתרונותות: **שאלה 2:**

$X \sim U(0,10)$ א.

0.6 ב.

10 ג.

 שאלה 1:

14.5 א. תוחלת :

0.866 שוננות :

1/3 ב.

2/3 ג.

 שאלה 3:

0.2 א.

$\frac{2}{7}$ ב.

109 ג.

פרק 30 - התפלגויות רציפות מיוחדות - התפלגות נורמלית

רקע:

התפלגות נורמלית הינה התפלגות של משתנה רציף. ישנו משתנים רציפים מסוימים שנוהג להתייחס אליהם כנורמליים כמו: זמן ייצור, משקל תינוק ביום הילולו ועוד. פונקציית הצפיפות של ההתפלגות הנורמלית נראה ככזה לעמום:



לעומתה זו קוראים גם עקומת גaus ועוממה אחת נבדלת מהשניה באמצעות הממוצע וסטיית התקן שלה. אלה הם הפרמטרים שמאפיינים את ההתפלגות.

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

נוסחת פונקציית הצפיפות:

כדי לחשב הסתברויות בהתפלגות נורמלית יש לחשב את השטחים הרלבנטיים שמתוחת לעוממה. כדי לחשב שטחים אלה נמיר כל ההתפלגות נורמלית להתפלגות נורמלית סטנדרטית על ידי תהליך הנקרא תקנון.

התפלגות נורמלית סטנדרטית היא ההתפלגות נורמלית שהממוצע שלה הוא אפס וסטיית התקן היא אחת והיא מסומן באות Z .



$$Z \sim N(0, 1^2)$$


תהליך התקנון מבוצע על ידי הנוסחה הבאה:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

אחרי התקנון מקבלים ערך הנקרא ציון תקן. ציון התקן משמעו בכמה סיטיות תקן הערך סוטה מהממוצע. לאחר חישוב ציון התקן של ערך מסוים נעררים בטבלה של ההתפלגות הנורמלית הסטנדרטית לחישוב השטח הרצוי.

ובאופן כללי נתאר את הסכמתה הבאה :



טבלת ההתפלגות המצטברת הנורמלית סטנדרטית – ערכי $\Phi(z)$


z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998

z	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090	3.291	3.891	4.417
$\Phi(z)$	0.90	0.95	0.975	0.99	0.995	0.999	0.9995	0.99995	0.999995

דוגמיה: (הਪתרוון בהקלטה)

משקל חפיסות שוקולד המיצירות בחברה מתפלג נורמלית עם ממוצע 100 גרם בסטיית תקן של 8 גרם.

- א. מה אחוז חפיסות השוקולד שעשוולות מתחת ל- 110 גרם?
- ב. מה אחוז חפיסות השוקולד העשוולות מעל 110 גרם?
- ג. מה אחוז חפיסות השוקולד העשוולות מתחת ל 92 גרם?
- ד. מהו המשקל של 90% מהחפיסות בקע הייצור שוקלים פחות מהם?

תרגילים:

1. הגובה של אנשים באוכלוסייה מסוימת מתפלג נורמלית עם ממוצע של 170 ס"מ וסטיית תקן של 10 ס"מ.

א. מה אחוז האנשים שגובהם מתחת ל- 182.4 ס"מ?

ב. מה אחוז האנשים שגובהם מעל 190 ס"מ?

ג. מה אחוז האנשים שגובהם בדיק 173.6 ס"מ?

ד. מה אחוז האנשים שגובהם מתחת ל- 170 ס"מ?

ה. מה אחוז האנשים שגובהם לכל היותר 170 ס"מ?

2. נתון שהזמן שלוקח לטרופה מסוימת להשפייע מתפלג נורמלית עם ממוצע של 30 דקות וdispersion של 9 דקות רביעות.

א. מהי פרופורציה המקרים בהן הטרופה תעזרו יותר מאשר משעה?

ב. מה אחוז מהקרים שבחון הטרופה תעזר בין 35 ל-37 דקות?

ג. מה הסיכוי שהטרופה תעזר בדיק 36 דקות?

ד. מה שיעור המקרים שבהם ההשפעה של הטרופה תסטה מ-30 דקות לפחות מ-3 דקות?

3. המשקל של אנשים באוכלוסייה מסוימת מתפלג נורמלית עם ממוצע של 60 ק"ג וסטיית תקן של 8 ק"ג.

א. מה אחוז האנשים שמשקלם נמוך מ- 55 ק"ג?

ב. מהי פרופורציה האנשים באוכלוסייה שמשקלם לפחות 50 ק"ג?

ג. מהי השכיחות היחסית של האנשים באוכלוסייה שמשקלם בין 60 ל- 70 ק"ג?

ד. לאיזה חלק מהאוכלוסייה משקל הסוטה מהמשקל הממוצע ללא יותר מ- 4 ק"ג?

ה. מה הסיכוי שאדם אكري ישקל מתחת ל – 140 ק"ג?

4. משקל תינוקות ביום היולדם מתפלג נורמלית עם ממוצע של 3300 גרם וסטיית תקן 400 גרם.

א. מצאו את העשירון העליון.

ב. מצאו את האחוזון ה-95.

ג. מצאו את העשירון התיכון.

- . 5. ציוני מבחון אינטיליגנציה מתפלג נורמלית עם ממוצע 100 ושונות 225 .
 א. מה העשironו העליון של הציונים בבחון האינטיליגנציה?
 ב. מה העשironו התחתון של ההתפלגות?
 ג. מהו הציון ש- 20% מהבחנים מקבלים מעליו?
 ד. מהו האחוזון ה- 20?
 ה. מהו הציון ש- 5% מהבחנים מקבלים מתחניו?
6. נפח משקה בבקבוק מתפלג נורמלית עם סטיית תקן של 20 מ"ל, נתנו ש 33% מהבקבוקים הם
 עם נפח שעולה על 508.8 מ"ל.
 א. מה ממוצע נפח משקה בבקבוק ?
 ב. 5% מהבקבוקים המיוצרים עם הנפח הגבוה ביותר ביותר נשלחים לבדיקה, החל מאיזה נפח
 שלוחים בקבוק לבדיקה?
 ג. 1% מהבקבוקים עם הנפח הקטן ביותר נתרמים לצדקה, מהו הנפח המקסימלי לצדקה?
7. אורך חיים של מכשיר מתפלג נורמלית . ידוע שמחצית מהמכשירים חיים פחות מ- 500 שעות,
 כמו כן ידוע ש- 67% מהמכשירים חיים פחות מ- 544 שעות.
 א. מהו ממוצע אורך חי מכשיר?
 ב. מהי סטיית בתקן של אורך חי מכשיר?
 ג. מה הסיכוי שמכשיר אקראי יהיה פחות מ- 460 שעות?
 ד. מהו המאון העליון של אורח חי מכשיר?
 ה. 1% מהמכשירים בעלי אורך החיים קצר ביותר נשלח למעבדה לבדיקה מעמיקה. מהו
 אורך החיים המקסימלי לשילוח מכשיר למעבדה?

8. להלן שלוש התפלגויות נורמליות של שלוש קבוצות שונות ששורטטו באותה מערכת ציריים. החתפלגויות מוספרו כדי להבדיל ביניהן.



- א. לאיזו התפלגות הממוצע הגבוה ביותר?
- ב. במה בין המדדים הבאים התפלגות 1 ו 2 זהות?
- א. בעשרון העליון.
 - ב. בממוצע.
 - ג. בשוננות.
- ג. לאיזו התפלגות סטיית התקן הקטנה ביותר?
- א. 1
 - ב. 2
 - ג. 3
 - ד. אין לדעת.
9. הזמן שלוקח לאדם להגיע לעבודתו מתפלג נורמלית עם ממוצע של 40 דקות וסטיית התקן של 5 דקות.
- א. מה ההסתברות שמשך הנסיעה של האדם לעבודתו יהיה לפחות רביעי השעה?
- ב. אדם יצא לעבודתו בשעה 10:08 מביתו. הוא צריך להגיע לעבודתו בשעה 09:00. מה הסיכוי שייאחר לעבודתו?
- ג. אם ידוע שהוא נסיעתו לעבודה תהיה יותר משלושת רביעי השעה. מה ההסתברות שהוא הנסיעה הכוללת יהיה פחות מ- 50 דקות?
- ד. מה הסיכוי שבשבוע (חמשה ימי עבודה) בדיק פעם אחת יהיה זמן הנסיעה לפחות שלושת רביעי השעה?

10. ההוצאה החודשית לבית אב בעיר "טרירה" מתפלגת נורמלית עם ממוצע של 2000 דולר וסטיית תקן של 300 דולר. בחרו באקראי 5 בתי אב. ההסתברות שלפחות אחד מהם מוציא בchodש מעלה ל- T 0.98976 .

א. מה ערכו של T ?

ב. מה הסיכוי שההוצאה החודשית של בית אב בעיר תהיה לפחות סטיטית. תקן אחד מעלה T ?

ג. מסתבר שנפלה טעות בנתונים, ויש להוסיף 100 דולר לחוצאות החודשית של כל בתיה האב בעיר. לאור זאת, מה ההסתברות שההוצאה החודשית של בית אב נמוכה מ-1800 דולר?

11. אורך שיר אקראי המשודר ברדיו מתפלג נורמלית עם תוחלת של 3.5 דקות וסטיית תקן של שלושים שניות.

א. מה ההסתברות שאורך של שיר אקראי המונגן ברדיו יהיה בין 3 ל 2.5 דקות?

ב. מהו הטווח הבין רבוני של אורך שיר המשודר ברדיו?

ג. ביום מסוים מנוגנים 200 שירים ברדיו. כמה שירים מתוכם תצפה יהיו באורך הנמוך מ 3.5 דקות?

ד. בשעה מסוימת שודרו 8 שירים. מה ההסתברות שרבע מהם בדיקן היו ארוכים מ-4 דקות והיתר לא?

פתרונותות : שאלה 3

26.43%	.א.
89.44%	.ב.
39.44%	.ג.
0.383	.ד.
100%	.ה.

 שאלה 1

89.25%	.א.
2.28%	.ב.
0	.ג.
50%	.ד.

 שאלה 7

500	.א.
100	.ב.
0.3446	.ג.
733	.ד.
267	.ה.

 שאלה 5

119.2	.א.
80.8	.ב.
112.6	.ג.
87.4	.ד.

 שאלה 9

0.1587	.א.
0.0228	.ב.
0.8563	.ג.
0.3975	.ד.

 שאלה 8

3	.א.
ב. בממוצע.	.ב.
1	.ג.

 שאלה 11

0.1359	.א.
0.675	.ב.
100	.ג.
0.25	.ד.

 שאלה 10

1925	.א.
0.2266	.ב.
0.1587	.ג.

פרק 31 - טרנספורמציה על משתנה מקרי רציף

רקע:

מדובר על מצב שידועה לנו התפלגות של משתנה מקרי רציף כלשהו ואו יוצרים משתנה מקרי חדש שהוא פונקציה של המשתנה המקורי הידוע.

דוגמה : (פתרון בהקלטה)

נתון משתנה מקרי רציף: X המתפלג אחיד בין 0 ל-1. מצא את פונקציית ההתפלגות המוגדרת

של המשתנה Y . כאשר הקשר בין X ל- Y נתון על ידי הנוסחה: $Y = e^X$.

תרגילים:

1. יהיו W משתנה מקרי המתפלג מעריכית עם תוחלת השווה ל-1.

$$\text{הגדירו משתנה חדש } Y = e^{-W}$$

א. מצא את פונקציית ההסתגלות המצטברת של Y .

ב. זהה את Y כהתפלגות מיוחדת וקבוע מהם הפרמטרים.

2. נתון ש: $X \sim U(0,1)$. יוצרים דרך X משתנה חדש המוגדר להיות: $R = X^2$. מצאו את

פונקציית הצפיפות של המשתנה החדש R .

3. ידוע ש- $(\lambda) \sim X \sim \exp(\lambda)$. כמו כן נתון הקשר הבא: $Y = \ln(X)$. הוכיח שפונקציית הצפיפות של

$$f(Y) = \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot e^Y + 1}$$

4. ידוע ש- $(\lambda = 1) \sim X \sim \exp(\lambda = 1)$. כמו כן נתון הקשר הבא:

א. מצא את פונקציית ההסתגלות המצטברת של Y .

ב. זהה את התפלגות של Y .

5. אורך מקצוע של קובייה מתפלג אחיד בין 1 ל-2. מצא את פונקציית הצפיפות של נפח הקובייה.

6. נתונה פונקציית ההסתגלות המצטברת הבאה: $F_X(t) = \theta^t - 1$ עבור התחום $0 \leq t \leq 1$.

א. מצא את ערכו של הפרמטר θ .

ב. מצא את פונקציית הצפיפות של המשתנה X .

ג. יהיו $Y = 2^X - 1$. מצא את פונקציית הצפיפות של Y זהה את התפלגותנו.

פתרונותות: **שאלה 1:**

$$Y \sim U(0,1) \text{ . ב.}$$

 שאלה 2:

$$\text{כasher } 0 < R < 1 \quad f(R) = \frac{1}{2\sqrt{R}}$$

 שאלה 4:

$$Y \sim U(-1,1)$$

 שאלה 5:

$$\text{כasher } 1 < y < 8 \quad f(y) = \frac{1}{3} y^{-\frac{2}{3}}$$

 שאלה 6:

2. א.

$$Y \sim U(0,1) \text{ . ג.}$$

פרק 32 - משתנה דו מימדי בדיד - פונקציית הסתברות משותפת

רקע:

התפלגות דו ממדית הינה התפלגות שדנה בשני משתנים.

נרצה כעת לבנות פונקציית הסתברות דו ממדית.

בפונקציה שכזו יש התפלגות של שני משתנים בו זמנית : X ו Y .

דוגמה:

תלמיד ניגש בסמסטר לשני מבחנים מבחן בכלכלה ובבחן סטטיסטיקה.


כמו כן נתון שהסיכוי לעبور את המבחן בכלכלה הננו 0.8 והסיכוי לעبور את המבחן סטטיסטיקה הננו 0.9.

הסיכוי לעبور את שני המבחנים הננו 0.75

יהי X - מספר הקורסים שהסטודנט עבר.

יהי Y - משתנה אינדיקטור המקבל את הערך אחד אם הסטודנט עבר את הבחינה בכלכלה ואפס אחרה.

. בנו את פונקציית ההסתברות המשותפת של X ו Y .



נחשב את כל ההסתברויות המשותפות :

$$p(x=0, y=0) = 0.05$$

$$p(x=0, y=1) = 0$$

$$p(x=1, y=0) = 0.15$$

$$p(x=1, y=1) = 0.05$$

$$p(x=2, y=0) = 0$$

$$p(x=2, y=1) = 0.75$$

\backslash	X	0	1	2
0	0.05	0.15	0	
1	0		0.05	0.75

שימו לב שסכום כל ההסתברויות בפונקציית ההסתברות המשותפת הוא 1.

כעת נסכם את השורות ואת העמודות ונקבל את פונקציית הסתברות שלוליות :

$X \backslash Y$	0	1	2	P_Y
0	0.05	0.15	0	0.2
1	0	0.05	0.75	0.8
P_X	0.05	0.2	0.75	1

משתנים בלתי תלויים:

X ו-Y יהיו משתנים בלתי תלויים אם עבור כל X ו-Y אפשריים התקיימים הדבר הבא :

$$p(x=k, y=l) = p(x=k) \cdot p(y=l)$$

משמעות פעם אחת שהמשתנים אינם מקיימים תנאי זה אז הם תלויים.

למשל, בדוגמה זו את :

$$p(x=2, y=1) = 0.75 \neq p(x=2) \cdot p(y=1) = 0.75 \cdot 0.8 = 0.6$$

ככל אם יש אפס בתוך פונקציית ההסתברות המשותפת ניתן להבין באופן מיידי שהמשתנים תלויים. שאז הרי התנאי לא מתקיים.
אך אם אין אפס בטבלה אין זה אומר שהמשתנים בלתי תלויים ויש לבדוק זאת.

תרגילים :

1. אדם נכנס לקזינו עם 75 דולר . הוא ישחק במכונת מזל בה יש סיכוי של 30 לנצח. במקרה של ניצחון במשחק הוא מקבל מהקזינו 25 דולר ובמקרה של הפסד הוא ישלם 25 דולר . אותו אדם החליט שיפסיק לשחק ברגע שהייתה לו 100 דולר , אך ככל מקרה לא ישחק יותר מ – 3 משחקים. נגידר את X להיות הכספי שברשות האדם במצבו מהקזינו ואת Y מספר המשחקים שהאדם שיחק.
- א. בנו את פונקציית ההסתברות המשותפת והשלויות.
- ב. מה תוחלת מספר המשחקים שיחק האדם?
- ג. אם האדם יצא מהקזינו שברשותו 100 דולר , מה התוחלת ומה הבדלים של מספר המשחקים ששיחק?

2. להלן פונקציית ההסתברות המשותפת והשלויות של שני משתנים מקרים בדים:

$Y \setminus X$	0	1	2	$P(Y)$
2		0.08	0.12	0.4
3	0.1	0.05		
4				0.45
$P(X)$		0.4	0.2	

- א. השלם את ההסתברויות החסרות בטבלה.
- ב. האם X ו- Y תלויים ?
- ג. מצא את הסתברות $-3 \leq Y \leq 1$, אם ידוע ש- $X=1$.
3. מפעל משובק מוצר הנארז בחבילות בגודלים שונים. ישנו מספר שווה של חבילות בנות שני מוצרים ושלושה מוצרים. ההסתברות ש מוצר מסוים יהיה פגום היא $1/10$. מהנדס הייצור בוחר באקראי חבילה מוצרים לשם בקורס איות. יהיו $-X$ מספר המוצרים בחבילה, $-Y$ מספר המוצרים הפוגומים בחבילה.
- א. מה ההסתברות של המשתנה Y בהינתן $X=3$?
- ב. מה ההסתברות של המשתנה Y בהינתן $X=K$ כלשהו.
- ג. מה תוחלת מספר המוצרים הפוגומים בחבילות בנות 3 מוצרים? נזכיר.
- ד. בנה את פונקציית ההסתברות המשותפת.

4. מתוך כד עם שלושה כדורים ממוספרים במספרים 2, 4, 8 שולפים באקראי שני כדורים לא החזרה. נגיד: X - המספר הקטן מבין השניים; Y - המספר הגדול מבין השניים.
- א. חשבו את ההסתגלות של (X, Y).
- ב. אם המספר המינימלי שנבחר הוא 2, מה הסיכוי שהמספר המקסימלי 8?
- ג. חשבו את ההסתגלות המותנית של X בהינתן $4 = Y$. מצאו $E(X / Y = 4)$.

5. בישוב שני סניפי בנק. סניף פועלים וסניף לאומי. להלן הנתונים לגבי האוכלוסייה הבוגרת המתגוררת בישוב:
- ל-60% יש חשבון בסניף פועלים של היישוב.
ל-50% יש חשבון בסניף לאומי של היישוב.
ל-95% יש חשבון לפחות אחד מהסניפים.
יהי X - מספר הסניפים בישוב אשר לתושב בוגר יש בהם חשבון.
יהי Y - משתנה אינדיקטור:
- 1 אם יש לתושב חשבון בסניף פועלים.
 - 0 אחרת.
- א. בנו את פונקציית ההסתברות המשותפת של X ו- Y .
- ב. הוסיפו את פונקציית ההסתברות השולית.
- ג. ידוע שלתושב בוגר חשבון בבנק פועלים, מה ההסתברות שיש לו חשבון בנק בסניף אחד בלבד?

פתרונותות: **שאלה 2:**

ב. תלויים

ג. 0.125

 שאלה 1:

ב. 2.4

ג. התוחלת 1.348 השונות 0.575

 שאלה 5:

ג. 0.75

 שאלה 4:

ב. 0.5

ג. תוחלת 2

פרק 33 - משתנה דו מימדי בדיד - מתאם בין משתנים

רקע:

נרצה לבדוק את מידת ההתאמה הлиינארית בין שני המשתנים על ידי מקדם המתאים הלינארי שמסומן ב- ρ .
מקדם מתאים זה מקבל ערכים בין -1 ל 1.

-1

0

1

מקדם מתאים 1- או 1 אומר שקיים קשרlienar מוחלט ומלא בין המשתנים שניתן לבתו על ידי הנוסחה : $y = ax + b$.

מתאים חיובי מלא (מקדם מתאים 1) אומר שקיים קשרlienar מלא בו השיפוע a יהיה חיובי וailo מתאים שלילי מלא אומר שקיים קשרlienar מלא בו השיפוע a שלילי (מקדם מתאים -1-).

מתאים חיובי חלק אומר שככל שמשתנה אחד עולה לשני יש נטייה לעלות בערכו אבל לא קיימות נוסחהlienar שמקשרת את X ל- Y באופן מוחלט וailo מתאים שלילי חלק אומר שככל שמשתנה אחד עולה לשני יש נטייה לרדת אבל לא קיימת נוסחהlienar שמקשרת את X ל- Y באופן מוחלט.

חישוב מקדם המתאים :

$$\text{הנוסחה של מקדם המתאים היא : } \rho = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma_x \cdot \sigma_y}$$

השונות המשותפת :

$$\text{cov}(x, y) = E[(x - \mu_x)(y - \mu_y)] = E(x \cdot y) - E(x) \cdot E(y)$$

תכונות של השונות המשותפת :

$$\text{cov}(X, Y) = \text{cov}(Y, X) . 1$$

$$\text{cov}(X, X) = \text{Var}(X) . 2$$

משתנים בלתי מתואמים :

משתנים בלתי מתואמים הם משתנים שמקדם המתאים שלהם אפס וכי דבר כזה יקרה השונות המשותפת צריכה להתאים.

משתנים בלתי מתואמים הם משתנים שככל אין בין התאמה לינארית.

משתנים בלתי תלויים הם משתנים שאון ביןם קשר ולכון הם גם בלתי מתואמים, אך משתנים בלתי מתואמים אינם בהכרח בלתי תלויים.

השפעת טרנספורמציה לינארית על מקדם המתאים

$$\rho[(aX+b), (cY+d)] = \begin{cases} \rho(X, Y) & \text{if } a \cdot c > 0 \\ -\rho(X, Y) & \text{if } a \cdot c < 0 \end{cases}$$

כלומר, טרנספורמציה לינארית על שני משתנים לא משנה את עוצמת הקשר בין היא עלולה לשנות רק את כיוון הקשר.

דוגמה : (פתרו בחקלה)

נזכיר לדוגמה שהוצגה בפרק הקודם :

תלמיד ניגש בסמסטר לשני מבחנים מבחן בכלכלה ו מבחן בסטטיסטיקה.

כמו כן נתון שהסיכוי לעبور את המבחן בכלכלה הננו 0.8 והסיכוי לעبور את המבחן בסטטיסטיקה הננו 0.9.

הסיכוי לעبور את שני המבחנים הננו 0.75

יהי X - מספר הקורסים שהסטודנט עבר.

יהי Y - משתנה אינדיקטור המקבל את הערך אחד אם הסטודנט עבר את הבחינה בכלכלה ואפס אחרת.

נחשב את מקדם המתאים :

\backslash Y	X	0	1	2	P_Y
0		0.05	0.15	0	0.2
1		0	0.05	0.75	0.8
P_X		0.05	0.2	0.75	1

2	1	0	x
0.75	0.20	0.05	P(x)

$$E(X) = \sum_i x_i P(x_i) = \mu = 0 * 0.05 + 1 * 0.2 + 2 * 0.75 = 1.7$$

$$V(X) = \sum_i (x_i - \mu)^2 P(x_i) = \sum_i x_i^2 P(x_i) - \mu^2 = 0^2 * 0.05 + 1^2 * 0.2 + 2^2 * 0.75 - 1.7^2 = 0.31 = \sigma^2$$

$$\sigma_x = \sqrt{V(X)} = \sqrt{0.31} = 0.557$$

y	P_y
0	0.2
1	0.8

$$E(y) = \sum_i y_i P(y_i) = 0 + 0.8 = 0.8$$

$$V(y) = \sum_i (y_i - \mu_y)^2 P(y_i) = \sum_i y_i^2 P(y_i) - \mu_y^2 = 0 + 0.8 - 0.8^2 = 0.16 = \sigma_y^2$$

$$\sigma_y = \sqrt{0.16} = 0.4$$

$$E(xy) = 0 \cdot 0 \cdot 0.05 + 0 \cdot 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 \cdot 0.15 + 1 \cdot 1 \cdot 0.05 + 2 \cdot 0 \cdot 0 + 2 \cdot 1 \cdot 0.75 = 1.55$$

$$\text{cov}(x, y) = E(x \cdot y) - E(x) \cdot E(y) = 1.55 - 1.7 \cdot 0.8 = 0.19$$

$$\rho = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma_x \cdot \sigma_y} = \frac{0.19}{0.557 \cdot 0.4} = 0.853$$

כל קורס שהסטודנט מסיים מזכה אותו ב- 3 נקודות אקדמיות.
מה יהיה מקדם המתאים בין נקודות הזכות שייצבור למשתנה Y ? ?

תרגילים:

1. הסיכוי שסטודנט עבר את מועד א' בסטטיסטיקה הוא 0.8. אם הוא נכשל במועד א' הוא ניגש למועד ב' שם הסיכוי לעبور את המבחן מוערך להיות 0.9 (סטודנט שעבור את א' לא ניגש לב'). במידה והסטודנט נכשל במועד ב' הוא מגיש בקשה למועד ג' אותה מאשרים בסיכוי של 0.2. ואז הסיכוי שלו לעبور את מועד ג' הוא 0.7.
- נגידר את X להיות מספר המבחנים אליהם ניגש הסטודנט.
- נגידר את Y להיות מספר הנבחנים שנכשל בהם.
- א. בנו את פונקציית ההסתברות המשותפת ואת פונ' ההסתברות השולית.
- ב. האם המשתנים הינם בלתי תלויים?
- ג. ידוע שהסטודנט ניגש ליותר מבחן אחד, מה ההסתברות שהוא נכשל לפחות שלושה מבחנים?
- ד. האם המתאים בין X ל- Y מלא או חלק? חיובי או שלילי? הסבר ללא חישוב.
- ה. חשבו את מקדם המתאים בין X לבין Y .
- ו. האם המשתנים הם בלתי מתואמים?
-
2. מטילים מטבע שלוש פעמים. נגידר את X להיות מספר העצים המתקבלים בשתי הטלות הראשונות ואת Y להיות מספר העצים המתקבלים בשתי הטלות האחרונות.
- א. בנו את פונקציית ההסתברות המשותפת של X ו- Y ואת פונקציית ההסתברות השוליות.
- ב. האם X ו- Y הם משתנים בלתי תלויים?
- ג. מהו מקדם המתאים בין X ל- Y . האם המשתנים מתואמים?
- ד. אם בשתי הטלות הראשונות יצא בדיקות אחד, מה ההסתברות שבשתי הטלות האחרונות יצאו שני עצים?
- ה. אם בשתי הטלות האחרונות יצא לפחות פעם אחת עצ, מה ההסתברות שבשתי הטלות הראשונות יצא עצ אחד?
-
3. מפוזרים שלושה כדורים שונים בשלושת תאים.
- נגידר את המשתנים הבאים:
- X = מספר ה כדורים בתא הראשון.
- Y = מספר ה כדורים בתא השני.
- א. בנו את פונקציית ההסתברות המשותפת.
- ב. האם המשתנים בלתי מתואמים?

4. מטילים קובייה הוגנת פערמיים.

יהי: $X =$ ה הטלה הגדולה מ בין שתי התוצאות

$Y =$ מס' ה הטלות בהן יצאת תוצאה זוגית.

א. מצא את פונקציית ההסתברות המשותפת של X ו- Y .

ב. חשבו את מקדם המתאים של X ו- Y .

ג. מצאו את התפלגות של Y בהינתן $-2=X$.

5. במבנה בן 5 דירות. דירות מספר אחד ושלוש הן דירות משופצות והשאר אין. הוחלט

לבחור שתי דירות באקראי מ בין הדירות בבניין. נגידר את המשתנים הבאים :

X - מספר הדירות משופצות שנבחרו.

Y - מספר הדירות האי זוגיות שנדגמו.

א. בנו את פונקציית ההסתברות המשותפת ואת פונקציית ההסתברות השולית.

ב. האם המשתנים מתואמים?

ג. מה מקדם המתאים בין X לבין Y ?

ד. מה יהיה מקדם המתאים :

1. בין מספר הדירות משופצות למספר הדירות הזוגיות שנדגמו.

2. בין מספר הדירות הזוגיות לדירות האי זוגיות שנדגמו.

ה. כל דירה משופצת עולה 2 מיליון שקלים, כל דירה לא משופצת עולה 1.5 מיליון

שקלים. מה המתאים בין עלות הדירות שנדגמו למספר הדירות הזוגיות?

פתרונות: **שאלה 1 :**

- ג. 0.994 .
ה. 0.963 .

 שאלה 2 :

- ב. תלויים.
ג. מקדם המתאים : 0.5. מתואמים
ד. 0.25
ה. 0.5.

 שאלה 3 :

- ב. מתואמים

 שאלה 4 :

- ב. 0.252

 שאלה 5 :

- ב. X ו-Y מתואמים.

$$\frac{2}{3} . \text{ג.}$$

$$-\frac{2}{3} . \text{ד. } 1.7$$

$$(-1) . 2.7$$

$$-\frac{2}{3} . \text{ה.}$$

פרק 34 - המשטנה המקורי הדו ממדי - קומבינציות לנאריות

רקע:

תוחלת ושונות של סכום משתנים :

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2 \cdot COV(X, Y)$$

תוחלת ושונות של הפרש משתנים :

$$E(X - Y) = E(X) - E(Y)$$

$$V(X - Y) = V(X) + V(Y) - 2 \cdot COV(X, Y)$$

קומבינציות לנאריות:

যוצרים משתנה חדש שהוא קומבינציה לנארית של שני משתנים אחרים :

$$W = (aX + b) + (cY + d)$$

$$COV[(aX + b), (cY + d)] = a \cdot c \cdot COV(X, Y)$$

$$E(W) = E((aX + b) + (cY + d)) = aE(X) + b + cE(Y) + d$$

$$V(W) = V((aX + b) + (cY + d)) = a^2V(X) + c^2V(Y) + 2 \cdot a \cdot c \cdot COV(X, Y)$$

דוגמה: (פתרון בהקלטה)

עבור שני משתנים מקריים נתון :

$$\mu_X = 80$$

$$\sigma_X = 15$$

$$\mu_Y = 70$$

$$\sigma_Y = 20$$

$$COV(X, Y) = 200$$

• מצא את התוחלת והשונות של סכום המשתנים.

• מצא את התוחלת והשונות של X-Y.

• מצא את השונות ומה התוחלת של המשתנה $W = 2X + 3Y$

תרגילים:

1. נתונה פונקציית ההסתברות המשותפת הבאה :

$Y \setminus X$	1	2	3	$P(Y)$
2		0.1	0.3	0.6
3	0.2		0.1	
$P(X)$				

- א. השלם את ההסתברויות החסרות.
- ב. האם המשתנים תלויים?
- ג. האם המשתנים בלתי מתואמים?
- ד. חשב את השונות המשותפת.
- ה. חשב את התוחלת והשונות של סכום המשתנים.
- ו. חשב את התוחלת והשונות של הפרש המשתנים.

2. מבחן בניו מחלק כמותי וחלק מילולי. תוחלת הציון בחלק הכמותי היא 100 עם סטיית תקן 20. תוחלת הציונים בחלק המילולי 90 עם סטיית תקן 15. מקדם המתאים בין הציון הכמותי לציון המילולי הוא 0.8.

- א. חשבו את השונות המשותפת בין הציון הכמותי לציון המילולי.
- ב. חשבו את התוחלת והשונות של סכום הציונים בחלק הכמותי ובחלק המילולי.
- ג. חשבו את התוחלת והשונות של הפרש הציונים בין החלק הכמותי לחלק המילולי.
- ד. עלות הבדיקה 2000 שקלים. הוחלט לזכות שקל עבור כל נקודה שנצברה בחלק המילולי ושני שקלים עבור כל נקודה שנצברה בחלק הכמותי. מהי התוחלת ומהי השונות של עלות הבדיקה נטו (העלות לאחר הזיכוי)?

3. נתו : $\text{Cov}(X, Y) = 3$. $\text{Var}(X+2Y) = 2$. $\text{Var}(X-2Y) = ?$

4. מטילים קובייה n פעמים.

נגידר את המשתנים הבאים :

X =מספר הפעמים שהתקבלת התוצאה 6.

Y =מספר הפעמים שהתקבלת התוצאה 5

בטאו את השונות המשותפת באמצעות n .

פתרונות : **שאלה 1 :**

- ב. תלויים
ג. מתואמים.
ד. -0.1.
ה. תוחלת : 4.4, שונות : 0.84
ו. תוחלת : -0.4, שונות : 1.24

 שאלה 2 :

- א. 240
ב. תוחלת : 190 שונות : 1105
ג. תוחלת : 10 שונות : 145
ד. תוחלת : 1710 שונות : 2785

 שאלה 3 :

-0.125

 שאלה 4 :

$$\frac{-n}{36}$$

פרק 35 - קומבינציות לינאריות להתפלגות נורמלית

רקע:

כל קומבינציה לינארית של משתנים המתפלגים נורמלית מתפלגת נורמלית בעצמה.

דוגמה: (פתרו בהקלטה)

הגובה של גברים במדינת ישראל מתפלג נורמלית עם תוחלת של 175 ס"מ וסטיית תקן של 10 ס"מ, כמו כן הגובה של נשים במדינה מתפלג נורמלית עם תוחלת של 165 ס"מ וסטיית תקן של 8 ס"מ.

מה הסיכוי שגבר אקראי מהמדינה יהיה גבוה מאיישה אקראייה? (0.7823)

תרגילים:

1. המשקל של גברים במדינת ישראל מתפלג נורמלית עם תוחלת של 75 ק"ג וסטיית תקן של 10 ק"ג.
כמו כן המשקל של נשים במדינה מתפלג נורמלית עם תוחלת של 65 ק"ג וסטיית תקן של 8 ק"ג.
מה הסיכוי שאישה אקראית תהיה בעלת משקל גבוה יותר מאשר אקרה?
2. ההוצאה השנתית על ביגוד לאדם מתפלג נורמלית עם תוחלת של 3000 ש"ח וסטיית תקן של 1000 ש"ח. ההוצאה השנתית על בילויים מתפלגת נורמלית עם תוחלת של 4000 ש"ח וסטיית תקן של 1500 ש"ח. מוקדם המתאים בין ההוצאה השנתית על ביגוד וההוצאה השנתית על בילויים הינו 0.6.
א. מה התוחלת ומהי סטיית התקן של התפלגות ההוצאה השנתית הכוללת על ביגוד ובילוי?
ב. מה הסיכוי שההוצאה השנתית הכוללת על ביגוד ובילוי עלה על 8000 ש"ח?
ג. מהו העשירון העליון של ההוצאה השנתית הכוללת על ביגוד ובילוי?
3. צרכית הירקות היומית במסעדה מתפלג נורמלית עם תוחלת של 50 ק"ג וסטיית תקן של 4 ק"ג. נתנו שמחיר ק"ג ירק הוא 6 ש"ח לקיולו.
א. מה התוחלת ומהי השונות של הוצאות היומיות של ירקות למסעדה?
ב. מה ההסתברות שההוצאות היומיות על ירקות תהיה נמוכה מ-290 ש"ח?
ג. מהו האחוזון ה-40 של התפלגות הוצאות היומיות של המסעדה על ירקות?
4. נפח יין בבקבוק מתפלג נורמללית עם תוחלת של 750 מ"ל וסטיית תקן של 20 מ"ל. אדם קנה מארז של 4 בקבוקי יין.
א. מהי התוחלת ומהי סטיית התקן של נפח היין במארז.
ב. את היין שבמארז האדם מזג לכלי שקיבולתו 3.1 ליטר. מה ההסתברות שהיין יגלוש מהכלי?
5. לדוד משה הייתה חווה. בחווה פרה ועזה. תנובת החלב של הפרה מתפלג נורמלית עם ממוצע של 20 ליטר ביום וסטיית תקן של 5 ליטר ותנובת החלב של העזה מתפלג גם כן נורמלית עם ממוצע של 10 ליטר וסטיית תקן של 2 ליטר. כל ליטר חלב פרה נימכר ב- 2 ש"ח וליטר חלב עזה נימכר ב- 3 ש"ח.
א. מה הסיכוי שהפדיון היומי של דוד משה מחלב יהיה לפחות 62 ש"ח?
ב. מה הסיכוי שmonths 5 ימים יהיו לפחות 4 ימים בהם תנובת החלב מהפרה והעזה ביחד תהיה מתחת ל- 30 ליטר?
ג. מה הסיכוי שביום מסוים תנובת הפרה תהיה נמוכה מタンובת העזה?

פתרונות:**שאלה 1**

0.2177

שאלה 2

א. תוחלת 7000, סטיית תקן 2247.

ב. 0.3264

ג. 9881

שאלה 3

א. תוחלת 300, שונות 576.

ב. 0.3372

ג. 294.

שאלה 4


א. תוחלת 3000 מיל וסטיית תקן 40 מיל.

ב. 0.0062

פרק 36 - מערכות חשמליות

רקע:


מערכת חשמלית בטור הינה מערכת חשמלית בה הרכיבים מסודרים באופן הבא :



נסמן ב A_i את המאורע : רכיב i פועל.

כדי שהמערכת יכולה לפעול צורך להתקיים ש $\bigcap_{i=1}^n A_i$

מערכת חשמלית במקביל הינה מערכת חשמלית בה הרכיבים מסודרים באופן הבא :



כדי שהמערכת החשמלית יכולה לפעול צורך להתקיים ש : $\bigcup_{i=1}^n A_i$

דוגמא : הפתרון בהקלטה.

- במערכת חשמלית 4 רכיבים בלתי תלויים שלכל אחד מהם סיכון P לפועל. בטאו באמצעות P את הסיכוי שהמערכת תפעל.
- א. כל הרכיבים מחוברים בטור זה לזה.
 - ב. כל הרכיבים מחוברים במקביל זה לזה.

תרגילים :

1. נתונם שלושה רכיבים חשמליים מחוברים בטור. אורך החכים של כל מכשיר מתפלג באופן הבא:


$$X_1 \sim U(2,4)$$

$$X_2 \sim N(3,1)$$


$$X_3 \sim \exp(1)$$

כל רכיב פועל באופן בלתי תלוי זה לזה. כל הרכיבים הופעלו כעת. מה הסיכוי שבעוד 3 שעות המערכת תפעל?

2. המערכת החשמלית הבאה מכילה 6 רכיבים כמפורט בשרטוט:




כל רכיב פועל באופן בלתי תלוי זה לזה. רכיבים מס' 1, 2, 6 פועלים בסיכוי 0.9. רכיב מס' 3 פועל בסיכוי 0.8. רכיבים מס' 4, 5 פועלים בסיכוי P. מצא את P אם הסיכוי שהמערכת תפעל הוא 0.887148.



בין שני המחשבים A ו- B נמצאים 6 שרטטים כמוראה בשרטוט. כל אחד מהשרטטים תקין בסיסי
9.0. על מנת שהודעה תצליח לעבור ממחשב A ל- B צריך להיות לפחות מסלול אחד שבו כל
השרטטים תקינים.

- א. מה ההסתברות לכך שההודעה תעבור בהצלחה ממחשב A ל- B?
ב. ההודעה לא הצלחה לעבור ממחשב A למחשב B. מה הסיכוי שרטרט מס' 1 לא תקין?


3. נתונה המערכת החשמלית הבאה :



כל יחידה עובדת באופן בלתי תלוי ובהסתברות P .
כדי שהמערכת תפעל צריך לעبور זרם מהנקודה A לנקודת B.
הוכח שהסיכוי שהמערכת תפעל :

$$P + (1-P)(2P - P^2)^2$$

4. מערכת חשמלית כוללת 4 רכיבים אלקטרוניים זהים הפעלים במקביל כמוראה בשרטוט:



על מנת שהמערכת תפעול בצורה תקינה נדרש שלפחות אחד מהרכיבים יהיה תקין.

אורך החיים של כל רכיב מתפלג מעריכית עם ממוצע של 100 שניות.

א. מה ההסתברות שהמערכת תפעול בצורה תקינה במשך 100 שעות לפחות?

ב. מעוניינים להוסיף במקביל עוד רכיב למערכת. עלות הוספה רכיב היא K ש. כמו כן אם

המערכת עבדה פחות מ-100 שעות נגרם הפסד של A ש.

מה התנאי שבו יהיה כדי להוסיף את הרכיב למערכת?

פתרונותות : **שאלה 1**

0.1245

 שאלה 2

0.7

 שאלה 3

א. 0.880632

ב. 0.837745

 שאלה 5

א. 0.8403

ב. $0.0588A > K$

פרק 37 - התפלגות מינימום ומקסימום

רקע:

התפלגות מקסימום:

נניח ש- X_i הינם משתנים מקריים בלתי תלויים בעלי אותה התפלגות רציפה. נגידר את

$$U = \max(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

מתקדים ש- :

$$F_U(t) = (F_{X_i}(t))^n$$

ולכן :

$$f(u) = n \cdot (F_{X_i}(u))^{n-1} \cdot f_{X_i}(u)$$

התפלגות מינימום:

נניח ש- X_i הינם משתנים מקריים בלתי תלויים בעלי אותה התפלגות רציפה. נגידר את

$$Z = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

מתקדים ש- :

$$F_Z(t) = 1 - (1 - F_{X_i}(t))^n$$

$$f(z) = n \cdot [1 - F_{X_i}(z)]^{n-1} \cdot f_{X_i}(z)$$

דוגמה : (הפתרו בהקלטה)

$$X_i \sim \exp(\lambda)$$

$$i = 1, 2, \dots, n \quad \min(x_i) \sim \exp(n\lambda) \quad \text{הוכיח ש :}$$

תרגילים:

1. א. הוכח שאם X_i מתפלג רציף עבור כל $n=1,2,\dots,i$ באופן בלתי תלוי עם פונקציה צפיפות $f(x)$

$$\text{ו- } Z = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

$$\text{מתקיים ש: } f(z) = n[1 - F_X(z)]^{n-1} \cdot f_x(z)$$

ב. הוכח שאם X_i מתפלג רציף עבור כל $n=1,2,\dots,i$ באופן בלתי תלוי עם פונקציה צפיפות $f(x)$

$$\text{ו- } U = \max(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$\text{מתקיים ש: } f(u) = n \cdot (F_x(u))^{n-1} \cdot f_x(u)$$

2. אורך חי רכיב מתפלג מעריכית עם תוחלת של 30 ימים.

א. מכשיר בניי מס-3 רכיבים בלתי תלויים המוחברים במקביל. בנו את פונקציית ההסתפוגות המתקבלת של אורך חי מכשיר.

ב. חזרו על סעיף א' אם הרכיבים מוחברים בטור.

ג. מה התוחלת והשונות של אורך חי המכשיר המתואר בסעיף ב?

3. בכיתה 30 תלמידים, כל תלמיד נרדם תוך זמן המתפלג אקספוננציאלית עם קצב של 8 הרידמוויות בשעה. המורה צועק אחורי שנרדם התלמיד הראשון ועובד את הכיתה שנרדם התלמיד האחרון.

א. מה הסיכוי שייצעק אחורי פחות מדקה?

ב. מה הסיכוי שייצא מהכיתה אחורי פחות מדקה?

4. שלושה אנשים משתתפים בתחרויות ריצה של 100 מטרים. כל אחד מהם רץ את המרחק בזמן שהוא משתנה מקרי בעל התפלגות אחידה בתחום בין 10 ל-12 שניות.

א. מה הסיכוי שהמנצח סיים את הריצה בזמן הגובה מ-10.5 ל-11.5 שניות?

ב. מה הסיכוי שהמפסיד סיים את הריצה בזמן הנמוך מ-11.2 ל-12.5 שניות?

ג. מהי התפלוגות זמן הריצה של המפסיד בתחרויות? מצא את התוחלת והשונות שלו?

5. $Y = \max(X_1, X_2)$ מתפלגים נורמלית סטנדרטית. נגידר את $Z = \min(X_1, X_2)$ וואת

$$\text{א. } P(Z > 1)$$

$$\text{ב. } P(Y > 1)$$

$$\text{ג. } \text{חישב } P(Y > 1 | Y > 0)$$

6. רונית נכנסת למכון יופי. היא מבצעת טיפול פדיקור ומניקור בו זמנית. משך זמן הבדיקה מתפלג מעריכית עם תוחלת של 20 דקות ומשך זמן המניקור מתפלג מעריכית עם תוחלת של 15 דקות. נניח שאין תלות במשך זמן הטיפול של המניקור והпедיקור.
- א. מצא את ההסתברות שמשך זמן הטיפול לא עולה על שעה.
- ב. ידוע שימוש זמן טיפול הבדיקה上升 על 10 דקות. מה ההסתברות שימוש זמן טיפול במכון היופי לא עולה על 20 דקות?

7. נתון ש: (λ) ו- $U = \min(x, y)$. x, y בלתי תלויים. הוכח ש $Y \sim \exp(\mu + \lambda)$

8. נתון ש X_1 ו- X_2 שני משתנים מקרים רציפים בלתי תלויים המתפלגים אחיד בין 0 ל-1. נגדיר $P(Y > 0.5)$. חשב את $Y = \max(x_1, x_2)$

9. נתון ש $X_i \sim U(0, 2)$ בלתי תלויים זה בזה כאשר $i = 1, 2, \dots, 5$. מצא את פונקציית הצפיפות של $T = \max(X_i)$

10. נתון משתנה מקרי X בעל פונקציית הצפיפות הבאה:

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{אחר}\end{cases}$$

נגדיר את $E(W)$ כאשר $i = 1, 2, \dots, 10$ חשב את $W = \max(X_i)$

פתרונות: שאלה 1

הוכחה

 שאלה 2

ג. תוחלת : 10

שונות : 100

 שאלה 3

א. 0.9817

ב. 0

 שאלה 4

א. 0.421875

ב. 0.216

ג. תוחלת : 11.5 שונות : 0.15

 שאלה 5

א. 0.02518

ב. 0.2922

ג. 0.3896

 שאלה 6

א. 0.9328

ב. 0.2898

 שאלה 7

הוכחה

 שאלה 8

0.75

 שאלה 9

$$\frac{5}{2} \cdot \left(\frac{t}{2}\right)^4$$

 שאלה 10

$$\frac{30}{31}$$

פרק 38 - אי שוויוניים הסתברותיים

א. אי שוויון צ'ביצ'ב

.1. מצא חסמים להסתברויות הבאות עבור משתנה מקרי רציף בעל תוחלת 8 וסטיית תקן 3.

.א.

$$P(2 < x < 14)$$

.ב.

$$P(|x - 8| \geq 9)$$

.2. מתוך קו יצור של רכיבים שאורכם הממוצע הינו 10 ס"מ ושווניהם 3 סמ"ר. יש לנקח מדגם. מהו גודל המדגם שיבטיח שהסתברות של 0.9 לפחות ימצא ממוצע המדגם בין 9 ל-11 ס"מ?

.3. אחוז התומכים במפלגה מסוימת הינו 40%. נלקח מדגם מקרי בגודל 200.תו חסם תחתון לכך שאחוז התומכים במדגם יהיה בין 35% ל – 45%.

.4. מספר המתוסים המגיעים לנמל תעופה ב 20 דקות מתפלג התפלגות פואסונית עם תוחלת של 100. העזר באי שוויון צ'ביצ'ב כדי למצוא גבול תחתון להסתברות שמספר המתוסים המגיעים בתקופה בת 20 דקות נתונה תהיה בין 80 ל-120.

.5.
א. עבור $n = 10$: הערך את ההסתברות שסכום הספרות במספר יسطה מתוחלתו לפחות 1.
ב. מה אורך המספר המינימלי (n) שיבטיח שהסתברות של 95%, ממוצע הספרות יسطה מתוחלתו לפחות 0.75? לפי אי-שוויון צ'ביצ'ב.

.6. בעיר מסוימת ל 5% מהמשפחות אין מכונית, ל-20% יש מכונית אחת, ל-35% יש שתי מכוניות, ל-30% שלוש מכוניות וליתר ארבע מכוניות. נניח שמספר המשפחות ביישוב הוא גדול מאד. הערך את ההסתברות שמספר המכוניות הכללי בעשר משפחות יהיה לפחות 17 ולכל היוטר ל-27.

ב. אי שוויון מركוב

1. אורך חיים של מכשיר מתפלג עם תוחלת של 500 שעות. חשב לפי אי שוויון מركוב את ההסתברות שאורך חיים של מכשיר יהיה לפחות 1500 שעות.
2. התפלגות מספר הילדים למשפחה במדינה מסוימת היא עם תוחלת של 2 ילדים. נלקחו 5 משפחות אקראיות. הערך את הסיכוי שבסה"כ בחמשת השפחות יש יותר מ-15 משפחות.
3. ידוע מניסיון בעבר כי ציון בבחן הגמר של סטודנט הוא משתנה מקרי שתוחלתו .75
 - א. מצא חסם עליון להסתברות שציון בבחן הגמר של סטודנט יהיה לפחות .85.
 - ב. נניח שהמרצה יודיע בנוספ' שונות ציון בבחן הגמר של הסטודנט היא 25, מה אפשר לומר על ההסתברות שציון בבחן הגמר של סטודנט יהיה גבוהה מ-65 ונמוך מ-85?

פתרונותות**פרק א' - אי שוויון צ'ביצ'ב**

<u>שאלה 2</u>	<u>שאלה 1</u>
לפחות 30	א. בין $3/4$ ל- 1 ב. בין 0 ל- $1/9$
<u>שאלה 4</u>	<u>שאלה 3</u>
0.75	0.52
<u>שאלה 6</u>	<u>שאלה 5</u>
0.706	א. 0.825 ב. 294

פרק ב' - אי שוויון מרקוב

<u>שאלה 2</u>	<u>שאלה 1</u>
לכל היוטר 0.625	בין 0 ל- $1/3$
<u>שאלה 3</u>	
	א. 0.8823 ב. לפחות 0.75

פרק 39 - התפלגות הדגימה - ממוצע המדגם ומשפט הגבול המרכזי

רקע:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

בפרק זה נדנו בהתפלגות של ממוצע המדגם :

מכיוון שמדובר במקרים אחדים לקבל ממוצע מדגם שונה, אז ממוצע המדגם הוא משתנה מקרי ויש לו התפלגות.

গدلים המתארים התפלגות כלשי או אוכלוסייה כלשי נקראים פרמטרים. להלן רישום של פרמטרים החשובים לפרק זה :

מ ממוצע האוכלוסייה נסמן ב μ (נקרא גם תוחלת).

שונות אוכלוסייה נסמן ב σ^2 .
סטיית תקן של אוכלוסייה: σ .

א. תכונות התפלגות

מ ממוצע כל ממוצעי המדגם האפשריים שווה למ ממוצע האוכלוסייה :

$$E(\bar{x}) = \mu_{\bar{x}}$$

שונות כל ממוצעי המדגם האפשריים שווה לשונות האוכלוסייה מחולק ב- n . תכונה זו נקראת רק במדגים מקרים :

$$V(\bar{x}) = \sigma_{\bar{x}}^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

ישיחס ההפוך בין גודל המדגם לבין שונות ממוצעי המדגם.

אם נוציא שורש לשונות נקבל סטיית תקן של ממוצע המדגם שנקרה גם טעות תקן :

$$\sigma(\bar{x}) = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

דוגמה: (פתרון בהקלטה)

השכר הממוצע במשק הינו 9000 ₪ עם סטיית תקן של 4000. דגמו באקראי 25 עובדים.

א. מי אוכלוסיית המחקר? מהו המשטנה הנחקר?

ב. מהם הפרמטרים של האוכלוסייה?

ג. מה התוחלת ומהי סטיית התקן של ממוצע המדגם?

ב. דוגמה מהתפלגות נורמללית

אם נדגם מתוך אוכלוסייה שהמשתנה בה מתפלג נורמללית עם ממוצע μ ושונות² σ^2 ממוצע המדגם גם יתפלג נורמללית:

$$\bar{x} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$$

$$Z_{\bar{x}} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

דוגמה: (פתרון בהקלטה)

משקל תינוק ביום היולדו מתפלג נורמללית עם ממוצע 3400 גרם וסטיית תקן של 400 גרם. מה ההסתברות שבמדגם של 4 תינוקות אקראיים בעת הולדתם המשקל הממוצע של התינוקות יהיה מתחת ל-3.5 ק"ג?

ג. משפט הגבול המרכזי

אם אוכלוסייה מתפלגת כלשהו עם ממוצע μ ושונות² σ^2 אז עבור מדגם מספיק גדול ($n \geq 30$) ממוצע המדגם מתפלג בקרוב נורמללית $(\bar{x} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}))$.

דוגמה: (פתרון בהקלטה)

משקל חפיסת שוקולד בכו ייצור מתפלג עם ממוצע 100 גרם וסטיית תקן של 4 גרם. דגמו מכו הייצור 36 חפיסות שוקולד אקראיות. מה ההסתברות שהמשקל הממוצע של החפיסות השוקולד שנדגמו יהיה מתחת ל 102 גרם?

תרגילים :

1. מתוך כלל הסטודנטים במכלה שסימנו סטטיסטיקה א נדגו שני סטודנטים. נתון שסכום
הציונים של כלל הסטודנטים היה 78 עם סטיית תקן של 15.
- מי האוכלוסייה?
 - מה המשנה?
 - מהם הפרמטרים?
 - מהו גודל המדגם?
 - מהו תוחלת ממוצע המדגם?
 - מהי טעות התקן?

2. להלן התפלגות מספר מקלטיו הטלוויזיה למשפחה בישוב מסוים :

מספר מקלטים	מספר המשפחות
0	500
1	2500
2	3500
3	3000
4	500
סך הכל	$N = 10000$

- נגיד את α להיות מספר המקלטים של משפחה אקראית.
- בנו את פונקציית ההסתברות של α .
 - чисבו את התוחלת, השונות וסטיית התקן של α .
 - אם נדגו 4 משפחות מהישוב עם החזרה מה תהיה התוחלת, מהי השונות ומהי סטיית
התקן של ממוצע המדגם?
3. אם נטיל קובייה פעמים ונתבונן בממוצע התוצאות שיתקבלו, מה תהיה התוחלת ומה תהיה
סטיית התקן של ממוצע זה?

4. משקל תינוק ביום היולדו מתפלג נורמללית עם ממוצע 3400 גרם וסטטיסטית תקן של 400 גרם
א. מה ההסתברות שתינוק אكريאי בעת הלידה ישוקל פחות מ-3800 גרם?

נתון כי ביום מסויים נולדו 4 תינוקות.

ב. מה ההסתברות שהמשקל הממוצע שלהם יעלה על 4 ק"ג?

ג. מה ההסתברות שהמשקל הממוצע של התינוקות יהיה מתחת ל-2.5 ק"ג?

ד. מה ההסתברות שהמשקל הממוצע של התינוקות יהיה רחוק מהתוחלת ללא יותר מ-50 גרים?

ה. הסבירו ללא חישוב כיצד התשובה לסעיף הקודם הייתה משתנה אם היה מדובר על יותר מ-4 תינוקות?

5. הגובה של המתגייםים לצה"ל מתפלג נורמללית עם תוחלת של 175 ס"מ וסטטיסטית תקן של 10 ס"מ. ביום מסויים המתגייםו 16 חיילים.

א. מה ההסתברות שהגובה הממוצע שלהם יהיה לפחות 190 ס"מ?

ב. מה ההסתברות שהגובה הממוצע שלהם יהיה בדיק 180 ס"מ?

ג. מה ההסתברות שהגובה הממוצע שלהם יסטה מהתוחלת הגבהים לפחות מ-5 ס"מ?

ד. מהו הגובה שהסתברות של 90% הגובה הממוצע של המדגים יהיה נמוך ממנו?

6. הזמן הממוצע שלוקח לאדם להגיע לעבודתו 30 דקות עם שונות של 16 דקות רבעות. האדם נוסע לעבודה במשך שבוע 5 פעמיים. לצורך פתרון הינו שזמן הנסעה לעבודה מתפלג נורמללית.

א. מה ההסתברות שבמשך שבוע משך הנסעה הממוצע יהיה מעל 33 דקות?

ב. מהו הזמן שהסתברות של 90% הממוצע משך הנסעה השבועי יהיה גבוה ממנו?

ג. מה ההסתברות שמספר משך הנסעה השבועי יהיה מרוחק מ-30 דקות לפחות 2 דקות?

ד. כיצד התשובה לסעיף הקודם הייתה משתנה אם האדם היה נוסע לעבודה 6 פעמים בשבוע?

7. נפח הין בקבוק מתפלג נורמללית עם תוחלת של 750 סמ"ק וסטטיסטית תקן של 10 סמ"ק.

א. בארגז 4 בקבוקי יין. מה ההסתברות שהנפח הממוצע של הבקבוקים בארגז יהיה בדיק 755 סמ"ק?

ב. בארגז 4 בקבוקי יין. מה ההסתברות שהנפח הממוצע של הבקבוקים בארגז יהיה יותר מ-555 סמ"ק?

ג. בארגז 4 בקבוקי יין. מה ההסתברות שהנפח הממוצע של הבקבוקים בארגז יהיה לפחות 755 סמ"ק?

ד. בקבוקי הין שבארגז נזוגים לקערה עם קיבולת של שלושה ליטר. מה ההסתברות שהיין יgelosh מהקערה?


8. משתנה מתפלג נורמלי עם תוחלת 80 וסטיית תקן 4.

א. מה ההסתברות שסכום המדגם יסטה מתחלתו ללא יותר מיחידה כאשר גודל המדגם הוא 9?

ב. מה ההסתברות שסכום המדגם יסטה מתחלתו ללא יותר מיחידה שגודל המדגם הוא 16?

ג. הסבר את ההבדל בתשובות של שני הטעיפים.

9. בקזינו ישנה רולטה. על הרולטה רשומים המס' הבאים כמוראה בשרטוט:



אדם מסובב את הרולטה וזוכה בסכום הרשום על הרולטה.

א. בנו את פונקציית ההסתברות של סכום הזכיה במשחק בודד.

ב. מה התוחלת ומה השונות של סכום הזכיה?

ג. אם האדם ישחק את המשחק 5 פעמים מה התוחלת ומה השונות של ממוצע סכום הזכיה בחמשת המשחקים?

ד. אם האדם משחק את המשחק 50 פעם מה ההסתברות שבסה"כ יזכה ב-1050 ש"ח ומעלה?

10. לפי הערכות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה השכר הממוצע במשק הוא 8000 ש"ח עם סטיית תקן של 3000 ש"ח. מה ההסתברות שבמדגם מקרי של 100 עובדים השכר הממוצע יהיה יותר מ- 8500 ש"ח?

11. מטילים קובייה 50 פעמים בכל פעם מtabוננים בתוצאה של הקובייה. מה ההסתברות שהממוצע של התוצאות יהיה לפחות 3.72 - ב- 50 הטלות?

12. אורך צינור שמאפיין מייצר הינו עם ממוצע של 70 ס"מ וסטיית תקן של 10 ס"מ.

א. נלקחו באקראי 100 מוטות, מה ההסתברות שסכום אורך המוטות יהיה בין 68 ל 78 ס"מ?

ב. יש לחבר 2 בניינים באמצעות מוטות. המרחק בין שני הבניינים הינו 7200 ס"מ. מה ההסתברות ש 100 המוטות יספקו למלאכה?

ג. מה צריך להיות גודל המדגם המינימלי, כדי שההסתברות של 5% ממוצע המדגם יהיה קטן מ- 69 ס"מ. העזר במשפט הגבול המרツז.

13. נתון משתנה מקרי בדיד בעל פונקציית ההסתברות הבאה:

2	4	6	8	X
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$P(X)$

מתוך התפלגות זו נלקח מדגם מקרי בגודל 50. מה הסיכוי שסכום המדגם יהיה קטן מ- 5?

14. נתון ש $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2)$ דגמו 5 תצפויות מאוותה התפלגות והתבוננו במשמעות המדגם :

לכן ($\mu > \bar{X}$ יהיה : (בחר בתשובה הנכונה)

א. 0

ב. 0.5

ג. 1

ד. לא ניתן לדעת.

15. נתון ש X מתפלג כלשהו עם תוחלת : μ וdispersion σ^2 .

החליטו לבצע מדגם בגודל 200 מתוך ההפლגות הנתונה לפי משפט הגבול המרכזי מתקיים ש :

(בחר בתשובה הנכונה)

$$X \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{200}\right) \text{ א.}$$

$$\mu \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{200}\right) \text{ ב.}$$

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \sigma^2\right) \text{ ג.}$$

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{200}\right) \text{ ד.}$$

16. נתון ש $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$ אזי : $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. אם נדgos מ-5 תצפויות מתוך התפלגות ונגידיר

(בחר בתשובה הנכונה)

א. μ ו- \bar{X} יהיו משתנים מקרים.

ב. μ יהיה משתנה מקרי ו- \bar{X} קבוע.

ג. \bar{X} יהיה משתנה מקרי ו- μ קבוע.

ד. μ ו- \bar{X} יהיו קבועים.

17. משקל חפיסת שוקולד בק"ו ייצור מתפלג עם ממוצע 100 גרם . החפישות נארזות בקרטונו המכיל 36 חפיסות שוקולד אקריאיות. ההסתברות שהמשקל הממוצע של חפיסות השוקולד בקרטונו יהיה מעל 99 גרם הוא 0.9932.

- א. מהי סטיית התקן של משקל חפיסת שוקולד בודדת?
- ב. מה הסיכוי שמתוך 4 קרטונים בדיק קרטון אחד יהיה עם משקל ממוצע לחפיסת הנמוֹך מ-100 גרם?

18. משתנה מקרי כלשהו מתפלג עם סטיית התקן של 20. מה הסיכוי שאם נדגום 100 תצפיות בלתי תלויות מאותה התפלגות אזי ממוצע המדגמים יסטה מתחולתו בפחות מ-2?

19. מספר המכוניות המכונסות לחניון "בציר " במשך היום מתפלג פואסונית עם קצב של מכונית אחת לדקה. שומר מסר נתונים על מספר המכוניות שנמכנסות בכל שעה לגביה 40 שעות שאסף נתונים. מה ההסתברות שמספר המכוניות שנכנסו לחניון לשעה בשעות אלה יהיה לפחות 63?

20. הוכחו שאם משתנה מתפלג כלשהו עם תוחלת μ ושונות σ^2 וمبرאים מדגם בגודל n של תצפיות בלתי תלויות מהמשתנה , אזי מתקינות התכונות הבאות לגבי ממוצע המדגמים :

$$E(\bar{x}) = \mu$$

$$V(\bar{x}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

פתרונותות: שאלה 2

א.

4	3	2	1	0	X
0.05	0.3	0.35	0.25	0.05	P(x)

$$\mu = 2.05 \quad \sigma^2 = 0.9475 \quad \sigma = 0.973 \quad \text{ב.}$$

$$\mu_{\bar{x}} = 2.05 \quad \sigma_{\bar{x}}^2 = 0.2369 \quad \text{ג.}$$

$$\sigma(\bar{X}) = 0.486$$

 שאלה 3

$$\mu_{\bar{x}} = 3.5$$

$$\sigma(\bar{X}) = 1.21$$

 שאלה 4

$$0.8413 \quad \text{א.}$$

$$0.0013 \quad \text{ב.}$$

$$0 \quad \text{ג.}$$

$$0.1974 \quad \text{ד.}$$

 שאלה 6

$$0.0465 \quad \text{א.}$$

$$27.71 \quad \text{ב.}$$

$$0.2628 \quad \text{ג.}$$

 שאלה 7

$$0 \quad \text{א.}$$

$$0.1587 \quad \text{ב.}$$

$$0.1587 \quad \text{ג.}$$

$$0.5 \quad \text{ד.}$$

שאלה 8

א. 0.5468

ב. 0.6826

שאלה 9

א.

30	20	10	
0.5	0.25	0.25	P(x)

ב. התוחלת : 22.5

השונות : 68.75

ג. התוחלת : 22.5

השונות : 13.75

ד. 0.8997

שאלה 10

0.0475

שאלה 11

0.1814

שאלה 12

א. 0.9772

ב. 0.0228

ג. 271

שאלה 14

התשובה ב

שאלה 15

התשובה ד

שאלה 16

התשובה ג

שאלה 17

א. 2.429

ב. 0.25

פרק 40 - התפלגות הדגימה - התפלגות סכום תצפיות המדגם ומשפט הגבול המרצי

רקע:

כעת נדון בסטטיסטי המביטה את סכום התצפיות במדגם $T = \sum_{i=1}^n X_i$

כאשר כל התצפיות נדגו באקראי מאויה אוכלוסייה.

כלומר, היו X_1, \dots, X_n - משתנים מקרים בלתי תלויים בעלי התפלגות זהה שתוחלתה μ ושוננותה σ^2 איזי:

a. התוחלת והשונות של סכום התצפיות:

$$E(T) = n\mu$$

$$V(T) = n\sigma^2$$

b. דגימה מתוך התפלגות נורמלית:

$$T \sim N(n\mu, n\sigma^2)$$

$$Z = \frac{T - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}} \text{ איזי} \quad X \sim N(\mu, \sigma^2) \text{ אם}$$

g. משפט הגבול המרצי:

$$E(X) = \mu$$

$$V(X) = \sigma^2$$

איזי עבור מדגם מספיק גדול (לפחות 30)

$$T \sim N(n\mu, n\sigma^2)$$

דוגמה: (פתרון בהקלטה)

בעיר מסוימת המשכורת הממוצעת של עובד הינה 8000 ש. עם סטיטית התקן של 2000 ש. נדגו 100 עובדים מהעיר שמקידים את משכורותיהם לסניף בנק.

א. מה התוחלת וסטיטית התקן של סך המשכורות שיופקדו לסניף הבנק על ידי העובדים הללו?
ב. מה ההסתברות שלסניף יופקד פחות מ-7800 אלף ש. עיי' אתם עובדים? (0.1587)

תרגילים:

1. המשקל באוכלוסייה מסוימת מתפלג נורמללית עם תוחלת של 60 ק"ג וסטיית תקן של 10 ק"ג.
- מה הסיכוי שאדם אكريאי מהאוכלוסייה ישקל מתחת ל-65 ק"ג?
 - מה הסיכוי שהמשקל הממוצע של 4 אנשים אكريאים יהיה מתחת ל-65 ק"ג?
 - מה הסיכוי שהמשקל הכולל של 4 אנשים אكريאים יהיה מתחת ל-240 ק"ג?
2. נפח יין בבקבוק מתפלג נורמללית עם תוחלת של 750 מ"ל וסטיית תקן של 20 מ"ל. אדם כמה מרוז של 4 בקבוקי יין.
- מהי התוחלת ומהי סטיית התקן של נפח היין במרוז?
 - את היין שבמרוז האדם מזג לכלי שקיבולתו 3.1 ליטר. מה ההסתברות שהיין יגלוש מהכלי?
 - אם לא היה נתון שנפח היין מתפלג נורמללית. האם התשובה לסעיף א הייתה משתנה? האם התשובה לסעיף ב הייתה משתנה?
3. בספר כלשהו 500 עמודים. קצב הקריאה הממוצע הוא עמוד אחד ב 4 דקות עם סטיית התקן של 1 دقيقة.
- מה ההסתברות לסיים את הפרק הראשון (40 עמודים) תוך שעתיים וחצי?
 - מהו האחוזון ה-95 לזמן סיום קריאת הספר?
4. במגדל נבנו 40 יחידות דיור. כמו כן נבנו 135 מקומות חניה לבניין. להלן פונקציית ההסתברות של מספר המכוניות ליחידה דיור :


x	1	2	3	4	5
$P(X = x)$	0.1	0.2	0.3	0.25	0.15

נניח שמספר המכוניות ליחידה דיור בלתי תלויות זו בזו ועם אותה פונקציית הסתברות לכל יחידה דיור (אינו צורך בתיקון רציפות).

- מהי ההסתברות שהיא מקום בחניון המגדל לכל מכוניות הבניין ?
- בהתנאי שיש מקום במגדל לכל המכוניות , מה הסיכוי שבפועל מספר המכוניות נМОך מ-

?130

5. בקזינו ישנה רולטה עליה מסומנים המספרים הבאים :



אדם מסובב את הרולטה וזוכה בסכום הרשום על הרולטה.

א. אם האדם משחק את המשחק 50 פעמים מה ההסתברות שבסך הכל יזכה בסכום של

1050

שקלים ומעלה?

ב. האדם מגיע בכל יום לказינו ומשחק את המשחק 50 פעם עד אשר מגיע היום בו הוא

יזכה

ב- 1050 שקלים ומעלה. מה התוחלת ומהי השונות של מספר הימים שיבלה בקזינו?

6. נתון ש $i = 1, 2, \dots, 100$ $X_i \sim \exp(\lambda = 1)$ כאשר

$$P\left(\sum_i X_i \geq 115\right).$$

7. אורך חייו סוללה בשעות הוא בעל פונקציית הצפיפות הבאה :

$$f(x) = 2x \quad 0 < x < 1$$

ברגע שסוללה מתורוקנת מחליפים אותה מיידית בסוללה אחרת. כמה סוללות יש להחזיק במלאי אם רוצים שבסיכוי של 90% לפחות המלאי יספיק עבור 35 שעות לפחות?

פתרונותות:**שאלה 1**

- א. 0.6915
 ב. 0.8413
 ג. 0.5

שאלה 2

- א. תוחלת 3000 מ"ל וסטיית תקן 40 מ"ל
 ב. 0.0062

שאלה 4

- א. 0.883

שאלה 5

- א. 0.8997
 ב. תוחלת : 1.111 שונות 0.1239

שאלה 7

56

**פרק 41 - התפלגות הדגימה - התפלגות מספר ההצלחות במדגם –
הקרוב הנורמלי להתפלגות הבינומית**

רקע:


תזכורת על התפלגות בינומית

בפרק זה נדון על התפלגות מספר ההצלחות במדגם אקראי (תצפיות בלתי תלויות זו בזו).

מספר ההצלחות במדגם מסמן ב- Y .

מחלקים כל תצפית במדגם להצלחה או כישלון.

כעת מה שמשתנה מתצפית לתצפית הוא משתנה דיקוטומי (משתנה שיש לו שני ערכים).



הסיכוי להצלחה יסמן עם הפרמטר p וכישלון יסמן ע"י הפרמטר $q = 1 - p$.

מבצעים מדגם אקראי בגודל n .

$$Y \sim B(n, p)$$

פונקציית ההסתברות של ההתפלגות הבינומית היא :

$$\text{תוחלת} : E(y) = np$$

$$\text{שונות} : V(y) = npq$$

קירוב נורמלי עבור התפלגות בינומית

אם לפנינו התפלגות בינומית : $(Y \sim B(n, p))$ ומתקיים ש :

$$n \cdot p \geq 5 .1$$

$$n \cdot (1-p) \geq 5 .2$$

$$y \sim N(np, npq)$$

$$Z_y = \frac{y - np}{\sqrt{npq}} \quad \text{או :}$$

תיקון רציפות:

כאשר משתמשים בקירוב הנורמלי להתפלגות הבינומית יש לבצע תיקון רציפות.

הסיבה שעוברים כאן מהתפלגות בדידה להתפלגות נורמלית שהיא התפלגות רציפה.

על פי הכללים הבאים :

$$p(Y = a) \cong p(a - \frac{1}{2} \leq Y \leq a + \frac{1}{2}) .1$$

$$P(Y \leq a) \cong P(Y \leq a + 0.5) .2$$

$$P(Y \geq a) \cong P(Y \geq a - 0.5) .3$$

הערות:

- התנאים למעבר מבינומי לנורמלי הם נזילים, כולל משתנים ממרצה אחד לשני. התנאי שהציגי כאן הוא הפולרי ביותר :

$$n \cdot p \geq 5 .1$$

$$n \cdot (1-p) \geq 5 .2$$

- ישנו מרצים שונים את התנאי המחייב הבא :

$$n \cdot p \geq 10 .1$$

$$n \cdot (1-p) \geq 10 .2$$

- וישנו מרצים שפשוטו התנאי שהם נתונים הוא : $(n \geq 30)$.


- תאלצו לבדוק מהו התנאי שניתן לכם בכיתה כדי לעבור מההפלגות ביןומית לנורמלית.
- הערכה נוספת היא לגבי תיקון רציפות. ישנו מרצים שלא מחיברים לבצע תיקון רציפות שהמקרים גדולים (בדרך כלל מעל 100 תוצאות) אני בפתרונות שאציג תמיד אבצע תיקון רציפות במעבר מבינומי לנורמלי כיון שכן הפתרון יהיה יותר מדויק (בכל מקרה שהמקרים גדולים הענין זהה).

דוגמה: (הפתרון בהקלטה)

נתון שבקרב אוכלוסיית הנוער 25% זוקקים למשקפיים. נגמרו באקראי 48 בני נוער.

א. מה הסיכוי שבדוק 14 מתוכם יהיו זוקקים למשקפיים?

ב. מה הסיכוי שלכל היתר 13 מתוכם זוקקים למשקפיים?



תרגילים:

- .1. נתון ש-20% מאוכלוסייה מסוימת אקדמאית. נבחרו באקראי 10 אנשים באותה אוכלוסייה.
- מה ההסתברות שלושה מהם אקדמיים?
 - מה ההסתברות שלכל היוטר אחד מהם אקדמי?
 - מה התוחלת ומהי סטיית התקן של מספר האקדמאים במדגם?
- .2. במפעל 10% מהמוצרים פגומים. נלקחו 100 מוצרים באקראי מכו היצור.
- מה ההסתברות שנדגמו לפחות 6 מוגמים?
 - מה ההסתברות שמספר המוגמים יהיה לכל היוטר 11 במדגם?
- .3. ציוני פסיקומטרי בקרוב הנרשמים למוסד מסוים מתפלגים נורמללית עם ממוצע 500 וסטיית תקן 100. למוסד מסוים הוחלט לקבל א' ורק סטודנטים שקיבלו מעל 600 בפסיכומטרי. 100 סטודנטים אקרים נרשמו למוסד. מה ההסתברות שלפחות 20 ינקבלו?
- מטילים מטבע 50 פעמים.
 - מה ההסתברות לקבל לכל היוטר 30 עצים?
 - מה ההסתברות לקבל 28 עצים לפחות הבינומית ולפי הקירוב הנורמלי?
- .5. במטוס מקום ל-400 נוסעים. נרשמו לטיסה 430 אנשים (overbooking). מנתונים סטטיסטיים ידוע שהסיכוי שאדם שנרשם לטיסה אכן הגיע הוא 0.9.
- מה ההסתברות שלא יהיה מקום ישיבה לכל האנשים שהגיעו לטיסה?
 - מה צריך להיות גודל המטוס כדי שהסיכוי שלפחות 95% המטוס יספק לכמה הנרשמים?
- .6. מפעל לייצור ארטיקים טוען שהסיכוי שארטיק שהוא מייצר יהיה פגום הוא 0.01. מוכר הזמין 1000 ארטיקים מהמפעל. מה ההסתברות שהמוכר יקבל לפחות 980 ארטיקים תקינים אם טענת המפעל מוצדקת?
- .7. מהמר מטיל קובייה הוגנת 100 פעמים. בכל הטלה, אם מתקבל תוצאה זוגית בקובייה המהמר זוכה בשקל. אחרת, המהמר משלם שקל. המהמר הטיל את הקובייה 100 פעמים מה הסיכוי שהרוווח של המהמר יהיה לכל היוטר 10?

פתרונות:**שאלה 1**

א. 0.201

ב. 0.3758

ג. התוחלת : 2, סטיית התקן : 1.2649

שאלה 2

א. 0.9332

ב. 0.6915

שאלה 3

0.1611

שאלה 4

א. 0.9406

שאלה 5

א. 0.015

שאלה 6

0.8544

שאלה 7

0.8643

פרק 42 - התפלגות הדגימה - התפלגות פרופורציית ההצלחות במדגם

רקע:

בפרק זה נדון על התפלגות הדגימה של פרופורציית המדגם.

א- מספר ההצלחות במדגם (למשל , מספר המובטלים במדגם)

$$\hat{p} = \frac{y}{n} \quad \text{- פרופורציית ההצלחות במדגם (למשל , שיעור המובטלים במדגם)}$$

למשל,

$$n = 200$$

מספר המובטלים :

$$\hat{p} = \frac{20}{200} = 0.1 \quad \text{פרופורציית המובטלים במדגם}$$

נסמן ב- \hat{p} את שיעור ההצלחה באוכלוסייה וב- q את שיעור הכישלונות באוכלוסייה.

נבע מדוגמה מקרי (הנחה שהתוצאות בלתי תלויות זו בזו) ונtabונן בהתפלגות של פרופורציית המדגם.

התוחלת, השונות וסטיית התקן של פרופורציית המדגם:

$$\begin{aligned} E(\hat{P}) &= p \\ V(\hat{P}) &= \frac{pq}{n} \\ \sigma(\hat{p}) &= \sqrt{\frac{pq}{n}} \end{aligned}$$

משפט הגבול המרכזי עבור הפרופורציה המדגמית :

$$\hat{p} \sim N(p, \frac{pq}{n}) \quad \text{אזי } np \geq 5 \& nq \geq 5$$

$$Z_{\hat{p}} = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}}$$

הערות:

- התנאים לקרוב הנורמלי הם נזילים, ככלומר משתנים ממרצה אחד לשני. התנאי שהציגי כאן הוא הפופולרי ביותר :

$$n \cdot p \geq 5 . 1$$

$$n \cdot (1-p) \geq 5 . 2$$

- ישנים מרצים שנוטנים את התנאי המחייב הבא :

$$n \cdot p \geq 10 . 1$$

$$n \cdot (1-p) \geq 10 . 2$$

- וישנים מרצים המשמשים בתנאי : $(n \geq 30)$.

• תאלצו לבדוק מהו התנאי שנותנו לכם בכיתה כדי לעبور לנורמלית.

• כיוון שספרופרנציה אינה חייבת להיות מספר שלם בהכרח לא נהוג לבצע כאן תיקון רציפות.

דוגמה : (פתרון בהקלטה)

לפי נתוני משרד החינוך בעיר ירושלים ל-60% מתלמידי התיכון זכאים לתעודת בגרות.
נדגמו 200 תלמידי תיכון.

א. מה ההסתברות שהשכיחות היחסית (\hat{p}) של הזכאים לבגרות במדגם עולה על 60%?

ב. מה ההסתברות שספרופרנציה הזכאים לבגרות במדגם עולה על 70%?

תרגילים:

1. במדינה מסוימת 10% מכלל האוכלוסייה הינם מובטלים. נדגו באקראי 140 אנשים מהמדינה.
- מה התוחלת ומהי השונות של פרופורציות המובטלים שנדגו?
 - מה ההסתברות שבמבחן לפחות 10% יהיו מובטלים?
 - מה ההסתברות שלכל היוטר 9% מהמבחן יהיו מובטלים?
2. נניח כי 30% מהאוכלוסייה תומכים בהצעת חוק מסוימת. אם נדגו מהאוכלוסייה 200 איש. חשבו את ההסתברויות הבאות:
- לפחות 35% יתמכו בהצעת החוק במבחן.
 - לכל היוטר 25% יתמכו בהצעת החוק במבחן.
 - יוטר מ – 27% יתמכו בהצעת החוק במבחן.
3. לפי נתוני משרד התקשורת 40% מהאוכלוסייה מחזיקים טלפון נייד מסווג "סמארטפון". נדגו 400 אנשים מהאוכלוסייה.
- מה ההסתברות שבמבחן לכל היוטר לפחות 40% יש סמארטפון?
 - מה ההסתברות שבמבחן לרוב יש סמאטרפון?
 - מה ההסתברות שפרופורציית בעלי הסמארטפון במבחן תסטה מהפרופורציה האמתית ללא יותר מ-4%?
 - כיצד התשובה לשאיפ הקודם הייתה משתנה אם היו מגדילים את גודל המבחן?
4. נתון כי 80% מבתי האב מחוברים לאינטרנט. נדגו 400 בתים אב אקרים.
- מה ההסתברות שלפחות 340 מהם מחוברים לאינטרנט?
 - מה ההסתברות שפרופורציית המוחברים לאינטרנט במבחן תסטה מהפרופורציה האמתית ביותר מ-4%?
 - כמה בתים אב יש לדגום כדי שהסתטיה בין הפרופורציה המדגמית לפרופורציה האמתית לא תעללה על 3% בהסתברות של 90%?
 - מהו העשירון התיכון של התפלגות פרופורציית המבחן?
5. נתון שצינוי פסיכומטרי מתפלגים נורמלית עם תוחלת 500 וסטיית תקן 100. ל"מועדון ה-700" נכללים נבחנים שמקבלים ציון מעל 700 בפסיכומטרי. מה הסיכוי שבמועד בו נבחנו 2000 נבחנים אקרים יהיו לפחות 3% המשתייכים למועדון?

. $\hat{P} = \frac{X}{n}$: נתון ש $X \sim B(n, p)$ נגדיר את המשתנה הבא

א. הוכחו ש :

$$E(\hat{P}) = p$$

$$V(\hat{P}) = \frac{p(1-p)}{n}$$

ב. מה ימביא את $V(\hat{P})$ להיות במקסימום?

פתרונות: **שאלה 1**

א. התוחלת : 0.1 , השונות : 0.00064

ב. 0.5

ג. 0.3446

 שאלה 2

א. 0.0618

ב. 0.0618

ג. 0.8238

 שאלה 3

א. 0.5

ב. 0

ג. 0.8968

ד. גדלתה

 שאלה 4

א. 0.0062

ב. 0.0456