

# פיזיקה מודרנית קורס חלקי



## תוכן העניינים

1	גלים	1
14	חוק קולון- מתוך פיזיקה 2	2
(ללא ספר)	חוק גאוס- מתוך פיזיקה 2	3
18	תורת הקוונטים	4
35	תורת הקוונטים חלק 2	5
57	המחזורית-יש להתעלם מכל מה שקשור לאטום המימן ולהתמקד רק בהסברים על תנו וספין	57
	6. המודל הקוונטי לאטום המימן ספין והטבלה	
69	מעגלי CR	7
75	פורמליזם אלגברי לתורת הקוונטים	8
80	אופרטורים בייצוג האלגברי	9
88	10. הרחבה על תנו מסילתי ספין ותנו כולל	10
96	11. תרגילים ברמת מבחן	11

# פיזיקה מודרנית קורס חלקי

פרק 1 - גלים

תוכן העניינים

1. גלים והתאבכות גלים.....1

## גלים והתאבכות גלים:

### רקע:

מהירות גל מחזורי:  $v = \lambda f$

$\lambda$  – אורך הגל.

$f$  – תדירות הגל.

$$\text{חוק השבירה: } \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2}$$

$\theta$  – הזוויות בין הקרן הפוגעת/ מוחזרת לאנך למשטח.

$n$  – מקדם השבירה של כל תווך.

$v$  – מהירות הגל בכל תווך.

$$\text{גל עומד במיתר שקצותיו קשורים: } \ell = n \frac{\lambda}{2}$$

$\ell$  – אורך המיתר.

$n$  – מספר נקודות הקמר (מקס" / מיני)

$\lambda$  – אורך הגל

קווי מקסימום ראשיים בהתאבכות משני מקורות (ויותר) שווי-מופע:

$$\sin \theta_n = \frac{X_n}{L_n} = n \frac{\lambda}{d}$$

$\theta_n$  – זווית הסטייה של האור המגיע לנק' המקסימום  $n$  ביחס לכיוון המאונך למישור החריצים.

$X_n$  – המרחק בין אמצע הלוח והמקסימום מסדר  $n$ .

$L_n$  – המרחק בין המרכז של החריצים למקסימום מסדר  $n$ .

$n$  – סדר קו המקסימום.

$\lambda$  – אורך הגל.

$d$  – המרחק בין החריצים.

$$\sin \theta_n = \frac{X_n}{L_n} = \left(n - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{d}$$

$\theta_n$  – זווית הסטייה של האור המגיע לנק' המינימום  $n$  ביחס לכיוון המאונך למישור החריצים.

$X_n$  – המרחק בין אמצע הלוח והמינימום מסדר  $n$ .

$L_n$  – המרחק בין המרכז של החריצים למינימום מסדר  $n$ .

$n$  – סדר קו המינימום.

$\lambda$  – אורך הגל.

$d$  – המרחק בין החריצים.

$$\frac{\Delta X}{L} = \frac{\lambda}{d}$$

$\Delta X$  – רוחב פס האור

$L$  – מרחק האנך למסך מהחריצים.

$\lambda$  – אורך הגל.

$d$  – המרחק בין החריצים.

$$\sin \theta_n = n \frac{\lambda}{d} = nN \cdot \lambda$$

$\theta_n$  – הזווית למקסימום מסדר  $n$ .

$d$  – המרחק בין שני חריצים צמודים.

$N$  – קבוע הסריג.

$$\sin \theta_n = \frac{X_n}{L_n} = n \frac{\lambda}{w}$$

$\theta_n$  – הזווית למינימום מסדר  $n$ .

$X_n$  – מרחק מרכז המינימום מסדר  $n$  למרכז המקסימום המרכזי.

$L_n$  – המרחק בין החריץ למינימום מסדר  $n$ .

$w$  – רוחב החריץ.

## שאלות:

## (1) תרגול גל 1

פולס נע ימינה בחבל.

מתוארת צורתו בשני זמנים שונים:  $t = 0$ ,  $t = 2 \text{ sec}$ .

א. מה משרעת הפולס?

ב. מה מהירות התקדמותו?


ג. מה כיוון תנועת החלקיק בחבל שנמצא בנקודה A ברגע  $t = 0$ ?

ד. מה כיוון תנועת החלקיק בחבל שנמצא בנקודה B ברגע זה?

## (2) תרגול גל 2

מציירים בחבל שתי הפרעות כמתואר בתרשים:  $v = 10 \frac{\text{cm}}{\text{sec}}$ .

שרטט את החבל בזמנים הבאים:

א.  $t = 8 \text{ sec}$ ב.  $t = 16 \text{ sec}$ ג.  $t = 18 \text{ sec}$ ד.  $t = 22 \text{ sec}$ 

## (3) תרגול גל 3

בחבל מייצרים שתי הפרעות שונות בשני קצותיו שמתקדמות אחת לקראת

השנייה, כמתואר בתרשים:  $v = 0.5 \frac{\text{cm}}{\text{sec}}$ .

שרטט את צורת החבל בזמנים הבאים:

א.  $t = 8 \text{ sec}$ ב.  $t = 12 \text{ sec}$ ג.  $t = 13 \text{ sec}$ ד.  $t = 16 \text{ sec}$ 

## (4) תרגול גל 4


פולס משולש נע בחבל ומגיע לקצהו. שרטט את החבל + הפולס במקרים הבאים:

א. קצה החבל קשור לקיר.

ב. קצה החבל מולבש על טבעת חופשיה למנוע על פני ציר שעובר דרכה.

ג. קצה החבל קשור לחבל כבד יותר.

ד. קצה החבל קשור לחבל קל יותר.

**5) תרגול גל עומד**


חוט AB, שאורכו 1m, קשור בקצהו B למחולל תנודות, ובקצהו A למוט קבוע (ראה תרשים).  
 כאשר תלמיד מפעיל את מחולל התנודות, נוצר בחוט AB גל, שמוחזר מהקצה A.  
 התלמיד מגדיל ברציפות את תדירות מחולל התנודות ורושם את התדירויות בכל פעם שנוצר בחוט AB גל עומד.  
 תוצאות הניסוי רשומות בטבלה שלפניך:

$\frac{1}{\lambda} (\text{m}^{-1})$	$\lambda (\text{m})$	צורת הגל העומד	f - תדירות התנודות (Hz)
			24
			45
			67
			88

התייחס לנקודה B כנקודת צומת.

א. העתק את הטבלה למחברתך, ורשום בעמודה את אורך הגל  $\lambda$ , לכל אחד מארבעת הגלים העומדים שנוצרו בחוט?

ב. רשום בעמודה המתאימה בטבלה את הערך  $\frac{1}{\lambda}$  לכל אחד מארבעת הגלים, וסרטט גרף של התדירות f כפונקציה של  $\frac{1}{\lambda}$ .

ג. מצא בעזרת הגרף את מהירות התפשטותו של גל בחוט AB.

ד. התלמיד ממשיך להגדיל את תדירות מחולל התנודות.

מהי התדירות הראשונה (הגבוהה מ-88Hz) שיווצר בה גל עומד בחוט AB? נמק.

**6) תרגול גל מחזורי 1**

מופיעים לפניכם גרפי העתק זמן והעתק מקום של חבל מסוים.



א. מהי משרעת הגל?

ב. מהו אורך הגל המתקדם בחבל?

ג. מה זמן המחזור של הגל?



ד. מה מהירות הגל?

ה. לאיזה נקודה/נקודות בחבל יכול להתאים גרף ההעתק זמן (השמאלי)?



**7) תרגול גל מחזורי 2**

לפניכם גרף העתק-מקום והעתק-זמן של הגוף מהשאלה הקודמת.  
מכפילים את תדירות מחולל הגלים (מקור).  
שרטטו את גרף העתק-זמן והעתק-מקום החדשים.

**8) תרגול גל מחזורי 3**

- לפניך שני תצלומים (נראים זהים). הימני: גל מתקדם, השמאלי: גל עומד בקהל.  
א. קבע את אורך הגל של כל אחד מהגלים בחבל.  
ב. שרטט את החבל  $\frac{1}{4}$  זמן מחזור לאחר תצלום זה.  
ג. שרטט את החבל  $\frac{1}{2}$  זמן מחזור לאחר תצלום זה.  
ד. בחר בכל תצלום נקודה מימין ומשמאל למשרעת, וצייר את כיוון תנועתה מיד לאחר צילום זה.

**9) תרגיל 1**

- מהירות גל במיתר מתוח 25 מטר בשנייה. קושרים את היתר בין שני כנים שהמרחק ביניהן 3 מטר.  
מניעים את המיתר בעזרת מתנד.  
באיזו תדירות יש לנדנד אותו כך שייווצר בו גל עומד עם 12 נקודות צומת (כולל הקצוות)?
- 45.8 הרץ.
  - 70 הרץ.
  - 8.3 הרץ.
  - 75 הרץ.
  - 80.7 הרץ.

**(10) תרגיל 2**

מיתר בעל אורך 90 ס"מ קשור בשני קצותיו. כשמנדנדים אותו בתדירות 150 הרץ, נוצר בו גל עומד עם 8 נקודות צומת (כולל הקצוות). מהירות גל במיתר הנ"ל:

א.  $15.3 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$

ב.  $38.6 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$

ג.  $17 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$

ד.  $34.3 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$

**(11) תרגיל 3**

מנדנדים מיתר מתוח הקשור בשני קצותיו בתדירות 100 הרץ. אורך המיתר 3 מטר. במיתר נוצר גל עומד עם 5 נקודות צומת (כולל הקצוות). מהי מהירות הגל במיתר?

א.  $150 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$

ב.  $100 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$

ג.  $330 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$

ד.  $20 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$

ה.  $340 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$

**(12) תרגיל 4**

מיתר של גיטרה משמיע עם הפריטה עליו צליל בתדירות של 300 הרץ. אם רוצים להפיק מהמיתר צליל בעל תדירות של 900 הרץ:


- אין כל דרך להפיק את התדירות הנ"ל מהמיתר.
- יש להקטין את המתיחות במיתר פי 3.
- יש לקצר את המיתר פי 3.
- יש להאריך את המיתר פי 3.
- יש להגדיל את המתיחות פי 2.

**(13) תרגול אנרגיה ומשרעת של גל**

- גל מעגלי מתפשט באמבט גלים. משרעתו, כשהיה מעגל ברדיוס 3cm, הייתה 1cm.
- א. פי כמה תהיה קטנה האנרגיה שלו כשיתפשט לרדיוס של 15cm?
- ב. מה תהיה משרעתו במצב זה?

**(14) התאבכות גלי מים – תרגיל 1**

- נתון תרשים של אמבט גלים ובו 2 מקורות בעלי אורך גל זהה ושווי מופע.
- קווים רציפים מייצגים שיא בגל וקווים מקווקוים – שפל.
- זהו את קווי המקסימום והמינימום בתרשים.

**(15) התאבכות גלי מים – תרגיל 2**

- נתון אמבט גלים בו 2 מקורות שהמרחק ביניהם 7 ס"מ.
- המקורות מכים במים במופע זהה בתדירות 20 הרץ.
- מהירות התקדמות הגלים באמבט היא 25 ס"מ לשנייה.
- א. מה אורך הגל של הגלים שיוצרים המקורות?
- ב. קבע, לגבי כל אחת מהנקודות הבאות: A, B, C, D בתרשים, האם היא על קו מקסימום, על קו מינימום או נקי ביניים:
- i. A - מרחקה מהמקור הראשון - 4 ס"מ ומהמקור השני - 2.8 ס"מ.
  - ii. B - מרחקה מהמקור הראשון - 5 ס"מ ומהמקור השני - 3.2 ס"מ.
  - iii. C - מרחקה מהמקור הראשון - 7 ס"מ ומהמקור השני - 3.4 ס"מ.
  - iv. D - מרחקה מהמקור הראשון - 8 ס"מ ומהמקור השני - 6.5 ס"מ.
- ג. כמה קווי מקסימום וכמה קווי מינימום יופיעו באמבט?

**16) שאלה 1 בהתאבכות גלי מים**

שני מקורות גל זהים A ו-B נמצאים בנקודות  $(0,0)$  ו- $(6,0)$ . המקורות משדרים באורך גל של  $1\text{cm}$  לכל הכיוונים. על ציר  $y$  מתקבלת התאבכות בונה בנקודות הבאות (המספרים בס"מ):

- א.  $(0,1.1)$   $(0,2.5)$   $(0,4.5)$   $(0,8)$   $(0,17.5)$ .
- ב.  $(0,1)$   $(0,2)$   $(0,4)$   $(0,8)$   $(0,16)$   $(0,32)$ .
- ג.  $(0,6)$   $(0,12)$   $(0,18)$   $(0,24)$   $(0,30)$ .
- ד.  $(4,4.5)$   $(4,8)$   $(4,17.5)$   $(3,2)$ .
- ה.  $(0,4.2)$   $(0,8.7)$   $(0,16.5)$   $(0,0)$ .
- ו.  $(0,4.5)$   $(0,8)$   $(0,17.5)$ .

**17) שאלה 2 בהתאבכות גלי מים**

שני מקורות גל זהים ושווי מופע ממוקמים בנקודות  $(0,0)$  ו- $(5,0)$  (הערכים בס"מ). אורך הגל של כל אחד מהם  $2$  ס"מ. היכן על ציר  $y$  תתקבל התאבכות בונה מסדר ראשון? (הערכים בס"מ).

- א.  $(5,2.5)$ .
- ב.  $(0,5.25)$ .
- ג.  $(0,6)$ .
- ד.  $(0,2.5)$ .
- ה.  $(0,-5.25)$ .

**18) שאלה 3 בהתאבכות גלי מים**

שני מקורות גל זהים A ו-B נמצאים בנקודות  $(0,5)$  ו- $(0,-5)$ . בנקודה  $(10,10)$  מתקבלת התאבכות בונה מסדר ראשון (כל המספרים נתונים בס"מ) אורך הגל הוא בקירוב:

- א.  $8.5$  ס"מ.
- ב.  $5$  ס"מ.
- ג.  $7.3$  ס"מ.
- ד.  $15$  ס"מ.
- ה.  $6.8$  ס"מ.

**(19) שאלה 4 בהתאבכות גלי מים**

באמבט גלים ממקמים שני מתנדים בשתי נקודות (4,2) ו-(7,6). המתנדים רוטטים בתדירות זהה ובאותו מופע. בנקודה (10,10) מתקבלת התאבכות בונה מסדר שלישי. מהו אורך הגל? (הגדלים המספריים במטרים).

א. 1.67m

ב. 0.62m

ג. 2.79m

ד. 6.83m

ה. 1.23m

**(20) התאבכות אור תרגיל 1**

מאירים בלייזר בעל אורך גל 500 ננומטר לוחית בעלת 2 סדקים בעלי  $d = 0.2\text{mm}$ . במרחק  $L = 3\text{m}$  נמצא מסך.

א. מהו רוחב פס אור כל עוד אנחנו בזווית קטנות?

ב. מהו מרחקו ממרכז התבנית של מרכז פס האור מסדר רביעי?

ג. מהו מרחקו ממרכז תבנית ההתאבכות של קו החושך מסדר שביעי?

ד. מה מרחקו ממרכז תבנית ההתאבכות של מרכז פס האור מסדר 200?

**(21) התאבכות אור תרגיל 2**

מאירים בלייזר ירוק בעל אורך גל לא ידוע על לוחית ובה 2 סדקים שהמרחק ביניהם 0.15 מ"מ. מניחים מסך שאורכו  $h = 1\text{m}$  במרחק 3 מטר מהלוחית כך שמרכז המסך בדיוק מול הסדקים. הזווית למקסימום מסדר חמישי נמדדת ושווה ל-1 מעלה.

א. מה אורך הגל של הלייזר?


ב. מה מרחקו של המינימום מסדר חמישי ממרכז המסך?

ג. כמה קווי חושך התקבלו על המסך?

ד. אם נחליף המסך במסך ארוך מאוד שיונח באותו מיקום, כמה פסי אור ייווצרו על המסך?

**(22) התאבכות אור תרגיל 3**




לוקחים לייזר אדום בעל אורך גל לא ידוע ומציבים לפניו לוחית בעלת 2 סדקים שהמרחק ביניהם 0.25 מ"מ. ממקמים מסך במרחק 1.8 מטר מהלוחית. על המסך מתקבלת תבנית ההתאבכות הבאה, לצד סרגל שהודבק למסך מראש.



- א. מצא את אורך הגל של הלייזר בדרך המדויקת ביותר.
- ב. איזה מהנקודות בצילום הינה נקודת המקסימום המרכזי?
- ג. לאיזה נקודה בצילום מגיע אור שמרחקו מאחד הסדקים גדול ב-3 אורכי גל מאשר מרחקו מהסדק השני?
- ד. לאיזה נקודה על המסך מגיע אור שמרחקו מאחד הסדקים גדול ב-4.5 אורכי גל מאשר מרחקו מהסדק השני?
- ה. מהן 3 הדרכים אשר ניתן לצופף בהן את תבנית ההתאבכות?

**תשובות סופיות:**


(1) א.  $A = 0.3m$  ב.  $V = 0.2 \frac{m}{sec}$  ג. למעלה. ד. למטה.



א. (5)

$\frac{1}{\lambda} (\text{m}^{-1})$	$\lambda (\text{m})$	צורת הגל העומד	f - תדירות התנודות (Hz)
0.5	2		24
1	1		45
1.5	$\frac{2}{3}$		67
2	$\frac{1}{2}$		88

$$f = 111 \text{ Hz} \quad \text{ד.} \quad f = v \frac{1}{\lambda} \quad \text{ג.}$$




ב.

$$v = 25 \frac{\text{cm}}{\text{sec}} \quad \text{ד.}$$


$$t = 4 \quad \text{ג.} \quad \lambda = 1 \text{ m} \quad \text{ב.} \quad A = 0.15 \text{ m} \quad \text{א.} \quad (6)$$

$$(0.5, 0), (1.5, 0), (2.5, 0) \quad \text{ה.}$$


הגל הירוק בשרטוט: (7)




$$\text{א. מתקדם: } \lambda_1 = 80 \text{ cm}, \text{ עומד: } \lambda_2 = 80 \text{ cm}. \quad (8)$$



ג.



ב.



ד.


א. (9)

ב. (10)

א. (11)

ג. (12)

א. (13) ב. 0.45 cm



(15) א. 1.2 ס"מ.

ב.i. - נקי מקסימום מסדר ראשון.

ב.ii. - נקי צומת מסדר שני.

ב.iii. - נקי מקסימום מסדר שלישי, נקי על קו מקסימום.

ב.iv. - נקי ביניים.

ג. 11 קווי מקסימום, 12 קווי מינימום.

(16) א' מלאה ו-ו' חלקית.

(17) ב' ו-ה.

(18) ה.

(19) א'.

(20) א. 7.5 nm. ב. 3 ס"מ. ג.  $\theta = 0.93^\circ$ . ד.  $x_{200} = 1.73$

(21) א. 524 נ"מ. ב. 4.72 ס"מ. ג. 94 קווי חושך. ד. 573 פסי מקסימום.

(22) א. 5 מ"מ. ב.  $\lambda = 694$ . ג.  $3\lambda$ . ד.  $4.5\lambda$ . ה. ראה סרטון.

# פיזיקה מודרנית קורס חלקי

פרק 2 - חוק קולון- מתוך פיזיקה 2

תוכן העניינים

1. חוק קולון וסופרפוזיציה.....14

## חוק קולון וסופרפוזיציה:

רקע:

חוק קולון :

הכוח החשמלי שמפעיל מטען  $q_1$  כלשהו על מטען  $q_2$  כלשהו

$$\vec{F} = \frac{kq_1 \cdot q_2}{r^2} \hat{r} = \frac{kq_1 q_2}{r^3} \vec{r}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2}$$

$$\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{N \cdot m^2}$$

$\vec{r}$  - וקטור מ-  $q_1$  אל  $q_2$

$$\hat{r} = \frac{\vec{r}}{r} \quad r = |\vec{r}|$$

השדה החשמלי שיוצר מטען  $q$  במרחב :

$$\vec{E} = \frac{kq}{r^2} \hat{r} = \frac{kq}{r^3} \vec{r}$$

$\vec{r}$  - וקטור מהמטען  $q$  אל הנקודה בה מחשבים את השדה.

שימו לב שבנוסחה הזו המטען הוא זה שיוצר את השדה.


הכוח הפועל על מטען  $q$  הנמצא בשדה חשמלי  $\vec{E}$  :

$$\vec{F} = q \vec{E}$$

שימו לב שבנוסחה הזו המטען  $q$  הוא המטען שמרגיש את הכוח (המטען בעצמו גם יוצר שדה אבל זה לא רלוונטי לנוסחה הזו והמטען לא מרגיש את השדה שהוא עצמו יוצר)


**שאלות:**

**(1) מטען בפינת ריבוע**




חשב את הכוח הפועל על המטען שבפינה התחתונה הימנית של הריבוע שבשרטוט.  $q$  ו- $a$  נתונים.

**(2) מטענים בקודקודי משולש**



שלושה מטענים זהים נמצאים על קודקודיו של משולש שווה צלעות. גודל כל מטען הוא  $q = 2\mu\text{C}$  ואורך צלע המשולש היא  $4\text{m}$ . מצא את הכוח שמרגיש כל מטען כתוצאה מהמטענים האחרים.


**(3) שני כדורים תלויים**



שני כדורים בעלי מסה  $m$  ומטען זהה תלויים מהתקרה ע"י חוטים בעלי אורך  $L$ . הזווית בין החוטים היא  $30$  מעלות. מצא את מטען הכדורים.

**(4) שדה מקסימלי בין שני מטענים**


שני מטענים בעלי מטען זהה  $Q$  נמצאים על ציר ה- $x$  בנקודות  $(a, 0)$  ו- $(-a, 0)$ .  
א. מצאו את הנקודה על ציר ה- $y$  כלומר  $(0, y)$  שבה השדה החשמלי מקסימאלי.




ב. מה גודל השדה בנקודה זו?  
ג. באיזה נקודה השדה מקסימאלי בציר ה- $z$ ?

**5) שפופרת טלויזיה**

אלקטרונים נכנסים לשפופרת במהירות  $V$  נתונה. בשפופרת יש שדה קבוע בשני הכיוונים הניצבים למהירות כניסת האלקטרונים. אורך השפופרת הוא  $d$ .  
חשב את נקודת הפגיעה של האלקטרונים במסך הנמצא במרחק  $L$  מקצה השפופרת. הנח כי  $d \ll L$  וכי מסת ומטען האלקטרון ידועים.



**6) דיפול מפעיל כוח על דיפול**



דיפול חשמלי מורכב משני מטענים נקודתיים  $\pm q$  הנמצאים בנקודות  $(0, \pm \frac{d}{2})$  (ראו איור).

א. חשבו את השדה החשמלי שיוצר הדיפול בנקודה  $(y, 0)$  שעל ציר ה- $y$ .

ב. השתמשו בתוצאת הסעיף הקודם וחשבו את הכוח שמפעיל הדיפול הנ"ל על דיפול נוסף שמטעניו גם כן  $\pm q$  המרוחקים זה מזה

מרחק  $d$  (המצוי על ציר ה- $y$  גם כן) ואשר מרכזו במרחק  $r$  ממרכז הדיפול הראשון. הניחו ש- $r > d$ .

ג. למה תצטמצם תשובתכם לסעיף קודם עבור  $r \gg d$ ?  
הדרכה: השתמשו בפיתוח לטור טיילור (או מקלורן) של פונקציית

החזקה:  $(1+x)^n \approx 1+nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2 \dots +$

## תשובות סופיות:

$$\frac{kq^2}{a^2} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \quad (1)$$

$$3.897 \cdot 10^{-3} \text{ N} \quad (2)$$

$$\sqrt{\frac{mg}{k}} \tan(15^\circ) L^2 (2 - \sqrt{3}) \quad (3)$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} a \quad \lambda \quad \frac{4kQ}{\sqrt{27}a^2} \quad \text{ב.} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} a \quad \text{א.} \quad (4)$$

$$z \approx \frac{|e|E_z d \cdot L}{mv^2}, \quad \frac{|e|E_x d \cdot L}{mv^2} \quad (5)$$

$$\vec{E}(y) = kq \left[ \frac{1}{\left(y - \frac{d}{2}\right)^2} - \frac{1}{\left(y + \frac{d}{2}\right)^2} \right] \hat{y} \quad \text{א.} \quad (6)$$

$$\vec{F} = kq^2 \left[ \frac{2}{r^2} - \frac{1}{(r+d)^2} - \frac{1}{(r-d)^2} \right] \hat{y} \quad \text{ב.}$$

$$\vec{F} = -\frac{6d^2 kq^2}{r^4} \hat{y} \quad \text{ג.}$$

# פיזיקה מודרנית קורס חלקי

פרק 3 - חוק גאוס - מתוך פיזיקה 2

תוכן העניינים

1. הסברים בסיסיים ..... (ללא ספר)

# פיזיקה מודרנית קורס חלקי

פרק 4 - תורת הקוונטים

תוכן העניינים

1. הרצאות ותרגולים ..... 18

## פונקציית הגל של החומר:

### סיכום כללי:

- $|\psi(x)|$  היא פונקציית הגל של החומר.
- $|\psi(x)|^2$  היא צפיפות ההסתברות למצא חלקיק בנקודה מסוימת.
- ההסתברות שחלקיק נמצא בין  $x_1$  ל- $x_2$  היא:  $\int_{x_1}^{x_2} |\psi(x)|^2 dx$ .
- נרמול:  $\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1$ .
- כאשר מתבצעת מדידה של החלקיק פונקציית הגל קורסת.
- מיקום ממוצע:  $\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x |\psi(x)|^2 dx$
- המיקום בעל ההסתברות הגבוה ביותר הוא נקודת המקסימום של פונקציית ההסתברות  $|\psi(x)|^2$  (ניתן למצא אותו על ידי נגזרת).
- שונות:  $\sigma^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$  כאשר  $\langle x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 |\psi(x)|^2 dx$

### שאלות:

- (1) דוגמה – חישוב ההסתברות לדעיכה אקספוננציאלית  
 פונקציית הגל של חלקיק היא  $4e^{-8x}$  עבור  $x > 0$  ואפס עבור  $x < 0$ .  
 מה הסיכוי למצא את החלקיק ב- $x > 0.03$ .

(2) דוגמה – מצאו את המקדם

$$\psi(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ A \sin(20\pi x) & 0 \leq x \leq 0.05 \\ 0 & x > 0.05 \end{cases}$$

נתונה פונקציית הגל הבאה של חלקיק:  $0 \leq x \leq 0.05$

מצאו את הקבוע A.

**3) דוגמה – מצאו משתנים**

נתונה פונקציית גל מנורמלת לחלקיק בעל מסה  $M$ :  $\psi(x) = Ae^{-\alpha(x-x_0)^2}$ . מצאו את:

א.  $A$ .ב.  $\langle x \rangle$ .

ג. המיקום המסתבר ביותר.

ד.  $\langle x^2 \rangle$ .ה.  $\Delta x$ .

לעזרתכם:  $\int_0^\infty e^{-bx^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{4b}}$ ;  $\int_0^\infty x^2 e^{-bx^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{16b^3}}$

**תשובות סופיות:**

(1) 38%

(2)  $A = 2\sqrt{10}$

(3) א.  $A = \left(\frac{2\alpha}{\pi}\right)^{\frac{1}{4}}$

ג.  $x_0$ .ב.  $x_0$ .

ה.  $\left(\frac{\pi}{8192\alpha^3}\right)^{\frac{1}{8}}$

ד.  $\left(\frac{\pi}{8192\alpha^3}\right)^{\frac{1}{4}} + x_0^2$

## עקרון אי הוודאות של הייזנברג:

### סיכום כללי:

הערות		
1. אי אפשר למדוד במדויק את המיקום והתנע באותו ציר בו זמנית. 2. אותה נוסחה לכל ציר בנפרד. 3. אין בעיה למדוד במדויק את התנע ב-X והמיקום ב-Y בו זמנית.	$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$ $\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.055 \cdot 10^{-34} J \cdot S$	אי ודאות מיקום תנע
1. ככל שמוודדים את הזמן בדיוק גבוה יותר כך הדיוק במדידת האנרגיה קטן. 2. האנרגיה נשמרת עד כדי אי הוודאות, הגופים יכולים להיות באנרגיות האסורות קלאסית.	$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$	אי ודאות זמן אנרגיה
	$\Delta L_z \Delta \theta \geq \frac{\hbar}{2}$	אי ודאות במדידת הזווית והתנע הזוויתי

### שאלות:

(1) דוגמה – מדידת מיקום  
 אלקטרון נע במהירות:  $2.10 \cdot 10^6 \frac{m}{sec}$  שנמדדה בדיוק של 0.12%.  
 מה הדיוק המקסימאלי שניתן להשיג במדידה סימולטנית של המיקום?

(2) דוגמה – אי וודאות של טניס  
 מה היא אי הוודאות במדידת המיקום של כדור טניס בעל מסה של 150 גרם הנזרק במהירות:  $35 \pm 2 \frac{m}{sec}$ ?

(3) אי ודאות במיקום נויטרון שנע  
 נויטרון נע במהירות:  $(6.650 \pm 0.023) \cdot 10^5 \frac{m}{sec}$ .  
 באיזו רמת דיוק ניתן לדעת את המיקום שלו?  $m_p = 1.67 \cdot 10^{-27} kg$

(4) אנרגיה במצב מעורר  
 אלקטרון נשאר במצב מעורר באטום בערך  $10^{-8} sec$ .  
 מה אי הוודאות באנרגיה של המצב באלקטרון וולט?

**(5) אי ודאות יחסית בפליטת פוטון**

זמן החיים של אטום במצב מעורר הוא בערך  $10^{-9}$  sec. האטום יורד מהמצב המעורר ופולט פוטון באורך גל של 400nm, מצאו את אי הודאות היחסית באנרגיית הפוטון  $\frac{\Delta E}{E}$  ובאורך הגל  $\frac{\Delta \lambda}{\lambda}$ .

**(6) אי ודאות בשל קליע באקדח**

קליע בעל מסה של 5gr נורה מאקדח במהירות אופקית של  $180 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ .

- א. מהו אורך הגל של הקליע?  
 ב. מהי אי הודאות המינימלית במדידת המיקום של הקליע?  
 ג. מהי אי הודאות המינימלית בתנע בכיוון האנכי של הקליע אם רדיוס הקנה הוא 0.60cm?

**(7) אי ודאות במסת נויטרון**

לנויטרון חופשי:  $m = 1.67 \cdot 10^{-27}$  kg יש זמן חיים של 886sec. מה אי הודאות במדידת המסה של הנויטרון (בק"ג)?

**(8) אלקטרון יורד מצב באטום המימן**

אלקטרון נמצא במצב המעורר הראשון ( $=2n$ ) של אטום המימן בממוצע  $10^{-8}$  sec לפני שהוא יורד למצב הייסוד ( $=1n$ ).  
 א. העריכו את אי הודאות באנרגיית האלקטרון במצב  $=2n$ .  
 ב. מהי אי הודאות היחסית באנרגיית הפוטון הנפלט?  
 ג. מהו אורך הגל ורוחב הפס של קו הספקטרום הנצפה מתהליך זה?

**תשובות סופיות:**

$$\Delta X \text{ min} = 2.3 \cdot 10^{-6} \text{ m} \quad (1)$$

$$1.8 \cdot 10^{-34} \text{ m} \quad (2)$$

$$1.37 \cdot 10^{-11} \text{ m} \quad (3)$$

$$3 \cdot 10^{-8} \text{ eV} \quad (4)$$

$$\frac{\Delta E}{E} = 4 \cdot 10^{-5} \% , \quad \left| \frac{\Delta \lambda}{\lambda} \right| = 4 \cdot 10^{-5} \% \quad (5)$$

$$7.4 \cdot 10^{-34} \text{ m} \quad \text{א.} \quad 10^{-32} \text{ m} \quad \text{ב.} \quad 10^{-32} \text{ kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{sec}} \quad \text{ג.} \quad (6)$$

$$10^{-51} \text{ kg} \quad (7)$$

$$3 \cdot 10^{-8} \text{ eV} \quad \text{א.} \quad 3 \cdot 10^{-9} \quad \text{ב.} \quad \lambda = 122 \text{ nm} , \quad |\Delta \lambda| \approx 4 \cdot 10^{-7} \text{ nm} \quad \text{ג.} \quad (8)$$

## משוואת שרדינגר:

### סיכום כללי:

משוואת שרדינגר עם תלות בזמן במימד אחד:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2} + U(x, t)\Psi(x, t)$$

תנאים נוספים:

1. פסי מנורמלת.
2. פסי יכולה להיות פונקציה מורכבת.
3. פסי רציפה.
4. הגזרת של פסי רציפה למעט נקודות בהן הפוטנציאל מתבדר.

בתלת מימד:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(x, y, z, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \vec{\nabla}^2 \Psi(x, y, z, t) + U(x, t)\Psi(x, y, z, t)$$

משוואת שרדינגר ללא תלות בזמן במימד אחד:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + U(x)\psi = E\psi$$

כאשר:  $\Psi(x, t) = \psi(x)e^{-\frac{iEt}{\hbar}}$

- התרגילים של נושא זה מופעים בנושאים הבאים.

## חלקיק חופשי ובור פוטנציאל:

### סיכום כללי:

חלקיק חופשי – חלקיק שנע ללא השפעת כוחות:  $U(x) = 0$ .  
 פונקציית הגל של חלקיק חופשי:  $\psi(x) = A \sin(kx)$ .  
 חבילת גלים:  $\psi(x) = \sum_n A_n \sin(k_n x) + B_n \cos(k_n x)$ .

בור פוטנציאל אינסופי:

פונקציית הגל של המצב ה- $n$ :  $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{l}} \sin\left(\frac{\pi n}{l} x\right)$

האנרגיה של המצב ה- $n$ :  $E_n = \frac{h^2}{8ml^2} n^2, n = 1, 2, 3, \dots$

- לפי תורת הקוונטים קיימת אפשרות שהחלקיק יהיה במקום שבו האנרגיה הכוללת קטנה מהאנרגיה הפוטנציאלית, מצב שאינו אפשרי לפי המכניקה הקלאסית. באזור האסור פונקציית הגל דועכת אקספוננציאלית.

עקרונות לציור פונקציית גל:

- ציירו את פונקציית הפוטנציאל ואת אנרגיית החלקיק.
- עבור המצב ה- $n$  ציירו גל עם  $n-1$  נקודות צומת (לא כולל הקצוות).
- ככל שהאנרגיה הקינטית גדולה יותר כך האמפליטודה ואורך הגל קטנים יותר (ולהיפך).
- פונקציית הגל הולכת לאפס במיקום בו הפוטנציאל הולך לאינסוף.
- פונקציית הגל דועכת אקספוננציאלית במקומות האסורים קלאסית. ככל שההפרש בין האנרגיה הפוטנציאלית לאנרגיה הכללית גדול יותר כך הדעיכה מהירה יותר.

מיקום ממוצע:  $\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x |\psi(x)|^2 dx$

המיקום בעל ההסתברות הגבוהה ביותר הוא נקודת המקסימום של פונקציית ההסתברות  $|\psi(x)|^2$  (ניתן למצוא אותו על ידי נגזרת).

## שאלות:

- (1) **דוגמה – אלקטרון חופשי עם אנרגיה ידועה**  
 אלקטרון עם אנרגיה  $E = 3.7\text{eV}$  נע באופן חופשי במרחב.  
 א. מהו אורך הגל של האלקטרון?  
 ב. רשמו את פונקציית הגל של האלקטרון.  
 אין צורך לנרמל את הפונקציה והניחו כי הפאזה היא אפס.
- (2) **דוגמה – אלקטרון באמצע הקופסה**  
 אלקטרון נמצא במצב היסוד בתוך קופסה קשיחה באורך  $l$ .  
 מצאו את ההסתברות שהאלקטרון נמצא במרחק  $\frac{l}{8}$  ממרכז הקופסה (מימין או משמאל למרכז).
- (3) **דוגמה – מיקום ממוצע ומסתבר במצב המעורער הראשון**  
 מצאו את המיקום הממוצע והמיקום המסתבר ביותר עבור חלקיק הנמצא במצב המעורער הראשון בתוך קופסה קשיחה באורך:  $2.00 \cdot 10^{-10}\text{m}$ .
- (4) **דוגמה – חיידק בקופסה**  
 חיידק קטן בעל מסה של  $10^{-13}\text{kg}$  מוגבל לזוז בין שני קירות קשיחים במרחק  $0.1\text{mm}$  אחד מן השני.  
 א. האריכו את המהירות המינימאלית של החיידק.  
 ב. אם מהירות החיידק היא בערך  $10^{-6}\frac{\text{m}}{\text{sec}}$ , מהו המספר הקוונטי של המצב בו נמצא החיידק?
- (5) **דוגמה – חלקיק בבור סופי**  
 חלקיק בעל מסה  $M$  נמצא בבור פוטנציאל הנתון לפי הפונקציה הבאה:

$$U(x) = \begin{cases} \infty & x < 0 \\ 0 & 0 \leq x \leq L \\ U_0 & L < x \end{cases}$$

אנרגיית החלקיק  $E$  נתונה וקטנה מ- $U_0$ .

- א. מצאו את פונקציית הגל בכל המרחב ללא מציאת המקדמים הקבועים של הפונקציה בכל תחום.  
 ב. השתמשו בתנאי השפה (פונקציית הגל רציפה והנגזרת רציפה) בשביל למצא משוואה ממנה ניתן לחשב את הערכים האפשריים של האנרגיה. הראו כי מתקיים הקשר:


$$\tan(kL) = -\frac{k}{\alpha} \text{ כאשר } k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \text{ ו- } \alpha = \sqrt{\frac{2m(U_0-E)}{\hbar^2}}$$

ג. מצאו מהו תחום הערכים האפשריים של  $kL$  והראו כי :

$$|\sin(kL)| = \frac{\hbar k}{\sqrt{2mU_0}}$$

ד. כתבו את המשוואה של סעיף ג' באמצעות המשתנים :  $z = kL$


ו-  $A = \frac{\hbar}{L\sqrt{2mU_0}}$  כעת ניתן לפתור את הבעיה באמצעות פתרון גרפי. הפתרונות הן נקודות החיתוך של הפונקציות משני צידי המשוואה. סמנו את נקודות הפתרון בגרף הבא עבור :  $A = 0.1$  ו-  $A = 0.7$ . הקפידו על תחום ההגדרה של סעיף ג'.





ה. מהו התנאי על  $A$  עבורו אין פתרון למשוואה?  
מה המשמעות הפיזיקאלית של מצב זה?

**6) דוגמה – בור אינסופי עם מדרגה**

באיור נתונה פונקציית פוטנציאל של בור פוטנציאל אינסופי עם מדרגת פוטנציאל. ציירו את פונקציית הגל עבור האנרגיות  $E_1$  ו-  $E_4$  באיור.



**(7) דוגמה – התאימו פוטנציאל לפונקציית הגל**  
איזה מהגרפים הבאים מתאר את הפוטנציאל של פונקציית הגל הבאה:



**תשובות סופיות:**

1) א.  $6.38 \cdot 10^{-10} \text{ m}$  ב.  $\psi(x) = A \sin(9.84 \cdot 10^{-9} \text{ m}^{-1} \cdot x)$


2) 47.5%

3) ממוצע:  $\langle x \rangle = \frac{l}{2}$ , מסתבר:  $\frac{l}{4}$ ,  $\frac{3l}{4}$


4) א.  $3 \cdot 10^{-17} \frac{\text{m}}{\text{sec}}$  ב.  $3 \cdot 10^{-10}$

5) א.  $\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ikx} + Be^{-ikx} & x < 0 \\ Ce^{-\alpha x} & 0 < x < L \end{cases}$  כאשר:  $k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$  ו-  $\alpha = \frac{\sqrt{2m(U_0 - E)}}{\hbar}$

ב. הוכחה. ג.  $\frac{\pi}{2} + \pi n < KL < \pi + \pi n \quad n = 0, 1, 2, \dots$



ד.  $|\sin(z)| = Az$  ה.



4 (7)

## מנהור (tunneling):

### סיכום כללי:

ההסתברות שהחלקיק יעבור את המחסום.  $-l$ אורך המחסום  $T \ll 1$ רק עבור	$T \approx 16 \frac{E}{U_0} \left(1 - \frac{E}{U_0}\right) e^{-2\alpha l}$ $\alpha = \frac{\sqrt{2m(U_0 - E)}}{\hbar}$	<b>מקדם ההעברה</b>
	$R = 1 - T$	<b>מקדם החזרה</b>

### שאלות:

#### (1) דוגמה – אלקטרון חודר מחסום

אלקטרון חופשי בעל אנרגיה של 40eV נע במרחב ונתקל במחסום פוטנציאל בעל אנרגיה של 60eV. מה ההסתברות שהאלקטרון יעבור את המחסום אם עובי המחסום הוא:

א. 1.0nm  
ב. 0.1nm

#### (2) נתונים של אלקטרון חופשי

פונקציית הגל של אלקטרון חופשי היא:  $\psi(x) = A \sin(\pi \cdot 10^{10} x)$  כאשר  $x$  במטרים. מצאו את:

א. אורך הגל והתנע של האלקטרון.  
ב. מהירות האלקטרון.  
ג. אנרגיית האלקטרון.

#### (3) מהירות מינימלית בבור אינסופי


מהי המהירות המינימלית של אלקטרון הנמצא בבור פוטנציאל אינסופי ברוחב 0.30nm?

(4) **אי ודאות במצב היסוד\***  
 חלקיק נמצא במצב היסוד בתוך בור פוטנציאל אינסופי.  
 הראו כי יחס אי הודאות מתקיים עבור מצב זה. עבור  $\Delta x$  ניתן לקחת את רוחב הבור (או יותר מדויק רוחב הבור חלקי  $4\pi$ ). התנע של החלקיק אמנם ידוע מתוך האנרגיה אבל הכיוון שלו אינו ידוע, התנע יכול להיות חיובי או שלילי ולכן אי הודאות בתנע היא  $2p$ .

(5) **הסתברות למצא אלקטרון בבור**  
 אלקטרון נמצא בקופסה סגורה וקשיחה ברוחב  $1.00\text{nm}$ .  
 מה ההסתברות למצא את האלקטרון במרחק  $0.10\text{nm}$  ממרכז הקופסה, מכל צד, עבור המצב:  
 א.  $n = 1$   
 ב.  $n = 4$   
 ג.  $n = 20$   
 ד. השוו למקרה הקלאסי.

(6) **בור אינסופי מוזז**  
 מצאו את פונקציות הגל עבור בור פוטנציאל אינסופי ברוחב  $l$  הנמצא מ- $x = -\frac{l}{2}$  ועד  $x = \frac{l}{2}$  (במקום מ-0 עד  $l$ ). האם רמות האנרגיה משתנות?

(7) **בור סופי עם קירות שונים**  
 חלקיק נמצא תחת הפוטנציאל הנתון באיור.  
 שרטטו את פונקציית הגל עבור שלושת המצבים הבאים:  
 א. החלקיק במצב המעורר הראשון ו- $E < U_2$ .  
 ב.  $U_2 < E < U_1$ .  
 ג.  $U_1 < E$ .



**(8) זרם פרוטונים עובר מחסום**

זרם של  $1.2\text{mA}$  המכיל פרוטונים באנרגיה  $1.8\text{MeV}$  נתקל במחסום פוטנציאל בגובה  $2.0\text{MeV}$  וברוחב  $5.0 \cdot 10^{-14}\text{m}$ . מהו הזרם המועבר?

**תשובות סופיות:**

(1) א.  $4.86 \cdot 10^{-18}\%$  ב.  $3.67\%$


(2) א.  $\lambda = 2 \cdot 10^{-10}\text{m}$ ,  $p = 3.3 \cdot 10^{-24}\text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{sec}}$  ג.  $3.64 \cdot 10^6 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$  ד.  $38\text{eV}$

(3)  $1.2 \cdot 10^6 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$

(4) הוכחה.

(5) א.  $0.387$  ב.  $0.153$  ג.  $0.2$  ד.  $0.2$

(6)  $\sqrt{\frac{2}{l}} \sin\left(\frac{\pi nx}{l} + \frac{\pi n}{2}\right)$ , לא משתנות.



(8)  $96\text{nA}$

## אוסילטור הרמוני:

### סיכום כללי:

$$\psi_1(x) = (\pi b^2)^{-\frac{1}{4}} e^{-\frac{x^2}{2b^2}}$$

$$\psi_2(x) = (\pi b^2)^{-\frac{1}{4}} \frac{x}{b} e^{-\frac{x^2}{2b^2}}$$

$$\psi_3(x) = 8\sqrt{3} (\pi b^2)^{-\frac{1}{4}} \left(1 - \frac{2x^2}{b^2}\right) e^{-\frac{x^2}{2b^2}} \quad \text{פונקציות הגל:}$$

$$b = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$$

$$\text{רמות האנרגיה: } E_n = \left(n - \frac{1}{2}\right) \hbar\omega \quad \text{כאשר } n=1,2,3,\dots$$


$$\text{(או } E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega \text{ כאשר } n=0,1,2,\dots)$$

פתרון כללי ל

### שאלות:

- (1) דוגמה – אלקטרון בתנודה הרמונית פולט פוטון  
אלקטרון הנמצא באוסילטור הרמוני קוונטי פולט פוטון באורך גל של 400nm  
כאשר הוא יורד רמת אנרגיה אחת.  
א. האם ניתן לדעת באיזה רמת אנרגיה היה האלקטרון?  
ב. מהו "קבוע הקפיץ"?

- (2) דוגמה – איזה פונקציית הסתברות מתאימה  
איזו פונקציית הסתברות מתאימה לחלקיק הנמצא תחת פוטנציאל של  
אוסילטור קוונטי עם אנרגיה:  $E = \frac{7}{2} \hbar\omega$ ?



### תשובות סופיות:

- (1) א. לא. ב.  $0.02 \frac{N}{m}$
- (2) 4.

## תרגילים נוספים:

### שאלות:

- (1) פונקציית חומר מול פונקציות גל אחרות השוו בין פונקציית הגל של החומר  $\psi$  לבין: א. פונקציית הגל של מיתר. ב. פונקציית גל של גל אלקטרומגנטי.
- (2) מודל בוהר וקוונטים מה ההבדל בין המודל האטומי של בוהר למכניקת הקוונטים? רמז: עיקרון אי הוודאות.
- (3) האם אפשר לאזן מחט האם אפשר לאזן מחט כך שהיא תעמוד על החוד שלה באופן מוחלט?
- (4) ניוטון וקוונטים באיזה אופן התורה של ניוטון שונה מתורת הקוונטים?
- (5) מיקום מדויק האם עקרון אי הוודאות מגביל את הדיוק שבו ניתן למדוד את המיקום של גוף?
- (6) למי יש יותר סיכוי לעבור מחסום אטום מימן ואטום הליום בעלי אנרגיה זהה מתקרבים למחסום פוטנציאל ברוחב סופי עם אנרגיה פוטנציאלית גבוהה מהאנרגיה שלהם. למי סיכוי גדול יותר לעבור את המחסום?
- (7) חיים של בוזון  $Z^0$  בוזונים הם שם לקבוצת חלקיקים נשאי כוח (עם ספין שלם). הבוזון  $Z^0$  קשור ל"כוח החלש" (כוח שפועל בתוך הגרעין) ודועך מאוד מהר. האנרגיה הממוצעת שלו היא  $91.9 \text{ GeV}$  והרוחב במדידת האנרגיה הוא  $2.5 \text{ GeV}$ . מהו זמן החיים המוערך של הבוזון  $Z^0$ ?

**(8) כדור מקפץ**


כדור קטן במסה  $10^{-6} \text{kg}$  משוחרר ממנוחה בגובה  $2 \text{m}$  מעל הרצפה. הכדור פוגע ברצפה וקופץ חזרה. לאחר כל פגיעה ברצפה הכדור מגיע חזרה ל-60% מהגובה הקודם בגלל איבוד אנרגיה בהתנגשות עם הרצפה. כמה פעמים צריך הכדור לפגוע ברצפה עד שאי הודאות במהירות שלו תהיה משמעותית (כלומר בסדר גודל של המהירות עצמה). הניחו שאי הודאות במדידת המיקום היא בסדר גודל של הגובה הנמדד.

**(9) פונקציית גל נתונה**

נתונה פונקציית הגל הבאה:  $\psi(x) = b^{-\frac{1}{2}} \left| \frac{x}{b} \right|^{\frac{1}{2}} e^{-(x/b)^2/2}$ , כאשר  $nmb = 0.5$ .  
 א. בדקו כי פונקציית הגל מנורמלת.  
 ב. מהו המיקום המסתבר ביותר בו נמצא החלקיק בתחום  $x > 0$ ?  
 ג. מה ההסתברות למצא את החלקיק בין  $x = 0$  ל- $x = 0.50 \text{nm}$ ?

**(10) נויטרונים בניסוי שני סדקים**

עורכים את ניסוי שני הסדקים עם נויטרונים בעלי אנרגיה של  $0.0040 \text{eV}$ . המרחק בין הסדקים הוא  $d = 0.70 \text{mm}$  והמרחק למסך הוא  $L = 1.0 \text{m}$ . מהו המרחק מהמרכז בו תופיע ההתאבכות הראשונה?  $m_p = 1.67 \cdot 10^{-27} \text{kg}$ .





## תשובות סופיות:

- (1) א. חומר: פונקציה סקלרית, מתארת הסתברות וללא תווך.  
מיתר: פונקציה סקלרית, מתארת תנודה, דרוש תווך.  
ב. א"מ: פונקציה וקטורית, מתארת הסתברות ואת האמפליטודה של השדה החשמלי והמגנטי, ללא תווך.
- (2) ראו סרטון.
- (3) לא.
- (4) בתורה של ניוטון ניתן לחשב את המיקום והתנע באופן מדויק בו זמנית, כתוצאה מכך ניתן תיאורטית לצפות בדיוק את ההתנהגות של מערכת בעתיד. לפי תורת הקוונטים יש אי ודואות במדידות ולכן ניתן לצפות רק הסתברויות להתנהגות המערכת בעתיד.
- (5) לא.
- (6) מימן.
- (7)  $1.3 \cdot 10^{-25} \text{ sec}$
- (8) .70
- (9) א. הוכחה. ב.  $0.35 \text{ nm}$ . ג.  $63\%$ .
- (10)  $6.5 \cdot 10^{-7} \text{ m}$

# פיזיקה מודרנית קורס חלקי

פרק 5 - תורת הקוונטים חלק 2

תוכן העניינים

1. הרצאות ותרגילים ..... 35


## מהירות הפאזה, יחס דיספרסיה ומהירות החבורה

### סיכום כללי

שם	נוסחה	הערות
מהירות הפאזה	$v_{ph} = \frac{\omega}{k}$	המהירות של אורך גל מסוים
מהירות החבורה	$v_g = \frac{d\omega}{dk}$	מהירות של כל הפונקציה או סכום כל הגלים (חבילת הגלים)
יחס הדיספרסיה	הקשר בין $\omega$ ל- $k$	

## פיזור

## סיכום כללי

הערות	נוסחה	שם
<p>ההסתברות שהחלקיק יעבור את המחסום במקרה שבו <math>k_2</math> בתחום אליו החלקיק עובר שונה מ-<math>k_1</math> בתחום ממנו החלקיק הגיע</p> $T = \frac{ C ^2 k_2}{ A ^2 k_1}$	$T = \frac{ C ^2}{ A ^2}$	מקדם ההעברה
<p>ההסתברות שהחלקיק יוחזר מהמחסום</p>	$R = \frac{ B ^2}{ A ^2}$	מקדם החזרה
$T = \frac{4k_1 k_2}{(k_1 + k_2)^2}; R = \left(\frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2}\right)^2$		<p>עבור מדרגת פוטנציאל וכאשר <math>E &gt; U_0</math></p> 

- כאשר  $E < U(\pm\infty)$  נקבל מצבים קשורים, החלקיק "כלוא" ורמות האנרגיה בדידות.
- כאשר  $E > U(\pm\infty)$  נקבל פיזור, החלקיק יגיע לאינסוף ורמות האנרגיה רציפות.

שאלות

(1) פיזור מפוטנציאל מלבני

חלקיק חופשי בעל מסה  $m$  נע משמאל לימין ונתקל בפוטנציאל מלבני בגובה  $U_0$  וברוחב  $L$  המתחיל ב- $x = 0$ . אנרגיית החלקיק היא  $E$  וקטנה מ- $U_0$ . א. הראו כי הפתרון הכללי לפונקציית הגל הוא מצורה:

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ikx} + Be^{-ikx} & x < 0 \\ Ce^{\alpha x} + De^{-\alpha x} & 0 < x < L \\ Fe^{ikx} & L < x \end{cases}$$

כאשר:  $k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$  ו-  $\alpha = \frac{\sqrt{2m(U_0-E)}}{\hbar}$ .

ב. רשמו את תנאי השפה והראו כי הקשר בין הקבועים נתון לפי המשוואות:

$$A + B = C + D$$

$$ik(A - B) = \alpha(C - D)$$

$$Ce^{\alpha L} + De^{-\alpha L} = Fe^{ikL}$$

$$\alpha(Ce^{\alpha L} - De^{-\alpha L}) = ikFe^{ikL}$$

ג. פתרו את המשוואות (רצוי באמצעות מחשב) והראו כי:

$$T = \left| \frac{F}{A} \right|^2 = \frac{1}{\cosh^2(\alpha L) + \left(\frac{\gamma}{2}\right)^2 \sinh^2(\alpha L)}$$

כאשר:  $\gamma = \frac{\alpha}{k} - \frac{k}{\alpha}$ .

ד. הראו כי במקרה של  $e^{-\alpha L} \ll 1$  מקדם ההעברה הוא בקירוב:

$$T \approx 16 \frac{E}{U_0} \left(1 - \frac{E}{U_0}\right) e^{-2\alpha L}$$

ה. כעת הניחו ש- $E > U_0$ , מצאו את מקדם ההעברה במקרה זה. הדרכה: חזרו על השלבים שבסעיפים א - ג עבור מקרה זה.

רמז:  $\cosh(ik) = \cos(k)$  ו-  $\sinh(ik) = i \sin(k)$ .

(2) חלקיק עובר מעל בור פוטנציאל סופי

$$U(x) = \begin{cases} U_0 & x < 0 \\ 0 & 0 < x < L \\ U_0 & L < x \end{cases}$$

חלקיק בעל מסה  $m$  נע משמאל בהשפעת הפוטנציאל:  $0 < x < L$ .

כאשר אנרגיית החלקיק  $E$  נתונה וגדולה מ- $U_0$ .

א. מצאו את מקדם ההעברה.

ב. עבור אילו מצבים הבור "שקוף" לתנועת החלקיק? האם המצבים מוכרים לכם?


**(3) מקדם החזרה בפגיעת אלקטרון בשפת מתכת**

במקרה של פליטת אלקטרונים ממתכת, חלק מהאלקטרונים עם אנרגיה מספיקה ליציאה מהמתכת עדיין יכולים להיות מוחזרים משפת המתכת. במודל חד מימדי נניח כי פוטנציאל האלקטרון בתוך המתכת ( $x < 0$ ) שווה ל- $-5\text{eV}$  והפוטנציאל הוא אפס מחוץ למתכת ( $x > 0$ ).

מהו מקדם החזרה של האלקטרון משפת המתכת אם אנרגיית האלקטרון היא

א.  $90\text{eV}$

ב.  $0.4\text{eV}$



**תשובות סופיות**

(1) א-ד. שאלות הוכחה. ה.  $T = \left| \frac{F}{A} \right|^2 = \frac{1}{\cos^2(k_2L) + \left(\frac{\tilde{\gamma}}{2}\right)^2 \sin^2(k_2L)}$

כאשר:  $\tilde{\gamma} = \frac{k_1}{k} + \frac{k}{k_2}$  ו-  $k_2 = \frac{\sqrt{2m(E - v_0)}}{\hbar}$

(2) א.  $T = \frac{1}{\cos^2(k_2L) + \left(\frac{\tilde{\gamma}}{2}\right)^2 \sin^2(k_2L)}$  כאשר:  $\tilde{\gamma} = \frac{k_1}{k_2} + \frac{k_2}{k_1}$  ו-  $k_2 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$

ב.  $E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2mL^2}$  ,  $n = 1, 2, 3, \dots$  כן.

(3) א.  $1.83 \cdot 10^{-4}$  ב.  $0.328$

## פונקציית דלתא של דיראק

### סיכום כללי

הגדרת הפונקציה:

$$\delta(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 0 \\ \infty, & x = 0 \end{cases}$$

או

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = 1$$

או

$$\delta_a(x) = \frac{1}{a\sqrt{\pi}} e^{-x^2/a^2}$$

כאשר  $a$  הולך לאפס.

תכונה:

$$f(x)\delta(x-a) = f(a)\delta(x-a) \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x-a) dx = f(a)$$

פיזור מפונקציית דלתא:

עבור:

$$V(x) = -a\delta(x)$$

כאשר  $E < 0$ :

$$\psi(x) = \frac{\sqrt{am}}{\hbar} e^{-\frac{am}{\hbar^2}|x|}$$

$$E = -\frac{a^2 m}{2\hbar^2}$$

מקבלים מצב אחד בלבד, לא משנה מה הערך של  $a$  (גודל הבור).

כאשר  $E > 0$  וחלקיק שמגיע משמאל:

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ikx} + Be^{-ikx} & x < 0 \\ Ce^{ikx} & x > 0 \end{cases}$$

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

$$R = \left| \frac{B}{A} \right|^2 = \frac{\beta^2}{1 + \beta^2}$$

$$T = \left| \frac{C}{A} \right|^2 = \frac{1}{1 + \beta^2}$$

$$\beta = \frac{am}{\hbar^2 k}$$

עבור :

$$V(x) = +a\delta(x)$$

$E$  חייב להיות גדול מאפס והפתרון זהה לפתרון במקרה של הפוטנציאל השלילי כאשר  $E > 0$ .

## שאלות

### 1) פוטנציאל דלתא בתוך בור אינסופי\*\*

אלקטרון נמצא בבור פוטנציאל ברמה השנייה. הבור הוא אינסופי אך במרכז יש פוטנציאל דלתא, כלומר :

$$V(x) = \infty, |x| > \frac{l}{2}$$

$$V(x) = a\delta(x), |x| < l/2$$

א. מצאו את הפתרונות עבור משוואת שרדינגר הבלתי תלויה בזמן. הפרידו בין הפתרונות הסימטריים לאנטי סימטריים ומצאו את האנרגיות המתאימות לכל פתרון. עבור הפתרונות הסימטריים הראו רק כי המשוואה ממנה ניתן לקבל את רמות האנרגיה היא מהצורה:  $\tan\left(k\frac{l}{2}\right) = -\frac{\hbar^2 k}{am}$ . בשני המקרים אין צורך לנרמל את הפתרונות.

ב. דונו במקרה ש-  $a \ll \frac{\hbar^2}{ml}$  ובמקרה ש-  $a \gg \frac{\hbar^2}{ml}$ .

ג. האלקטרון יורד לרמת היסוד ופולט פוטון, מהי האנרגיה של הפוטון הנפלט ב- $eV$  אם:  $a = 2 \cdot 10^{-27} j \cdot m$  ו-  $l = 2.7nm$ .

**(2) קרן אלקטרוניים עוברת שתי דלתות**

קרן אלקטרוניים מפוזרת על ידי מחסום פוטנציאל המורכב שתי פונקציות דלתא זהות במרחק  $l$ . כלומר:  $V(x) = a\delta(x) + a\delta(x - l)$ . חשבו בקירוב את האנרגיה הכי נמוכה של אלקטרון עברה אין החזרה של הקרן (כל האלקטרוניים עוברים דרך המחסום).  
 $a = 1.9 \cdot 10^{-27} \text{ j} \cdot \text{m}, l = 4.2 \text{ nm}$

**(3) קרן עוברת דרך שתי דלתות ומדרגה**

קרן אלקטרוניים מגיעה משמאל לפוטנציאל הבא:


$$V(x) = U(x) + a\delta(x) + a\delta(x - l)$$

$$U(x) = \begin{cases} U_0 & 0 < x < l \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

מצאו את רמת האנרגיה הרביעית עברה אין החזרה של הקרן, יש להשתמש בפתרון גרפי ולבטא ב- $eV$ .  
 נתון:  $a = 0.63 \cdot 10^{-28} \text{ j} \cdot \text{m}, U_0 = 4.7 \text{ eV}, l = 0.2 \text{ nm}$

**תשובות סופיות**

**(1) א. פתרון גרפי למצבים הסימטריים:**



האנרגיות של המצבים האנטי סימטריים:  $n = 2, 4, 6, \dots$   $E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ml^2} n^2$

ב. האנרגיות של הפונקציות האנטי סימטריות לא מושפעות מ- $a$  עבור  $a \ll \frac{\hbar^2}{ml}$  האנרגיות של הפונקציות הסימטריות שואפות לאנרגיות שלהם בבור אינסופי (ללא דלתא). עבור  $a \gg \frac{\hbar^2}{ml}$  האנרגיות של הפונקציות הסימטריות שואפות

לאנרגיות של בור אינסופי **ברוחב**  $\frac{l}{2}$ . ג.  $0.3 \text{ eV}$

**(2)**  $0.02 \text{ eV}$

**(3)**  $125 \text{ eV}$

## פוטנציאלים תלת מימדים

### סיכום כללי

פונקציית הגל והאנרגיות של תיבה תלת מימדית:

$$\psi(x, y, z) = \sqrt{\frac{8}{abc}} \sin\left(\frac{n_x \pi}{a} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{b} y\right) \sin\left(\frac{n_z \pi}{c} z\right)$$

$$E = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m} \left( \frac{n_x^2}{a^2} + \frac{n_y^2}{b^2} + \frac{n_z^2}{c^2} \right)$$

אוסילטור הרמוני תלת מימדי:

$$v(x, y, z) = \frac{1}{2} k_x x^2 + \frac{1}{2} k_y y^2 + \frac{1}{2} k_z z^2$$

האנרגיה של אוסילטור תלת מימדי:

$$E = \left( n_x - \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_x + \left( n_y - \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_y + \left( n_z - \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_z$$

**ניוון** - כאשר לכמה מצבים (פונקציות גל) שונים יש את אותה האנרגיה. אי אפשר לדעת את המצב של החלקיק מהאנרגיה בלבד.

ניוון היא תופעה שלא מתרחשת במימד אחד

**דרגת הניוון** מוגדרת לפי מספר המצבים הקוונטים שיש לאנרגיה.

## שאלות

## (1) אוסילטור ב-Z בור ב-X ו-Y

חלקיק בעל מסה  $m$  נמצא תחת הפוטנציאל הבא:

$$V(x, y, z) = V_1(x) + V_2(y) + V_3(z)$$

כאשר:

$$V_1(x) = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2, \quad + V_2(y) = \begin{cases} 0, & 0 < y < a \\ \infty, & \text{otherwise} \end{cases}, \quad V_3(z) = \begin{cases} 0, & 0 < z < b \\ \infty, & \text{otherwise} \end{cases}$$

כמו כן נתון כי:

$$\hbar \omega = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

$$b = 2a$$

- א. מהי האנרגיה של הרמה המעורערת החמישית?
- ב. מהי דרגת הניוון של רמה זו?
- ג. מהי פונקציית הגל של חלקיק שנמצא ברמת אנרגיה זו?

## תשובות סופיות

א.  $E = 2.75 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}$  רמה 5. ב. 2

ג. 
$$\psi(x, y, z) = \sin\left(\frac{\pi}{L}x\right) e^{-\frac{z^2 \pi^2 \hbar}{4L^2}} \left[ \alpha \sin\left(\frac{\pi}{2L}y\right) \left(1 - \left(\frac{\pi z}{L}\right)^2\right) + \beta \sin\left(\frac{3\pi}{2L}y\right) \right]$$

## פונקציית הגל כתלות בזמן

### סיכום כללי

ניתן לקבל את פונקציית הגל הכללית, הפותרת את משוואת שרדינגר התלויה בזמן על ידי קומבינציה לינארית של פונקציות הגל המתקבלות במצבים עמידים (מתוך פתרון משוואת שרדינגר הבלתי תלוי בזמן).

$$\Psi(x, t) = \sum_n \alpha_n \psi_n(x) e^{-\frac{iE_n t}{\hbar}}$$

כאשר - הן פתרונות המצבים העמידים ו - היא האנרגיה של כל מצב.

את המקדמים ניתן למצוא לפי (בהנחה שהפונקציות שמתקבלות מהמצב העמיד הן אורתונורמליות).

$$\alpha_n = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_n^*(x) \Psi(x, 0) dx$$

ו -  $|\alpha_n|^2$  הן ההסתברות להיות במצב מסוים.

יוצא גם שאם  $\Psi(x, 0)$  מנורמלת אז  $\Psi(x, t)$  מנורמלת לכל  $t$ .

## שאלות

## (1) רשמו פונקציית גל

חלקיק בעל מסה  $m$  נמצא תחת פוטנציאל מהצורה  $\frac{1}{2}kx^2$ .  
 ב-  $t = 0$  לחלקי הסתברות של 75% להיות במצב ייסוד ו- 25% להיות במצב המעורר הראשון. רשמו את פונקציית הגל של החלקיק כתלות בזמן. פונקציות הגל של מצב היסוד והמצב המעורר הראשון הן:

$$\psi_1(x) = (\pi b^2)^{-\frac{1}{4}} e^{-\frac{x^2}{2b^2}}$$

$$\psi_2(x) = (\pi b^2)^{-\frac{1}{4}} \frac{x}{b} e^{-\frac{x^2}{2b^2}}$$

$$b = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}, \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{כאשר}$$

והאנרגיות הן:

$$E_n = \left(n - \frac{1}{2}\right) \hbar\omega \quad n = 1, 2, 3 \dots$$

## (2) מסת חלקיק מפונקציית הגל

נתונה פונקציית גל (חד מימדית) של חלקיק חופשי

$$\Psi(x, t) = A e^{i\left(\frac{x}{L} - \frac{t}{\tau}\right)}$$

כאשר  $L, A, \tau$  קבועים חיוביים נתונים.  
 מהי מסת החלקיק?

## תשובות סופיות

$$\psi(x, t) = \frac{\sqrt{3}}{2} \psi_1(x) e^{-i\frac{1}{2}\omega t} + \frac{1}{2} \psi_2(x) e^{-i\frac{3}{2}\omega t} \quad (1)$$

$$m = \frac{\hbar \tau}{2L^2} \quad (2)$$

## אופרטורים

### סיכום כללי

**אופרטור** - לכל גודל פיזיקאלי ניתן לשייך אופרטור. כאשר שמים את האופרטור בין  $\psi$  ל- $\psi^*$  ועושים אינטגרל על כל המרחב (סנוויץ) הוא נותן את ערך התוחלת של הגודל הפיזיקאלי אליו הוא שייך.

$$\langle Q \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \hat{Q} \psi dx$$

אופרטור המיקום:  $\hat{x} = x$

אופרטור התנע במימד אחד:  $\hat{p} = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x}$

כל אופרטור אחר יהיה פונקציה של אופרטור המיקום והתנע:

$$Q(x, p, t) \rightarrow \hat{Q}\left(x, \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} t\right)$$

כאשר מכפילים אופרטור בפונקציה אומרים שהאופרטור "פועל" על הפונקציה. אם  $\hat{Q}\psi = \lambda\psi$ , אז  $\psi$  היא פונקציה עצמית של האופרטור ו- $\lambda$  הוא ערך עצמי (ע"ע) של האופרטור.

הפונקציות העצמיות של אופרטור התנע הן:  $\psi(x) = Ae^{ikx}$  והערכים העצמיים הם:  $\hbar k$ .

הפונקציות העצמיות של אופרטור המיקום הן:  $\delta(x - a)$  והערכים העצמיים הם  $a$  (המיקום עצמו).

אופרטור ההמילטוניאן (מודד את האנרגיה):

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)$$

אפשר לכתוב את משוואת שרידנגר הבלתי תלויה בזמן באמצעות ההמילטוניאן. הפונקציות העצמיות של ההמילטוניאן הן הפתרונות של משוואת שרידנגר הבלתי תלויה בזמן והאנרגיות הן הערכים העצמיים של ההמילטוניאן.

## שאלות

## 1) המילטוניאן ומדידת אנרגיה בבור פוטנציאל

חלקיק בעל מסה  $m$  נמצא בבור פוטנציאל ברוחב  $0 < x < l$ .  
 א. מצאו את המצבים העצמיים ואת הערכים העצמיים של ההמילטוניאן.  
 כעת נניח כי פונקציית הגל של החלקיק ברגע מסוים היא:

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{3}}\psi_1(x) + \frac{1}{\sqrt{3}}\psi_2(x)$$

כאשר  $\psi_1(x)$  ו- $\psi_2(x)$  הן פונקציות הגל של האנרגיות  $E_1$  ו- $E_2$  בבור בהתאמה.  
 ב. האם פונקציה זו היא פונקציה עצמית של ההמילטוניאן?  
 ג. מהי האנרגיה הממוצעת של החלקיק במצב הנ"ל?  
 האם ניתן למצא את החלקיק באנרגיה זו?

## 2) חלקיק בצד ימין של בור פוטנציאל

חלקיק בעל מסה  $m$  נמצא בבור פוטנציאל אינסופי ברוחב  $l$ .  
 נתון כי בזמן  $t = 0$  לחלקיק הסתברות שווה להיות בחצי הימני של הבור.  
 א. מהי פונקציית הגל של החלקיק ב- $t = 0$ ?  
 ב. מצאו את פונקציית הגל של החלקיק כתלות בזמן.  
 שערו ללא חישוב האם החלקיק יישאר בחצי הימני של הבור?  
 ג. מהי ההסתברות שהחלקיק יהיה במצב היסוד ב- $t = 2 \text{ sec}$ ?  
 ד. ב- $t = 3 \text{ sec}$  נעשתה מדידה והתגלה שהחלקיק אכן במצב היסוד.  
 מהי פונקציית הגל של החלקיק מרגע זה והילך, ניתן לקבוע רגע זה כ- $t = 0$  חדש.  
 ה. מהו ערך התוחלת של התנע של החלקיק מסעיף ד'?

## 3) מוסיפים פאזות למקדמים

חלקיק נמצא בבור פוטנציאל אינסופי ברוחב  $l$ .  
 א. מצאו את ההסתברות כתלות בזמן של החלקיק להיות בחצי השמאלי של הבור אם ידוע שהוא נמצא במצב עמיד כלשהו (או מצב עצמי של ההמילטוניאן).  
 כעת נתון שפונקציית הגל של החלקיק היא:  

$$\Psi(x, t) = c_1\psi_1(x)e^{-i\frac{E_1t}{\hbar}} + c_2\psi_2(x)e^{-i\frac{E_2t}{\hbar}}$$
 כאשר  $c_1 = c_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ,  $\psi_1$  ו- $\psi_2$  הן פונקציות הגל של מצב היסוד והמצב המעורר הראשון בבור, ו- $E_1, E_2$  הן האנרגיות של אותם מצבים.  
 ב. הראו כי  $\Psi(x, t)$  מנורמלת.  
 ג. מהי ההסתברות למצא את החלקיק בחצי השמאלי של הבור כתלות בזמן?  
 ד. חזרו על סעיף ג כאשר  $c_1 = \frac{e^{i\varphi_1}}{\sqrt{2}}$ ,  $c_2 = \frac{e^{i\varphi_2}}{\sqrt{2}}$ .

#### (4) אופרטור האנרגיה הקינטית

אופרטור האנרגיה הקינטית הוא :

$$\hat{T} = \frac{\hat{p}^2}{2m}$$

הראו כי הפונקציות העצמיות של אופרטור התנע  $\phi_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ikx}$  הן גם פונקציות עצמיות של אופרטור האנרגיה הקינטית ומצאו את הערכים העצמיים של אופרטור זה.

#### תשובות סופיות

$$\langle E \rangle = \frac{\pi^2 \hbar^2}{ml^2}, \text{ ג. לא, } \psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{l}} \sin\left(\frac{\pi n}{l} x\right), E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ml^2} n^2 \text{ א. לא. ב. לא. } \quad (1)$$

$$\psi(x, t) = \sum \alpha_n \psi_n(x) e^{\frac{iE_n t}{\hbar}}$$

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{l}} \sin\left(\frac{\pi n}{l} x\right)$$

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ml^2} n^2$$

$$\alpha_n = \frac{2}{\pi n} \left[ \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) - (-1)^n \right]$$

$$\psi(x, t=0) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x < \frac{l}{2} \\ \sqrt{\frac{2}{l}} & \frac{l}{2} \leq x \leq l \end{cases} \text{ א. ב. לא יישאר. } \quad (2)$$

$$\psi(x, t) = \sqrt{\frac{2}{l}} \sin\left(\frac{\pi}{l} x\right) e^{\frac{iE_1 t}{\hbar}}, E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ml^2} \text{ ד. } \left(\frac{2}{\pi}\right)^2 \text{ ג. אפס. ה. } \quad (3)$$

$$\frac{1}{2} + \cos\left(\frac{E_2 - E_1}{\hbar} t\right) \frac{4}{3\pi} \text{ ג. ב. הוכחה. } 0.5 \text{ א. } \quad (3)$$

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1, P\left(0 \leq x \leq \frac{l}{2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{4}{3\pi} \cos\left(\frac{E_2 - E_1}{\hbar} t - \Delta\varphi\right) \text{ ד.}$$

$$\lambda = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \quad (4)$$

## אופרטורים הרמיטיים

### סיכום כללי

גודל פיזיקאלי מדיד חייב להיות מספר ממשי .  
 כל הגדלים הפיזיקאלי מיוצגים ע"י אופרטורים הרמיטיים.

הגדרה :

$$(\hat{A}\psi)^* = \psi^* \hat{A}$$

לכל הפונקציות במרחב.

או :

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_1^* \hat{A} \psi_2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} (\hat{A} \psi_1)^* \psi_2 dx$$

תכונות של אופרטור הרמיטי :

1. ערך התוחלת של אופרטור הרמיטי תמיד ממשי.
2. הערכים העצמיים של אופרטור הרמיטי תמיד ממשיים.
3. הפונקציות העצמיות של אופרטור הרמיטי הן אורתוגונליות.
4. הפונקציות העצמיות של אופרטור הרמיטי מהוות סט שלם.\*

\* אם ניתן לתאר את כל הפונקציות במרחב באמצעות קומבינציה לינארית של סט מסוים של פונקציות אז אותו סט נקרא סט שלם.

## הפירוש הסטטיסטי המוכלל והסבר מסכם על צורת העבודה בתורת הקוונטים

### סיכום כללי

הפונקציות העצמיות של אופרטור הרמיטי מהוות סט שלם של פונקציות (או בסיס). אפשר לכתוב כל פונקציית גל כקומבינציה לינארית של הבסיס העצמי של כל אופרטור.

כלומר, אם  $\phi_n$  ו- $\lambda_n$  הן הפונקציות העצמיות והערכים העצמיים של האופרטור  $\hat{A}$

אז אפשר לרשום כל פונקציית גל בצורה:  $\omega(x, t) = \sum \alpha_n \phi_n$ .

$|\alpha_n|^2$  זה ההסתברות להיות במצב  $\phi_n$  או ההסתברות למדוד את הערך  $\lambda_n$ .

הערכים המדידים היחידים של גודל מסוים הם הערכים העצמיים של האופרטור השייך לאותו גודל.

בשביל למצא את  $\alpha_n$ :

$$\alpha_n = \int_{-\infty}^{\infty} \phi_n^* \Psi(x, t) dx$$

במקרה הרציף:

$$\lambda_n = \lambda(k)$$

$$\phi_n \rightarrow \phi(k)$$

$$\sum \alpha_n \phi_n \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \alpha(k, t) \phi(k) dk$$

$$\Psi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \alpha(k, t) \phi(k) dk$$

$$|\alpha_n|^2 \rightarrow |\alpha(k, t)|^2 dk$$

**שאלות**

**(1) פונקציה משולשת**

נתון חלקיק בבור פוטנציאל אינסופי ברוחב  $L$ . כזכור, המצבים העצמיים עבור

בור שכזה נתונים ע"י הפונקציות:  $\phi_n = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$  והאנרגיות העצמיות

הן:  $E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} n^2$ . נתון שפונקציית הגל ההתחלתית בה הוכנה המערכת היא

$$\psi(x,0) = \begin{cases} \frac{A}{L}x & \text{for } 0 < x < \frac{L}{2} \\ A\left(1 - \frac{x}{L}\right) & \text{for } \frac{L}{2} < x < L \end{cases}$$

פונקציה משולשת מהצורה:

א. מצאוי את  $A$ .

ב. מהי ההסתברות שבמידת אנרגיית החלקיק ימדדו הערכים:  $E_1, E_2, E_3, E_4, E_5$ ?

ג. חשבו את ערך התוחלת של אנרגיית החלקיק  $\langle E \rangle$ .

ייתכן ותזדקקו לטור הבא:  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$

**(2) פונקציית גאוסיאן ומעבר לתדר**

פונקציית הגל (מנורמלת) של חלקיק חופשי ב- $t=0$  נתונה לפי:

$$\Psi(x, t=0) = (2\pi a^2)^{-\frac{1}{4}} e^{-\frac{(x-x_0)^2}{4a^2}}$$

א. מצאו את פונקציית הגל של החלקיק במרחב התדר:  $\Psi(k, t=0)$ .

ב. מצאו את אי הודאות של מספר הגל של החלקיק  $\Delta k$ .

השתמשו ב:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2-bx-c} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{\frac{b^2-4ac}{4a}}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-ax^2} dx = 0$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{4a^3}}$$

### תשובות סופיות

$$A = \sqrt{\frac{12}{11L}} \quad \text{א. (1)}$$

$$P(E_1) = 0.09 \quad , \quad P(E_3) = 1.1 \cdot 10^{-3} \quad , \quad P(E_5) = 1.4 \cdot 10^{-4} \quad , \quad P(E_2) = P(E_4) = 0 \quad \text{ב.}$$

$$\langle E \rangle = \frac{6\hbar^2}{11mL^2} \quad \text{ג.}$$

$$\sqrt{\frac{\pi}{2a^2}} \quad \text{ב.} \quad \sqrt{2} (2\pi\varphi^2)^{\frac{1}{4}} e^{-ikx_0} e^{-a^2k^2} \quad \text{א. (2)}$$

## יחס החילוף

### סיכום כללי

יחס החילוף (או הקומוטטור) מוגדר להיות:

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

יחס החילוף הוא אופרטור בפני עצמו. אם סדר הפעולה של האופרטורים לא משנה אז יחס החילוף שלהם שווה לאפס ואם הסדר כן משנה אז הפעלה של יחס החילוף תיתן ערך מורכב כלשהו לאופרטורים שיחס החילוף שלהם מתאפס אנחנו קוראים חילופיים. יחס החילוף של המיקום עם התנע:

$$\langle [\hat{x}, \hat{p}_x] \rangle = i\hbar$$

אם האופרטורים  $\hat{A}$  ו- $\hat{B}$  מתחלפים אז קיים סט של פונקציות עצמיות משותפות לשניהם ולהפך (אם הם לא מתחלפים אז לא ניתן למצא סט של פונקציות עצמיות משותפות).

אם שני אופרטורים מתחלפים אז ניתן למדוד את שניהם בו זמנית בדיוק אינסופי. אם הם לא מתחלפים אז ניתן לרשום את יחס אי הודאות בניהם לפי:

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle|$$

### שאלות

1 פירוק יחס חילוף מורכב

א. הראו כי:  $[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B}$

ב. הראו כי:  $[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C}$

ג. מצאו את  $[\hat{x}, \hat{p}^2]$  ובדקו האם אופרטור המיקום מתחלף עם ההמילטוניאן של חלקיק חופשי במימד אחד.

2 הוכחת זהות

הוכיחו כי:  $[\hat{A} + \hat{B}, \hat{C}] = [\hat{A}, \hat{C}] + [\hat{B}, \hat{C}]$ .

### תשובות סופיות

1 א-ב. הוכחה. ג.  $2i\hbar\hat{p}$ , לא מתחלף.

2 הוכחה.

## משפט ארנפס

### סיכום כללי

$$\frac{d}{dt}\langle Q \rangle = \frac{i}{\hbar}\langle [\hat{H}, \hat{Q}] \rangle + \left\langle \frac{\partial \hat{Q}}{\partial t} \right\rangle$$

אם אופרטור מתחלף עם ההמילטוניאן אז ערך התוחלת של הגודל הפיזיקאלי קבוע בזמן.

### שאלות

#### 1) הקשרים הקלאסיים

- א. הראו באמצעות משפט ארנפסט כי:  $\langle p \rangle = \frac{d}{dt}\langle x \rangle$ .
- ב. הראו כי:  $[\hat{p}, U(\hat{x})] = -i\hbar \frac{\partial U}{\partial x}$ .
- ג. הראו באמצעות משפט ארנפסט כי:  $\frac{d}{dt}\langle p \rangle = -\left\langle \frac{\partial U}{\partial x} \right\rangle$ .

### תשובות סופיות

1) הוכחה.

## תרגילים נוספים

### שאלות

#### (1) התפתחות בזמן בבור אינסופי

נתון חלקיק בעל מסה  $m$  אשר כלוא בבור פוטנציאל אינסופי חד-מימדי בעל

אורך  $L$  אשר מרכזו ב- $x = \frac{L}{2}$ . פונקציית הגל של החלקיק ברגע  $t = 0$  הינה

סופרפוזיציה של שני מצבים עצמיים של בור פוטנציאל אינסופי:

$$\psi(x, t=0) = A[\phi_1(x) + \phi_2(x)]$$

כאשר  $\phi_1$  הוא מצב היסוד (בעל אנרגיה  $E_1$ ) ו- $\phi_2$  הוא המצב המעורר הראשון

(בעל אנרגיה  $E_2$ ).

שני המצבים בעלי הסתברות זהה.

א. מצאו את הנרמול של פונקציית הגל.

ב. מצאו את  $\psi(x, t)$ . ודאו כי  $\psi(x, t)$  מקיימת את משוואת שרדינגר.

ג. מצאו את  $|\psi(x, t)|^2$ , בטאו את פונקציית צפיפות ההסתברות כפונקציה סינוסואידלית בזמן.

ד. חשבו את ערך התצפית של המקום. שימו לב כי ערך התצפית עושה אוסילציות בזמן. מהי תדירות האוסילציות?

ה. חשבו את ערך התצפית של התנע לפי הגדרה. הראו כי מתקיים:

$$\left( \langle p \rangle = m \frac{d}{dt} (\langle x \rangle) \right)$$

ו. חשבו את ערך התצפית של האנרגיה של החלקיק לפי הגדרה. הסבירו את תשובתכם.

ז. הניחו כי אי הודאות באנרגיה היא:  $\Delta E = (E_2 - E_1)$  והשתמשו בעיקרון

אי הודאות של הייזנברג על מנת למצוא את  $\Delta t$ .

השוו לזמן המחזור של האוסילציות שמצאתם בסעיף ד' והסבירו.

## תשובות סופיות

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \phi_1 e^{-i\frac{E_1 t}{\hbar}} + \phi_2 e^{-i\frac{E_2 t}{\hbar}} \right) \quad \text{ב.} \quad A = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{א.} \quad (1)$$

$$|\psi(x, t)|^2 = \frac{1}{2} \left( |\phi_1|^2 + |\phi_2|^2 + 2\phi_1 + \phi_2 \cos\left(\frac{E_2 - E_1}{\hbar} t\right) \right) \quad \text{ג.}$$

$$\langle P \rangle = \frac{8\hbar}{3L} \sin\left(\frac{E_2 - E_1}{\hbar} t\right) \quad \text{ה.} \quad \langle x \rangle: \frac{L}{2} - \frac{16}{9} \frac{L}{\pi^2} \cos\left(\frac{E_2 - E_1}{\hbar} t\right) \quad \text{ד.}$$

$$\omega = \frac{E_2 - E_1}{\hbar} = 2\pi F$$

ג.  $\langle E \rangle = \frac{1}{2} E_1 + \frac{1}{2} E_2$ , חישוב התוחלת של האנרגיה הוא ההסתברות להיות בכל

מצב עצמי של האנרגיה כפול האנרגיה של המצב.

$$\Delta t \approx \frac{\hbar}{2(E_2 - E_1)} \quad \text{ו.}$$

## פיזיקה מודרנית קורס חלקי

פרק 6 - המודל הקוונטי לאטום המימן ספין והטבלה המחזורית-יש להתעלם מכל מה שקשור לאטום המימן ולהתמקד רק בהסברים על תנז וספין

תוכן העניינים

1. הרצאות ותרגולים ..... 57

## פתרון עבור אטום המימן ותנע זוויתי קוונטי:

### סיכום כללי:

משוואת שרדינגר לפוטנציאל התלוי רק ב- $r$ :

משוואה ל- $\theta(\theta)$ :

$$\frac{1}{\theta(\theta)} \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial \theta(\theta)}{\partial \theta} \right) + l(l+1) \sin^2 \theta = m^2$$

משוואה ל- $\phi(\phi)$ :

$$\frac{\partial^2 \phi(\phi)}{\partial \phi^2} = -m^2 \phi(\phi)$$

פתרון לחלק הזוויתי:

$$Y_l^m(\theta, \phi) = \theta(\theta)\phi(\phi) = \varepsilon \sqrt{\frac{(2l+1)(l-|m|)!}{4\pi(l+|m|)!}} P_l^m(\cos \theta) e^{im\phi}$$

$$\varepsilon = \begin{cases} (-1)^m & m > 0 \\ 1 & m \geq 0 \end{cases}$$

$l \geq 0$  ו- $|m| \leq l$  שלם.

$$P_l^m(x) \equiv (1-x^2)^{|m|/2} \left( \frac{d}{dx} \right)^{|m|} P_l(x)$$

$$P_l(x) \equiv \frac{1}{2^l l!} \left( \frac{d}{dx} \right)^l (x^2-1)^l$$

$$Y_0^0 = \left( \frac{1}{4\pi} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$Y_2^{\pm 2} = \left( \frac{15}{32\pi} \right)^{\frac{1}{2}} \sin^2 \theta e^{\pm 2i\phi}$$

$$Y_1^0 = \left( \frac{3}{4\pi} \right)^{\frac{1}{2}} \cos \theta$$

$$Y_3^0 = \left( \frac{7}{16\pi} \right)^{\frac{1}{2}} (5 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta)$$

$$Y_1^{\pm 1} = \mp \left( \frac{3}{8\pi} \right)^{\frac{1}{2}} \sin \theta e^{\pm i\phi}$$

$$Y_3^{\pm 1}$$

$$= \mp \left( \frac{21}{64\pi} \right)^{\frac{1}{2}} \sin \theta (5 \cos^2 \theta - 1) e^{\pm i\phi}$$

$$Y_2^0 = \left( \frac{5}{16\pi} \right)^{\frac{1}{2}} (3 \cos^2 \theta - 1)$$

$$Y_3^{\pm 2} = \left( \frac{105}{32\pi} \right)^{\frac{1}{2}} \sin^2 \theta \cos \theta e^{\pm 2i\phi}$$

$$Y_2^{\pm 1} = \mp \left(\frac{15}{8\pi}\right)^{\frac{1}{2}} \sin \theta \cos \theta e^{\pm i\phi} \quad Y_3^{\pm 3} = \mp \left(\frac{35}{64\pi}\right)^{\frac{1}{2}} \sin^3 \theta e^{\pm 3i\phi}$$

$$\begin{aligned} P_1^1 &= \sin \theta & P_3^3 &= 15 \sin \theta (1 - \cos^2 \theta) \\ P_1^0 &= \cos \theta & P_3^2 &= 15 \sin^2 \theta \cos \theta \\ P_2^2 &= 3 \sin^2 \theta & P_3^1 &= \frac{3}{2} \sin \theta (5 \cos^2 \theta - 1) \\ P_2^1 &= 3 \sin \theta \cos \theta & P_3^0 &= \frac{1}{2} (5 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta) \\ P_2^0 &= \frac{1}{2} (3 \cos^2 \theta - 1) \end{aligned}$$

אורתוגונליות:

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi [Y_l^m(\theta, \varphi)]^* [Y_l^{m'}(\theta, \varphi)] \sin \theta \, d\theta \, d\varphi = \delta_{ll'} \delta_{mm'}$$

המשוואה לחלק הרדיאלי:

$$\begin{aligned} \frac{1}{R(r)} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial R(r)}{\partial r} \right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2} (V(r) - E) &= l(l+1) \\ R(r) &= \frac{u(r)}{r} \\ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u(r)}{dr^2} + \left[ V(r) + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{l(l+1)}{r^2} \right] u(r) &= Eu(r) \end{aligned}$$

פתרון עבור אטום המימן:

מתוך פתרון המשוואה תנאי שמקוונטט את האנרגיה:

$$\begin{aligned} E_n &= -\frac{mk^2 e^4}{2\hbar^2} \cdot \frac{1}{n^2} = \frac{E_1}{n^2} \\ E_1 &= -\frac{mk^2 e^4}{2\hbar^2} = -13.6 \text{ eV} \\ n &= 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

הפתרון לפונקציה תלוי בקבועים  $n$  ו- $l$ :

$$R_{nl}(r) = \sqrt{\left(\frac{2}{na}\right)^3 \frac{(n-l-1)!}{2n[(n-l)!]^3}} e^{-\frac{r}{na}} \left(\frac{2r}{na}\right)^l L_{n-l-1}^{2l+1} \left(\frac{2r}{na}\right)$$

רדיוס בוהר:

$$a = \frac{\hbar^2}{kme^2} = 0.529 \cdot 10^{-10} m$$

$$L_{q-p}^p(x) \equiv (-1)^p \left(\frac{d}{dx}\right)^p L_q(x)$$

$$L_q(x) \equiv e^x \left(\frac{d}{dx}\right)^q (e^{-x} x^q)$$

$$R_{10} = 2a^{-\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{r}{a}\right)$$

$$R_{20} = \frac{1}{\sqrt{2}} a^{-\frac{3}{2}} \left(1 - \frac{1}{2} \frac{r}{a}\right) \exp\left(-\frac{r}{2a}\right)$$

$$R_{21} = \frac{1}{\sqrt{24}} a^{-\frac{3}{2}} \frac{r}{a} \exp\left(-\frac{r}{2a}\right)$$

$$R_{30} = \frac{2}{\sqrt{27}} a^{-\frac{3}{2}} \left(1 - \frac{2}{3} \frac{r}{a} + \frac{2}{27} \left(\frac{r}{a}\right)^2\right) \exp\left(-\frac{r}{3a}\right)$$

$$R_{31} = \frac{8}{27\sqrt{6}} a^{-\frac{3}{2}} \left(1 - \frac{1}{6} \frac{r}{a}\right) \left(\frac{r}{a}\right) \exp\left(-\frac{r}{3a}\right)$$

$$R_{32} = \frac{4}{81\sqrt{30}} a^{-\frac{3}{2}} \left(\frac{r}{a}\right)^2 \exp\left(-\frac{r}{3a}\right)$$

$$R_{40} = \frac{1}{4} a^{-\frac{3}{2}} \left(1 - \frac{3}{4} \frac{r}{a} + \frac{1}{8} \left(\frac{r}{a}\right)^2 - \frac{1}{192} \left(\frac{r}{a}\right)^3\right) \exp\left(-\frac{r}{4a}\right)$$

$$R_{41} = \frac{\sqrt{5}}{16\sqrt{3}} a^{-\frac{3}{2}} \left(1 - \frac{1}{4} \frac{r}{a} + \frac{1}{80} \left(\frac{r}{a}\right)^2\right) \frac{r}{a} \exp\left(-\frac{r}{4a}\right)$$

$$R_{42} = \frac{1}{64\sqrt{5}} a^{-\frac{3}{2}} \left(1 - \frac{1}{12} \frac{r}{a}\right) \left(\frac{r}{a}\right)^2 \exp\left(-\frac{r}{4a}\right)$$

$$R_{43} = \frac{1}{768\sqrt{35}} a^{-\frac{3}{2}} \left(\frac{r}{a}\right)^3 \exp\left(-\frac{r}{4a}\right)$$

פתרון כללי:

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r) Y_l^m(\theta, \varphi)$$

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

$$0 \leq l \leq n - 1$$

 $l$  שלם ומקיים:

$$-l \leq m \leq l$$

 $m$  שלם ומקיים:

אורתוגונליות:

$$\int \psi_{nlm}^* \psi_{n'l'm'} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi = \delta_{nn'} \delta_{ll'} \delta_{mm'}$$

פונקציית ההסתברות הרדיאלית (צפיפות ההסתברות למצא את האלקטרון במרחק  $r$  מהגרעין):

$$P_{nl}(r) = |R_{nl}|^2 r^2$$

**תנע זוויתי:**

התנע הזוויתי הוא:  $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = (L_x, L_y, L_z)$   
נגדיר אופרטורים:  $\hat{L}^2, \hat{L}_z, \hat{L}_x, \hat{L}_y$

$$\hat{L}^2 Y_l^m = l(l+1)\hbar^2 Y_l^m$$

$$|L| = \sqrt{l(l+1)}\hbar$$

גודל התנע יכול להיות גם אפס וזה בניגוד למודל של בוהר.

את הכיוון נתאר באמצעות הגודל של  $L_z$ , משם אפשר למצא את  $\cos \theta = \frac{L_z}{|L|}$

$$\hat{L}_z Y_l^m = m\hbar Y_l^m$$

גם הכיוון של וקטור התנע הזוויתי מקוונטט!

**רמות אנרגיה ניוון וספקטרום הפליטה:**

צפיפות המצבים:  $g(n) = 2n^2$  (ה-2 מגיע מהספין).

כללי מעבר (Selection Rules):

$$n_i > n_f \quad .1$$

$$\Delta l = l_f - l_i = \pm 1 \quad .2$$

$$\Delta m = m_f - m_i = 0, \pm 1 \quad .3$$

**שאלות:**

**(1) הסתברות להיות רחוק מרדיוס בוהר**

- א. חשבו את ההסתברות של אלקטרון במצב היסוד באטום מימן, להימצא במרחק שגדול מרדיוס בוהר מהגרעין.  
 ב. מצאו את הרדיוס הממוצע בו נמצא האלקטרון במצב היסוד.

**(2) כוח ממוצע**

פונקציית הגל של המצב:  $n = 2, l = 1, m = 0$  היא:  $\psi_{210} = \frac{r \cdot \cos \theta}{\sqrt{32\pi a^5}} e^{-\frac{r}{2a}}$   
 מצאו את גודל הכוח החשמלי הממוצע שפועל על האלקטרון.

נוסחאות עזר:

$$\int_0^\infty x^n e^{-\alpha x} dx = \frac{n!}{\alpha^{n+1}}$$

$$\int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta = \frac{2}{3}$$

$$\int_0^\pi \sin^5 \theta d\theta = \frac{16}{15}$$

**(3) הראו כי התנז לא בכיוון Z**

הראו שהתנע הזוויתי המסלולי של האלקטרון באטום המימן לא יכול להיות מקביל לציר Z.

**(4) גז מעורר**

נתון גז של אטומי מימן שבכל אחד מהם האלקטרון נמצא ברמה התחלתית ( $n = 4, l = 3$ ).  
 נתון שאין אינטראקציה בין האטומים, טמפרטורת הגז נשארת קבועה כל הזמן ולא קיים שדה מגנטי חיצוני.  
 כמה קווי פליטה שונים (אורכי גל שונים) נראה בספקטרום הפליטה של הגז (ספקטרום הפליטה מתקבל כאשר האלקטרונים יורדים לרמות נמוכות יותר)?  
 רשמו את מצבי האנרגיה הנמוכים ביותר שבהם יכולים להימצא האלקטרונים לאחר זמן רב (השתמשו במספרים הקוונטים  $(n, l)$  כדי לאפיין את מצבי האנרגיה).

**(5) צבר אטומי מימן במצב 2 בשטרן גרלך**

- צבר אטומי מימן נמצא במצב  $n = 2$  (ועם תנע זוויתי כלשהו).  
 בכל סעיפי השאלה יש להתחשב גם בספין.  
 א. כמה כתמים יהיו על המסך עבור הצבר בניסוי שטרן גרלך?  
 ב. ציינו איזה מצב קוונטי גרם לכל כתם על המסך.

- אורך המגנט בניסוי הוא  $L$  והמרחק מסוף המגנט ועד המסך הוא  $10L$ .  
 השדה המגנטי הוא  $B(z) = B_0 \frac{z}{L}$  ומהירות האטומים היא  $v$ .  
 ג. מה יהיה המרחק בין שני הכתמים הנוצרים מהמצבים בהם האלקטרון נמצא ברמה  $2s$ ?  
 ד. כמה רמות אנרגיה שונות קיימות לצבר (תחת שדה מגנטי)? כמה אורכי גל שונים יכולים להיפלט מהצבר?

### תשובות סופיות:

- (1) א.  $0.677$  ב.  $1.5a$   
 (2)  $\frac{ke^2}{12a^3}$   
 (3) הוכחה.  
 (4) 5 קווים,  $1s$  ו- $2s$ .  
 (5) א. ישנם 5 אופציות שונות למומנט המגנטי ולכן נקבל 5 כתמים.  
 ב. הכתם הכי נמוך שייך ל- $m+2ms=2$  וככל שהערך יורד הכתם יהיה יותר גבוה.  
 ג.  $21 \frac{\mu_B B_0 L}{mv^2}$   
 ד. לצבר 5 רמות אנרגיה שונות עבור הערכים השונים של המומנט המגנטי.  
 7 אורכי גל שונים.

## מומנט מגנטי מסילתי ואפקט זימן הנורמאלי:

### סיכום כללי:

מומנט כוח על דיפול מגנטי:

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$$

אנרגיה פוטנציאלית של דיפול מגנטי בשדה מגנטי:

$$U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$$

כוח על דיפול מגנטי בשדה מגנטי לא אחיד:

$$\vec{F} = (\vec{\mu} \cdot \nabla) \vec{B}$$

מומנט דיפול מגנטי כתוצאה מתנועת האלקטרון סביב הגרעין:

$$\vec{\mu} = \frac{-\mu_B}{\hbar} \vec{L}$$

גודל קבוע שנקרא המגנטון של בוהר:

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 5.788 \cdot 10^{-5} \text{ eV/T}$$

האנרגיה הפוטנציאל כתוצאה האינטראקציה של המומנט המגנטי המסילתי עם שדה מגנטי חיצוני:

$$U = \frac{\mu_B}{\hbar} \vec{L} \cdot \vec{B} = \mu_B B m$$

כאשר m הוא המספר הקוונטי של  $L_z$ .

תוספת לשינוי באנרגיה כתוצאה ממעבר בין הרמות בעקבות אפקט זימן:

$$\begin{aligned} \Delta E_z &= \mu_B B \Delta m \\ \Delta m &= \pm 1, 0 \end{aligned}$$

התוספת בעקבות אפקט זימן גורמת לכל קו ספקטרלי להתפצל לשלושה קווים.

## שאלות:

### 1) פוטון נפלט מאטום מימן בשדה מגנטי

אלקטרון נמצא ברמת האנרגיה  $3p$  של אטום מימן. האטום נמצא באזור בו יש שדה מגנטי אחיד  $B = 4 \cdot 10^3 [T]$ . מצאו את אורך הגל הקצר ביותר שיכול

להתקבל ממעבר של האלקטרון לרמה כלשהיא (הניחו שהאלקטרון אינו עולה רמות לפני הפליטה).

## (2) פליטה מאטום בורון ורוחב פס

- גז של אטומי בורון נמצא באזור בו קיים שדה מגנטי חיצוני אחד  $B$ .  
 בכל אחד מהאטומים מעוררים את האלקטרון שנמצא ברמה  $2p$  לרמה  $3s$   
 ומוודדים את ספקטרום הקרינה האלקטרומגנטית שמתקבל בחזרה של  
 האלקטרון לרמה המקורית.
- א. כמה קווים יתקבלו בספקטרום? הניחו שרמת האנרגיה זהות לאלו של  
 אטום המימן.
- ב. מצאו את הערך של  $B$  עבורו נוכל להבחין כי הפיצול אכן נבע מהשדה  
 המגנטי החיצוני אם נתון שזמן החיים של הרמה המעוררת הוא  $2\text{ns}$ .

## תשובות סופיות:

- (1)  $100\text{nm}$   
 (2) א. 3 קווים. ב.  $B > 9\text{mT}$

## ספין ניסוי ושטרן גרלך:

### סיכום כללי:

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$$

$\vec{L}$  תנ"ז מסילתי, נובע מהתנועה הסיבובית של החלקיק.

$\vec{S}$  תנ"ז כתוצאה מהספין.

$$S = \sqrt{s(s+1)}\hbar$$

$S$  גדולה - גודל התנ"ז מהספין.

$s$  קטנה - הספין של החלקיק, עבור אלקטרון  $s = \frac{1}{2}$ .

עבור חלקיקים אחרים ערכי הספין הן כפולות שלמות של חצי  $s = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$

חלקיקים שהספין שלהם חצי שלם  $\frac{3}{2}, \frac{1}{2}$  וכו' נקראים **פרמיונים** וחלקיקים שהספין שלהם שלם  $0, 1, 2$  נקראים **בוזונים**.

$$S_z = m_s \hbar$$

$-s < m_s < s$  בקפיצות של 1

עבור אלקטרון  $m_s = -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$

$$\vec{\mu}_s = -g \frac{\mu_B}{\hbar} \vec{S}$$

פקטור  $g$  או gyromagnetic ratio

עבור אלקטרון  $g = 2.0023 \dots \approx 2$

**שאלות:**

**(1) תוחלת של S**

נתונה פונקציית הגל הבאה:

$$\frac{1}{\sqrt{4}} \Psi_{2,1,-1, \frac{1}{2}} + \frac{1}{\sqrt{4}} \Psi_{2,1,1, \frac{1}{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \Psi_{2,1,1, -\frac{1}{2}}$$

א. הראו שהפונקציה מנורמלת (בהנחה ש- $\Psi_{n,l,m,m_s}$  הן אורטונורמליות).

ב. מצאו את  $\langle \hat{L}_z \rangle$ .

ג. מצאו את  $\langle \hat{S}_z \rangle$ .

ד. מצאו את  $\Delta S_z$ .

**(2) שטרן גרלך עם תנז מסילתי**

מה היה קורה בניסוי שטרן-גרלך אם לאלקטרון בקרן שפוגעת היה  $l = 1$ ?

**תשובות סופיות:**

- (1) א. הוכחה. ב.  $\frac{\hbar}{2}$ . ג. 0. ד.  $\frac{\hbar}{2}$ .
- (2) הקרן תתפצל לחמש קרניים ונראה חמש נקודות על המסך.

## אטומים מורכבים והטבלה המחזורית:

### סיכום כללי:

כל אלקטרון מאכלס מצב מסוים המאופיין על ידי המספרים הקוונטים:  $n, l, m_l, m_s$ . בגלל האינטראקציה של האלקטרונים עם עצמם האנרגיות תלויות ב- $n$  וגם ב- $l$ .

עיקרון האיסור של פאולי (1900-1958) Wolfgang Pauli: שני אלקטרונים באטום לא יכולים לאכלס את אותו המצב הקוונטי. כלומר לא יכולים להיות שני אלקטרונים שיש להם בדיוק אותם מספרים קוונטים:  $n, l, m_l, m_s$ .

ככל ש- $l$  גדל (יש יותר תנ"ז מסילת) האנרגיה גדלה.

### הטבלה המחזורית:

**KEY:**

- Atomic Number: 6
- Element Symbol: C
- Electronic Configuration: He 2s<sup>2</sup> 2p<sup>2</sup>
- Density at 300K (g/cm<sup>3</sup>): 2.27
- Indicates density in g/l of gaseous state at 273K and 1 atm: 3825
- Atomic Mass: 12.011
- Oxidation States (data indicates most stable): +4, +2
- Electronegativity: 2.55
- Element Name: CARBON
- Melting Point, K: 5100
- Boiling Point, K: 1126
- First Ionization Potential, V: 70
- Atomic Radius (pm): 16
- Ionic Radius (pm): 1126

**Legend:**

- Alkali metals (Blue)
- Alkali earth metals (Light Blue)
- Transition metals (Orange)
- Rare earths (Pink)
- Basio metals (Red)
- Metalloids (Yellow)
- Non-metals (Green)
- Halogens (Light Green)
- Noble gases (Light Blue)
- Solid (White)
- Liquid (Light Blue)
- Gas (Light Blue)
- Hydrogen (Red)
- Not classified (Grey)

Source: ChemRoots, cchange, sasol, UNIVERSITY OF CAPE TOWN, CAPE TOWN SCIENCE CENTRE, CTSC

**שאלות:**

- (1) **טיטניום**  
כמה אלקטרונים יש ליסוד טיטניום:  $(Z = 22)$  Ti ברמה הרביעית?  
הניחו שהוא במצב היסוד.
- (2) **אטום ראשון ברמה החמישית**  
מהו המספר האטומי של האטום "הראשון" ברמה החמישית?
- (3) **קונפיגורציה של ברזל**  
רשמו את קונפיגורציית האלקטרונים של אטום הברזל: Fe  $Z=26$   
במצב היסוד. רשמו את הכתיב המלא והמקוצר.
- (4) **קונפיגורציות הגיוניות**  
אלו מהקונפיגורציות הבאות הן הגיוניות ואלו לא? (עבור אטומים ברמת היסוד)
- א.  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^3$   
ב.  $1s^2 2s^2 2p^6 2d^2$   
ג.  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5 4s^2$   
ד.  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^2$

**תשובות סופיות:**

- (1) שני אלקטרונים.  
(2) 37.  
(3)  $3d^2 4s^2$ ,  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$   
(4) א. לא. ב. לא. ג. לא. ד. כן.

# פיזיקה מודרנית קורס חלקי

פרק 7 - מעגלי RC


תוכן העניינים

1. פריקה וטעינה של קבל (מעגלי RC) ..... 69

## פריקה וטעינה של קבל - מעגלי RC :

רקע:

טעינה:



משוואת המתחים:

$$V_0 - \frac{q}{C} - IR = 0$$



$$I = \frac{dq}{dt}$$

המטען והמתח על הקבל כתלות בזמן:

$$q(t) = CV_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$


$$V_c(t) = V_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

$\tau = RC$  - קבוע הזמן



הזרם כתלות בזמן:

$$I(t) = \frac{V_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$




בהתחלה ( $t = 0$ ):

הקבל מתנהג כמו קצר, המתח והמטען על הקבל הם אפס והזרם הוא  $\frac{V_0}{R}$ .

לאחר זמן רב ( $t > 5\tau$ ):

הקבל מתנהג כמו נתק, המטען והמתח קבועים והזרם מתאפס.

פריקה:



משוואת המתחים:

$$\frac{q}{C} - IR = 0$$


$$I = -\frac{dq}{dt}$$

המטען והמתח על הקבל כתלות בזמן:

$$q(t) = Q_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$


$$V_c(t) = V_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$Q_0 = CV_0$$




הזרם כתלות בזמן:

$$I(t) = \frac{V_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$




**שאלות:**

**(1) מתג מתחלף**




- במעגל הבא מחברים ב- $t = 0$  את המפסק המתחלף לנקודה A. ב- $t = 0.01$  מעבירים את המפסק לנקודה B.
- רשום את המתח על הקבל כתלות בזמן.
  - מה המטען על הקבל ב- $t = 0.02$ .
  - רשום שוב את הזרם כתלות בזמן.
  - צייר גרפים עבור המתח והזרם כתלות בזמן.

**(2) טעינה של שני קבלים**




- במעגל הבא סוגרים את המפסק ב- $t = 0$ .
- מהו הזמן האופייני במעגל?
  - מצא את המתח והמטען בכל קבל בזמנים:  $0.8\text{sec}$ ,  $t = 0.2\text{sec}$ .

**(3) קבלים בהתחלה ובסוף**




- במעגל הבא הקיבול של הקבלים זהה ושווה ל-C התנגדות הנגדים זהה ושווה ל-R ומתח הסוללה הוא V.
- הקבלים אינם טעונים כאשר המפסק פתוח.
- מצאו את הזרם בסוללה ברגע סגירת המתג.
  - מצאו את הזרם בסוללה והמתח על כל קבל לאחר זמן רב.
  - מהו המטען על כל קבל לאחר זמן רב?



**(4) מטען על קבל במקביל לפי הזמן**

במעגל הבא סוגרים את המפסק ב- $t = 0$  כאשר הקבל אינו טעון. מצא את המטען על הקבל והזרם בכל נגד כפונקציה של הזמן. נתון:  $V, R_1, R_2, C$ .




**(5) פריקה בין שני קבלים**

במעגל הבא הקבל  $C_1$  טעון במטען  $Q_0$  לפני סגירת המתג  $s$  לנקודה  $a$ .  
 א. רשום את המשוואה ממנה ניתן לקבל את המטען על הקבל  $C_1$  כתלות בזמן.  
 ב. פתור את המשוואה ומצא את המטען על כל קבל כתלות בזמן.  
 ג. מהם הזרמים בשני הנגדים כתלות בזמן?

**(6) קבל של שני כדורים**

שני כדורים בעלי רדיוסים  $a$  ו- $b$  מרוחקים מאוד זה מזה. טוענים את הכדורים במטענים  $+Q$  ו- $-Q$  בהתאמה.



א. חשב את האנרגיה האלקטרוסטטית הכוללת של המערכת.

ב. חשב את הקיבול של המערכת דרך התוצאה שקיבלת עבור האנרגיה.

ג. אם מחברים את הכדורים בחוט ארוך מאוד עם התנגדות כוללת  $R$ , מה זמן הפריקה האופייני של המערכת?

## תשובות סופיות:

$$V_C(t) = \begin{cases} 10 \left( 1 - e^{-\frac{t}{0.05}} \right) & 0 < t < 0.01 \\ 8.65 \cdot e^{-\frac{t-0.01}{0.0025}} & 0.1 < t \end{cases} \quad \text{א. (1)}$$

ב.  $q_0(t=0.02) \approx 7.92 \cdot 10^{-6} \text{C}$

ד. ראה סרטון

$$I(t) = \begin{cases} \frac{10}{100} \cdot e^{-\frac{t}{0.005}} & 0 < t < 0.01 \\ \frac{8.65}{50} \cdot e^{-\frac{t-0.01}{0.0025}} & 0.1 < t \end{cases} \quad \text{ג.}$$

א.  $0.1 \text{sec}$       ב.  $0.8 \text{sec}$  :  $V_1 = V_2 = 10 \text{V}$ ,  $q_1 = 3 \cdot 10^{-3} \text{C}$ ,  $q_2 = 7 \cdot 10^{-3} \text{C}$       (2)

א.  $0.2 \text{sec}$  :  $V_1 = V_2 \approx 8.65 \text{V}$ ,  $q_1 = 2.6 \cdot 10^{-3} \text{C}$ ,  $q_2 = 6.01 \cdot 10^{-3} \text{C}$

א.  $\frac{6V}{7R}$       ב. זרם סוללה:  $\frac{V}{2R}$ , מתח קבלים:  $\frac{V}{2}$       (3)

ג. מטען קבלים:  $\frac{CV}{2}$

$$q(t) = \frac{VR_1 \cdot C}{R_2 + R_1} \left( 1 - e^{-\frac{R_2 + R_1}{R_1 C R_2} t} \right) \quad \text{א. (4)}$$

א.  $\frac{C_1 + C_2}{2RC_1 C_2} \cdot q_1 + q_1 - \frac{Q_0}{2RC_2} = 0$       ב.  $q_1(t) = (\tau \cdot A - Q_0) e^{-\frac{t}{\tau}}$       (5)

א.  $q_2(t) = (-\tau \cdot A + Q_0) \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$       ג.  $I = \left( \frac{Q_0}{\tau} - A \right) e^{-\frac{t}{\tau}}$

א.  $U = \frac{KQ^2}{2} \left( \frac{b+a}{a \cdot b} \right)$       ב.  $C = \frac{a \cdot b}{K(a+b)}$       ג.  $\tau = RC = \frac{Rab}{K(a+b)}$       (6)

# פיזיקה מודרנית קורס חלקי

פרק 8 - פורמליזם אלגברי לתורת הקוונטים

תוכן העניינים

75 ..... 1. הרצאות ותרגילים

## ייצוג באמצעות אלגברה לינארית:

### סיכום כללי:

פונקציות הגל מקיימות את התנאים של מרחב וקטורי.  
הכללות:

1. נעבוד עם וקטורים ביותר משלושה מימדים.
2. נעבוד עם סקלרים שיכולים להיות גם מספרים מורכבים.

כתיב דיראק:

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \vdots \\ \vdots \end{pmatrix} \quad \text{:ket}$$

$$\langle\psi| = (\alpha_1^*, \alpha_2^*, \alpha_3^*, \dots) \quad \text{:bra}$$

מכפלה פנימית - הכללה של מכפלה סקלרית ליותר מ-3 מימדים.

תכונות המכפלה הפנימית:

תכונה 1:  $\langle v|u\rangle = \langle u|v\rangle^*$  סקלר

תכונה 2:  $\langle v|v\rangle \geq 0$  ממש, אם  $\langle v|v\rangle = 0$  אז  $|v\rangle = |0\rangle$

תכונה 3:  $\langle v|(\alpha|u\rangle + \beta|k\rangle) = \alpha\langle v|u\rangle + \beta\langle v|k\rangle$   
הגדרת המכפלה הפנימית בפונקציות הגל:

$$\langle\psi_1|\psi_2\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_1^* \psi_2 dx$$

נורמה – הכללה של גודל של וקטור ליותר מ-3 מימדים.

$$\|v\| = \sqrt{\langle v|v\rangle}$$

אם המכפלה הפנימית של שני וקטורים מתאפסת אז אומרים שהוקטורים אורתוגונליים.

מרחב  $L_2$  (או  $L^2$ ) – מכיל את כל הפונקציות שהאינטגרל על גודל הפונקציה בריבוע

$$\text{אינו מתבדר: } \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx < \infty .$$

בפיזיקה, מרחב פונקציות הגל שנעבוד איתו נקרא מרחב הילברט ובפועל הוא יהיה המרחב  $L_2$ .

\* הפונקציות העצמיות של התנע והמיקום אינם ב- $L_2$  אבל עדיין עובדים איתם.

ייצוג באמצעות בסיס:

בסיס – סט של וקטורים (בלתי תלויים) שבאמצעותם ניתן לבטא כל וקטור אחר במרחב.

בסיס אורתונורמלי – בסיס שבו כל הוקטורים אורתונורמליים.

בסיס אורתונורמלי – בסיס אורתונורמלי שבו הנורמה של כל וקטור היא 1.

הבסיס הסטנדרטי – בסיס שמורכב מוקטורי יחידה.

סט הפונקציות העצמיות (או הו"ע) של כל אופרטור מהוות בסיס\*  
 \* יש יוצאי דופן, לדוגמה במקרים שהבסיס אינסופי.

$$\psi(x) = \sum \alpha_n \phi_n(x)$$

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \quad \text{או}$$

$$\alpha_n = \langle \phi_n | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \phi_n^*(x) \psi(x) dx \quad \text{כאשר}$$

המכפלה הפנימית בהצגה באמצעות בסיס אורתונורמלי:

$$\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = (\alpha_1^*, \alpha_2^*, \alpha_3^*, \dots) \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \dots \end{pmatrix} = \sum \alpha_i^* \beta_i$$

## שאלות:

## 1) ייצוג בסיס לז'נדר

נתונה הפונקציה:  $f(x) = |x|$ ,  $x \in [-1, 1]$ .

בתרגיל זה נתרגל פריסה (או ייצוג) באמצעות בסיס פולינומי לז'נדר המנורמל לקטע:  $x \in [-1, 1]$ .

$$L_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}, L_1(x) = \sqrt{\frac{3}{2}}x, L_2(x) = \sqrt{\frac{5}{2}} \cdot \frac{1}{2}(3x^2 - 1), L_3(x) = \sqrt{\frac{7}{2}} \cdot \frac{1}{2}(5x^3 - 3x), \dots$$

א. הראו כי ארבעת איברי הבסיס הנ"ל הם אכן אורתונורמלים,

$$\delta_{nm} = \langle L_n | L_m \rangle.$$

ב. מצאו את ארבעת המקדמים ("המשקלים") הראשונים בייצוג של  $f(x)$

$$\text{בבסיס לז'נדר. (רמז: } \langle L_n | f \rangle = \alpha_n \text{)}$$

ג. רשמו את הפונקציה לפי ארבעת האיברים הראשונים ושרטטו אותה (באמצעות מחשב) על גבי הפונקציה המקורית.

## 2) חישוב אי ודאות בתנע ומיקום

א. חשבו את אי הודאות במקום ובתנע של המצב:  $|\psi\rangle = |x_1\rangle$ . הנחייה: בשביל לחשב את ערכי התצפית של התנע השתמשו

בקשר:  $\langle p|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-\frac{ipx}{\hbar}}$  (או בטרנספורם פורייה) על מנת למצא את פונקציית הגל בבסיס התנע.

ב. חשבו את אי הודאות במקום ובתנע של המצב:  $|\psi\rangle = \alpha|x_1\rangle + \beta|x_2\rangle$ . (ממשיים  $\beta, \alpha$ ).

מהו החסם על אי הודאות בתנע?


(את אי הודאות בתנע ניתן להשאיר כאינטגרל).

ג. מה יקרה לפונקציית הגל אם נערוך מדידה ונקבל שהחלקיק נמצא ב- $x_1$ ?

**תשובות סופיות:**

(1) א. הוכחה. ב.  $\alpha_1 = \alpha_3 = 0, \alpha_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \alpha_2 = \sqrt{\frac{5}{32}}$

ג.  $f(x) \approx \frac{1}{\sqrt{2}}L_0 + \sqrt{\frac{5}{32}}L_2$



(2) א.  $\Delta x = 0, \Delta p = \infty$

ב.

□  $x = \alpha\beta|x_1 - x_2|, \langle p \rangle = 0, \langle p^2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} p \left[ 1 + 2\alpha\beta \cos\left(\frac{p(x_1 - x_2)}{\hbar}\right) \right] dp = \infty$

ג. פונקציית הגל תקרוס ונחזור למצב של סעיף א'.

**אי שוויון שורץ:**

$$|\langle a|b \rangle|^2 \leq \langle a|a \rangle \langle b|b \rangle$$

זווית מוכללת בין וקטורים:

$$\cos \theta = \frac{\langle a|b \rangle \langle b|a \rangle}{\sqrt{\langle a|a \rangle \langle b|b \rangle}}$$

אי שוויון המשולש:

$$|\langle a + b | a + b \rangle| \leq |a| + |b|$$

## שאלות:

## (1) אי שוויון שורץ

הוכיחו את אי שוויון שורץ:  $\langle a|a\rangle\langle b|b\rangle \geq |\langle a|b\rangle|^2$ .

השתמשו ב- $|c\rangle = |a\rangle - \frac{\langle b|a\rangle}{\langle b|b\rangle}|b\rangle$  ובעובדה שהנורמה של וקטור תמיד גדולה או שווה לאפס  $\langle c|c\rangle \geq 0$ .

## (2) אי שוויון המשולש

הוכיחו את אי שוויון המשולש:  $|(|a\rangle + |b\rangle)| \leq |a| + |b|$ .  
 רמז: השתמשו גם באי שוויון שורץ.

## תשובות סופיות:

(1) הוכחה.

(2) הוכחה.

# פיזיקה מודרנית קורס חלקי

פרק 9 - אופרטורים בייצוג האלגברי

תוכן העניינים

1. הרצאות ותרגילים ..... 80

## הרצאות ותרגילים:

### סיכום כללי:

-אופרטורים מיוצגים באמצעות מטריצות:

$$\hat{Q} = \begin{pmatrix} Q_{11} & Q_{12} & \dots & Q_{1n} \\ Q_{21} & Q_{22} & \dots & Q_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ Q_{n1} & Q_{n2} & \dots & Q_{nn} \end{pmatrix}$$

האיבר  $Q_{ij}$  מעביר את הוקטור  $e_j$  לוקטור  $e_i$ :  $Q_{ij} = \langle e_i | \hat{Q} | e_j \rangle$  (כפול סקלר כלשהו).  
 $i$  שורה,  $j$  עמודה.

אם הבסיס הוא בסיס עצמי של אופרטור כלשהו אז המטריצה של האופרטור תהיה אלכסונית והערכים על האלכסון הם הערכים העצמיים של האופרטור.

$$\langle \psi_1 | \hat{Q} | \psi_2 \rangle = \langle \psi_1 | \hat{Q} \psi_2 \rangle$$

כתיב נוסף:

$$\langle \hat{Q} \psi | = (\hat{Q} | \psi \rangle)^\dagger = \langle \psi | \hat{Q}^\dagger$$

### חזרה על אלגברה לינארית

- מציאת ערכים עצמיים (ע"ע):  $\det(Q - \lambda I) = 0$

- מציאת וקטורים עצמיים (ו"ע) בסרטון:

מטריצה משוחלפת:

$$A^T = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

צמד הרמיטי :

$$A^\dagger = (A^*)^T = \begin{pmatrix} A_{11}^* & A_{21}^* & \dots & A_{n1}^* \\ A_{12}^* & A_{22}^* & \dots & A_{n2}^* \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ A_{1n}^* & A_{2n}^* & \dots & A_{nn}^* \end{pmatrix}$$

מטריצת יחידה :

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} = \sum |\phi_n\rangle\langle\phi_n|$$

כפל מטריצות :  $C = A \cdot B \Rightarrow C_{mn} = \sum A_{mi} B_{in}$ כפל מטריצות הוא לא חילופי :  $AB \neq BA$ יחס חילוף בין מטריצות :  $[A, B] = AB - BA$ מטריצה ההופכית :  $AA^{-1} = A^{-1}A = I$ מטריצה אוניטרית :  $U^\dagger = U^{-1}$ 

- זהויות :

$$(\langle\psi_1|\hat{A}^\dagger|\psi_2\rangle)^* = \langle\psi_2|\hat{A}|\psi_1\rangle$$

$$\langle\psi_1|\hat{A}\psi_2\rangle = \langle\hat{A}^\dagger\psi_1|\psi_2\rangle$$

$$(A^\dagger)^\dagger = A$$

$$(AB)^T = B^T A^T$$

$$(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger$$

$$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$$

הגודל של ערך עצמי של אופרטור אוניטרי הוא תמיד 1.  
 אופרטורים הרמיטים ואוניטרים הם אופרטורים נורמליים, כלומר :  $[A, A^\dagger] = 0$ .

## שאלות:

## (1) בניית אופרטורים ופעולות על פונקציות שונות

נתון כי:  $\{|v_1\rangle, |v_2\rangle\}$  מהווים בסיס אורתונורמאלי במרחב וקטורי דו מימדי. מגדירים את המצבים הבאים:

$$\begin{aligned} |\psi_1\rangle &= \alpha_1 |v_1\rangle + \alpha_2 |v_2\rangle \\ |\psi_2\rangle &= \beta_1 |v_1\rangle + \beta_2 |v_2\rangle \end{aligned}$$

כאשר:  $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$  הם סקלרים מורכבים.

- רשמו את  $\langle \psi_2 |$  בכתוב דיראק בבסיס הנייל.
- חשבו את המכפלה הפנימית  $\langle \psi_2 | \psi_1 \rangle$ . האם היא שווה למכפלה הפנימית  $\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle$ ?
- רשמו את  $|\psi_2\rangle$  ואת  $\langle \psi_2 |$  כוקטורים בכתוב מטריצי.
- מצאו את הנורמה של המצב  $|\psi_2\rangle$ .
- נגדיר אופרטור  $\hat{Q} = c|v_1\rangle\langle v_2|$  כאשר  $c$  הוא סקלר מורכב שונה מאפס. חשבו את פעולת האופרטור על איברי הבסיס וכתבו את הייצוג המטריצי של האופרטור בבסיס הנתון. האם האופרטור הרמיטי?
- חשבו את הפעולה של  $\hat{Q}$  על המצב  $|\psi_2\rangle$  פעם אחת דרך הייצוג המטריצי ופעם שניה דרך כתיב דיראק.
- נגדיר אופרטור חדש  $\hat{G} = c|\psi_1\rangle\langle \psi_2|$  מצאו את  $\hat{G}$  בייצוג המטריצי.
- נתון כי האופרטור  $\hat{S}$  מבצע את הפעולה הבאה:

$$\begin{aligned} \hat{S}|v_1\rangle &= |v_2\rangle \\ \hat{S}|v_2\rangle &= |v_1\rangle \end{aligned}$$

מצאו את הייצוג המטריצי של  $\hat{S}$  וחשבו את הפעולה שלו על המצבים  $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$ .


## (2) מציאת עע ווע

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} : \text{נתונה המטריצה הבאה:}$$

- האם המטריצה הרמיטית?
- מצאו את העי"ע וי"ע של  $A$ .

## 3 אתרים על טבעת (3)

נתונה מערכת ובה שלושה אתרים על טבעת:



נסמן את המצבים בהם נמצא החלקיק בכל אחד מהאתרים בצורה הבאה:

$$|1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, |2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |3\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

הדינמיקה של המערכת מתוארת ע"י ההמילטוניאן:  $H = \varepsilon \hat{D} + \varepsilon \hat{D}^\dagger$   
 כך שאופרטורי ההזזות מוגדרים:

$$\hat{D}|i\rangle = |i-1\rangle, \hat{D}|1\rangle = |3\rangle, \hat{D}^\dagger|i\rangle = |i+1\rangle, \hat{D}^\dagger|3\rangle = |1\rangle$$

אופרטור המיקום מוגדר כ-  $\hat{x}|i\rangle = i|i\rangle$ .

א. ייצגו את אופרטורי ההזזה ע"י מטריצה והראו כי אחד הוא צמוד הרמיטי של השני.

ב. ייצגו את אופרטור המיקום ע"י מטריצה. מהם הוקטורים והערכים העצמיים.

ג. מהם הוקטורים והערכים העצמיים של ההמילטוניאן?

שימו לב כי הו"ע אינם אורתוגונליים ויש לבצע תהליך גרהם שמידט.

פתרון המשוואה:  $-\lambda^3 + 3\varepsilon^2\lambda + 2\varepsilon^3 = 0$  הוא:  $\lambda_{1,2} = -\varepsilon, \lambda_3 = 2\varepsilon$ .

ד. מכינים את החלקיק בזמן 0 במצב  $|2\rangle$ , מהו מצב המערכת בזמן כלשהו?

ה. מה הסיכוי למצוא את החלקיק באתר 3 אחרי זמן כלשהו?

ו. מהו יחס החילוף  $[D, x]$ ?

ז. \*\*מצאו את המצבים העצמיים עבור מערכת עם אינסוף אתרים

(גבול הרצף) עבור  $\hat{D}^\dagger, \hat{D}$  ועבור  $H$ .

הדרכה: כתבו את משוואת המצבים העצמיים בכתוב דיראק ונסו לחלץ

סדרה הנדסית עבור המקדמים. מתוך התנאי על האיבר האחרון מצאו

את הערכים העצמיים והפונקציות העצמיות.

**4 הוכחת זהויות 1**

- א. הוכיחו כי:  $\langle i|\hat{A}|j\rangle = (\langle j|\hat{A}^\dagger|i\rangle)^*$  כאשר:  $|i\rangle, |j\rangle$  הן פונקציות בסיס אורתונורמאלי.
- ב. הוכיחו כי:  $\langle \psi_2|\hat{A}|\psi_1\rangle = (\langle \psi_1|\hat{A}^\dagger|\psi_2\rangle)^*$  כאשר  $\psi_1, \psi_2$  הן פונקציות כלשהן.
- ג. הוכיחו כי:  $\langle \psi_1|\hat{A}\psi_2\rangle = \langle \hat{A}^\dagger\psi_1|\psi_2\rangle$ .

**5 הוכחת זהויות 2**

- הוכיחו את הטענות הבאות עבור אופרטורים כלשהם  $A$  ו- $B$ :
- א.  $(A^\dagger)^\dagger = A$ .
- רמז: השתמשו בתכונות ההצמדה של מכפלה פנימית והראו
- כי:  $\langle \psi_1|(A^\dagger)^\dagger|\psi_2\rangle = \langle \psi_1|A|\psi_2\rangle$
- ב.  $(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger$ .
- ג.  $AA^\dagger, i(A - A^\dagger), A + A^\dagger$  הם כולם אופרטורים הרמיטיים.

**6 הוכחת זהויות 3**

- נניח כי לאופרטור  $Q$  ישנם וקטורים עצמיים  $|\phi_i\rangle$  עם ערכים עצמיים  $\lambda_i$  בהתאמה. הראו כי אם אין ניוון אז:  $(\prod_i(\hat{Q} - \lambda_i))|\psi\rangle = 0$
- כאשר:  $\prod_i(x_i) = x_1x_2x_3 \cdots x_n$ .
- רמז: השתמשו בתכונת מטריצת היחידה:  $I = \sum_i |\phi_i\rangle\langle\phi_i|$ .

**7 הוכחת זהויות 4**

- הראו כי הגודל של ערך עצמי של אופרטור אוניטרי הוא תמיד 1.
- הנחייה: הניחו מצב עצמי של אופרטור אוניטרי שעבורו מתקיים:  $U|\phi\rangle = \lambda|\phi\rangle$ .

**8 הוכחת זהויות 5**

- הוכיחו שאופרטורים הרמיטיים ואוניטרים הם אופרטורים נורמליים, כלומר שהם מקיים את התנאי:  $[A, A^\dagger] = 0$ .

**9 הוכחת זהויות 6**

- הראו כי אופרטור אוניטרי הפועל על פונקציית גל אינו משנה את הנורמה של הפונקציה.

**10) אופרטור סיבוב**

נתון האופרטור הבא :

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

- א. הראו שהאופרטור אוניטרי.  
 ב. מצאו את הערכים העצמיים והוקטורים העצמיים.  
 ג. הראו שהוקטורים העצמיים אורתונורמאליים.  
 ד. הראו שהמטריצה  $U^\dagger A U$  היא מטריצה אלכסונית כאשר  $U$  מורכבת מהוקטורים העצמיים של  $A$  בעמודות.

**11) חישוב אי ודאות בתנע ומיקום**

- א. חשבו את אי הודאות במקום ובתנע של המצב  $|\psi\rangle = |x_1\rangle$ . הנחייה: בשביל לחשב את ערכי התצפית של התנע השתמשו בקשר:  $\langle p|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-\frac{ipx}{\hbar}}$  (או בטרנספורם פורייה) על מנת למצא את פונקציית הגל בבסיס התנע.
- ב. חשבו את אי הודאות במקום ובתנע של המצב:  $|\psi\rangle = \alpha|x_1\rangle + \beta|x_2\rangle$ . (ממשיים  $\beta, \alpha$ ). מהו החסם על אי הודאות בתנע? (את אי הודאות בתנע ניתן להשאיר כאינטגרל).
- ג. מה יקרה לפונקציית הגל אם נערוך מדידה ונקבל שהחלקיק נמצא ב- $x_1$ ?

## תשובות סופיות:

$$(1) \quad \text{א. } \beta_1^* < \nu_1 | + \beta_2^* < \nu_2 | \quad \text{ב. } \beta_1^* \alpha_1 + \beta_2^* \alpha_2 | \text{ לא שווה.}$$

$$\sqrt{|\beta_1|^2 + |\beta_2|^2} \quad \text{ד.}$$

$$L\psi_2 | = (\beta_1^*, \beta_2^*), \quad |\psi_2\rangle = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} \quad \text{ג.}$$

$$c\beta_2 |\nu_1\rangle \quad \text{או} \quad \begin{pmatrix} c\beta_2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{ו.}$$

$$\text{ה. } \begin{pmatrix} 0 & c \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ לא הרמיטי.}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{S}|\psi_1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \alpha_1 \end{pmatrix} \quad \text{ח.}$$

$$c \begin{pmatrix} \alpha_1 \beta_1^* & \alpha_1 \beta_2^* \\ \alpha_2 \beta_1^* & \alpha_2 \beta_2^* \end{pmatrix} \quad \text{ט.}$$

$$\hat{S}|\psi_2\rangle = \begin{pmatrix} \beta_2 \\ \beta_1 \end{pmatrix}$$

(2) א. כן.

$$\text{ב. } \lambda_1 = 0, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 1 \quad |\lambda_1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |\lambda_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, |\lambda_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(3) \quad \text{א. } D^+ = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{ב. } |1\rangle, |2\rangle, |3\rangle \quad \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3, X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_1 = -\varepsilon, |\lambda_1\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} \left( -\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2} \right)$$

$$\lambda_2 = -\varepsilon, |\lambda_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (0, 1, -1) \quad \text{ג.}$$

$$\lambda_3 = -2\varepsilon, |\lambda_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} (1, 1, 1)$$

$$\text{ד. } |\psi(t)\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} e^{+\frac{i\varepsilon t}{\hbar}} |\lambda_1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} e^{\frac{i\varepsilon t}{\hbar}} |\lambda_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}} e^{-\frac{2\varepsilon t}{\hbar}} |\lambda_3\rangle$$

$$\text{ה. } \left( -\frac{5}{6} \cos(\omega t) + \frac{1}{3} \cos(2\omega t) \right)^2 + \left( \frac{5}{6} \sin(\omega t) + \frac{1}{3} \sin(2\omega t) \right)^2$$

$$\text{ו. } [\hat{D}, \hat{X}] = \hat{D}$$

ז. הפונקציות העצמיות של שלושת האופרטורים הן:

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{N}} e^{-ikx} \text{ או } |\phi_i\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \varepsilon e^{-i\frac{2\pi j}{N}n} |n\rangle \text{ כאשר } j \text{ מספר שלם בין } -\infty$$

$$\text{ל- } \infty \text{ ו- } k = \frac{2\pi}{N} j$$

$$. E_j = 2\varepsilon\omega \cos\left(\frac{2\pi j}{N}\right) \text{ הן } D^+ \text{ של } \lambda_j^+ = e^{i\frac{2\pi j}{N}} \text{ הן } D \text{ של } \lambda_j = e^{-i\frac{2\pi j}{N}} \text{ ושל } H \text{ הן } \left(\frac{2\pi j}{N}\right)$$

(4) הוכחה.

(5) הוכחה.

(6) הוכחה.

(7) הוכחה.

(8) הוכחה.

(9) הוכחה.

$$\lambda_1 = e^{i\theta} \quad |\lambda_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, i) \quad \text{א. הוכחה. (10)}$$

$$\lambda_2 = e^{-i\theta} \quad |\lambda_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -i) \quad \text{ב. הוכחה. ג. הוכחה.}$$

ד. הוכחה.

$$\Delta x = 0, \Delta p = \infty \quad \text{א. (11)}$$

ב.

$$\Delta x = \alpha\beta|x_1 - x_2|, \langle p \rangle = 0, \langle p^2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} p \left[ 1 + 2\alpha\beta \cos\left(\frac{p(x_1 - x_2)}{\hbar}\right) \right] dp = \infty$$

ג. פונקציית הגל תקרוס ונחזור למצב של סעיף א'.

# פיזיקה מודרנית קורס חלקי

פרק 10 - הרחבה על תנז מסילתי ספין ותנז כולל

תוכן העניינים

88	.....	1. תנז מסילתי והספין
93	.....	2. המילטוניאן פריק
94	.....	3. חיבור תנז

## תנ"ז מסילתי והספין:

### סיכום כללי:

יחסי החילוף של התנ"ז המסילתי:

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar \hat{L}_z$$

$$[\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar \hat{L}_x$$

$$[\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar \hat{L}_y$$

$$[\hat{L}^2, \hat{L}_z] = [\hat{L}^2, \hat{L}_y] = [\hat{L}^2, \hat{L}_x] = 0$$

התנ"ז בקואורדינטות כדוריות:

$$\hat{L}_z = (-i\hbar) \frac{\partial}{\partial \varphi}$$

$$\hat{L}_x = -i\hbar \left( -\sin \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} - \cos \varphi \cot \theta \frac{\partial}{\partial \varphi} \right)$$

$$\hat{L}_y = -i\hbar \left( \cos \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} - \sin \varphi \cot \theta \frac{\partial}{\partial \varphi} \right)$$

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left( \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right)$$

הפונקציות העצמיות של  $\hat{L}_z$  ו- $\hat{L}^2$  הן הספריות ההרמוניות:  $Y_l^m(\theta, \varphi)$ .

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = \theta(\theta)\phi(\varphi) = \varepsilon \sqrt{\frac{(2l+1)(l-|m|)!}{4\pi(l+|m|)!}} P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi}$$

$$\varepsilon = \begin{cases} (-1)^m & m > 0 \\ 1 & m \geq 0 \end{cases} \quad -l \leq m \leq l$$

$m, l$  שלמים

$$\begin{aligned} \hat{L}_z Y_l^m &= \hbar m Y_l^m \\ \hat{L}^2 Y_l^m &= \hbar^2 l(l+1) Y_l^m \\ \hat{L}_\pm &= \hat{L}_x \pm i\hat{L}_y \\ \hat{L}_+ \hat{L}_- &= \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hbar \hat{L}_z \\ \hat{L}_- \hat{L}_+ &= \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 - \hbar \hat{L}_z \\ [\hat{L}_+, \hat{L}_-] &= 2\hbar \hat{L}_z \\ [\hat{L}_z, \hat{L}_\pm] &= \pm \hbar \hat{L}_\pm \\ [\hat{L}^2, \hat{L}_\pm] &= 0 \end{aligned}$$

מטריצות התנ"י עבור  $l=1$  :

$$\begin{aligned} \hat{L}_x &= \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ \hat{L}_y &= \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & i & 0 \\ -i & 0 & i \\ 0 & -i & 0 \end{pmatrix} \\ \hat{L}^2 &= \hbar^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ספין :

התנ"י של הספין מקיים את אותם יחסי חילוף כמו התנ"י המסילתי :

$$\begin{aligned} [\hat{S}_x, \hat{S}_y] &= i\hbar \hat{S}_z \\ [\hat{S}_y, \hat{S}_z] &= i\hbar \hat{S}_x \\ [\hat{S}_z, \hat{S}_x] &= i\hbar \hat{S}_y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \hat{S}_z f &= \hbar m_s f \\ \hat{S}^2 f &= \hbar^2 S(S+1) f \\ -S &\leq m_s \leq S \end{aligned}$$

קפיצות של 1

$S, m_s$  יכולים להיות חצי שלמים.  
 $S$  תלוי רק בסוג החלקיק.  
 פרמיונים – ספין חצי שלם.  
 בוזונים – ספין שלם.

ספין חצי :

מצבים אורתונורמאליים :

$$S = \frac{1}{2} \quad m_s = \pm \frac{1}{2}$$

$$|x_+\rangle = \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \equiv |\uparrow\rangle$$

$$|x_-\rangle = \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \equiv |\downarrow\rangle$$

$$\hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{S}^2 = \frac{3}{4} \hbar^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\hat{S}_\pm = \hat{S}_x \pm i\hat{S}_y$$

$$\hat{S}_\pm |s, m_s\rangle = \hbar \sqrt{s(s+1) - m_s(m_s \pm 1)} |s, m_s \pm 1\rangle$$

פונקציית מצב כללית של הספין :

$$|x\rangle = \alpha |x_+\rangle + \beta |x_-\rangle$$

**שאלות:**

**(1) אלקטרון במצב אפ נמדד באיקס**

מודדים את ערך הספין בכיוון  $z$  של אלקטרון ומקבלים כי האלקטרון במצב up. מייד לאחר מכן מודדים את הספין שלו בכיוון  $x$ .

א. מצאו את העי"ע והו"ע של  $\hat{S}_x$ .

ב. מהי ההסתברות לקבל  $\frac{\hbar}{2}$  ומהי ההסתברות לקבל  $-\frac{\hbar}{2}$  במדידת  $\hat{S}_x$ ?


ג. חשבו את התוחלת במדידת  $\hat{S}_x$ .

במדידת  $\hat{S}_x$  התקבלה התוצאה  $\frac{\hbar}{2}$ . מיד לאחר מכן מדדו שוב את  $\hat{S}_z$ .

ד. מה ההסתברות למדידת  $-\frac{\hbar}{2}$  במדידת ה-  $\hat{S}_z$ ?

**(2) קרן אלק דרך מכונות שטרן-גרלך**

מעבירים קרן של אלקטרונים דרך הסדרה הבאה של מכונות (ניסויי) שטרן-גרלך (הקרן נעה משמאל לימין).



נתון שבכל מכונות (ניסויי) שטרן-גרלך האלקטרונים עם היטל הספין החיובי על הציר שמצוין על המכונה נמצאים בקרן העליונה שיוצאת מהמכונה והאלקטרונים עם היטל הספין השלילי על הציר שמצוין על המכונה נמצאים בקרן התחתונה שיוצאת מהמכונה.

בהינתן שמצב האלקטרונים בקרן המקורית הוא:  $|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|\downarrow\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}|\uparrow\rangle$

בבסיס  $\hat{S}_z$ .

מצאו את אחוז האלקטרונים מהקרן המקורית שנמצאים בקרן התחתונה שיוצאת ממכונת שטרן-גרלך האחרונה (הימנית ביותר) בסדרה.

**תשובות סופיות:**

$$\frac{1}{2} \quad \text{ד.} \quad 0 \quad \text{ג.}$$

$$p\left(\frac{\hbar}{2}\right) = p\left(-\frac{\hbar}{2}\right) = \frac{1}{2} \quad \text{ב.}$$

$$\lambda_1 = \frac{\hbar}{2} \quad v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1) \quad \text{א.} \quad (1)$$

$$\lambda_2 = -\frac{\hbar}{2} \quad v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)$$

$$\frac{1}{12} \quad \text{א.} \quad (2)$$

## המילטוניאן פריק:

### סיכום כללי:

המילטוניאון פריק הוא המילטוניאון מהצורה הבאה:

$$\hat{H}(\hat{X}, \hat{P}, \hat{S}) = \hat{H}_0(\hat{X}, \hat{P}) + \hat{H}_s(\hat{S})$$

במקרה של המילטוניאון פריק ניתן לפתור את משוואת שרידינגר לספין ולמרחב בנפרד.

## חיבור תנ"ז:

### סיכום כללי:

חיבור שני ספינים:

$$|S_1 - S_2| \leq S < S_1 + S_2$$

$S$  הוא של כל המערכת והוא לא קבוע בניגוד לחלקיק בודד:

$$-S \leq m_s \leq S$$

עבור שני חלקיקים עם ספין חצי:

טריפלט -

$$|S, m_s\rangle$$

$$|1, 1\rangle \rightarrow |\uparrow\uparrow\rangle$$

$$|1, 0\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle)$$

$$|1, -1\rangle \rightarrow |\downarrow\downarrow\rangle$$

סינגלט -

$$|0, 0\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)$$

תנ"ז כולל:

$$\hat{J} = \hat{L} + \hat{S}$$

אותם יחסי חילוף כמו של התנ"ז המסילתי והספין:

$$\hat{J}_z f = \hbar m_j f$$

$$\hat{J}^2 f = \hbar^2 j(j+1) f$$

$$m_j = m_l + m_s$$

$$|l - S| \leq j \leq l + S$$

## שאלות:

### (1) חישוב מפורש של $S$

חשבו מפורשות את  $S$  עבור מצבי הטריפלט ומצב הסינגלט.

רמז:  $\hat{S}_1 \cdot \hat{S}_2 = \hat{S}_{1x} \cdot \hat{S}_{2x} + \hat{S}_{1y} \cdot \hat{S}_{2y} + \hat{S}_{1z} \cdot \hat{S}_{2z}$  והשתמשו במטריצות של  $\hat{S}_i$  כדי לחשב את הפעולות על המצבים העצמיים של  $\hat{S}_z$ .

## תשובות סופיות:

(1) הוכחה.

# פיזיקה מודרנית קורס חלקי

פרק 11 - תרגילים ברמת מבחן

תוכן העניינים

1. שאלות חזרה קצרות בנושאים ספציפיים.....96
2. תרגילים בתורת הקוונטים..... (ללא ספר)

## שאלות חזרה קצרות בנושאים ספציפיים

### שאלות

#### 1 פוטואלקטרי 1


קבעו האם הטענה הבאה נכונה או לא נכונה.  
בניסוי פוטואלקטרי ככל שמגדילים את עוצמת האור כך גדל הזרם החשמלי (בהנחה שתדירות האור גדולה מספיק בשביל להביא לפליטה של האלקטרונים מהמתכת)

#### 2 פוטואלקטרי 2

בניסוי פוטואלקטרי המתכת שבקטודה היא אשלגן. אורך הגל המקסימאלי עבורו מודדים מתח באנודה הוא  $558 \text{ nm}$ .  
מהי האנרגיה הקינטית המקסימלית של האלקטרונים (ב-eV) עבור אור באורך גל של  $380 \text{ nm}$  ועוצמה ליחידת שטח של  $10^{-2} \frac{\text{W}}{\text{cm}^2}$ ?  
האם אנרגיה זו תגדל כאשר נגדיל את עוצמת האור?

#### 3 פוטואלקטרי 3

הגרפים הבאים מתארים תוצאות ניסוי פוטואלקטרי עבור מתכת זהה.



אילו מהטענות הבאות נכונה:

- גרף A בעל התדירות הכי גבוהה, גרף C בעל עוצמת האור הכי נמוכה.
- גרף B בעל אורך הגל הכי גבוה, גרף A בעל העוצמה הכי נמוכה.
- גרף C בעל אורך הגל הכי גבוהה, גרף B בעל העוצמה הכי גבוהה.
- גרף A בעל העוצמה הכי גבוהה, גרף B בעל אורך הגל הכי נמוך.

**4) אורך גל דה ברולי 1**

קבעו האם הטענה הבאה נכונה או לא נכונה.  
 לפי התורה הקלאסית (כלומר, ללא תיקונים של תורת היחסות) עבור כל חלקיק הנע במרחב, במהירות כלשהיא ביחס למערכת  $S$ , ניתן למצא מערכת ייחוס אחרת בה אורך הגל של החלקיק ישאף לאינסוף.

**5) אורך גל דה ברולי 2**

חלקיק חופשי בעל אנרגיה  $E$  ומטען  $q$  נכנס לאזור בו יש מתח  $V$ . מהו אורך גל דה ברולי של החלקיק ביציאתו מן האזור?

**6) אורך גל דה ברולי ויחסות 1**

ניתן לרשום את אורך גל דה ברולי של אלקטרון יחסותי באופן הבא:  

$$\lambda = \frac{\delta}{\sqrt{\gamma^2 - 1}} [\text{\AA}]$$
 כאשר  $\delta$  הוא קבוע חיובי חסר יחידות ו- $\gamma$  הוא פקטור לורנץ. מצאו את ערכו של הקבוע  $\delta$ . שימו לב שהנוסחה נותנת תוצאה באנגסטרומים!

**7) דה ברולי ויחסות 2**

לפוטון ואלקטרון יחסותי אורך גל זהה. האם התנע והאנרגיה שלהם זהים?

**8) אי וודאות 1**

קבעו אם הטענה הבאה נכונה:  
 ככל שזמן החיים של רמה מעורערת באטום גדול יותר אז החסם התחתון על אי הוודאות בתדירות הפוטון הנפלט (כאשר האלקטרון יורד לרמה נמוכה) קטן.

**9) אי וודאות 2**

זמן החיים למעבר בין הרמות  $2p$  ל- $1s$  באטום המימן הוא  $1.6 \cdot 10^{-9} s$ . מהו סדר הגודל של טווח התדירויות (או רוחב הקו) של הקרינה הנפלטת במעבר? רשמו את התשובה ללא חזקות של 10 תוך שימוש באחת מהיחידות הבאות:  $Hz$ ,  $KHz$ ,  $MHz$ ,  $GHz$ .

**10) משוואת שרדינגר 1**

קבעו אם הטענה הבאה נכונה:

אם  $\psi_1$  ו- $\psi_2$  מהווים פתרונות למשוואת שרדינגר, אזי גם  $\psi_3 = \frac{i}{5}\psi_1 + \frac{1}{\sqrt{10}}\psi_2$  מהווה פתרון למשוואה.

**11) משוואת שרדינגר 2**

האם הפונקציה  $\psi(x, y, z, t) = \frac{t}{xy}$  מהווה פתרון למשוואת שרדינגר:

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x, y, z, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \vec{\nabla}^2 \psi(x, y, z, t) + V(x, y, z, t) \psi(x, y, z, t)$$

**12) חלקיק חופשי**

האם ניתן לנרמל את משוואת הגל של חלקיק חופשי לא יחסותי (בעל מסה שונה מאפס) בקטע חצי אינסופי?

**13) בור פוטנציאל אינסופי**

חלקיק בעל מסה  $M$  נמצא בבור פוטנציאל אינסופי חד מימדי. מקטינים את רוחב הבור לאט מאוד, האם מהירות החלקיק תגדל, תקטן או לא תשתנה?

**14) ציור פונקציית גל**

חלקיק עובר מאזור בו הפוטנציאל הוא אפס לאזור בו הפוטנציאל קטן מאפס. האם אורך הגל שלו יגדל יקטן או לא ישתנה?

**15) אוסילטור הרמוני 1**

חלקיק נמצא תחת פוטנציאל הרמוני. האם המרווח בין שתי רמות אנרגיה קטן, גדל או לא משתנה ככל שהמספר הקוונטי  $n$  גדל?

**16) אוסילטור הרמוני 2**

חלקיק נמצא ברמת הייסוד של פוטנציאל הרמוני חד מימדי. מצאו את הביטוי להסתברות למצא את החלקיק מחוץ לתחום הקלאסי (אין צורך לפתור את האינטגרל בביטוי).

פונקציית הגל של מצב הייסוד היא  $\psi_1(x) = (\pi b^2)^{-\frac{1}{4}} e^{-\frac{x^2}{2b^2}}$ , כאשר  $b = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$ .

**17) פיזור**

חלקיק בעל אנרגיה  $E$  פוגע במדרגת פוטנציאל בגובה  $V_0 > E$  ורוחב אינסופי. האם מקדם ההחזרה גדול, קטן או שווה ל-1?

**18) אופרטורים 1**

קבעו האם הטענה הבאה נכונה או לא נכונה:  
 הערך העצמי של אופרטור הרמיטי חייב להיות מספר ממשי.

**(19) אופרטורים 2**

נתונים  $\psi_1$  ו- $\psi_2$  שהם שני מצבים עצמיים של אופרטור הרמיטי. האם גם  $\psi_1 + \psi_2$  הוא מצב עצמי של אותו אופרטור?

**(20) אופרטורים 3**

המצב הקוונטי של חלקיק נתון על ידי  $\psi = \alpha_1\phi_1 + \alpha_2\phi_2 + \alpha_3\phi_3$ , כאשר  $\phi_1, \phi_2, \phi_3$  מייצגים מצבים עצמיים של אופרטור התנע. מבצעים מדידה של התנע של החלקיק.

האם מיד לאחר המדידה החלקיק יכול להיות במצב  $\psi = \beta_1\phi_1 + \beta_2\phi_2$ , כאשר  $\beta_1, \beta_2$  הם קבועים השונים מאפס?

**(21) אופרטורים \*4**

האם האופרטור  $\hat{A} = \frac{\partial}{\partial x}$  יכול לייצג גודל פיזיקאלי מדיד?

**(22) המודל הקוונטי לאטום המימן 1**

האם לפי המודל הקוונטי לאטום המימן מרחק האלקטרון מהגרעין במצב הייסוד חייב להיות שווה לרדיוס בוהר?

**(23) המודל הקוונטי לאטום המימן 2**

האם המודל של בוהר נותן את הערך המדויק של התנ"ז באטום המימן?

**(24) המודל הקוונטי לאטום המימן 3**

גז של אטומי מימן נמצא ברמה  $4d$  ( $n=4, l=2$ ). כמה קווי פליטה נוכל לראות מהגז? ספרו את כל קווי הפליטה האפשריים עד שהאטומים מגיעים לרמת הייסוד.

**(25) המודל הקוונטי לאטום המימן 4**

אטום מימן נמצא במצב  $n=3, l=1$ . האם הזווית בין התנ"ז של האלקטרון לשדה המגנטי חיצוני יכולה להיות 135 מעלות?

**(26) המודל הקוונטי לאטום המימן 5**

מערכת מסוימת נמצאת במצב הקוונטי  $\psi(\theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{21}}(4Y_4^2 - Y_4^3 + 2Y_3^3)$ , כאשר

$Y_l^m$  הן הספריות ההרמוניות.

מה ההסתברות שבמידת גודלו של התנז יתקבל הערך  $\sqrt{20}\hbar$ ?

**(27) אפקט זימן 1**

מהו גודלו של השדה המגנטי הקבוע הדרוש על מנת שעבור אטום מימן הרמה  $(n = 5, l = 4, m = 3)$  תתלכד עם הרמה  $(n = 6, l = 2, m = -1)$ ? התעלמו מספין האלקטרון.

**(28) אפקט זימן 2**

כמה קווים ספקטרליים שונים ניתן לראות בעקבות מעברים באפקט זימן הנורמאלי?

**(29) אפקט זימן 3**

אטום דמוי מימן מורכב מאלקטרון אחד וגרעין בעל מסה  $3m_p$  ומטען  $5e$ . שמים את האטום באזור עם שדה מגנטי חיצוני אחיד שגודלו  $2 \cdot 10^4 T$ . מצאו את אורך הגל הקצר ביותר שיוכל להתקבל מהמעבר של האלקטרון מהמצב  $2p$  לרמת היסוד.

## תשובות סופיות

- (1) נכונה.
- (2)  $1.04\text{eV}$ , האנרגיה לא תשתנה.
- (3) ד
- (4) נכונה.
- (5)  $\frac{d}{\sqrt{2m(E+qv)}}$
- (6) 0.0243
- (7) לא
- (8) נכונה
- (9) 50MHz
- (10) נכונה
- (11) לא
- (12) לא
- (13) תגדל.
- (14) יקטן.
- (15) לא משתנה.
- (16)  $2 \int_b^\infty (\pi b^2)^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{x^2}{b^2}} dx$
- (17) שווה לאחד.
- (18) נכונה
- (19) לא, אלא אם  $\psi_1$  ו- $\psi_2$  הם מצבים מנוונים.
- (20) לא
- (21) לא
- (22) לא
- (23) לא
- (24) 5 מעברים.
- (25) הזווית אפשרית.
- (26)  $\frac{17}{21}$
- (27) 718 T
- (28) 3 קווים.
- (29) 48.4 אנגסטרום.