

# פיזיקה 1 מכניקה



## תוכן העניינים

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 1   | 1. מבוא מתמטי          |
| 18  | 2. וקטורים             |
| 41  | 3. קינמטיקה            |
| 61  | 4. תנועה יחסית         |
| 69  | 5. דינמיקה             |
| 87  | 6. תנועה מעגלית        |
| 104 | 7. קואורדינטות פולריות |
| 113 | 8. עבודה ואנרגיה       |
| 135 | 9. מתקף ותנע           |
| 153 | 10. מרכז מסה           |
| 164 | 11. מומנט התמד         |
| 168 | 12. מומנט כוח          |
| 177 | 13. תנע זוויתי         |
| 183 | 14. גוף קשיח           |
| 198 | 15. תנועה הרמונית      |
| 216 | 16. כבידה וכוח מרכזי   |
| 218 | 17. תרגילים ברמת מבחן  |

# פיזיקה 1 מכניקה

פרק 1 - מבוא מתמטי

תוכן העניינים

1. מעברי יחידות ..... 1
2. סינוס קוסינוס ומה שביניהם ..... 3
3. נגזרות ואינטגרלים בסיסיים ..... 7
4. אינטגרל כפול ומשולש ..... 13
5. קואורדינטות ואלמנטים דיפרנציאלים ..... 15
6. צפיפות ..... 16
7. צפיפות אינפיטיסימלית ..... 17

## מעברי יחידות:

### שאלות:

#### (1) דוגמה 1

נתון:  $A = 2\text{km}$ ,  $B = 10\text{gr}$ .

מצא את  $C = A \cdot B$  ביחידות של m.k.s.

#### (2) דוגמה 2

נתון:  $A = 2\text{m}^2$ ,  $B = 3\text{gr}$ ,  $C = 5\text{c.m} \cdot \text{s}$ .

חשב את הגדלים הבאים ביחידות של m.k.s:

א.  $D = 2 \cdot A$

ב.  $E = \frac{5 \cdot B \cdot C}{A}$

#### (3) מעבר יחידות בחזקות

מצא את הגדלים הבאים ביחידות של ס"מ:

א.  $A = 1\text{m}^2$

ב.  $B = 1\text{m}^3$

#### (4) סנטימטר בשלישית

הבע את הערכים הנ"ל ביחידות של  $\text{c.m}^3$ :

א.  $5.2\text{m}^3$

ב.  $320\text{mm}^3$

ג.  $0.0054\text{km}^3$

#### (5) ליטר, דוגמה

הבע את הגדלים הבאים ב-Liter:

א.  $5\text{m}^3$

ב.  $5\text{mm}^3$

## תשובות סופיות:

(1)  $20\text{m} \cdot \text{kg}$

(2) א.  $4\text{m}^2$

(3) א.  $10^4\text{cm}^2$

(4) א.  $5.2 \cdot 10^6\text{cm}^3$

(5) א.  $5 \cdot 10^3\text{Liter}$

ב.  $37.5 \cdot 10^{-5} \frac{\text{sec} \cdot \text{kg}}{\text{m}}$

ב.  $10^6\text{cm}^3$

ב.  $0.32\text{cm}^3$  ג.  $5.4 \cdot 10^{12}\text{cm}^3$

ב.  $5 \cdot 10^{-6}\text{Liter}$

## סינוס קוסינוס ומה שביניהם:

רקע

במשולש ישר זווית:


$$\sin \alpha = \frac{a}{c} = \frac{\text{ניצב שמול}}{\text{יתר}}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c} = \frac{\text{ניצב ליד}}{\text{יתר}}$$

$$\tan \alpha = \frac{a}{b} = \frac{\text{ניצב שמול}}{\text{ליד ניצב}}$$

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\cot \alpha = \frac{b}{a} = \frac{\text{ניצב ליד}}{\text{ניצב שמול}} = \frac{1}{\tan \alpha}$$



משפט פיתגורס:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

## זהויות:

|                                                                                                                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$<br>$\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$<br>$\tan(90^\circ - \alpha) = \cot \alpha$<br>$\cot(90^\circ - \alpha) = \tan \alpha$        | $90^\circ - \alpha$  |
| $\sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha$<br>$\cos(90^\circ + \alpha) = -\sin \alpha$<br>$\tan(90^\circ + \alpha) = -\cot \alpha$<br>$\cot(90^\circ + \alpha) = -\tan \alpha$     | $90^\circ + \alpha$  |
| $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$<br>$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$<br>$\tan(180^\circ - \alpha) = -\tan \alpha$<br>$\cot(180^\circ - \alpha) = -\cot \alpha$ | $180^\circ - \alpha$ |
| $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$<br>$\cos(-\alpha) = \cos \alpha$<br>$\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$<br>$\cot(-\alpha) = -\cot \alpha$                                             | $-\alpha$            |
| $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$<br>$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$                                        | $2\alpha$            |
| $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \sin \beta \cos \alpha$<br>$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$                    | $\alpha \pm \beta$   |

## סכום והפרש של פונקציות:

$$\sin \alpha \pm \sin \beta = 2 \sin \left( \frac{\alpha \pm \beta}{2} \right) \cos \left( \frac{\alpha \mp \beta}{2} \right)$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \left( \frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left( \frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = 2 \sin \left( \frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left( \frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

## ערכים ששווה לזכור:

| הזווית והפונקציה | $0^\circ$ | $30^\circ$           | $45^\circ$                                | $60^\circ$           | $90^\circ$ |
|------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------|
| $\sin \alpha$    | 0         | $\frac{1}{2}$        | $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1          |
| $\cos \alpha$    | 1         | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0          |
| $\tan \alpha$    | 0         | $\frac{1}{\sqrt{3}}$ | 1                                         | $\sqrt{3}$           | לא מוגדר   |

## פתרונות עבור:

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| $x_1 = \alpha + 2\pi k$<br>$x_2 = \pi - \alpha + 2\pi k$ | $\sin x = \sin \alpha$ |
| $x_1 = \alpha + 2\pi k$<br>$x_2 = -\alpha + 2\pi k$      | $\cos x = \cos \alpha$ |
| $x = \alpha + \pi k$                                     | $\tan x = \tan \alpha$ |

## שאלות:

## (1) דוגמה 1- חישוב אלפא

חשב את הזווית אלפא במקרים הבאים:



## (2) דוגמה 2- משולשים שמסורטטים אחרת

חשב את הזווית אלפא במקרים הבאים:



## (3) דוגמה 2- מציאת ניצבים



## תשובות סופיות:

- (1) א.  $\alpha = 22^\circ$  ב.  $\alpha = 53^\circ$  ג.  $\alpha = 69^\circ$   
 (2) א.  $\alpha = 45^\circ$  ב.  $\alpha = 60^\circ$  ג.  $\alpha = 68.2^\circ$  ד.  $\alpha = 55^\circ$   
 (3) א.  $\sqrt{3m}$  ב.  $2\sqrt{2m}$  ג.  $\frac{5\sqrt{3m}}{2}$  ד.  $1.53m$

## נגזרות ואינטגרלים בסיסיים:

### רקע

#### נגזרות:

הנגזרת נותנת את שיפוע המשיק לפונקציה בנקודה כלשהיא.

אם  $y$  היא פונקציה של  $x$  אז הסימון של הנגזרת של  $y$  לפי  $x$  הוא  $\frac{dy}{dx}$  או  $y'$ .

#### נגזרת של פולינום:

$$y(x) = x^n \rightarrow y'(x) = nx^{n-1}$$

#### כפל בקבוע אפשר להוציא מהנגזרת:

$$(Ay(x))' = Ay'(x)$$

#### נגזרת של מכפלה:

$$y(x) = f(x)g(x) \rightarrow y'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

#### כלל שרשרת:

אם  $y$  היא פונקציה של  $x$  ו- $x$  היא פונקציה של  $t$  אז:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$$

#### נגזרות של פונקציות נוספות:

$$\frac{d}{dx} \left( \frac{1}{x} \right) = -\frac{1}{x^2} ; \quad \frac{d}{dx} (\sin x) = \cos x ; \quad \frac{d}{dx} (\cos x) = -\sin x$$

$$\frac{d}{dx} (e^x) = e^x ; \quad \frac{d}{dx} (\ln(x)) = \frac{1}{x}$$

**אינטגרל:**

פעולה הפוכה לנגזרת.

**אינטגרל של פולינום**

$$\int Ax^n dx = A \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

אינטגרל לא מסוים, מוסיפים קבוע לתוצאת האינטגרל.

אינטגרל מסוים, מציבים גבולות בתוצאה של האינטגרל.

$$\int_a^b x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \Big|_a^b = \frac{b^{n+1}}{n+1} - \frac{a^{n+1}}{n+1}$$

**מה עושה האינטגרל?**

האינטגרל מבצע סכימה על ערכי הפונקציה.

האינטגרל נותן את השטח מתחת לגרף הפונקציה.

## שאלות:

## (1) דוגמה 1

חשב את הנגזרות הבאות:

א.  $y = 5x^4, \frac{dy}{dx} = ?$

ב.  $y = ax^5, \frac{dy}{dx} = ?$

ג.  $y = 5x + 2x^{18}, \frac{dy}{dx} = ?$

ד.  $f(x) = 8x^2 + 2, \frac{df}{dx} = ?$

ה.  $y = 6t^2, \frac{dy}{dt} = ?$

ו.  $x = 5t^3, \frac{dx}{dt} = ?$

ז.  $x = 5t^4 + t^3 + 4, \frac{dx}{dt} = ?$

ח.  $f(t) = At^6 + Bt + C, \frac{df}{dt} = ?$

## (2) דוגמה 2

חשב את הנגזרות הבאות:

א.  $y = (5x^4 + 2)(5x + 2x^{18}), \frac{dy}{dx} = ?$

ב.  $y = Ax^5(B + Cx^3), \frac{dy}{dx} = ?$

ג.  $y = 5x + 2x^2(4x + 5x^5), \frac{dy}{dx} = ?$

ד.  $y = (5t^2 + 1)(2t + 27 + 5t^3), \frac{dy}{dt} = ?$

ה.  $x = (2t^3 + 7)(4t + 3 + 6t^2), \frac{dx}{dt} = ?$

**(3) דוגמה 3-נגזרת פנימית**

חשב את הנגזרות הבאות :

א.  $y = (x+2)^4$  ,  $\frac{dy}{dx} = ?$

ב.  $y = 5(8x^2 + x)^5$  ,  $\frac{dy}{dx} = ?$

ג.  $y = 5t + 2(5t^4 + 4)^{14}$  ,  $\frac{dy}{dx} = ?$

ד.  $f(t) = 8(5t^4 + t^3 + 4)^2 + 2$  ,  $\frac{df}{dt} = ?$

**(4) דוגמה 4-כלל שרשרת**

חשב את הנגזרות הבאות :

א.  $y = (x+2)^4$  ,  $x = 2t$  ,  $\frac{dy}{dt} = ?$

ב.  $y = 5(8x^2 + x)^5$  ,  $x = 5t^4 + 4$  ,  $\frac{dy}{dt} = ?$

ג.  $y = 5x + 2(5x^4 + 4)^{14}$  ,  $x = 3t^2 + t$  ,  $\frac{dy}{dt} = ?$

ד.  $y = x^2$  ,  $x = t^2$  ,  $\frac{dy}{dt} = ?$

**(5) דוגמה 5-נגזרות של פונקציות נוספות**

מצאו את הנגזרות של הפונקציות הבאות :

א.  $y = \sin(ax)$  כאשר  $a$  קבוע.

ב.  $y = e^{-x^2}$

**(6) דוגמה 1-אינטגרלים בסיסיים**

חשב את האינטגרלים הבאים :

א.  $\int x^7 dx$

ב.  $\int x dx$

ג.  $\int dx$

ד.  $\int 3 dx$

ה.  $\int 7x^4 dx$

ו.  $\int (5x^2 + 3) dx$

$$\int (8x^7 + 5x) dx \quad \text{ז.}$$

$$\int Ax^7 dx \quad \text{ח.}$$

$$\int (Ax^7 + Bx) dx \quad \text{ט.}$$

**(7) דוגמה 2-אינטגרל מסוים**  
 חשב את האינטגרלים הבאים :

$$\int_0^2 x^5 dx \quad \text{א.}$$

$$\int_1^5 4dx \quad \text{ב.}$$

$$\int_{-1}^3 7x^4 dx \quad \text{ג.}$$

$$\int_0^4 (2x^2 + 4) dx \quad \text{ד.}$$

$$\int_{-1}^2 (Ax^7 + Bx) dx \quad \text{ה.}$$

**(8) דוגמה 3-אינטגרל של פונקציות נוספות**  
 חשב את האינטגרלים הבאים :

$$\int_0^\pi \sin x dx \quad \text{א.}$$

$$\int_0^\pi \cos(2x) dx \quad \text{ב.}$$

$$\int e^{3x} dx \quad \text{ג.}$$

$$\int_0^5 2e^{-3x} dx \quad \text{ד.}$$

$$\int_3^5 \frac{1}{x} dx \quad \text{ה.}$$

$$\int \frac{1}{x^2} dx \quad \text{ו.}$$

$$\int e^{ax} dx \quad \text{ז.}$$

## תשובות סופיות:

- (1) א.  $20x^3$  ב.  $5a \cdot x^4$  ג.  $5 + 36x^{17}$  ד.  $16x$  ה.  $12 \cdot t$   
ו.  $15t^2$  ז.  $20t^3 + 3t^2$  ח.  $6At^5 + B$
- (2) א.  $20x^3 \cdot (5x + 2x^{18}) + (5x^4 + 2)(5 + 36x^{17})$  ב.  $5Ax^4(B + Cx^3) + 3ACx^7$  ג.  $5 + 4x \cdot (4x + 5x^5) + 2x^2(4 + 25x^4)$   
ד.  $(10t)(2t + 27 + 5t^3) + (5t^2 + 1)(2 + 0 + 15t^2)$   
ה.  $(6t^2 + 0)(4t + 3 + 6t^2) + (2t^3 + 7)(4 + 0 + 12t)$
- (3) א.  $4(x + 2)^3 \cdot 1$  ב.  $25(8x^2 + x)^4(16x + 1)$  ג.  $5 + 560t^3(5t^4 + 4)^{13}$  ד.  $16(5t^4 + t^3 + 4)(20t^3 + 3t^2)$
- (4) א.  $8(2t + 2)^3$  ב.  $500t^3(8(5t^4 + 4)^2 + 5t^4 + 4) \cdot (16(5t^4 + 4) + 1)$  ג.  $(5 + 2 \cdot 14(5x^4 + 4)^{13} \cdot (5 \cdot 4x^3 + 0)) \cdot (3 + 2t + 1)$  ד.  $4t^3$
- (5) א.  $\cos(ax) \cdot a$  ב.  $e^{-x^2} \cdot (-2x)$
- (6) א.  $\frac{x^8}{8} + C$  ב.  $\frac{x^2}{2} + C$  ג.  $x + C$  ד.  $3x$  ה.  $\frac{7x^5}{5} + C$  ו.  $x^8 + \frac{5}{2}x^2 + C$  ז.  $A \cdot \frac{x^8}{8} + C$  ח.  $A \cdot \frac{x^8}{8} + B \cdot \frac{x^2}{2} + C$  ט.  $31.875A + 1.5B$
- (7) א.  $10.67$  ב.  $16$  ג.  $341.6$  ד.  $58.67$  ה.  $\ln\left(\frac{5}{3}\right)$
- (8) א.  $2$  ב.  $0$  ג.  $\frac{e^{3x}}{3} + C$  ד.  $\frac{2}{3}$  ה.  $\frac{e^{ax}}{a}$  ו.  $-\frac{1}{x} + C$

## אינטגרל כפול ומשולש:

### שאלות:

פתור את האינטגרלים הבאים:

- (1) אינטגרל משולש – דוגמה 1
 
$$\int_1^2 \int_0^2 \int_0^3 (zx^2 + 3y) dy dx dz$$
- (2) דוגמה 1
 
$$\int_0^3 \int_0^2 3 \cdot x^3 y^2 dx dy$$
- (3) דוגמה 2
 
$$\int_1^2 \int_0^3 (x^2 + 2y) dx dy$$
- (4) דוגמה 3
 
$$\int_0^2 \int_1^3 (x^2 + y) dy dx$$
- (5) דוגמה 4
 
$$\int_0^1 \int_0^2 x \cdot z^2 dx dz$$
- (6) דוגמה 5
 
$$\int_1^5 \int_0^4 2 \cdot y^3 dy dz$$
- (7) דוגמה 6
 
$$\int_0^{2\pi} \int_0^3 r^2 dr d\theta$$
- (8) דוגמה 7
 
$$\int_a^b \int_0^c 4 \cdot x^2 y dx dy$$
- (9) דוגמה 8
 
$$\int_a^b \int_0^c (4z + r^2) dr dz$$
- (10) דוגמה 9
 
$$\int_0^{2\pi} \int_0^R 4a \cdot r^2 dr d\theta$$
- (11) דוגמה 10
 
$$\int_0^{2\pi} \int_0^R 4yr^2 dr d\theta$$
- (12) דוגמה 11
 
$$\int_0^\pi \int_0^{2\pi} r^2 \sin \varphi d\theta d\varphi$$

### תשובות סופיות:

(1) 39

(2) 108

(3) 18

(4) 13.33

(5)  $\frac{2}{3}$

(6) 512

(7) 56.55

(8)  $\frac{4c^3}{3} \left( \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} \right)$

(9)  $2cb^2 + \frac{c^3}{3}b - 2ca^2 - \frac{a^3}{3}$

(10)  $\frac{4aR^3}{3} 2\pi$

(11)  $\frac{8\pi yR^3}{3}$

(12)  $4\pi r^2$

## קואורדינטות ואלמנטים דיפרנציאליים:

### שאלות:

#### (1) דוגמה-זווית בין וקטורים

נתונים שני וקטורי מיקום:

הוקטור הראשון,  $\vec{r}_1$ , נתון בקואורדינטות כדוריות כך ש:

$$r = 2m, \theta = 0^\circ, \varphi = 30^\circ$$

הוקטור השני,  $\vec{r}_2$ , נתון בקואורדינטות גליליות כך ש:

$$r = 1m, \theta = 120^\circ, z = 2m$$

א. חשב את אורכו של כל וקטור.

ב. חשב את הזווית בין הוקטורים.

#### (2) שטח מעגל

חשב שטח דיסקה בעלת רדיוס R (שטח מעגל) באמצעות אינטגרל על אלמנט שטח בקואורדינטות פולריות.

#### (3) חישוב נפח גליל

חשב נפח גליל באמצעות אינטגרל על אלמנט נפח בקואורדינטות גליליות.

### תשובות סופיות:

$$(1) \quad \text{א. } |\vec{r}_1| = 2m, |\vec{r}_2| = \sqrt{5}m \quad \text{ב. } \alpha = 48.5^\circ$$

$$(2) \quad S = \pi R^2$$

$$(3) \quad V = \pi R^2 h$$

## צפיפות:

### שאלות:

#### 1) דיסקה עם חור

- א. מצא את הצפיפות של דיסקה בעלת רדיוס  $R$  ומסה  $M$ ?
- ב. בדיסקה קדחו חור ברדיוס  $r$ .  
מצא את המסה שהוצאה מהדיסקה.

### תשובות סופיות:

$$1) \quad \text{א. } \frac{M}{\pi R^2} \quad \text{ב. } M \left( \frac{r}{R} \right)^2$$

## צפיפות אינפיטיסימלית:

### שאלות:

#### (1) מוט עם צפיפות לא אחידה

חשב את המסה הכוללת של מוט בעל אורך  $L$  וצפיפות מסה  $\lambda(x) = \lambda_0 \frac{x}{L}$  כאשר  $x$  הוא המרחק מהקצה השמאלי של המוט והפרמטרים:  $\lambda_0$ ,  $L$  הם קבועים.

### תשובות סופיות:

$$\frac{\lambda_0 L}{2} \quad (1)$$

# פיזיקה 1 מכניקה

## פרק 2 - וקטורים

### תוכן העניינים


|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 18 | 1. הגדרות ופעולות בסיסיות      |
| 22 | 2. מכפלה סקלרית                |
| 27 | 3. וקטור יחידה                 |
| 29 | 4. -----                       |
| 31 | 5. וקטור בשלושה מימדים         |
| 34 | 6. מכפלה וקטורית בשלושה מימדים |
| 38 | 7. וקטורים קולינריים           |
| 39 | 8. גרדיאנט ורוטור              |

## הגדרות ופעולות בסיסיות:

### רקע:

הצגת וקטור באמצעות גודל וכיוון נקראת הצגה פולרית.  
 הצגת וקטור באמצעות רכיבי ה- $x$  וה- $y$  נקראת הצגה קרטזית.

### פירוק וקטור לרכיבים:



היטל על ציר ה- $x$  או רכיב ה- $x$  של  $A$ :

$$A_x = |\vec{A}| \cos \theta$$

היטל על ציר ה- $y$  או רכיב ה- $y$  של  $A$ :

$$A_y = |\vec{A}| \sin \theta$$

$$\text{המעבר ההפוך: } |\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}, \quad \tan \theta = \frac{A_y}{A_x}$$

### כפל בסקלר:

$$\vec{B} = \alpha \vec{A} = \alpha (A_x, A_y) = (\alpha A_x, \alpha A_y)$$

## שאלות:

## (1) חיבור וחסור בקרטזי

נתונים שלושה וקטורים:  $\vec{A}(1,3)$ ,  $\vec{B}(4,2)$ ,  $\vec{C}(3,5)$ .

א. חשבו את:  $\vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$ .

ב. חשבו את:  $\vec{A} - \vec{B} - \vec{C}$ .

ג. חשבו את:  $2\vec{A} + 3\vec{B} - 4\vec{C}$ .

## (2) חיבור וקטורים בפולרי

נתונים שני וקטורים בהצגה הפולרית:

הוקטור  $\vec{A}$  שגודלו 10 והזווית שלו עם ציר ה- $x$  היא  $30^\circ$ .

הוקטור  $\vec{B}$  שגודלו 8 והזווית שלו עם ציר ה- $x$  היא  $60^\circ$ .

מצאו את  $\vec{A} + \vec{B}$ .

## (3) עוד חיבור בפולרי

נתונים שני וקטורים:

הוקטור  $\vec{A}$  שגודלו 10 וכיוונו  $30^\circ$ ,

הוקטור  $\vec{B}$  שגודלו לא ידוע וכיוונו  $350^\circ$ .

מהו גודלו של הוקטור  $\vec{B}$  אם נתון שסכום הוקטורים ייתן וקטור ללא


רכיב בציר ה- $y$ ?

## (4) משושה של וקטורים


שישה וקטורים בגודל  $L$  כל אחד יוצרים משושה שווה צלעות.

מצאו את הוקטור השקול (גודל וכיוון) בכל אחד מהמקרים הבאים:

א.



ב.



**(5) וקטור בין שתי נקודות**

הוקטור  $\vec{A}$  הוא וקטור מהנקודה  $(x_1, y_1, z_1)$  אל הנקודה  $(x_2, y_2, z_2)$ .  
רשום ביטוי לרכיבים של הוקטור ומצא את גודלו.

**(6) חיבור באמצעות מקבילית**

נתונים הוקטורים  $\vec{A}$  ו- $\vec{B}$ .

גודלו של  $A$  הוא 8 והזווית שלו עם ציר ה- $x$  החיובי היא:  $\theta_A = 130^\circ$ .

גודלו של הוקטור  $B$  הוא 4 והזווית שלו עם ציר ה- $x$  החיובי היא:  $\theta_B = 60^\circ$ .

שרטט את הוקטורים על מערכת צירים ומצא את  $\vec{A} + \vec{B}$  באמצעות שיטת המקבילית.

**(7) חיסור באמצעות מקבילית**

נתונים הוקטורים  $\vec{A}$  ו- $\vec{B}$ .

גודלו של  $A$  הוא 8 והזווית שלו עם ציר ה- $x$  החיובי היא  $\theta_A = 130^\circ$ .

גודלו של הוקטור  $B$  הוא 4 והזווית שלו עם ציר ה- $x$  החיובי היא  $\theta_B = 60^\circ$ .

שרטט את הוקטורים על מערכת צירים ומצא את  $\vec{A} - \vec{B}$  באמצעות שיטת המקבילית.

**(8) מציאת אורך של שקול**

אורכם של שני וקטורים הוא 5 ו-10 ס"מ.

הזווית ביניהם היא 30 מעלות.

מהו אורכו של הוקטור השקול שלהם (סכום הוקטורים)?

**(9) מציאת זווית בין שני וקטורים**

נתונים שני וקטורים שאורכם 10 ו-13 מטר.

אורך השקול שלהם הוא 20 מטר.

מצא את הזווית בין הוקטורים.

**תשובות סופיות:**

$$(1) \quad \text{א. } (8,10) \quad \text{ב. } (-6,-4) \quad \text{ג. } (2,-8)$$

$$(2) \quad (12.7, 11.9)$$

$$(3) \quad 28.8$$

$$(4) \quad L \cdot 4 \cos(30)$$

$$(5) \quad |\vec{A}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}, \quad \vec{A} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

$$(6) \quad C=10.1, \theta_c=108.1^\circ$$

$$(7) \quad C=7.62, \theta_c=159.5^\circ$$

$$(8) \quad |\vec{d}|=14.6 \text{ c.m}$$

$$(9) \quad \theta = 60^\circ$$

## מכפלה סקלרית:

### רקע:

שתי דרכים לביצוע המכפלה:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x \cdot B_x + A_y \cdot B_y$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cdot \cos \alpha$$

$\alpha$  - זווית בין הוקטורים.

### תכונות המכפלה:

- תוצאת המכפלה היא תמיד סקלר (ולא וקטור).

- מכפלה בין וקטורים מאונכים מתאפסת (זו דרך לבדוק האם וקטורים מאונכים)

- מכפלה סקלרית של וקטור בעצמו נותנת את גודל הוקטור בריבוע  $\vec{A} \cdot \vec{A} = |\vec{A}|^2$

- פתיחת סוגרים והעלאה בריבוע:

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \vec{C}$$

$$(\vec{A} + \vec{B})^2 = |\vec{A}|^2 + 2\vec{A} \cdot \vec{B} + |\vec{B}|^2$$

נוסחה למציאת זווית בין שני וקטורים:  $\cos \alpha = \frac{A_x B_x + A_y B_y}{|\vec{A}| \cdot |\vec{B}|} = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}| \cdot |\vec{B}|}$


### שאלות:

#### 1) דוגמה 1

מצא את תוצאת המכפלה הסקלרית בין הוקטורים הנתונים בכל המקרים הבאים:

א.  $\vec{A} = (-1, 2)$ ,  $\vec{B} = (2, 2)$

ב.



**(2) דוגמה 2**

בדוק עבור זוגות הוקטורים הבאים האם הם מאונכים :

א.  $\vec{A} = (1, 4)$  ,  $\vec{B} = (-2, 5)$

ב.  $\vec{A} = (1, 4)$  ,  $\vec{B} = (8, -2)$

ג.  $\vec{A} = (-1, -2)$  ,  $\vec{B} = (-2, 1)$

ד. שרטט כל זוג וקטורים מאונכים על מערכת צירים, חשב את זוויות הוקטורים עם הצירים והראה שהזווית בין הוקטורים היא אכן  $90^\circ$ .

**(3) דוגמה 3**

נתונים הוקטורים הבאים :  $\vec{A} = (-3, 1)$  ,  $\vec{B} = (2, -4)$

א. מצא את תוצאת המכפלה הסקלרית באמצעות ההצגות הקרטזיות הנתונות.

ב. מצא את הגודל והזווית של כל וקטור.

ג. מצא את המכפלה הסקלרית שוב, הפעם באמצעות הנוסחה של מכפלת הגדלים בקוסינוס הזווית. בדוק כי התוצאה זהה לסעיף א'.

**(4) דוגמה 4**

נתונים הוקטורים הבאים :  $\vec{A} = (-3, 1)$  ,  $\vec{B} = (2, -4)$

א. הראה כי החישוב של  $\vec{A} \cdot \vec{B}$  זהה לחישוב  $\vec{B} \cdot \vec{A}$ .

ב. הוכח בצורה כללית כי המכפלה הסקלרית היא פעולה קומוטטיבית. (הדרכה : רשום את הוקטורים בצורה כללית עם נעלמים).

**(5) דוגמה 5**

נתונים הוקטורים הבאים :  $\vec{A} = (2, 1)$  ,  $\vec{B} = (-3, 2)$  ,  $\vec{C} = (1, -3)$

חשב את :

א.  $\vec{A} \cdot \vec{C}$

ב.  $(\vec{A} + \vec{B}) \cdot \vec{C}$

ג.  $\vec{A} \cdot \vec{C} + \vec{B} \cdot \vec{C}$

ד.  $(\vec{A} \cdot \vec{B}) \cdot \vec{C}$

ה.  $\vec{A} \cdot (\vec{B} \cdot \vec{C})$

ו.  $(\vec{A} \cdot \vec{B}) \cdot \vec{B}$

ז.  $(\vec{A} \cdot \vec{B}) \cdot (\vec{B} \cdot \vec{C})$

**(6) דוגמה 6**

נתונים הוקטורים הבאים:  $\vec{A} = (-2, 2)$ ,  $\vec{B} = (1, -3)$ ,  $\vec{C} = (1, 5)$

חשב את:

א.  $\frac{(\vec{A} \cdot \vec{B}) \vec{B}}{|\vec{B}|^2}$

ב.  $\frac{(\vec{B} \cdot \vec{C}) \vec{C}}{|\vec{C}|^2}$

**(7) דוגמה 7**

נתונים הוקטורים הבאים:  $\vec{A} = (-2, 2)$ ,  $\vec{B} = (1, -3)$ ,  $\vec{C} = (1, 5)$

מצא את הזווית בין  $\vec{A}$  ל- $\vec{B}$  לבין  $\vec{B}$  ל- $\vec{C}$ .


**(8) פירמידה משוכללת\***

באיור מתוארת פירמידה משוכללת שבסיסה ריבוע בעל אורך צלע  $a$  וגובהה  $H = 2a$ . נקודה 3 באיור נמצאת באמצע הצלע שבין הפינה לקודקוד. נגדיר שני ווקטורים:

הווקטור  $\vec{A}$  יוצא מנקודה 1 לנקודה 2.

הווקטור  $\vec{B}$  יוצא מנקודה 1 לנקודה 3.

מהי הזווית בין שני הווקטורים?




**(9) היטלים של וקטורים בתוך תיבה**

נתונה תיבה בעלת אורך צלעות:  $a$ ,  $3a$  ו- $4a$ . נגדיר שני וקטורים:  $\vec{A}$  ו- $\vec{B}$  כמתואר באיור.

א. מהו היחס בין ההיטל של  $\vec{A}$  על הכיוון של  $\vec{B}$  (נסמנו -  $A_B$ ) להיטל של  $\vec{B}$


על הכיוון של  $\vec{A}$  (נסמנו -  $B_A$ ),  $\frac{A_B}{B_A}$  ?

ב. חשבו את הזווית בין  $\vec{A}$  ל- $\vec{B}$ .


**(10) היטל של אלכסון על אלכסון בקובייה**



נתונה קובייה בעלת אורך צלע  $a$ , ראו איור.

מהו ההיטל של הווקטור המצביע מפינה 1 לפינה 4 על הציר המוגדר על ידי הכיוון מפינה 3 לפינה 2.



## תשובות סופיות:

- (1) א.  $\vec{A} \cdot \vec{B} = 2$       ב.  $\vec{C} \cdot \vec{D} = -5.13$
- (2) א.  $\vec{A}$  לא מאונך ל- $\vec{B}$       ב. הוקטורים מאונכים.      ג. הוקטורים מאונכים.



הזוויות:  $\theta_A = 75.96^\circ$ ,  $\theta_B = 14.04^\circ$       הזוויות:  $\theta_A = 26.57^\circ$ ,  $\theta_B = 26.57^\circ$

(3) א.  $\vec{A} \cdot \vec{B} = -10$       ב.  $|\vec{B}| = \sqrt{20}$ ,  $\theta_B = -63.43^\circ$ ,  $|\vec{A}| = \sqrt{10}$ ,  $\theta_A = 161.57^\circ$

ג.  $\vec{A} \cdot \vec{B} = -10$

(4) א. שאלת הוכחה.      ב. שאלת הוכחה.

(5) א.  $\vec{A} \cdot \vec{C} = -1$       ב.  $(\vec{A} + \vec{B}) \cdot \vec{C} = -10$       ג.  $\vec{A} \cdot \vec{C} + \vec{B} \cdot \vec{C} = -10$

ד.  $(\vec{A} \cdot \vec{B}) \cdot \vec{C} = (-4, 12)$       ה.  $\vec{A} \cdot (\vec{B} \cdot \vec{C}) = (-18, -9)$       ו.  $(\vec{A} \cdot \vec{B}) \cdot \vec{B} = (12, -8)$

ז.  $(\vec{A} \cdot \vec{B}) \cdot (\vec{B} \cdot \vec{C}) = 36$

(6) א.  $\frac{(\vec{A} \cdot \vec{B}) \vec{B}}{|\vec{B}|^2} = \left( \frac{-8}{10}, \frac{24}{10} \right)$       ב.  $\frac{(\vec{B} \cdot \vec{C}) \vec{C}}{|\vec{C}|^2} = (-0.54, -2.69)$

(7)  $\alpha_{\vec{BC}} = 150.26^\circ$ ,  $\alpha_{\vec{AB}} = 153.43^\circ$

(8)  $59^\circ$

(9) א.  $\frac{\sqrt{10}}{5}$       ב.  $40.6^\circ$

(10)  $-\frac{a}{\sqrt{3}}$

## וקטור יחידה:

רקע:

$$\hat{A} = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|}$$


שאלות:

### 1) דוגמה וקטור יחידה

מצא וקטורי יחידה בכיוון של הוקטורים הבאים:

א.  $\vec{A} = (-2, -3)$

ב.  $\vec{B} = (3, 4)$



### 2) הטלת וקטור יחידה על וקטור יחידה

נתון הוקטור  $\vec{A}$  שבשרטוט.

א. מהו היטל הוקטור על ציר ה- $x$  (וקטור יחידה)?

ב. מהו היטל הוקטור על ציר ה- $y$  (וקטור יחידה)?

ג. הסבר כיצד מחשבים היטל הוקטור על הוקטור  $\vec{B}(2,1)$ .

ד. הסבר במילים את משמעות ההטלה של וקטור על וקטור.

### 3) וקטור בזמן

נתון הוקטור  $\vec{A}(t)$  במישור דו מימדי כך ש-  $|\vec{A}(t)| = A_0 \sin(t)$

ו-  $\theta(t) = t$  כאשר  $t \in [0, \pi]$  ו-  $A_0$  קבוע.

א. מצא את הרכיבים הקרטזיים של  $\vec{A}(t)$  כתלות בזמן.

ב. מצא את  $\frac{d\vec{A}}{dt}$ .

ג. מצא את  $\frac{d|\vec{A}|}{dt}$ .

**תשובות סופיות:**

$$(1) \quad \hat{A} = (-0.55, -0.83) \text{ א. } \hat{B} = (0.6, 0.8) \text{ ב.}$$

$$(2) \quad \dot{\hat{A}}_x = (4, 0) \text{ א. } \dot{\hat{A}}_y = (0, 3) \text{ ב. ג. ראה סרטון}$$

$$(3) \quad \hat{A}_x(t) = \frac{1}{2} A_0 \sin 2t, \hat{A}_y(t) = A_0 \sin^2 t \text{ א. } A_0 (\cos 2t\hat{x} + \sin 2t\hat{y}) \text{ ב. ג. } -\sin t\hat{x} + \cos t\hat{y}$$

## מכפלה וקטורית בדרך מימד:

**רקע:**

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_x B_y - A_y B_x) \hat{z}$$

**הערות:**

התוצאה של המכפלה הוקטורית היא תמיד וקטור (בניגוד לסקלרית).

נוסחה נוספת לגודל של המכפלה הוקטורית:

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \sin \alpha$$

$\alpha$  - זווית הקטנה בין  $\vec{A}$  ל-  $\vec{B}$ .

**שאלות:**


### (1) דוגמה-מכפלה וקטורית

נתונים הוקטורים הבאים:  $\vec{A} = (-4, 1)$ ,  $\vec{B} = (2, -3)$

א. חשב את  $\vec{A} \times \vec{B}$  באמצעות ההצגות הקרטזיות הנתונות. מהו גודל המכפלה?

ב. מצא את הגודל והזווית של כל וקטור.

ג. חשב את  $|\vec{A} \times \vec{B}|$  שוב, הפעם באמצעות הנוסחה של מכפלת הגדלים בסינוס הזווית. (בדוק כי התוצאה זהה לסעיף א).



### (2) מכפלה סקלרית ווקטורית בפולרי

נתונה מערכת צירים כבשרטוט.

נתונים שני וקטורים:

גודל 10, זווית  $20^\circ$  -  $\vec{A}$

גודל 15, זווית  $60^\circ$  -  $\vec{B}$

א. חשב  $A \cdot B$  (מכפלה סקלרית).

ב. חשב  $A \times B$  (מכפלה וקטורית).

ג. הסבר מדוע המכפלה הוקטורית נותנת את שטח המקבילית שיוצרים הווקטורים.

### תשובות סופיות:


$$(1) \quad \text{א. } \vec{A} \times \vec{B} = 10\hat{z} \text{ וכן } |\vec{A} \times \vec{B}| = 10.$$

$$\text{ב. } |\vec{B}| = \sqrt{13}, \theta_B = -56.31^\circ, |\vec{A}| = \sqrt{17}, \theta_A = 165.96^\circ, \text{ ג. } |\vec{A} \times \vec{B}| = 10$$

$$(2) \quad \text{א. } \vec{A} \cdot \vec{B} = 150 \cdot \cos(40) \quad \text{ב. } \vec{A} \times \vec{B} = -150 \cdot \sin(40) \cdot \hat{z} \quad \text{ג. ראה סרטון.}$$

## וקטור בשלושה מימדים:

רקע:



$$0 \leq \varphi \leq \pi$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi$$

מציאת גודל הוקטור:  $|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$

פירוק לרכיבים:

$$A_z = |\vec{A}| \cos \varphi$$

$$A_{xy} = |\vec{A}| \sin \varphi$$

$$A_x = |\vec{A}| \sin \varphi \cos \theta$$

$$A_y = |\vec{A}| \sin \varphi \sin \theta$$

## שאלות:

## (1) חישוב וקטור יחידה

נתון הוקטור:  $\vec{A}(2,3,4)$ .

א. מהו גודלו של הוקטור?

ב. מהו וקטור היחידה של הוקטור  $\vec{A}$ ?

## (2) חישוב גודל זווית בקרטזי

נתונים שני וקטורים:  $\vec{A}(1,5,10)$ ,  $\vec{B}(3,4,5)$ .

א. מהו גודלו של כל וקטור?

ב. מהי הזווית בין שני הוקטורים?

## (3) מציאת שקול וזווית עם הצירים

שני כוחות נתונים פועלים על גוף:  $\vec{A}(1,4,5)$ ,  $\vec{B}(3,6,7)$ .

א. מהו הכוח השקול?

ב. מהו גודלו של הכוח השקול?

ג. מהי הזווית בין הכוח השקול ובין כל אחד מהצירים?

## (4) וקטור בזווית 30° עם ציר Y - ספיר אפיק מעבר

אילו מהווקטורים הבאים נמצא בזווית של 30° מציר y?

$$\vec{A} = \left( \frac{1}{3}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \quad \vec{B} = \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}, 1 \right) \quad \vec{C} = \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{3}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$


## (5) היטל של A על 150 מעלות מציר y

נתון הוקטור:  $\vec{A} = \hat{x} + \sqrt{3}\hat{y} + 6\hat{z}$ .מהו ההיטל של הוקטור  $\vec{A}$  על ציר  $\hat{n}$ 

הנמצא במישור y-z וכיוונו החיובי

מסובב בזווית של 150° מציר y נגד

כיוון השעון?



**(6) שהסכום מאונך להפרש**

הוכח- אם סכום של שני וקטורים מאונך להפרשם אזי אורכם שווה.

**(7) מציאת וקטור מאונך**

נתונים 2 וקטורים:  $\vec{A}(1,4,8)$ ,  $\vec{B}(B_x, B_y, 0)$

מצא את מרכיבי וקטור B אם נתון כי הוא ניצב לוקטור A וגודלו 10.

**תשובות סופיות:**

$$(1) \quad \text{א. } |A| = \sqrt{29} \quad \text{ב. } \hat{A} = \left( \frac{2}{\sqrt{29}}, \frac{3}{\sqrt{29}}, \frac{4}{\sqrt{29}} \right)$$

$$(2) \quad \text{א. } |\vec{A}| = \sqrt{126}, |\vec{B}| = \sqrt{50} \quad \text{ב. } \alpha = 23^\circ$$

$$(3) \quad \text{א. } \vec{C} = (4, 10, 12) \quad \text{ב. } |C| = \sqrt{260} \quad \text{ג. } \alpha = 75.63, \beta = 51.67, \gamma = 41.90$$

(4) הוקטור C.

(5) 1.5

(6) שאלת הוכחה.

$$(7) \quad \vec{B} = \left( -4\sqrt{\frac{100}{17}}, \sqrt{\frac{100}{17}}, 0 \right)$$

## מכפלה וקטורית בשלושה מימדים:

רקע:

שתי דרכים לביצוע המכפלה:

דרך 1 – דטרמיננטה:


$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

דרך 2 – לפי גודל וכיוון בנפרד:

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}||\vec{B}|\sin \alpha$$

גודל המכפלה -

כיוון לפי כלל יד ימין -



יש כמה דרכים לבצע את הכלל, אם מחליפים אצבעות לכל שלושת הוקטורים הכלל נשאר נכון (אם מחליפים מקום רק לשני וקטורים – טעות).

דרך נוספת לכלל יד ימין נקראת כלל הבורג



מסובבים את האצבעות מ- $\vec{A}$  ל- $\vec{B}$  והתוצאה בכיוון האגודל.

## שאלות:


## (1) דוגמה - דטרמיננטה

נתונים הוקטורים הבאים :

$$\vec{A}(-1,2,-2), \quad \vec{B}(2,0,1)$$


חשבו את  $\vec{A} \times \vec{B}$ .

## (2) דוגמה - כלל יד ימין

מצאו את  $\vec{A} \times \vec{B}$  במקרים הבאים :




## (3) דוגמה - מערכות צירים

בדקו האם המערכות הבאות הן ימניות או שמאליות :



**(4) דוגמה - כלל הבורג**

מצאו את  $\vec{A} \times \vec{B}$  באמצעות כלל הבורג:

**(5) מקבילון**

נתונים הוקטורים הבאים:  $\vec{a} = 2\hat{x} - 3\hat{y} + \hat{z}$ ,  $\vec{b} = \hat{x} + 2\hat{y} - \hat{z}$ ,  $\vec{c} = 2\hat{x} - \hat{y}$

מרכיבים מהוקטורים  $\vec{a}$  ו- $\vec{b}$  מקבילית ובוחרים את ראשית הצירים בקודקוד המקבילית (הנח כל היחידות בס"מ).

א. מצאו את מיקומו של הקודקוד שמול הקודקוד שבראשית הצירים.

ב. מצאו את אורכי האלכסונים של המקבילית.

ג. מצאו את שטח המקבילית.

ד. יוצרים מקבילון על ידי הוספת הוקטור  $\vec{c}$  למקבילית.

חשבו את גובה המקבילון המאונך למקבילית.

רמז: השתמש ב- $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$ .

## תשובות סופיות:

(1)  $2\hat{x} - 3\hat{y} - 4\hat{z}$

(2) א. לתוך הדף

(3) א. שמאלית

(4) א. לתוך הדף

(5) א.  $\vec{r}_1 = (3, -1, 0)$

ד.  $\tilde{h} = 0.13c.m$



ב. למעלה

ב. שמאלית

ב. למעלה

ב.  $|\vec{r}_1| = \sqrt{10}$  ,  $|\vec{r}_2| = \sqrt{30}$

ג.  $|\vec{a} \times \vec{b}| = \sqrt{59}c.m^2$



## וקטורים קולינריים:

### רקע:

וקטורים מקבילים ומתקיים הקשר  $\vec{B} = \alpha \vec{A}$  כאשר  $\alpha$  סקלר כלשהו.

### שאלות:

#### (1) וקטורים קולינאריים

עבור אילו ערכים של  $\alpha$  ו- $\beta$  הוקטורים הבאים קולינאריים (מצביעים באותו כיוון)?

$$\vec{A} = 3\hat{i} + a\hat{j} + 5\hat{k}$$

$$\vec{B} = -2\hat{i} + a\hat{j} - 2\beta\hat{k}$$

#### (2) מציאת וקטורים מאונכים

נתונים הוקטורים הבאים:  $\vec{A}(A_x, 4)$ ,  $\vec{B}(6, B_y)$ ,  $\vec{C}(5, 8)$ .

מצא את ערכי הוקטורים כך שהוקטור A והוקטור B יהיו מאונכים לוקטור C. האם שני הוקטורים שמצאת מקבילים?

### תשובות סופיות:

$$\alpha = -\frac{9}{2}, \beta = \frac{5}{3} \quad (1)$$

$$\vec{A} = \left(-\frac{32}{5}, 4\right), \vec{B} = \left(6, -\frac{30}{8}\right) \quad (2)$$

## גרדיאנט ורוטור:

### רקע:

#### גרדיאנט בקואורדינטות השונות:

$$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z} : \text{גרדיאנט בקואורדינטות קרטזיות}$$

$$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z} : \text{גרדיאנט בקואורדינטות גליליות}$$

$$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r \sin \varphi} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \hat{\varphi} : (*) \text{ גרדיאנט בקואורדינטות כדוריות}$$

(\*) שימו לב שהזווית  $\varphi$  היא עם ציר ה- $z$  והזווית  $\theta$  עם ציר ה- $x$ .

#### רוטור (Rot/Curl) בקואורדינטות השונות:

בקרטזיות:

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = \left( \frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \hat{x} - \left( \frac{\partial F_z}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial z} \right) \hat{y} + \left( \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \hat{z}$$

בגליליות:

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \left( \frac{1}{r} \frac{\partial F_z}{\partial \theta} - \frac{\partial F_\theta}{\partial z} \right) \hat{r} + \left( \frac{\partial F_r}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial r} \right) \hat{\theta} + \frac{1}{r} \left( \frac{\partial(r F_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial F_r}{\partial \theta} \right) \hat{z}$$

בכדוריות (\*):

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \times \vec{F} = & \frac{1}{r \sin \varphi} \left( \frac{\partial}{\partial \varphi} (F_\theta \sin \varphi) - \frac{\partial F_\varphi}{\partial \theta} \right) \hat{r} + \frac{1}{r} \left( \frac{\partial}{\partial r} (r F_\varphi) - \frac{\partial F_r}{\partial \varphi} \right) \hat{\theta} \\ & + \frac{1}{r} \left( \frac{1}{\sin \varphi} \frac{\partial F_r}{\partial \theta} - \frac{\partial}{\partial r} (r \cdot F_\theta) \right) \hat{\varphi} \end{aligned}$$

(\*) שימו לב שהזווית  $\varphi$  היא עם ציר ה- $z$  והזווית  $\theta$  עם ציר ה- $x$ .

## שאלות:

## (1) חישוב גרדיאנט

$$f(\vec{r}) = f(x, y, z) = \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}} : f \text{ נתונה פונקציית המיקום}$$

חשב את הגרדיאנט של הפונקציה  $f$ .

## (2) חישוב השיפוע בכיוון השונה

חשב את גודל השיפוע של הפונקציה  $f(x, y) = 2x^2y$  בנקודה  $(1, 2)$

$$\hat{n} = \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) : \text{בכיוון}$$

## תשובות סופיות:

$$\vec{D}f = \frac{-xz\hat{x} - yz\hat{y} + (x^2 + y^2)\hat{z}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (1)$$

$$\vec{\nabla}f \cdot \hat{n} = \frac{8}{\sqrt{2}} + -\frac{2}{\sqrt{2}} \quad (2)$$

# פיזיקה 1 מכניקה

פרק 3 - קינמטיקה

תוכן העניינים

1. תנועה בקו ישר (מימד אחד) ..... 41
2. תנועה במישור וזריקה משופעת (בליסטיקה) ..... 52
3. משוואת מסלול ..... 56
4. תרגילים נוספים ..... 57

## תנועה בקו ישר (מימד אחד):

רקע:

הגדרות:

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = \dot{x} \text{ - מהירות רגעית}$$

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} \text{ - מהירות ממוצעת}$$

$$a = \frac{dv}{dt} = \dot{v} = \frac{d^2x}{dt^2} = \ddot{x} \text{ - תאוצה רגעית}$$

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i} \text{ - תאוצה ממוצעת}$$

קשרים הפוכים:

$$x(t) = \int v(t) dt$$

$$v(t) = \int a(t) dt$$

את האינטגרל אפשר לעשות לא מסוים (בלי גבולות) ואז צריך להוסיף קבוע או מסוים (עם גבולות)

מיקום ומהירות כתלות בזמן בתאוצה קבועה:

$$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v(t) = v_0 + at$$

שטח מתחת לגרף הפונקציה:

- השטח מתחת לגרף הפונקציה של המהירות (כתלות בזמן) שווה להעתק (כאשר שטח מתח לציר הזמן מחושב כשלילי, אם מחשבים אותו כחיובי אז מקבלים את הדרך)

- השטח מתחת לגרף של התאוצה (כתלות בזמן) הוא שינוי המהירות (שטח מתחת לציר הזמן מחושב כשלילי)

## שאלות:

## (1) דני ודנה רצים זה לקראת זה


- דני ודנה רצים זה לקראת זה.  
 שניהם מתחילים לרוץ ממנוחה.  
 דני רץ בתאוצה של  $0.5$  מטר לשנייה בריבוע ודנה בתאוצה של  $1$  מטר לשנייה בריבוע.  
 המרחק ההתחלתי ביניהם הוא  $50$  מטר.  
 א. מתי והיכן יפגשו דני ודנה?  
 ב. מה מהירות כל אחד מהם ברגע המפגש?

## (2) דני שכח את הפלאפון

- דני רץ בקו ישר במהירות קבועה שגודלה  $14$  מטר לשנייה.  
 ברגע מסוים מבחין יוסי כי דני שכח את הפלאפון שלו.  
 באותו הרגע נמצא דני כבר במרחק של  $64$  מטר מיוסי.  
 יוסי מתחיל לרוץ אחר דני ממנוחה בתאוצה קבועה של  $8$  מטר לשנייה בריבוע.  
 א. מצא ביטוי למהירות כתלות בזמן עבור דני ויוסי.  
 שרטט גרפים עבור שני הביטויים שמצאת על אותה מערכת צירים.  
 ב. מתי מהירותו של יוסי שווה לזו של דני? האם הוא משיג את דני ברגע זה?  
 ג. מצא ביטוי למיקום כתלות בזמן עבור דני ויוסי.  
 שרטט גרפים עבור שני הביטויים שמצאת על אותה מערכת צירים.  
 ד. מתי ישיג יוסי את דני? כמה מרחק עבר יוסי עד אז?

## (3) גרף של מהירות אופנוע בזמן


- בגרף הבא נתונה מהירותו של אופנוע כתלות בזמן. האופנוע נע על קו ישר.  
 קבע את ראשית הצירים במיקום ההתחלתי של האופנוע.



- א. תאר את סוג התנועה של האופנוע בכל אחד מקטעי התנועה.  
 ב. מצא את תאוצת האופנוע כתלות בזמן.  
 ג. מהי מהירות האופנוע ברגעים:  $t = 15, 40, 55$ ?  
 ד. מצא את מיקום האופנוע באותם רגעים של סעיף ג'.

#### 4) גרף מהירויות של שני גופים


בגרף הבא מתוארות המהירויות של שני גופים כתלות בזמן. הנח ששני הגופים נעים לאורך קו ישר ויוצאים מהראשית.



- א. תאר את תנועתו של כל גוף.
- ב. רשום נוסחת מקום זמן לכל גוף.
- ג. מצא את המרחק בין הגופים ברגעים:  $t = 3s$ ,  $24s$  וציין מי מקדים את מי.
- ד. מתי מהירויות שני הגופים שוות?
- ה. מתי מיקום שני הגופים זהה?

#### 5) תרגיל עם הכל

- הגרף הבא מתאר את מהירותו של גוף הנע בקו ישר. הנח שהגוף מתחיל את תנועתו מהראשית. הגוף נע במשך 10 שניות ונעצר.
- א. תאר את התנועה של הגוף במילים.
  - ב. שרטט גרף של התאוצה כתלות בזמן של הגוף.
  - ג. מתי נמצא הגוף במרחק הגדול ביותר (בכיוון החיובי) מהראשית? מהו מרחק זה?
  - ד. מהו המרחק הכולל שעבר הגוף?
  - ה. מהו ההעתק הכולל שעשה הגוף?
  - ו. מהי המהירות הממוצעת של הגוף בתנועה?
  - ז. מהו מרחק הגוף מהראשית ב-  $t = 6s$ ?
  - ח. מתי נמצא הגוף במרחק 12 מטרים מהראשית?
  - ט. שרטט גרף של מיקומו של הגוף כתלות בזמן, אין צורך לסמן ערכים בציר האנכי של הגרף.



**(6) תפוח עץ**

- תפוח נופל מעץ בגובה 15 מטרים.  
 (הנח שהתפוח נופל ממנוחה והזנח את התנגדות האוויר).  
 א. מצא את המהירות בה יפגע התפוח בקרקע.  
 ב. מצא את המהירות בה יפגע התפוח בראשו של ניטון היושב מתחת לעץ.  
 הנח שגובה הראש של ניטון בישיבה הוא אחד מטר.

**(7) חסידה מביאה חבילה**

- חסידה מרחפת במנוחה באוויר ומפילה חבילה מגובה של 320 מטרים.  
 א. מצא את ההעתק שמבצעת החבילה בשנייה הרביעית של תנועתה.  
 ב. מצא את ההעתק שמבצעת החבילה בשנייה האחרונה של תנועתה.

**(8) דני זורק כדור מחלון גבוה**

- דני זורק כדור כלפי מעלה מחלון בביתו הנמצא בגובה 105 מטרים מעל הקרקע (בניין גבוה). מהירות הכדור ישר אחרי הזריקה היא 20 מטר לשנייה.  
 סמן את כיוון הציר החיובי כלפי מעלה ואת ראשית הצירים בנקודת הזריקה.  
 א. רשום נוסחאות מקום זמן ומהירות זמן עבור הכדור.  
 ב. הכן טבלה ורשום בטבלה את הערכים של המיקום והמהירות ב-6 השניות הראשונות.  
 ג. צייר את מיקום הכדור בכל שנייה ב-6 השניות.  
 ד. מתי יפגע הכדור בקרקע?  
 ה. חזור על סעיפים א' ו-ד' במקרה שבו ראשית הצירים בקרקע.

**(9) גוף נזרק אנכית מגג בניין**

- גוף נזרק אנכית כלפי מעלה מגג בניין שגובהו 40 מטר.  
 מהירותו ההתחלתית של הגוף היא 30 מטר לשנייה.  
 בחר ציר  $y$  שראשיתו בקרקע וכיוונו החיובי כלפי מעלה.  
 א. רשום את פונקציית המקום-זמן, מהירות-זמן ותאוצה-זמן של הגוף.  
 ב. ערוך טבלה של מהירותו ומיקומו בזמנים:  $t = 0, 1, 2, 3, 4, 5 \text{ sec}$ .  
 ג. שרטט גרפים עבור שלושת הפונקציות שחישבת בסעיף א'.

**(10) כדור נזרק מלמעלה וגוף נזרק מלמטה**

- כדור נזרק כלפי מטה מראש בניין שגובהו 80 מטר.  
מהירותו ההתחלתית של הכדור היא 15 מטר לשנייה.  
באותו הרגע נזרק גוף שני מתחתית הבניין כלפי מעלה.  
מהירותו ההתחלתית של הגוף השני היא 40 מטר לשנייה.  
א. רשום נוסחת מקום-זמן עבור כל גוף.  
ב. האם הגוף השני יעבור את גובה הבניין?  
ג. היכן ביחס לרצפת הבניין יחלפו הגופים אחד ליד השני?  
ד. רשום נוסחת מהירות-זמן לכל גוף.  
ה. מה תהיה מהירות כל גוף ברגע המפגש?  
ו. מהי מהירות הפגיעה בקרקע של כל גוף?  
ז. שרטט גרף מהירות-זמן וגרף מיקום זמן לכל גוף.

**(11) מהירות כנגזרת של פולינום**

- גוף נע בקו ישר ומיקומו כתלות בזמן נתון לפי:  $x(t) = 2t^3 - 12t + 30$   
כאשר הזמן בשניות והמיקום במטרים.  
א. מצאו את המהירות כתלות בזמן.  
ב. מתי הגוף נעצר?

**(12) תנועה בקו ישר, מהירות כנגזרת**

- מיקומו של גוף הנע בקו ישר נתון לפי:  $x(t) = 32te^{-t}$   
א. מצא את הזמן בו הגוף נעצר.  
ב. מצא את מרחק הגוף ברגע זה מהראשית.

**(13) תנועה בקו ישר, מהירות כנגזרת ותאוצה**

- גוף נע בקו ישר ומיקומו כתלות בזמן נתון לפי:  $x(t) = -2t^3 + 6t + 3$   
כאשר הזמן בשניות והמיקום במטרים.  
א. מצאו את המהירות כתלות בזמן ואת הרגע בו הגוף נעצר.  
ב. מהו המרחק המקסימאלי אליו הגיע הגוף?  
ג. מהי תאוצת הגוף?

**(14) תאוצה מפוצלת**

גוף נקודתי מתחיל לנוע ממנוחה ונע בקו ישר.

$$a(t) = \begin{cases} t \left[ \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} \right], & 0 \leq t \leq 3[\text{sec}] \\ 5 - t \left[ \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} \right], & 3 < t[\text{sec}] \end{cases}$$

תאוצת הגוף תלויה בזמן ונתונה לפי:

תנועת הגוף נמשכת עד לרגע בו הוא עוצר.

- מהי מהירות הגוף בזמן?
- מהי המהירות המרבית של הגוף במהלך התנועה?
- מתי עוצר הגוף?
- איזה מרחק (העתק) הוא עובר עד לעצירה?

**(15) מהירות מינימלית**

גוף נע בקו ישר ומיקומו כתלות בזמן נתון לפי:  $x(t) = \alpha t^3 - \beta t^2 + \gamma t$ .  
כל היחידות סטנדרטיות (מיקום במטר וזמן בשניות).

- מהן היחידות של  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ?
- מהו מיקום הגוף ב- $t = 0$ ?
- מצאו את המהירות ההתחלתית של הגוף.
- מצאו מהי התאוצה ההתחלתית של הגוף.
- חשבו את המהירות המינימלית של הגוף כפונקציה של הקבועים  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ .  
בבעיה ומצאו מה התנאי שצריכים למלא הקבועים על מנת שאכן תהיה מהירות מינימלית.

**(16) ילד זורק כדור בקפיצה\***

ילד מנסה לזרוק כדור לתקרה של הכיתה אך אינו מצליח להגיע עד לתקרה.  
המורה לפיזיקה שהבחין בניסיונותיו של הילד הציע לו שיזרוק את הכדור תוך כדי קפיצה בכיוון מעלה.

- האם המורה צודק? לאיזה גובה יגיע הכדור אם הילד קופץ ומיד זורק את הכדור כלפי מעלה? הניחו שמהירות הקפיצה של הילד היא  $v_1$  ומהירות הזריקה של הכדור  $v_2$  ביחס לילד היא אותו הדבר.  
הניחו שזריקת הכדור לא משפיעה על הילד.
- בטאו את ההעתק של הילד ושל הכדור כפונקציה של הזמן בו הילד זורק את הכדור.

**(17) זמן מינימלי לסיים מסלול\***

מכונית יכולה להאיץ מאפס ל-100 קמ"ש תוך 10 שניות, כאשר ניתן להניח שקצב ההאצה קבוע. אותה מכונית יכולה לבלום בקצב של 0.5g. מהו הזמן המינימלי לעבור מסלול של 3 ק"מ אם המכונית מתחילה ממנוחה ומסיימת בעצירה מוחלטת? (רמז: השתמש בגרף מהירות זמן).

**(18) כמה זמן הרכבת נסעה במהירות קבועה\***

רכבת יוצאת מיישוב א' אל יישוב ב'. בשליש הראשון של הדרך הרכבת מאיצה בתאוצה קבועה. בשליש השני של הדרך הרכבת נוסעת במהירות קבועה. בשליש האחרון של הדרך הרכבת מאטה בקצב קבוע עד לעצירתה ביישוב ב'. זמן הנסיעה הכולל הוא T. כמה זמן נסעה הרכבת במהירות קבועה?


**(19) אדם משחרר כדור מתוך מעלית\***

מעלית עולה מגובה הקרקע במהירות קבועה. בזמן  $T_1$ , אדם הנמצא במעלית משחרר כדור מתוך המעלית דרך חור שברצפת המעלית. הכדור מגיע לקרקע כעבור  $T_2$  שניות. מצאו את גובה המעלית h בזמן  $T_1$ . נתונים  $T_1$  ו-  $T_2$ .

## תשובות סופיות:


1. א. הזמן:  $t = 8.16 \text{ sec}$ , המיקום:  $16.65 \text{ m}$ .

ב.  $V_{\text{Dana}}(t = 8.16) = -8.16 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ ,  $V_{\text{Dani}}(t = 8.16) = 4.08 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ .



2. א. דני -  $V(t) = 14 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ , יוסי -  $V(t) = 8t$ . גרף:

ב.  $t = 1.75 \text{ sec}$ , לא.



ג. דני -  $x(t) = 64 + 14t$ , יוסי -  $x(t) = 4t^2$ . גרף:

ד. ב-  $t = 6.12$ , המרחק:  $149.82 \text{ m}$ .

3. א. כאשר  $0 \leq t \leq 20$  (חלק I), התאוצה חיובית וקבועה, והמיקום הולך וגדל.  
כאשר  $20 \leq t \leq 50$  (חלק II), המהירות קבועה (אין תאוצה) והמיקום גדל.  
כאשר  $50 \leq t \leq 60$  (חלק III), התאוצה קבועה ושלילית והמיקום הולך וגדל.

$$a = \begin{cases} 2 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} & 0 < t < 20 \\ 0 & 20 < t < 50 \\ -4 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} & 50 < t < 60 \end{cases} \quad \text{ב.}$$

ג.  $V(t = 15) = 30 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ ,  $V(t = 40) = 40 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ ,  $V(t = 55) = 20 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ .

ד.  $x(t = 15) = 225 \text{ m}$ ,  $x(t = 40) = 1,200 \text{ m}$ ,  $x(t = 55) = 1,750 \text{ m}$ .

4. א. גוף א': תנועה בתאוצה קבועה, האצה. ההתקדמות בכיוון חיובי.

גוף ב': כאשר  $0 < t < 8$ , כמו גוף א'. כאשר  $8 \leq t$ ,

תנועה במהירות קבועה בכיוון חיובי.


ב. גוף א':  $\frac{2}{3}t^2$ , גוף ב': כאשר  $0 \leq t \leq 8$ , כמו גוף א'.

כאשר  $8 \leq t \leq \infty$ ,  $x(t) = 96 + 24(t - 8)$ .

ג. כש-  $\Delta x(t = 3) = 7.5 \text{ m}$ , וכש-  $\Delta x(t = 24) = 96 \text{ m}$ . גוף ב' מקדים את א'.


ד.  $t = 18 \text{ sec}$  ה. כש-  $t = 31.42 \text{ sec}$ .

- 5) א. כאשר  $0 \leq t \leq 3$  (חלק I), תאוצה קבועה, האצה והתקדמות בכיוון החיובי.  
כאשר  $3 \leq t \leq 5$  (חלק II), תנועה במהירות קבועה, התקדמות בכיוון החיובי.  
כאשר  $5 \leq t \leq 9$  (חלק III), תאוצה קבועה שלילית.  
תאוצה עד אשר המהירות מתאפסת, ואז מתחילה האצה בכיוון הנגדי.  
התקדמות בכיוון החיובי עד שהמהירות מתאפסת ואז מתחילים לחזור בכיוון הנגדי.  
כאשר  $9 \leq t \leq 10$ , תאוצה קבועה חיובית, תאוצה. התקדמות בכיוון הנגדי.



גרף:  $a = \begin{cases} 2 \frac{m}{sec^2} & 0 < t < 3 \\ 0 & 3 < t < 5 \\ -2.5 \frac{m}{sec^2} & 5 < t < 9 \\ 4 \frac{m}{sec^2} & 9 < t < 10 \end{cases}$  ב.

- ג. בזמן: 7.4 sec, המרחק: 28.2 m. ד.  $S = 33.4 m$ . ה.  $\Delta x = 23 m$ . ו.  $\bar{V} = 2.3 \frac{m}{sec}$ . ז.  $\Delta x = x(t=6) = 25.75 m$ . ח.  $t = 3.5 sec$ .




6) א.  $17.32 \frac{m}{sec}$  ב.  $V_F \approx 16.73$

7) א. 80 m ב.  $40 \frac{m}{sec}$

8) א. מקום-זמן:  $y(t) = 20t - 5t^2$ ,  $V(t) = 20 - 10t$

- ב. ג. ד. 7 sec



| זמן (שניות) | מיקום (מטר) | מהירות (מטר לשנייה) |
|-------------|-------------|---------------------|
| 1           | 15          | 10                  |
| 2           | 20          | 0                   |
| 3           | 15          | -10                 |
| 4           | 0           | -20                 |
| 5           | -25         | -30                 |
| 6           | -60         | -40                 |

ה. (א) מקום-זמן:  $y(t) = 105 + 20t - 5t^2$ . מהירות-זמן:  $V(t) = 20 - 10t$

(ד) 7 sec

9 א. מקום-זמן:  $y(t) = 40 + 30t - 5t^2$ , מהירות-זמן:  $v(t) = 30 - 10t$ ,

תאוצה-זמן:  $a = -10$


ב.

| זמן<br>(שניות) | מקום<br>(מטר) | מהירות<br>(מטר לשנייה) |
|----------------|---------------|------------------------|
| 0              | 40            | 30                     |
| 1              | 65            | 20                     |
| 2              | 80            | 10                     |
| 3              | 85            | 0                      |
| 4              | 80            | -10                    |
| 5              | 65            | -20                    |


תאוצה-זמן:



מהירות-זמן:



ג. מקום-זמן:




10 א. גוף 1 - כדור:  $y_1(t) = 80 + (-15)t - 5t^2$ , גוף 2 - ריבוע:  $y_2(t) = 40t - 5t^2$ .

ב. יגיע בדיוק לגובהו. ג. 47.74m. ד. גוף 1:  $v_1(t) = -15 - 10t$


גוף 2:  $v_2(t) = 40 - 10t$  גוף 1:  $-29.6 \frac{m}{sec}$ , גוף 2:  $25.4 \frac{m}{sec}$

ו. גוף 1:  $-42.72 \frac{m}{sec}$ , גוף 2:  $-40 \frac{m}{sec}$

מהירות-זמן:



ז. מיקום-זמן: (גוף 1 בכחול, גוף 2 בירוק)



11 א.  $v = 6t^2 - 12$  ב.  $t = \sqrt{2} \text{ sec}$

12 א.  $t = 1 \text{ sec}$  ב.  $x(t=1) = \frac{32}{e}$

13 א.  $t = 1 \text{ sec}$ ,  $v(t) = -6t^2 + 6$  ב.  $X_{\max} = 7 \text{ m}$  ג.  $a = -12t$

$$V(t) = \begin{cases} \frac{t^2}{2} \left( \frac{\text{m}}{\text{sec}} \right) & 0 \leq t \leq 3 \\ \left( 5t - \frac{t^2}{2} - 6 \right) \left( \frac{\text{m}}{\text{sec}} \right) & 3 \leq t \end{cases} \quad \text{א. (14)}$$

$$V_{\max} = 6.5 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \quad \text{ב.}$$

$$\Delta x \approx 31.79 \text{m} \quad \text{ד.} \quad t_2 \approx 8.61 \quad \text{ג.}$$

$$[\alpha] = \frac{\text{m}}{\text{sec}^3}, [\beta] = \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}, [\gamma] = \frac{\text{m}}{\text{sec}} \quad \text{א. (15)}$$

$$\text{ב. } 0$$

$$\gamma \quad \text{ג.}$$

$$-2\beta \quad \text{ד.} \quad -\frac{\beta^2}{3\alpha} + \gamma, \quad \alpha > 0 \quad \text{ה.}$$

$$\frac{(v_1 + v_2)^2}{2g} \quad \text{א. (16)} \quad \text{המורה צודק} \quad \text{ב. ילד: } \frac{v_1^2}{2g}, \quad \text{כדור: } \frac{(v_1 + v_2)^2}{2g} - v_2 t_0$$

$$T \approx 58 \text{sec} \quad \text{(17)}$$

$$t_2 = \frac{T}{5} \quad \text{(18)}$$

$$h = \frac{gT_2^2}{2 \left( 1 + \frac{T_2}{T_1} \right)} \quad \text{(19)}$$

## תנועה במישור וזריקה משופעת:

### רקע:

וקטור המיקום -  $\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$ .

וקטור ההעתק -  $\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ .

וקטור המהירות הממוצעת (velocity) -  $\bar{\vec{v}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$ .

וקטור המהירות הרגעית (velocity) -  $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ .

וקטור התאוצה הממוצעת -  $\bar{\vec{a}} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$ .


וקטור התאוצה הרגעית -  $\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt}$ .

גודל המהירות (Speed) -  $|\vec{v}| = \frac{dS}{dt}$ , כאשר S זה הדרך.

## שאלות:

## (1) דוגמה - דן יורה חץ על עץ

דן יורה חץ מגובה של 2 מטרים לעבר עץ הנמצא במרחק של 8 מטרים. מהירות היציאה של החץ מהקשת היא 30 מטר לשנייה. מצא באיזה גובה יפגע החץ בעץ אם הזווית שבה יורה דן את החץ היא 15 מעלות?



## (2) כדור מתגלגל מגג משופע

כדור מתגלגל מגג בניין משופע. הכדור מתחיל תנועתו ממנוחה מגובה של 2 מטרים מקצה הגג. שיפוע הגג הוא 30 מעלות מתחת לאופק. נתון כי תאוצת הכדור בכיוון תנועתו על הגג היא 5 מטרים לשנייה בריבוע. גובה קצה הגג מעל הקרקע הוא 6 מטרים. מצא את המרחק האופקי מקצה הגג בו יפגע הכדור בקרקע.

## (3) תנועת כדור עם רוח נגדית

כדור נבעט מהקרקע במהירות של 20 מטרים לשנייה ובזווית של 45 מעלות מהקרקע. רוח נגדית גורמת לכדור תאוצה בכיוון האופקי של 2 מטרים לשנייה בריבוע (בנוסף לתאוצת הכובד).

- מצא את מיקום הכדור ומהירותו ב-  $t = 2 \text{ sec}$ .
- מהו המרחק בו פוגע הכדור בקרקע?
- מהו הגובה המקסימאלי אליו הגיע הכדור?
- מהו המרחק האופקי המקסימאלי אליו הגיע הכדור?

## (4) מסירה בפוטבול

במשחק הפוטבול הרכז האחורי זורק כדור בזווית של 45 מעלות ביחס לקרקע ובמהירות של 30 מטרים לשנייה. שחקן הקבוצה הנמצא 15 מטרים קדימה מהרכז האחורי רץ במהירות של 5 מטרים לשנייה. השחקן רואה את הכדור ומתחיל להאיץ בתאוצה קבועה. מהי התאוצה הדרושה לשחקן כך שיוכל לתפוס את הכדור בדיוק בגובה בו הוא נזרק? האם סימן התאוצה יכול להיות שלילי? מה המשמעות של תאוצה זו?

**(5) דוגמה מהירות ממוצעת**

מיקומו של גוף כתלות בזמן הוא:  $\vec{r}(t) = 3t^2x + (2t+1)y$ . מצא את המהירות הממוצעת ב-5 השניות הראשונות של התנועה.

**(6) דוגמה - מהירות רגעית**

מיקומו של גוף כתלות בזמן הוא:  $\vec{r}(t) = 3t^3x + (4t-5)y$ .  
 א. מצא את מהירות הגוף כתלות בזמן.  
 ב. מהי מהירות הגוף ב- $t = 2$ ?

**(7) דוגמה - תאוצה**

מהירותו של גוף כתלות בזמן היא:  $\vec{v}(t) = 2t^3x + (6t-5)y$ .  
 א. מצא את תאוצת הגוף כתלות בזמן.  
 ב. מהי התאוצה הממוצעת בחמש השניות הראשונות של התנועה?

**(8) דרך והעתק**

מיקומו של גוף לפי הזמן נתון לפי:  $\vec{r}(t) = 2t^3x + (t^3-2)y$ .  
 א. מצא את המהירות הרגעית (velocity) והתאוצה הרגעית כפונקציה של הזמן.  
 ב. מצא את גודל המהירות (speed) כתלות בזמן.  
 ג. מצא את הדרך שעשה הגוף בחמש השניות הראשונות.  
 ד. מצא את המהירות הממוצעת (average velocity) ב-5 השניות הראשונות של התנועה.  
 ה. מצא את ה-speed הממוצע של הגוף בחמש השניות הראשונות.

## תשובות סופיות:

(1)  $3.78\text{m}$

(2)  $4.49\text{m}$

(3) א.  $V_x = 10.14 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ ,  $V_y = -5.86 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ ,  $x = 24.28\text{m}$ ,  $y = 8.28\text{m}$  ב.  $32.01\text{m}$

ג.  $10\text{m}$  ד.  $x_{\max} = 32.01$

(4)  $a = 5.99 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$ , יכול לצאת שלילי, המשמעות שהשחקן צריך להאט בשביל להגיע לנקודה הזאת בדיוק יחד עם הכדור.

(5)  $\vec{V} = (15, 2)$

(6) א.  $\vec{V} = 9t^2\hat{x} + 4\hat{y}$  ב.  $\vec{V}(t=2) = (36, 4)$

(7) א.  $\vec{a}(t) = 6t^2\hat{x} + 6\hat{y}$  ב.  $\vec{a} = 50\hat{x} + 6\hat{y}$

(8) א.  $\vec{V}_{(t)} = 6t^2\hat{x} + 3t^2\hat{y}$  ב.  $|\vec{V}| = \sqrt{45}t^2$  ג.  $S \approx 279.5\text{m}$

ד.  $\vec{V} = 50\hat{x} + 25\hat{y}$  ה.  $|\vec{V}| \approx 55.9 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$

## משוואת מסלול:

### רקע:

משוואת מסלול היא פונקציה מהצורה  $y(x)$ , סרטוט של הפונקציה הוא המסלול של הגוף במישור. ניתן למצא את המשוואה באמצעות בידוד משתנה הזמן מהפונקציה  $x(t)$  והצבה ב  $y(t)$ .

### שאלות:

#### 1) דוגמה-משוואת מסלול

מצא את משוואת המסלול ושרטט את המסלול על מערכת צירים עבור

$$x(t) = \sqrt{3+t^2}, \quad y(t) = \sqrt{7-t^2}$$


הנח ש-  $x$  ו-  $y$  תמיד חיוביים.

#### 2) זריקה משופעת על מישור משופע

איתי עומד על מישור משופע בעל שיפוע  $m$ , איתי זורק כדור לכיוון מורד המישור במהירות התחלתית  $v_0$  ובזווית  $\theta$  ביחס לאופק.

א. מצא מה המרחק מאיתי שבו יפגע הכדור? (התעלם מהגובה של איתי).

ב. מהי הזווית  $\theta$  עבורה מרחק זה יהיה מקסימאלי?



### תשובות סופיות:



$$y(x) = \sqrt{10 - x^2} \quad (1)$$

$$\tan 2\theta = \frac{1}{m} \quad \text{ב.}$$

$$x = \frac{2v_0^2 \cos^2 \theta (\tan \theta + m)}{g} \quad \text{א.}$$

## תרגילים נוספים:

### שאלות:

#### (1) גודל מהירות מינימלי

וקטור המיקום של גוף מסוים כתלות בזמן נתון על ידי:  $\vec{r}(t) = 2t^2\hat{i} - 6j + (t-5)^2k$ .

א. מהו וקטור המהירות של הגוף כתלות בזמן?

ב. מהו וקטור התאוצה של הגוף כתלות בזמן?

ג. מתי גודל מהירות הגוף מינימלי?

ד. מהו וקטור המיקום כאשר גודל מהירותו הוא:  $\sqrt{160} \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ ?

#### (2) וקטורים בזריקה משופעת

גוף נזרק מראשית הצירים במהירות התחלתית  $v_0$  ובזווית  $\theta$  ביחס לציר ה- $x$ .

א. מצאו את וקטור המיקום של הגוף כתלות בזמן.

ב. מצאו את וקטור המהירות והתאוצה של הגוף כתלות בזמן.

ג. חשבו את הזווית בין וקטור המהירות לוקטור התאוצה כתלות בזמן.

#### (3) וקטור מיקום ומסלול

וקטור המיקום של גוף הנע במישור  $xy$  נתון לפי:  $\hat{r}(t) = A \sin(\omega t)\hat{x} + B \cos(\omega t)\hat{y}$ .

א. מצאו את וקטור המהירות והתאוצה של הגוף.

ב. חשבו את הזווית בין וקטור המהירות לוקטור התאוצה ב- $t=0$ .

ג. הראו שוקטור התאוצה ווקטור המיקום הפוכים בכיוון.

ד. מצאו את מסלול התנועה של הגוף, כלומר את  $y(x)$ .

#### (4) וקטור מיקום ומסלול עם זמן בריבוע

וקטור המיקום של גוף הנע במישור  $x-y$  נתון לפי:  $\vec{r}(t) = A \sin(\alpha t^2)\hat{x} + B \cos(\alpha t^2)\hat{y}$ .

א. מצאו את וקטור המהירות והתאוצה של הגוף.

ב. מצאו את מסלול התנועה של הגוף, כלומר את  $y(x)$ .

ג. מה ההבדל בין המסלול בתרגיל זה לבין המסלול בתרגיל הקודם?

**(5) רובין הוד יורה ותופס חץ**

רובין הוד יורה חץ במהירות  $v_0$  וזווית  $\theta$  ביחס לקרקע.  
ברגע שחרור החץ מתחיל רובין הוד לרוץ בקו ישר ובתאוצה  $a(t) = Ae^{-kt}$ .  
רובין הוד רוצה לתפוס את החץ ברגע פגיעתו בקרקע.  
מצאו משוואה עם הפרמטרים  $A$ ,  $\theta$ ,  $v_0$  והמשתנה  $k$  ממנה ניתן לחלץ את  $k$  כך שרובין יצליח לתפוס את החץ. אין צורך לפתור את המשוואה.

**(6) תנועה במעגל\***

גוף נקודתי נע במישור אופקי  $xy$ .

בזמן  $t=0$  מהירות הגוף הייתה:  $\vec{v}(0) = 15\pi \hat{i} \frac{\text{m}}{\text{sec}}$  יחד עם וקטור המצב:  $\vec{r}(0) = 5\hat{j}\text{m}$ .

תאוצת הגוף כפונקציית זמן החל מרגע זה היא:

$$\vec{a}(t) = -45\pi^2 \sin(3\pi t) \hat{i} - 45\pi^2 \cos(3\pi t) \hat{j} \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$$

- מצא את וקטור המהירות של הגוף בזמן.
- מצא את וקטור המצב של הגוף בזמן.
- מצא את הזווית בין וקטור המצב לוקטור התאוצה בזמן.
- מצא את משוואת המסלול של הגוף.

**(7) תנועה על אליפסה\***

מיקום של גוף נקודתי נתון במשוואה:  $\vec{r} = 4\sin(\pi t) \hat{i} + 3\cos(\pi t) \hat{j}$ .

(המיקום במטרים, הזמן בשניות).

- מצא את משוואת המסלול של הגוף.
- מצא את רגעי הזמן שבהם המהירות ורדיוס הוקטור מאונכים.
- מצא את תאוצת התנועה והראה שהיא מכוונת כלי ראשית הצירים.

$$\text{ד. מצא באיזה רגעי זמן גודל התאוצה הוא: } \frac{v^2}{r}.$$

- חשבו את המרחק המינימלי של הגוף מראשית הצירים.  
כמה פעמים, במשך מחזור תנועה אחד, מגיע הגוף למרחק מינימלי מהראשית?

**(8) מהירות לפי גזירה תרגיל פשוט**

נתון וקטור  $r$  של חלקיק מסוים:  $\vec{r} = (8t, -5t^2)$ .

- מהו רכיב ה- $x$  של הווקטור בזמן?
- מהו רכיב ה- $y$  של הווקטור בזמן?
- מהי מהירותו בציר  $x$ ?
- מהי מהירותו בציר  $y$ ?
- האם מהירויות אלו קבועות בזמן?
- מהו מרחק החלקיק מהראשית לאחר שעברו 3 שניות?

**(9) גזירת מיקום למציאת מהירות**

מיקומו של חלקיק נתון ע"י הווקטור  $r$ :  $\vec{r} = 5\sin(\pi t), 4t^3 + t^2, 8e^t$ .

- מצאו את ווקטור המהירות כפונקציה של הזמן.
- מהי מהירות החלקיק ב- $t = 2$ ?

**(10) העתק לפי גזירה**

וקטור  $r$  מתאר מיקומו של חלקיק בזמן:  $\vec{r} = (5t, 10 + t^2)$ .

- מהו מיקום החלקיק בזמן  $t = 0$ ?
- מהו מיקום החלקיק בזמן  $t = 5$ ?
- מהו ההעתק בחמש השניות הראשונות?
- מהי מהירות החלקיק בזמן  $t = 5$  (בהצגת גודל וכיוון)?

## תשובות סופיות:

$$(1) \quad \vec{v} = \dot{\vec{r}} = 4t\hat{i} + 2(t-5)\hat{k} \quad \text{א.} \quad \vec{a} = \dot{\vec{v}} = 4\hat{i} + 2\hat{k} \quad \text{ב.} \quad t_{\min} = 1\text{sec} \quad \text{ג.}$$

$$\vec{r}(t_1) = 18\hat{i} - 6\hat{j} + 4\hat{k} \quad \text{ד.}$$

$$(2) \quad \vec{r}(t) = v_0 \cos \theta \cdot t \hat{x} + (v_0 \sin \theta \cdot t - 5t^2) \hat{y} \quad \text{א.} \quad \vec{v} = v_0 \cos \theta \hat{x} + (v_0 \sin \theta - 10t) \hat{y} \quad \text{ב.}$$

$$\cos \alpha = \frac{10t - v_0 \sin \theta}{\sqrt{(v_0 \cos \theta)^2 + (v_0 \sin \theta - 10t)^2}} \quad \text{ג.}$$

$$(3) \quad \vec{v} = \omega A \cos(\omega t) \hat{x} - \omega B \sin(\omega t) \hat{y}, \quad \vec{a} = -\omega^2 A \sin(\omega t) \hat{x} - \omega^2 B \cos(\omega t) \hat{y} \quad \text{א.}$$

$$\left(\frac{y}{B}\right)^2 + \left(\frac{x}{A}\right)^2 = 1 \quad \text{ד.} \quad \text{ג. הוכחה.} \quad 90^\circ \quad \text{ב.}$$

$$(4) \quad \vec{v} = A \cos(\alpha t^2) 2\alpha t \cdot \hat{x} - B \sin(\alpha t^2) (2\alpha t) \hat{y} \quad \text{א.}$$

$$\vec{a} = \left[ -A \sin(\alpha t^2) (2\alpha t)^2 + 2\alpha A \cos(\alpha t^2) \right] \hat{x} - \left[ B \cos(\alpha t^2) (2\alpha t)^2 + 2\alpha B \sin(\alpha t^2) \right] \hat{y}$$

$$\left(\frac{y}{B}\right)^2 + \left(\frac{x}{A}\right)^2 = 1 \quad \text{ב.} \quad \text{ג. אין הבדל}$$

$$(5) \quad \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} = \frac{A}{k} \frac{2v_0 \sin \theta}{g} + \frac{A}{k^2} \left( e^{-k \frac{2v_0 \sin \theta}{g}} - 1 \right)$$

$$(6) \quad \vec{r}(t) = 5 \sin(3\pi t) \hat{i} + 5 \cos(3\pi t) \hat{j} \quad \text{ב.} \quad \vec{v}(t=0) = 15\pi \cos(3\pi t) \hat{i} - 15\pi \sin(3\pi t) \hat{j} \quad \text{א.}$$

$$x^2 + y^2 = 25 \quad \text{ד.} \quad \alpha = 180^\circ \quad \text{ג.}$$

$$(7) \quad \left(\frac{x}{4}\right)^2 + \left(\frac{y}{3}\right)^2 = 1 \quad \text{א.} \quad t_1 = 0, t_2 = 1, t_3 = \frac{1}{2}, t_4 = \frac{3}{2} \quad \text{ב.}$$

$$\vec{a} = \dot{\vec{v}} = -4\pi^2 \sin(\pi t) \hat{i} - 3\pi^2 \cos(\pi t) \hat{j} \quad \text{ג.}$$

$$\text{ה. } |\vec{r}|(t=1) = 3, \text{ פעמיים.} \quad t_1 = \frac{1}{4} \text{sec}, t_2 = \frac{5}{4} \text{sec}, t_3 = \frac{3}{4} \text{sec}, t_4 = \frac{7}{4} \text{sec} \quad \text{ד.}$$

$$(8) \quad r_x = 8t \quad \text{א.} \quad r_y = -5t^2 \quad \text{ב.} \quad v_x = \dot{r}_x = 8 \quad \text{ג.} \quad v_y = \dot{r}_y = -10t \quad \text{ד.}$$

ה. המהירות על  $x$  קבועה בזמן, המהירות על  $y$  לא קבועה בזמן.

$$|r_{t=3}| = \sqrt{2601} \quad \text{ו.}$$

$$(9) \quad \vec{v} = \dot{\vec{r}} = 5\pi \cos(\pi t), 12t^2 + 2t, 8e^t \quad \text{א.}$$

$$\vec{v}_{t=2} = 5\pi \cos(2\pi), 4.2^3 + 2^2, 8e^2 = 5\pi, 36, 8e^2 \quad \text{ב.}$$

$$(10) \quad \vec{r}_{t=0} = (0, 10) \quad \text{א.} \quad \vec{r}_{t=5} = (25, 35) \quad \text{ב.} \quad |\vec{r}_{t=5} - \vec{r}_{t=0}| = \sqrt{1250} \quad \text{ג.}$$

$$|\vec{v}_{(t=5)}| = \sqrt{125} \quad \text{ד.}$$

# פיזיקה 1 מכניקה

פרק 4 - תנועה יחסית

תוכן העניינים

1. הסבר על טרנספורמציית גלילי ..... 61
2. שיטה שניה-פתרון באמצעות תרשימי וקטורים ..... 66
3. מהירות יחסית בכיוון הצופה (מד לייזר) ..... 68

## טרנספורמציית גליליי:

רקע:

$$\begin{aligned}\vec{r}_{1,2} &= \vec{r}_1 - \vec{r}_2 \\ \vec{v}_{1,2} &= \vec{v}_1 - \vec{v}_2 \\ \vec{a}_{1,2} &= \vec{a}_1 - \vec{a}_2\end{aligned}$$

שאלות:

### (1) כלב קופץ בתוך רכבת

כלב נמצא ברכבת הנעה במהירות  $8 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$  ביחס לקרקע. הכלב קופץ בכיוון התקדמות הקרון מרחק של 7 מטרים ביחס לקרון. במהלך הקפיצה מהירות הכלב קבועה ביחס לקרון ושווה ל-  $3 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ . מהו המרחק שעבר הכלב ביחס לקרקע?

### (2) מדרגות נעות

כאשר אדם עומד על מדרגות נעות בחנות, הוא מגיע לקומה הרצויה תוך 50 שניות. יום אחד, המדרגות הנעות מתקלקלות והאדם צריך לעלות אותן ברגל בכוחות עצמו, כאשר הוא נע במלוא היכולת שלו, הוא מצליח להגיע לקומה הרצויה תוך 80 שניות. למחרת, המדרגות הנעות עובדות כרגיל, אך האדם מחליט לרוץ בהן במלוא יכולתו בכל זאת.

א. תוך כמה זמן יגיע לקומה הרצויה?

ב. האדם מנסה עתה לרדת חזרה לקומה המקורית במדרגות העולות (אלה בהן הוא עלה קודם).

האם הוא יכול להצליח בכך?

אם כן תוך כמה זמן יגיע לקומה המקורית?

**(3) כדור נזרק במעלית**

- מרצפת מעלית הנמצאת במנוחה נזרק כלפי מעלה במהירות התחלתית לא ידועה. הכדור עובר ליד שעון עצר, המחובר למעלית, ונמצא בגובה 2 מטרים מרצפת המעלית. שעון העצר מופעל ברגע שהכדור חולף לידו בפעם הראשונה ומפסיק ברגע שהכדור חולף לידו בפעם השנייה (בדרכו למטה). השעון מדד זמן של 0.5 שניות.
- א. מהו זמן התנועה של הכדור מרגע הזריקה עד לפגיעה ברצפת המעלית?  
 ב. מהי הדרך אותה עשה הכדור ביחס למעלית וביחס לכדה"א עד אשר הגיע לשעון בפעם השנייה?  
 ג. חוזרים על הניסוי, אבל כעת המעלית נעה (מלפני זריקת הכדור) במהירות קבועה כלפי מעלה של  $4 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ . הזמן שמודד השעון הוא שוב 0.5 שניות.
- מהו זמן התנועה של הכדור מרגע הזריקה ועד לפגיעה ברצפת המעלית?  
 ד. מהי הדרך אותה עשה הכדור ביחס למעלית וביחס לכדה"א עד אשר הגיע לשעון בפעם השנייה?  
 ה. מהי מהירות הכדור ביחס לכדה"א ברגע הפגיעה ברצפת המעלית?

**(4) כדור נזרק במעלית מאיצה**

- מעלית נעה בתאוצה קבועה כלפי מעלה של  $2 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$ .
- ברגע שמהירות המעלית היא  $4 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$  נזרק מרצפת המעלית כדור כלפי מעלה במהירות התחלתית לא ידועה.
- הכדור עובר ליד שעון עצר המחובר למעלית ונמצא בגובה 1 מטר מרצפת המעלית. שעון העצר מופעל ברגע שהכדור חולף לידו בפעם הראשונה ומפסיק ברגע שהכדור חולף לידו בפעם השנייה (בדרכו למטה). השעון מדד זמן של 0.5 שניות.
- א. מהו הזמן עד לפגיעת הכדור ברצפת המעלית?  
 ב. מהי הדרך הכוללת שעבר הכדור ביחס למעלית עד אשר עבר ליד השעון בפעם השנייה?  
 ג. מהי הדרך הכוללת שעבר הכדור ביחס לכדה"א עד אשר עבר ליד השעון בפעם השנייה?  
 ד. מהי מהירות הכדור יחסית לכדה"א ברגע הפגיעה ברצפת המעלית?


**(5) דוגמה - מכונית ביחס לאוטובוס**

- מכונית נוסעת במהירות של 30 מטר לשנייה בכיוון ציר ה- $x$ .  
 אוטובוס נוסע במהירות של 50 מטר לשנייה בכיוון ציר ה- $x$ .
- א. מצא את המהירות היחסית בין האוטובוס למכונית.  
 ב. מצא את הזווית בה האוטובוס יראה את המכונית נוסעת.

### 6) אבן נזרקת מכדור פורח – תעשיה טכניון

סטודנטית נמצאת על משטח שעולה אנכית במהירות קבועה  $v_0 = 6 \frac{m}{sec}$ , נסמן ב-  $t = 0$  את הרגע בו התחיל לעלות המשטח מהקרקע. ברגע  $t_1 = 3sec$  הסטודנטית זורקת אבן במהירות  $v_1 = 8 \frac{m}{sec}$ , אופקית ביחס אליה. מהו הזמן בו האבן פוגעת בקרקע (ביחס לזמן אפס של השאלה)?


### 7) מרחק מינימלי בין מכוניות



צופה הנמצא ברכב A יוצא מנקודה מסוימת לכיוון מזרח במהירות 30 קמ"ש. באותו הזמן רכב B יוצא ממרחק 68 ק"מ צפונית לנקודת יציאתו של רכב A ונוסע דרומה במהירות של 50 קמ"ש, כמתואר באיור. א. רשמו את פונקציית המרחק בין שני כלי הרכב כתלות בזמן. ב. מצאו תוך כמה שעות המרחק בין כלי הרכב יהיה מינימלי.

ג. מצאו את גודלו של מרחק זה. ג. הראו כי ברגע בו המרחק בין המכוניות מינימלי וקטור המיקום היחסי מאונך לוקטור המהירות היחסית.

### 8) סירה בנהר



נהר זורם צפונה במהירות  $V_r$ . יוסי נמצא בגדה המערבית ורוצה להשיט סירה לרוחב הנהר. מהירות הסירה היא  $V_{br}$  יחסית לנהר. יוסי מעוניין להגיע אל הגדה הנגדית בדיוק מזרחית לנקודת מוצאו. נתון כי רוחב הנהר d.

א. באיזה כיוון הוא יהיה חייב להשיט את הסירה? ב. מה מהירות הסירה יחסית לאדמה? ג. כמה זמן תארך דרכו?

### 9) אנייה שטה מערבה וצופה באנייה נוספת

מאנייה A השטה מערבה במהירות 30 קמ"ש נראית אנייה B כאילו היא שטה בדיוק צפונה. כאשר אנייה A מאטה ומורידה את מהירותה ל-10 קמ"ש (באותו הכיוון) נראית ממנה אנייה B כאילו היא שטה בכיוון היוצר זווית של 42 מעלות מערבית לצפון. מהו גודלה וכיוונה של מהירות אנייה B ביחס לקרקע?

**(10) זווית פגיעה של גשם במכונית**

נהג הנוסע במהירות 100 קמ"ש רואה טיפות גשם נמרחות על השמשה הצדדית של המכונית בכיוון הפוך לכיוון הנסיעה ובזווית של 45 מעלות עם הציר האנכי לכיוון הנסיעה.  
נהג אחר הנוסע במהירות 70 קמ"ש רואה את טיפות הגשם בזווית 30 מעלות עם אותו הציר.  
מצא את מהירות הטיפות ביחס לקרקע (גודל וכיוון).

**(11) זווית בין מהירויות**

שני קליעים נורים ברגע  $t = 0$ . מיקומם ומהירותם ההתחלתית הם:

$$\vec{v}_2(0) = -1\hat{i} + 4\hat{j}, \quad \vec{v}_1(0) = 2\hat{i} + 5\hat{j}, \quad \vec{r}_2(0) = \hat{i}, \quad \vec{r}_1(0) = 0$$

על שניהם פועל כוח משיכה הגורם לתאוצה של  $\vec{a} = -3\hat{i} + \hat{j}$  היחידות הן MKS.

א. מצא את  $\vec{r}_2(t)$ ,  $\vec{r}_1(t)$ .

ב. מצא את המרחק בין הקליעים כפונקציה של הזמן.

ג. מצא את הזווית בין  $\vec{v}_1$  ל- $\vec{v}_2$  ברגע  $t = 3$ .

**(12) מציאת מהירות בין מערכות**

ביחס למערכת ייחוס A, מיקומו של גוף מסוים נתונה על ידי:

$$\vec{r}_A(t) = (6t^2 - 4t, -3t^3, 3)$$

מערכת ייחוס B נעה ביחס למערכת הייחוס הראשונה במהירות קבועה,  $\vec{V}_{AB}$ . צופה הנמצא במערכת B רואה את הגוף נע כך שמיקומו בכל רגע הוא:

$$\vec{r}_B(t) = (6t^2 - 3t, 2t - 3t^3, 5)$$

א. חשבו את המהירות של המערכת B ביחס למערכת A,  $\vec{V}_{AB}$ .

ב. הראו שתאוצת הגוף זהה בשתי מערכות הייחוס, וחשבו אותה.

## תשובות סופיות:

$$25.7\text{m} \quad (1)$$

$$t = 30.8\text{sec} \quad \text{א.} \quad \text{ב. לא.} \quad (2)$$

$$t = 1.36\text{sec} \quad \text{א.} \quad \text{ב. } S = 2.62\text{m} \quad \text{ג. } t = 1.36\text{sec} \quad \text{ד. } S = 5.72\text{m} \quad (3)$$

$$v_1 = -2.8 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \quad \text{ה.} \quad (4)$$

$$v_1 = 0.16 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \quad \text{ז.} \quad \text{ב. } S = 1.76\text{m} \quad \text{ג. } S = 4.46\text{m} \quad \text{א. } t = 0.96\text{sec} \quad (4)$$

$$v_2' = \left( -24.01 \frac{\text{m}}{\text{sec}}, 15 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \right) \quad \text{א.} \quad \text{ב. } \theta_2' = 148^\circ \quad (5)$$

$$2.6\text{sec} \quad (6)$$

$$|r_{B,A}^r| = \sqrt{(30t)^2 + (68 - 50t)^2} \quad \text{א.} \quad \text{ב. } |r_{B,A}^r| = 35\text{km}, t = 1\text{hr} \quad \text{ג. הוכחה.} \quad (7)$$

$$\sin \theta = -\frac{V_r}{V_{br}} \quad \text{א.} \quad V_{bx} = \sqrt{V_{br}^2 - V_r^2} \quad \text{ב.} \quad t = \frac{d}{\sqrt{V_{br}^2 - V_r^2}} \quad \text{ג.} \quad (8)$$

$$V_B \approx 37.3 \text{ km/hr}, \alpha \approx 36.5^\circ \quad \text{צפונה מהמערב} \quad (9)$$

$$\text{מהירות: } V_y = -70.79 \frac{\text{km}}{\text{hr}}, V_x = 29.21 \frac{\text{km}}{\text{hr}}, \text{ גודל וכיוון: ראה סרטון.} \quad (10)$$

$$r_1(t) = \left( -\frac{3}{2}t^2 + 2t \right) \hat{i} + \left( \frac{t^2}{2} + 5t \right) \hat{j}, r_2(t) = \left( -\frac{3}{2}t^2 - t + 1 \right) \hat{i} + \left( \frac{t^2}{2} + 4t \right) \hat{j} \quad \text{א.} \quad (11)$$

$$|r_{1,2}^r| = \sqrt{10t^2 - 6t + 1} \quad \text{ב.} \quad \alpha = 13.82^\circ \quad \text{ג.} \quad (12)$$

$$(1, -2, 0) \quad \text{א.} \quad \text{ב. הוכחה.} \quad (12)$$

## שיטה שניה-פתרון באמצעות תרשימי וקטורים:

### שאלות:

#### (1) שיטה שניה-פתרון באמצעות תרשימי וקטורים ודוגמה

צופה הנמצא באונייה A השטה מזרחה במהירות 15 קמ"ש רואה את אונייה B שטה במהירות 20 קמ"ש ובכיוון 60 מעלות צפונית למזרח. מהי המהירות של אונייה B ביחס לקרקע, גודל וכיוון?

#### (2) סירה בנהר פתרון בשיטה השניה

נהר זורם צפונה במהירות  $V_r$ .

יוסי נמצא בגדה המערבית ורוצה להשיט סירה לרוחב הנהר.

מהירות הסירה היא  $V_{br}$  יחסית לנהר.


יוסי מעוניין להגיע אל הגדה הנגדית בדיוק מזרחית לנקודת מוצאו.

א. סרטטו תרשים וקטורי ובו:

מהירות הסירה ביחס לקרקע, מהירות הנהר

ביחס לקרקע ומהירות הסירה ביחס לנהר.

ב. מצאו את כיוון מהירות הסירה ביחס לנהר.



#### (3) מטוס נראה משתי רכבות

צופה הנמצא ברכבת הנעה מזרחה במהירות של 50 קמ"ש רואה

מטוס חוצה את המסילה בזווית של 30 מעלות מערבית לצפון.

צופה אחר הנוסע ברכבת הנעה מערב במהירות של 100 קמ"ש רואה

את אותו המטוס חוצה את המסילה בזווית של 50 מעלות מזרחית לצפון.

א. סרטטו תרשים וקטורים ובו:

מהירות הצופים ביחס לקרקע, מהירות המטוס ביחס לכל צופה ומהירות

המטוס ביחס לקרקע (אין צורך לדעת את כל הנתונים בתרשים).

ב. מצאו את מהירות המטוס ביחס לקרקע (גודל וכיוון).

#### (4) רכב רואה רכב רואה רכב

צופה היושב ברכב A רואה את רכב B כאילו הוא נע צפונה במהירות  $V_{BA}$ .

צופה היושב ברכב B רואה את רכב C, כאילו הוא נע בכיוון צפון מערב בזווית  $\alpha$

מהצפון ובמהירות  $V_{CB}$ .

רכב A נע ביחס לקרקע בכיוון צפון מזרח בזווית  $\beta$  מן הצפון ובמהירות  $V_A$ .

מהי המהירות של רכב C ביחס לקרקע, גודל וכיוון?

**(5) שני דאונים**

שני דאונים טסים באותו הגובה.

באזור טיסתם קיים זרם אוויר במהירות 40 קמ"ש ובכיוון של 30 מעלות מזרחה מהצפון.

דאון 1 טס ביחס לזרם במהירות 30 קמ"ש ובכיוון צפון.

דאון 2 טס ביחס לקרקע במהירות לא ידועה אך בכיוון צפון.


בנוסף הטייס שבדאון 1 רואה את דאון 2 כאילו הוא טס מערבה.

מצאו את גודל וכיוון מהירויות הדאונים ביחס לקרקע.


**תשובות סופיות:**

(1) 30.4 קמ"ש ובזווית 34.7 מעלות צפונית למזרח.

(2) א.  $\theta = \text{shift} \sin \left( \frac{V_r}{V_{br}} \right)$  ב. דרומית למזרח.



(3) א. ב. 84.98 קמ"ש ובכיוון 2 מעלות מערבית מהצפון.



$$v_c = \sqrt{(v_A \sin \beta - v_{CB} \sin \alpha)^2 + (v_A \cos \beta + v_{BA} + v_{CB} \cos \alpha)^2} \quad (4)$$

$$\tan \theta_c = \frac{v_A \cos \beta + v_{BA} + v_{CB} \cos \alpha}{v_A \sin \beta - v_{CB} \sin \alpha}$$

(5) דאון 1 : 67.7 קמ"ש ובזווית 17.2 מעלות מזרחה מהצפון.

דאון 2 : 64.6 קמ"ש צפונה.

## מהירות יחסית בכיוון הצופה (מד לייזר):

רקע:

$$\vec{v} = \frac{\dot{x}\hat{x} + \dot{y}\hat{y}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{d}{dt} |\vec{r}|$$

שמודד לייזר

שאלות:

(1) דוגמה ראשונה

מהירותה של מכונית נתונה לפי:  $\vec{v}(t) = 2t^2\hat{x} + (3t - 1)\hat{y}$   
ב-  $t = 0$  המכונית הייתה בראשית.

- א. מצא את וקטור מיקום המכונית כתלות בזמן.  
ב. מהי מהירות המכונית ב-  $t = 2$  כפי שימדוד אותה שוטר הנמצא בראשית, אם השוטר מודד באמצעות אקדח לייזר.  
ג. חזור על סעיף ב' אם השוטר נוסע במהירות קבועה  $v_0\hat{x}$  ונמצא גם כן בראשית ב-  $t = 0$ .

תשובות סופיות:

$$(1) \quad \text{א. } \vec{r} = \frac{2}{3}t^3\hat{x} + \left(\frac{3}{2}t^2 - t\right)\hat{y} \quad \text{ב. } v(t=2) = 9.4 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$$

$$\text{ג. } v(t=2) = \frac{(8 - v_0)\left(\frac{16}{3} - 2v_0\right) + 20}{\sqrt{\left(\frac{16}{3} - 2v_0\right)^2 + 16}}$$

# פיזיקה 1 מכניקה

פרק 5 - דינמיקה

תוכן העניינים

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 69 | 1. חוקי ניוטון             |
| 79 | 2. גלגולות נעות ומכפלי כוח |
| 80 | 3. תרגילים נוספים          |

## חוקי ניוטון:

### רקע:

#### כוחות נפוצים:

##### כוח הכובד:

סימון:  $W$  (קיצור של Weight).

מופעל ע"י כדור הארץ.

כיוון: למרכז כדור הארץ (או לכיוון האדמה).

גודל:  $mg$ .

##### נורמל:

סימון:  $N$ .

מופעל ע"י משטח.

כיוון: תמיד מאונך למשטח ודוחף (מהמשטח כלפי חוץ).

גודל: לא ידוע, תלוי בבעיה (לא שווה ל- $mg$ ).

##### מתיחות:

מופעל על ידי חוט או חבל.

סימון:  $T$  (קיצור של Tension).

כיוון: תמיד מושך את הגוף לכיוון החוט.

הערה, חוט תמיד מושך משני צדדיו.

חוט אידיאלי – חוט חסר מסה שאינו משנה את אורכו (לא אלסטי).

בחוט אידיאלי המתיחות אחידה לאורך החוט.

### החיכוך:

#### חיכוך סטטי - $f_s$ :

פועל כאשר אין תנועה יחסית בין המשטחים.

מופעל ע"י המשטח.

כיוון: משיק למשטח (נגד כיוון השליפה לתנועה).

גודל:  $f_s \leq \mu_s N$  (בד"כ נעלם לא ידוע).

$\mu_s$  - מקדם חיכוך סטטי (תלוי בחומר וקבוע).

$f_s \leq \mu_s N$  - החיכוך הסטטי תמיד קטן מ-  $\mu_s N$ .

$f_{s\max} = \mu_s N$ .

לשים לב שאפשר להציב  $f_{s\max} = \mu_s N$  רק אם ידוע שהמערכת על סף החלקה.

**חיכוך קינטי -  $f_k$  :**

פועל כאשר יש תנועה יחסית בין המשטחים.

מופעל ע"י משטח.

כיוון : משיק למשטח (נגד כיוון התנועה היחסית).

$$\text{גודל : } f_k = \mu_k N$$

$\mu_k$  - מקדם החיכוך הקינטי – תלוי בסוגי החומרים. בד"כ קבוע.

$N$  - נורמל שמפעיל אותו משטח.

**חוק ראשון של ניוטון – התמדה :**

אם גוף נע בקו ישר ובמהירות קבועה (בהתמדה) סכום הכוחות עליו שווה לאפס. מקרה פרטי של תנועה במהירות קבועה הוא מנוחה. לכן, אם גוף נמצא במנוחה סכום הכוחות עליו הוא אפס.

**חוק שלישי – עקרון פעולה תגובה :**

לכל כוח שגוף A מפעיל על גוף B יש כוח תגובה שגוף B מפעיל חזרה על גוף A. כוח התגובה שווה בגודלו והפוך בכיוונו. שימו לב : הכוחות פועלים על גופים שונים ולכן אף פעם לא יופיעו באותו תרשים כוחות.

**חוק שני של ניוטון :**

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

בפועל רושמים את הנוסחה לכל ציר בנפרד.

**חוק הוק – הכוח של קפיץ :**

$$F = -k\Delta x$$


$$\Delta x = x - x_0$$

$x$  - מיקום הגוף.

$x_0$  - מיקום שבו הקפיץ רפוי.


חיבור קפיצים במקביל (שני הקפיצים מחוברים לגוף ולקיר) -  $k_{eff} = k_1 + k_2$

חיבור קפיצים בטור (גוף מחובר לקפיץ אחד שמחובר לקפיץ שני שמחובר לקיר) -




$$\frac{1}{k_{eff}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$$


## שאלות:




- (1) **דוגמה-גוף תלוי מהתקרה**  
גוף תלוי במנוחה מהתקרה באמצעות שני חוטים, לפי האיור הבא.  
מהי המתיחות בכל חוט אם מסת הגוף היא 3 ק"ג?




- (2) **דוגמה-גוף תלוי מהתקרה ומהקיר**  
גוף תלוי במנוחה מהתקרה באמצעות חוט ומחובר לקיר המאונך לתקרה באמצעות חוט נוסף (הסתכל באיור).  
מהי המתיחות בכל חוט אם מסת הגוף היא 3 ק"ג?




- (3) **דוגמה-מסה על מסה**  
במערכת הבאה ישנה מסה של 3 ק"ג הנמצאת במנוחה על שולחן.  
על המסה מונחת מסה נוספת של 2 ק"ג.  
א. שרטט תרשים כוחות לכל אחת מהמסות.  
ב. חשב את הכוח הנורמלי הפועל על המסה העליונה.  
ג. חשב את הכוח הנורמלי הפועל על המסה התחתונה.  
ד. חשב את הכוח הנורמלי הפועל על השולחן.




- (4) **דוגמה-מסה על מסה על מסה**  
שלוש מסות מונחות אחת על גבי השנייה ועל הקרקע במנוחה, כפי שנראה בציור.  
א. מהו גודלו וכיוונו של הכוח שמפעילה המסה הכי תחתונה על המסה מעליה?  
ב. מהו גודלו וכיוונו של הכוח שמפעילה הרצפה על המסה הכי תחתונה?




- (5) **דוגמה-דני מושך במקביל לקרקע**  
דני מושך ארגז במקביל לקרקע. ידוע כי מסת הארגז היא 20 ק"ג ומקדם החיכוך הקינטי בין הארגז לקרקע הוא:  $\mu_k = 0.2$ .  
מצא מהו גודלו של הכוח שמפעיל דני, אם הארגז נע במהירות קבועה?

**(6) ירון מושך ארגז בזווית**


ירון מושך ארגז באמצעות חבל הנמתח בזווית של 30 מעלות ביחס לקרקע. ידוע כי מסת הארגז היא 20 ק"ג, ומקדם החיכוך הקינטי בין הארגז לקרקע הוא:  $\mu_k = 0.2$ . מצא מהו גודלו של הכוח שמפעיל ירון, אם הארגז נע במהירות קבועה?

**(7) גוף על שולחן**


גוף בעל מסה של 3 ק"ג נמצא במנוחה על שולחן. מקדם החיכוך הסטטי הוא:  $\mu_s = 0.4$ .  
 א. מהו הכוח המקסימלי הניתן להפעיל על הגוף, כך שישאר במנוחה?  
 ב. מצא את גודלו וכיוונו של החיכוך הסטטי.

**(8) כוח תלוי בזמן**

גוף בעל מסה של 5 ק"ג נמצא במנוחה על שולחן. כוח אופקי התלוי בזמן  $F(t) = 2 \cdot t^2$  פועל על הגוף ימינה. מקדם החיכוך הסטטי הוא:  $\mu_s = 0.3$ .  
 א. מהו הכוח המקסימלי הניתן להפעיל על הגוף, כך שישאר במנוחה?  
 ב. מתי יתחיל הגוף בתנועה?  
 ג. שרטט גרף של החיכוך הסטטי כתלות בזמן.

**(9) מסה בשיפוע**


מסה של 3 ק"ג נמצאת במנוחה על מישור משופע בעל זווית של 40 מעלות. בין המסה למדרון קיים חיכוך, ומקדם החיכוך הסטטי הוא:  $\mu_s = 0.9$ .  
 א. שרטט תרשים כוחות לבעיה.  
 ב. מצא את גודלם של הכוח הנורמלי והחיכוך.

**(10) מסה בשיפוע ומסה באוויר**

מסה של 5 ק"ג מונחת על מישור משופע בעל זווית של 50 מעלות. המסה מחוברת באמצעות חוט אידיאלי ודרך גלגלת אידיאלית למסה נוספת M התלויה באוויר מצידו השני של המישור.

א. מצא את גודלה של המסה M, על מנת שהמערכת תשאר במנוחה כאשר אין חיכוך בבעיה. כעת נתון שבין המסה למדרון קיים חיכוך, ומקדם החיכוך הסטטי הוא:  $\mu_s = 0.3$ .

ב. מצא מה הוא גודלה המקסימלי והמינימלי האפשרי של M, על מנת שהמערכת תשאר במנוחה.

**(11) דוגמה-כוח בזווית 30 מעלות**



כוח של 20 ניוטון פועל בזווית של 30 מעלות מעל האופק. הכוח מופעל על ארגז בעל מסה של 8 ק"ג. הארגז נמצא במנוחה ונתון כי בין הארגז לרצפה קיים חיכוך. מקדמי החיכוך הסטטי והקינטי הם:  $\mu_s = 0.2$ ,  $\mu_k = 0.1$ .

א. בדוק האם הארגז נשאר במנוחה או מתחיל נוע?  
 ב. כמה זמן ייקח להזיז את הארגז למרחק של 30 מטרים באמצעות כוח זה?  
 ג. חזור על הסעיפים אם הכוח היה בזווית של 70 מעלות.

**(12) דוגמה-מרחק עצירה**

דני נוסע במכוניתו במהירות של 54 קמ"ש, ולפתע הוא מבחין כי רמזור הנמצא 50 מטרים לפניו הופך לאדום. דני לוחץ על הבלמים ומתחיל בעצירה. מקדם החיכוך הקינטי בין הגלגלים לרצפה הוא:  $\mu_k = 0.3$ .

הנח שהגלגלים ננעלים ואין למכונית מערכת ABS.  
 א. האם דני יספיק לעצור לפני הרמזור?  
 ב. בדוק שוב האם דני יספיק לעצור, אך הפעם הוסף זמן תגובה של שנייה אחת (הזמן מהרגע שבו דני מבחין באור עד אשר הוא לוחץ על הבלמים).

**(13) דוגמה 1-קפיץ**

גוף בעל מסה של 2 ק"ג מחובר לקפיץ בעל קבוע

קפיץ  $k = 50 \frac{\text{N}}{\text{m}}$ . בין הגוף למשטח אין חיכוך.

א. מושכים את הגוף למרחק 5 ס"מ מהנקודה בה

הקפיץ רפוי ומשחררים אותו.

מהי תאוצת הגוף (גודל וכיוון)?

ב. דוחפים את הגוף למרחק 10 ס"מ מהנקודה בה

הקפיץ רפוי ומשחררים אותו.

מהי תאוצת הגוף (גודל וכיוון)?

כעת נתון כי בין הגוף למשטח קיים חיכוך, ומקדם

החיכוך הסטטי הוא:  $\mu_s = 0.2$ .


ג. מהו המרחק המקסימלי בו ניתן להניח את הגוף קשור

לקפיץ כך שיישאר במנוחה?

**(14) דוגמה 2-קפיץ**

גוף בעל מסה של 3 ק"ג מחובר לקפיץ בעל קבוע

קפיץ  $k = 100 \frac{\text{N}}{\text{m}}$ . בין הגוף למשטח אין חיכוך.



על הגוף פועל כוח ימינה שגודלו 50 ניוטון.

קבע את ראשית הצירים בנקודת הרפיון של הקפיץ.


היכן נמצאת נקודת שיווי המשקל (הנקודה בה סכום

הכוחות שווה לאפס)?

**(15) דוגמה 3-קפיץ**

גוף בעל מסה של 4 ק"ג מחובר לקיר באמצעות קפיץ

בעל קבוע קפיץ  $k = 50 \frac{\text{N}}{\text{m}}$ . בין הגוף למשטח אין חיכוך.



אורכו הרפוי של הקפיץ הוא 10 ס"מ.

א. חשב את הכוח שמפעיל הקפיץ על הגוף כאשר

הגוף במרחק 15 ס"מ מהקיר.

ב. חשב את הכוח שמפעיל הקפיץ על הגוף כאשר


הגוף במרחק 6 ס"מ מהקיר.

ג. חשב את תאוצת הגוף בכל נקודה אם על הגוף

פועל כוח שגודלו 10 ניוטון שמאלה.

**(16) מסה עם שלושה קפיצים**


שלושה קפיצים מחוברים למסה  $m = 2\text{kg}$ , כפי שנראה באיור.  
אין חיכוך בין המסה לרצפה.



נתון כי:  $k_1 = 3 \frac{\text{N}}{\text{m}}$ ,  $k_2 = 5 \frac{\text{N}}{\text{m}}$ ,  $k_3 = 12 \frac{\text{N}}{\text{m}}$ .

הנח כי כל הקפיצים רפויים באותה הנקודה.

מהי תאוצת המסה כאשר היא נמצאת במרחק 20 ס"מ מנקודת שיווי המשקל?

**(17) שלושה קפיצים שוב**

באיור הבא, המסה  $m = 4\text{kg}$  מחוברת לשלושה קפיצים

בעלי קבועי קפיץ שונים. הנח שכל הקפיצים רפויים

כאשר המסה נמצאת ב-  $x = 0$ .

מהי תאוצת המסה, כאשר מיקומה הוא:  $x = 0.2\text{m}$ ,

אם קבועי הקפיצים הם:  $k_1 = 3 \frac{\text{N}}{\text{m}}$ ,  $k_2 = 5 \frac{\text{N}}{\text{m}}$ ,  $k_3 = 12 \frac{\text{N}}{\text{m}}$ ?

**(18) כוח אופקי תלוי בזמן**

כוח אופקי שגודלו  $F = 2t$  פועל על גוף, כאשר הזמן  $t$  נתון בשניות והכוח  $F$  בניוטונים.  
מסת הגוף  $2\text{kg}$  והוא נמצא במנוחה על משטח אופקי.

מקדמי החיכוך בין הגוף למשטח:  $\mu_k = 0.15$ ,  $\mu_s = 0.2$ . מצאלי את:


א. זמן תחילת התנועה.

ב. כוח החיכוך בזמן  $t = 0.5\text{sec}$ .

ג. תאוצת הגוף כפונקציה של זמן.

ד. מהירות הגוף לאחר 4 שניות.

ה. מיקום הגוף לאחר 4 שניות.

**(19) כוח בזווית תלוי בזמן**

הגוף שבציור מונח על הרצפה, בזמן  $t = 0$  מתחיל לפעול

על הגוף כוח שגודלו  $F = 2t$  הזמן בשניות והכוח בניוטונים.

הכוח פועל בזווית  $\alpha = 37^\circ$  יחסית לציר התנועה.

מסת הגוף היא  $2\text{kg}$ .

נתון כי מקדם החיכוך הסטטי והקינטי בין הגוף והרצפה הוא:  $\mu = 0.2$ .

לפשטות החישוב קחו:  $\sin \alpha = 0.6$ ,  $\cos \alpha = 0.8$ ,  $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$ .


א. מתי יתחיל הגוף לנוע?

ב. מהי מהירות הגוף לאחר 4 שניות?

ג. מה המרחק שהתקדם הגוף עד לניתוקו מהקרקע?

**(20) אדם על קרונית על מישור משופע\***

אדם בעל מסה  $m$  עומד על משקל המחובר בצורה אופקית לקרונית. מסת הקרונית היא  $M$  ונתון כי היא מחליקה ללא חיכוך על פני מישור משופע בזווית  $\alpha$ .



א. מה מורים המאזניים?

הניחו שהחיכוך בין רגלי האדם לקרונית מספיק גדול, כך שאינו נע ביחס אליה.

ב. מצא את מקדם החיכוך המינימלי בין רגלי האדם והקרונית על מנת שהאדם לא יחליק ביחס לקרונית.


ג. כעת הנח כי אין חיכוך בכלל בין האדם לקרונית.

מה תהיה תאוצת הקרונית במצב זה? (כל עוד האדם נמצא על הקרונית).

ד. מה יורה המשקל במצב המתואר בסעיף ג'?

**(21) מספריים חותכות חוט\*\***

אדם מנסה לחתוך חוט מתכת בעזרת מספריים. החוט חופשי לנוע והוא מחליק על המספריים עד שזווית המפתח של המספריים היא  $\alpha$ , בזווית זו המספריים מתחילות לחתוך את החוט.



א. צייר את הכוחות שפועלים על החוט.

ב. מצא את מקדם החיכוך בין המספריים לחוט.

ג. הראה שהזווית  $\alpha$  אינה תלויה בכוח הכובד כאשר המספריים במצב אופקי.

ד. כעת, מסובבים את המספריים בזווית  $\beta$  סביב ציר העובר בבורג המספריים. כיוון הסיבוב הוא נגד השעון, כך שהחוט עולה כלפי מעלה.


הראה כעת שהשינוי בזווית  $\alpha$  הוא לפי:  $\mu = \mu_0 + V\mu$  כאשר  $\mu_0$  הוא

$$\text{המקדם שמצאת בסעיף ב' ו-} F \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = -\frac{mg \sin \beta}{V\mu}$$

האם המספריים יחתכו יותר מוקדם או יותר מאוחר?

**(22) חבל מחליק משולחן משופע\*\***

חבל בעל מסה  $M$  ואורך  $L$  נמצא על מישור משופע בזווית  $\alpha$  שנמצא על שולחן כך שחלק משתלשל מהשולחן מטה. בין החבל לשולחן יש מקדם חיכוך קינטי וסטטי  $\mu$ . בזמן  $t = 0$  יש חבל באורך  $l$  המשתלשל מקצה השולחן, ונמצא במנוחה.



מהו הגובה של קצה החבל  $y(t)$  מתחת לשולחן



כתלות בזמן? הניחו כי החבל בעל עובי אפס ויש חיכוך רק עם החלק העליון של המישור.

## תשובות סופיות:

(1)  $T_1 \approx 22.0\text{N}$  ,  $T_2 \approx 26.9\text{N}$

(2)  $T_2 \approx 19.6\text{N}$  ,  $T_1 \approx 26.4\text{N}$

(3) א. מסה 3 ק"ג: מסה 2 ק"ג:



ד. 50 N

ג. 20 N

ב. 20 N


(4) א. 30 N למעלה ב. 60 N למעלה

(5) 40 N


(6)  $T \approx 41.3\text{N}$

(7) א. 12 N ב. 10 N

(8) א. 20 N ב.  $\sqrt{10}\text{ sec}$  ג.



ב.  $f_s \approx 19.3\text{N}$  ,  $N \approx 23.0\text{N}$



(9) א.

(10) א.  $M = 3.83\text{kg}$  ב.  $M_{\min} = 2.87\text{kg}$  ,  $M_{\max} = 4.79\text{kg}$

(11) א. הגוף לא יכול להיות במנוחה. ב.  $t \approx 6.82\text{sec}$

ג. סעיף א': נשאר במנוחה, סעיף ב': אין משמעות.

(12) א. כן, כי  $\Delta x \approx 37.5\text{m} < 50\text{m}$  ב. לא, כי  $\Delta x = 52.5\text{m} > 50\text{m}$

(13) א. גודל:  $-1.25 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$  , הכיוון חיובי. ב. גודל:  $a = 2.5 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$  , הכיוון חיובי.

ג.  $x = 8\text{cm}$

(14)  $x = \frac{1}{2}\text{m}$

(15) א.  $F = -2.5\text{N}$  ב.  $F = 2\text{N}$  ג. סעיף א':  $a = -3.13 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$

סעיף ב':  $a = -2 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$

(16)  $a = -2 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$

$$a \approx 0.326 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} \quad (17)$$

$$a = \begin{cases} 0 & 0 < t < 2 \\ t - \frac{3}{2} & 2 < t \end{cases} \quad \text{ג.} \quad f_s = 1\text{N} \quad \text{ב.} \quad t = 2\text{sec} \quad \text{א.} \quad (18)$$


$$x(t=4) = 2.3\text{m} \quad \text{ה.} \quad v(t=4) = 3 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \quad \text{ד.}$$

$$x = 467\text{m} \quad \text{ג.} \quad v(t=4) = 1.53 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \quad \text{ב.} \quad t \approx 2.17\text{sec} \quad \text{א.} \quad (19)$$

$$a_x = \frac{(M+m)g \sin \alpha}{M+m \sin^2 \alpha} \quad \text{ג.} \quad \mu_{s\min} = \tan \alpha \quad \text{ב.} \quad N_2 = mg \cos^2 \alpha \quad \text{א.} \quad (20)$$

$$N_2 = m \left( g - \left( \frac{(M+m)g \sin \alpha}{M+m \sin^2 \alpha} \right) \sin \alpha \right) \quad \text{ד.}$$

$$\mu_k = \tan \frac{\alpha}{2} \quad \text{ב.} \quad \text{ג. הוכחה.}$$



(21) א.

ד. הוכחה. החוט יחתך יותר מאוחר.


$$y(t) = \frac{1}{2} \left( 1 + \frac{\beta}{k} \right) \left( e^{\sqrt{\frac{k}{M}}t} + e^{-\sqrt{\frac{k}{M}}t} \right) - \frac{\beta}{k} \quad (22)$$

## גלגלות נעות ומכפלי כוח:


### רקע:

נבטא את אורך החוט באמצעות מיקום הגופים וקבועים ונגזור.


### שאלות:



- (1) **גלגלות וגזירה בזמן של אורך החוט**  
 במערכת הבאה מסות הגופים ידועות.  
 אין חיכוך בין המסות למשטח.  
 מצא את תאוצות הגופים ואת המתיחויות בחוטים.



- (2) **אחת תלויה מהתקרה ואחת על שולחן**  
 במערכת הבאה המסה  $m_1$  נמצאת על שולחן חסר חיכוך  
 ומחוברת באמצעות חוט אידיאלי כפי שמתואר באיור.  
 הגלגלות אידיאליות ו- $m_2$  נתונה.  
 מצא את התאוצה של כל מסה כל עוד הן לא נופלות  
 מהשולחן או פוגעות ברצפה.



- (3) **מערכת גלגלות מסובכת**  
 מצאו את תאוצת הגופים במערכת הבאה.  
 מה התנאי לכך שהמסה  $m_3$  תנוע כלפי מעלה  
 אם נתון שהמערכת מתחילה ממנוחה?

### תשובות סופיות:

$$a_1 = \frac{2m_2g}{4m_2 + m_1} \quad (1)$$


$$a_1 = \frac{m_2g}{2m_1 + \frac{m_2}{2}}, \quad a_2 = \frac{m_2g}{4m_1 + m_2} \quad (2)$$

$$a_3 < 0, \quad a_3 = \left( (m_2 + m_3)(4m_2 + m_1) + 4m_2^2 \right) \quad (3)$$

## תרגילים נוספים:

### שאלות:

#### (1) זווית אופטימלית למשיכה



כוח  $F$  מושך ארגז בעל מסה  $m$  בזווית  $\theta$  מעל האופק. מקדם החיכוך בין הארגז לקרקע הוא  $\mu_k$ .

א. מצא את תאוצת הכוח כתלות בפרמטרים הרשומים בשאלה.


ב. הנח כי מקדם החיכוך הקינטי הוא 0.3.

בדוק באילו מהערכים הבאים של הזווית יש את

התאוצה הגבוהה ביותר:  $\theta = -10^\circ, 0^\circ, 10^\circ, 20^\circ, 30^\circ, 45^\circ$ .

ג. מצא את הזווית המדויקת בה התאוצה תהיה מקסימלית. השתמש בנגזרת.

#### (2) מטוטלת במכונית




מטוטלת קשורה לתקרת מכונית.

המטוטלת נמצאת בזווית קבועה ונתונה  $\alpha$ , ביחס לאנך מתקרת המכונית.

א. מצא מהי תאוצת המכונית (גודל וכיוון)?

ב. האם ניתן לדעת מה כיוון תנועת המכונית?

#### (3) מסה של 4 על עגלה של 10




מסה של 4 ק"ג מונחת מעל עגלה בעלת מסה של 10 ק"ג. החיכוך בין העגלה למשטח זניח.

מקדם החיכוך הסטטי בין המסה לעגלה הוא  $\mu_s = 0.2$ .

כוח אופקי  $F$  מופעל על המסה התחתונה ימינה.

מהו הכוח המקסימלי הניתן להפעיל כך שהמסה

העליונה לא תחליק על העגלה.

**(4) מסה מחליקה על עגלה**

מסה  $m$  מונחת על עגלה בעלת מסה  $M$ , הנמצאת במנוחה.

המסה מונחת בקצה השמאלי של העגלה.

נותנים למסה העליונה (בלבד) מהירות התחלתית  $v_0$ .

בין המסה לגג העגלה קיים חיכוך, והחיכוך בין העגלה למשטח זניח.

נתון:  $\mu_k = 0.2$ ,  $v_0 = 20 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ ,  $M = 12\text{kg}$ ,  $m = 3\text{kg}$ .

א. מצא את הביטוי למיקום ולמהירות המסה, כתלות בזמן.

ב. מצא את הביטוי למיקום ולמהירות העגלה, כתלות בזמן.


ג. מהי המהירות הסופית של שני הגופים, בהנחה שהמסה לא נופלת מהעגלה.

**(5) מסה צמודה למשאית**

מסה  $m$  מונחת בצמוד לחלקה הקדמי של משאית.

בין המסה למשטח קיים חיכוך. נתון:  $\mu_s$ ,  $m$ .

מהי התאוצה המינימלית הדרושה למשאית על מנת שהמסה לא תיפול?

**(6) קופסה בין מדרונות**

קופסה קטנה עם גלגלים מונחת על מישור משופע בעל זווית של  $45^\circ$  מעלות.

הקופסה משוחררת ממנוחה מגובה של 3 מטרים ומתחילה בתנועה.


בתחתית המדרון הקופסה עוברת למדרון משופע אחר בעל זווית של  $30^\circ$  מעלות.

הזנח אפקטים המתרחשים בעת המעבר והנח כי גודל מהירות הקופסה במעבר בין המדרונות נשאר זהה.


א. מהו הגובה המקסימלי אליו תגיע הקופסה במדרון השני? נחש מה יקרה לאחר מכן.

ב. חזור על סעיף א' אם נהג הקופסה שכח לשחרר את מעצור היד של הגלגלים וקיים חיכוך קינטי בין הקופסה למשטח.


מקדם החיכוך הוא:  $\mu_k = 0.2$ .

**(7) זריקה אופקית על מישור משופע**

- צייר מערכת צירים, ורשום את הכוחות הפועלים על הכדור בעת תנועתו על הלוח בכל ציר.
- מהי צורת המסלול של הכדור על הלוח?
- מצא את  $v_0$ , עבורה הכדור יגיע בדיוק לנקודה B.
- מהי מהירות הכדור בנקודה B עבור ה- $v_0$  שמצאת בסעיף ג'?


**(8) כוח דוחף שתי קופסאות צמודות**

- התאוצה של כל תיבה.
- הכוח הנורמלי  $N_{1 \rightarrow 2}$ , שבו התיבה הראשונה דוחפת את השנייה.
- הכוח הנורמלי  $N_{2 \rightarrow 1}$ , שבו התיבה השנייה דוחפת את הראשונה.

**(9) גוף על גוף במישור משופע**

- מהי המסה המרבית של גוף B, כך שהגופים A ו-C ינועו יחדיו במעלה המישור?
- מהי תאוצת הגופים והמתיחות בחוט, אם המסה של גוף B היא זאת שמצאת בסעיף א' (או טיפה קטנה ממנה)?
- מהן תאוצות הגופים אם המסה של גוף B גדולה מזו שמצאת בסעיף א' ומקדם החיכוך הקינטי הוא  $\mu_k$ ?

### 10 גליל על שני ארגזים



גליל אחיד, שמסתו  $m$  מונח על שני ארגזים

שמסותיהם:  $m_A = m$ ,  $m_B = 2m$ .

לארגזים גבהים שונים והם מונחים על משטח אופקי. בין הגליל לארגזים אין חיכוך.

כשהמערכת נמצאת בשיווי משקל יוצרים הרדיוסים

של הגליל, הנוגעים בפינות הארגזים זוויות של:  $\alpha = 30^\circ$ ,  $\beta = 45^\circ$


עם האנך לקרקע, ראה איור. נתונים:  $m$ ,  $g$ .

א. מה הכוח שמפעיל כל ארגז על הגליל?

ב. בהנחה שקיים אותו מקדם חיכוך בין הארגזים והמשטח,

מהו גודלו המינימלי של מקדם החיכוך, כך שהמערכת תישאר בשיווי משקל?

### 11 כוח דוחף גוף על גוף



שני גופים זהים שמסותיהם:  $m_1 = m_2 = m$  מונחים

זה על גבי זה, על גבי שולחן אופקי חלק (ראה איור).

בין הגופים קיים חיכוך, ומקדמי החיכוך הקינטי

והסטטי הם:  $\mu_s$ ,  $\mu_k$ .

כוח חיצוני  $\vec{F}$  מופעל על הגוף העליון בזווית  $\alpha$  מתחת לאופק.

הביעו את תשובתכם באמצעות הפרמטרים:  $F$ ,  $\alpha$ ,  $m$ ,  $g$ ,  $\mu_s$ ,  $\mu_k$ .

א. בהנחה שהגופים נעים יחדיו, מהי התאוצה המשותפת?

ב. בהנחה שהגופים נעים יחדיו, מהו גודלו של כוח החיכוך בין הגופים?


ג. מהו גודלו המקסימלי של  $\vec{F}$ , כך שהגופים ינועו יחדיו?

ד. נתון כי:  $\alpha = 30^\circ$ ,  $\mu_k = 0.15$ ,  $\mu_s = 0.2$ .

מצא את תאוצת כל גוף, כאשר הכוח הדוחף הוא:  $F = \frac{1}{2}mg$ .

ה. חזור על סעיף ד' כאשר  $F = 3mg$ .

### 12 מסה על מסה מחוברות בגלגלת



נתונה מערכת הכוללת שני גופים:  $m_1 = 4\text{kg}$ ,  $m_2 = 3\text{kg}$ .

הגופים קשורים על ידי חוט וגלגלת אידיאלית,

ומונחים על מישור משופע בעל זווית  $\alpha = 30^\circ$ .

מקדמי החיכוך בין הגופים הם:  $\mu_k = \mu_s = 0.4$ ,

ומקדמי החיכוך עם המישור הם:  $\mu_k = \mu_s = 0.3$ .


כוח אופקי  $F$  פועל על  $m_2$ .

א. מהו ה- $F$  המקסימלי, כך שהגופים יישארו במנוחה?


ב. אם  $F = 40\text{N}$ , מהי תאוצת הגופים?

**(13) זמן לעלות ולרדת מדרון עם חיכוך**

- גוף נזרק במעלה מדרון משופע במהירות התחלתית  $v_0$ .  
 זווית השיפוע של המדרון היא  $\theta$  ומקדם החיכוך בין המדרון לגוף הוא  $\mu_k$ .  
 א. מצאו כמה זמן ייקח לגוף לחזור לנקודת ההתחלה  
 (בהנחה שהוא לא נשאר במנוחה בשיא הגובה)?  
 ב. מה היחס בין המהירות הסופית והמהירות ההתחלתית של הגוף?

**(14) גוף על גוף וכוח מושך**

- במערכת שבאיור המסות נתונות.  
 נתונים גם מקדמי החיכוך בין  $m_1$  למשטח  $\mu_{k1}, \mu_{s1}$   
 ומקדמי החיכוך בין  $m_1$  ל- $m_2$   $\mu_{k2}, \mu_{s2}$ .  
 הכוח  $F$  באיור מתייחס רק לסעיף ב.  
 א. מהן תאוצות הגופים והמתיחות בחוט  
 בהנחה ש- $m_2$  נעה בתאוצה יחסית ל- $m_1$ ?  
 ב. מהו הכוח המינימאלי  $F$  שיש להפעיל בכדי שהמסות ינועו יחדיו?

**(15) תיבה על מכונית משולשת**

- מכונית עם זווית בסיס  $\alpha$  נוסעת בתאוצה קבועה.  
 מניחים תיבה בעלת מסה  $m$  על דופן המכונית.  
 א. מצאו את גודלו של כוח החיכוך  
 בין המכונית לתיבה אם ידוע  
 שתאוצת המכונית היא  $a$  ימינה  
 והתיבה לא מחליקה על הדופן.  
 ב. מהו  $\mu_s$  המינימלי המאפשר מצב זה?

**(16) כדור בתא מטען משופע**

- למשאית באיור תא מטען משופע בזווית  $\alpha$   
 ובסופו דופן אנכית.  
 בתוך תא המטען יש כדור בעל מסה  $M$ .  
 המשאית נוסעת בתאוצה קבועה  $a$  שמאלה.  
 מצאו את הכוחות הנורמלים שפועלים על הכדור בהנחה שאין חיכוך.

## תשובות סופיות:

$$(1) \quad a = \frac{F}{m} (\cos \theta + \mu_k \sin \theta) - \theta_k g \quad \text{א.} \quad \theta = 20^\circ \quad \text{ב.} \quad \theta_0 \approx 16.6992^\circ \quad \text{ג.}$$

$$(2) \quad \text{א. גודל: } a_x = g \tan \alpha, \text{ כיוון: חיובי} \quad \text{ב. לא}$$

$$(3) \quad F = \mu_s (m_1 + m_2) g = 28 \text{ N}$$


$$(4) \quad \text{א. מיקום-זמן: } x_1(t) = 0 - 20t - \frac{2}{2}t^2, \text{ מהירות-זמן: } v_1(t) = 20 - 2t$$

$$\text{ב. מיקום-זמן: } x_2(t) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}t^2, \text{ מהירות-זמן: } v_2(t) = 0 + \frac{1}{2}t$$

$$\text{ג. } v_2(t=8) = 4 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$$

$$(5) \quad a_{\min} = \frac{g}{\mu_s}$$

$$(6) \quad h_{\max} = 3 \text{ m} \quad \text{א.} \quad h_{\max} = 1.78 \text{ m} \quad \text{ב.}$$

$$(7) \quad \sum F_z = 0, \sum F_y = mg \sin 30^\circ, \sum F_x = 0 \quad \text{א.}$$


$$\text{ב. פרבולה כמו בזריקה אופקית.} \quad v_0 = \sqrt{2} \frac{\text{m}}{\text{sec}}$$

$$\text{ד. } v_{x(t_B)} = \sqrt{2} \frac{\text{m}}{\text{sec}}, \quad v_{y(t_B)} = 7.07 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$$

$$(8) \quad a_1 = a_2 = 2 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} \quad \text{א.} \quad N_{1 \rightarrow 2} = 6 \text{ N} \quad \text{ב.} \quad N_{2 \rightarrow 1} = 6 \text{ N} \quad \text{ג.}$$

$$(9) \quad m_{B_{\max}} = \frac{(m_A + m_C) \mu_s \cos \alpha}{1 + \sin \alpha - \mu_s \cos \alpha} \quad \text{א.}$$

$$\text{ב. } a = g[\mu_s \cos \alpha - \sin \alpha], \quad T = g(m_A + m_C) \mu_s \cos \alpha$$

$$\text{ג. } a_c = (\mu_k \cos \alpha - \sin \alpha) g, \quad a_A = a_B = \frac{g(m_B - \mu_k m_C \cos \alpha - m_A \sin \alpha)}{m_A + m_B}$$

$$(10) \quad N_A = 0.732 \text{ mg}, \quad N_B = 0.518 \text{ mg} \quad \text{א.} \quad \mu_{s_{\min}} = 0.464 \quad \text{ב.}$$

$$(11) \quad a = \frac{F \cos \alpha}{2m} \quad \text{א.} \quad f_s = \frac{F \cos \alpha}{2} \quad \text{ב.}$$

$$\text{ג. } F_{\max} = \frac{2\mu_s mg}{\cos \alpha - 2\mu_s \sin \alpha} \quad \text{ד. } a = 2.17 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$$

$$\text{ה. } a_1 = 22.2 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}, \quad a_2 = 3.75 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$$

$$a = 1.81 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} \quad \text{ב.} \quad F_{\max} = 31.05 \text{ N} \quad \text{א. (12)}$$

$$t = \frac{v_0}{g(\sin \theta + \mu_1 \cos \theta)} + \frac{v_0}{g \sqrt{(\sin^2 \theta - \mu_k^2 \cos^2 \theta)}} \quad \text{א. (13)}$$

$$\frac{v_f}{v_0} = \sqrt{\frac{\sin \theta - \mu_k \cos \theta}{\sin \theta + \mu_k \cos \theta}} \quad \text{ב.}$$

$$a_1 = a_3 = \frac{m_3 g - \mu_{k_2} m_2 g - \mu_{k_1} (m_1 + m_2) g}{m_1 + m_3} \quad , \quad a_2 = \mu_{k_2} g \quad \text{א. (14)}$$

$$F_{\min} = m_3 g - \mu_{s_2} g (m_3 + m_2) - \mu_{s_1} (m_1 + m_2) g \quad \text{ב.}$$

$$\mu_{s_{\min}} = \frac{g \sin \alpha - a \cos \alpha}{g \cos \alpha + a \sin \alpha} \quad \text{ב.} \quad f_s = mg \sin \alpha - ma \cos \alpha \quad \text{א. (15)}$$

$$N_1 = \frac{Mg}{\cos \alpha} \quad , \quad N_2 = M(a + g \tan \alpha) \quad \text{(16)}$$

# פיזיקה 1 מכניקה

פרק 6 - תנועה מעגלית

תוכן העניינים

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 87  | 1. נוסחאות בסיסיות בתנועה מעגלית. |
| 93  | 2. הכוח הצנטרפוגלי.               |
| 95  | 3. וקטורים בתנועה מעגלית.         |
| 98  | 4. תרגילים מסכמים.                |
| 102 | 5. תרגילים מסכמים למתקדמים.       |

## נוסחאות בסיסיות בתנועה מעגלית

### רקע

- תנועה מעגלית היא תנועה על מעגל עם רדיוס קבוע.

|                                 |                                                                 |                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| הדרך בתנועה מעגלית              | $S = \Delta\theta \cdot R$                                      | יש להציב את הזווית ברדיאנים                                                             |
| גודל המהירות הקווית (speed)     | $v(t) = \frac{dS}{dt}$                                          | כיוון המהירות תמיד משיק למעגל                                                           |
| מהירות זוויתית                  | $\omega = \frac{d\theta}{dt} = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$         | $f$ - התדירות<br>$T$ - זמן המחזור<br>התדירות וזמן המחזור מוגדרים רק בתנועה מעגלית קצובה |
| קשר בין המהירות הקווית לזוויתית | $v = \omega R$                                                  | קשר רק בין הגדלים                                                                       |
| תאוצה רדיאלית לכיוון מרכז המעגל | $a_r = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$                              |                                                                                         |
| הכוח                            | $\Sigma F_{\text{למרכז המעגל}} = m \frac{v^2}{R} = m\omega^2 R$ |                                                                                         |
| תאוצה זוויתית                   | $\alpha = \frac{d\omega}{dt}$                                   |                                                                                         |
| תאוצה משיקית                    | $a_\theta = \frac{d \vec{v} }{dt} = \alpha R$                   |                                                                                         |
| הגובה במעגל אנכי                | $h = R(1 - \cos \theta)$                                        | כאשר $h$ ו- $\theta$ נמדדים מתחתית המעגל                                                |

## שאלות

## (1) דוגמה-נהג מרוצים

נהג מרוצים נוסע במסלול מעגלי שרדיוסו 50 מטר.  
מהירותו של הנהג כתלות בזמן היא:  $v(t) = 4t$ .

- א. מצא את המהירות הזוויתית של הנהג כתלות בזמן ומצא את הזווית של הנהג לאחר 5 שניות? (בהנחה כי התחיל מזווית אפס).  
ב. מתי ישלים הנהג את הסיבוב הראשון?



## (2) דוגמה-חישוב מהירות זוויתית של מחוגי שעון

חשב את המהירות הזוויתית של מחוג השניות, מחוג הדקות ומחוג השעות בשעון מחוגים.


## (3) חישוב מהירות זוויתית של כדור הארץ

א. חשב את המהירות הזוויתית של סיבוב כדור הארץ סביב עצמו.

ב. מהי המהירות הקווית של אדם הנמצא בקו המשווה

אם רדיוס כדור הארץ הוא בערך 6400 ק"מ?

ג. מהי המהירות הקווית של אדם הנמצא בקו רוחב  $\lambda = 30^\circ$ ?



## (4) דוגמה-יובל מסובבת אבן

יובל קושרת אבן שמסתה 200 גרם לחוט באורך 0.7 מטר.

יובל מסובבת את האבן באמצעות החוט במעגל אופקי מעל ראשה

(כמו שמסובבים קלע). המהירות הזוויתית של האבן היא:  $12 \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$ .

מהי התאוצה הרדיאלית של האבן ומהי המתיחות בחוט?  
הנח שכוח הכובד זניח.

## (5) מסה קשורה לעמוד מסתובב


במערכת הבאה מסה  $m$  קשורה דרך שני חוטים למוט המסתובב


במהירות זוויתית  $\omega_0$ . אורך החוטים זהה ושווה ל- $l$ .

הזווית של החוטים עם המוט היא  $30^\circ$  מעלות.

מהי המתיחות בכל חוט? בשאלה זו כוח הכובד אינו זניח.

נתונים:  $m, l, \omega_0$ .



**(6) כדור בקערה כדורית**

כדור קטן מונח בתוך קערה כדורית בעלת רדיוס  $R$ . מניחים את הכדור בזווית של  $30^\circ$  מעלות ביחס לאופק ונותנים לו מהירות התחלתית לתוך הדף. מהו גודל המהירות ההתחלתית הדרוש כך שהכדור יישאר בתנועה מעגלית בגובה קבוע?

**(7) דוגמה-תאוצה זוויתית נהג המרוצים**

מצא את התאוצה הזוויתית בדוגמה-נהג מרוצים (שאלה 1).

**(8) זווית משתנה בזמן**

המיקום הזוויתי של נקודה על גבי שפת גלגל מסתובב נתונה ע"י:  $\phi = 5t + 3t^2 - 2t^3$ .

- א. מהי המהירות הזוויתית ב-  $t = 2\text{sec}$  ו-  $t = 4\text{sec}$ ?
- ב. מהי התאוצה הזוויתית הממוצעת בין זמנים אלו?
- ג. מהי התאוצה הזוויתית הרגעית בזמנים אלו?

**(9) תאוצה משיקית קבועה**


גוף נע במעגל בעל רדיוס  $R$  בתאוצה משיקית קבועה  $a_t$  וללא מהירות התחלתית. מצאו את גודל התאוצה הרדיאלית:  
א. כפונקציה של הזמן.  
ב. כפונקציה של זווית הסיבוב.

**(10) תאוצה משיקית רדיאלית וכוללת**

גוף נע במעגל שרדיוסו 3 מטר. הדרך שעובר הגוף נתונה ע"י:  $s = 6t^2 + 3t$ . חשב את התאוצה המשיקית, הרדיאלית והכוללת (כתלות בזמן).

**(11) דוגמה-כוח על נהג המרוצים**

בדוגמה של נהג המרוצים (שאלה 1), מצא מה הכוח הפועל על המכונית אם מסת המכונית (כולל הנהג) היא טון אחד. מי מפעיל כוח זה?

**12) דוגמה-כדור בלופ**

כדור קטן מאוד מתחיל להתגלגל ממנוחה מגובה  $h = 6m$  ונכנס לתוך מעגל אנכי.


נתון שהכדור משלים סיבוב ואין חיכוך בינו לבין הרצפה. רדיוס המעגל הוא:  $R = 2m$ .

א. מצא את מהירות הכדור בכל הנקודות באיור. (רמז: שימור אנרגיה).

ב. מצא את התאוצה הרדיאלית של הכדור באותן נקודות.

ג. מצא את התאוצה בכיוון המשיק באותן נקודות.

ד. מצא את גודל התאוצה הכוללת באותן נקודות.

**13) כוחות במטוטלת**

מטוטלת משוחררת ממנוחה מזווית של  $45^\circ$  מעלות. אורך החוט הוא  $l$  והמסה היא  $m$ .


א. מהי מהירות המסה בתחתית המסלול?

ב. מהי המתיחות בחוט ברגע זה?

ג. מהי מהירות המסה בנקודה B הנמצאת

בזווית  $30^\circ$  מעלות? ומהי המתיחות בחוט באותה נקודה?


ד. מהי המתיחות בחוט בשיא הגובה וברגע השחרור?

**14) רוכב אופנוע במעגל אנכי**

רוכב אופנוע מתחיל תנועתו מנקודת ההתחלה שבציור. מהי המהירות ההתחלתית המינימלית הנדרשת עבור הרוכב כך שיוכל להשלים את הסיבוב האנכי.

הנח שהרוכב אינו משתמש במנוע לאחר נקודת ההתחלה.

נתון:  $R, h$ .

**15) קופסה מחליקה על גבעה מעגלית**

קופסה במסה  $m$  מונחת על ראש גבעה בצורת חצי מעגל ברדיוס  $R$ .

הקופסה מתחילה להחליק לאחד הצדדים

ממנוחה כאשר אין חיכוך בינה לבין הגבעה.

מצא באיזה זווית הקופסה תתנתק מהגבעה.

## תשובות סופיות

$$(1) \quad \omega = \frac{2t}{25}, \theta \approx 57.3^\circ \quad \text{א.} \quad \text{ב. } 12.5 \text{ sec}$$

$$(2) \quad \text{מחוג שניות: } 0.105 \frac{\text{rad}}{\text{sec}} \quad \text{מחוג דקות: } 1.75 \cdot 10^{-3} \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$$

$$\text{מחוג שעות: } 1.45 \cdot 10^{-4} \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$$

$$(3) \quad \text{א. } 7.27 \cdot 10^{-5} \frac{\text{rad}}{\text{sec}} \quad \text{ב. } 465 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \quad \text{ג. } 400 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$$

$$(4) \quad T = 20.16 \text{ N}, a_r = 100.8 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$$

$$(5) \quad T_1 = \frac{mg}{\sqrt{3}} + \frac{m\omega_0^2 l}{2}, T_2 = \frac{-mg}{\sqrt{3}} + \frac{m\omega_0^2 l}{2}$$

$$(6) \quad v = \sqrt{\frac{3gR}{2}}$$

$$(7) \quad \alpha = \frac{2}{25} \frac{\text{rad}}{\text{sec}^2}$$

$$(8) \quad \omega(t=2) = -7 \frac{\text{rad}}{\text{sec}}, \omega(t=4) = -67 \frac{\text{rad}}{\text{sec}} \quad \text{א.} \quad \bar{\alpha} = -30 \frac{\text{rad}}{\text{sec}^2} \quad \text{ב.}$$

$$\alpha(t=2) = 18 \frac{\text{rad}}{\text{sec}^2}, \alpha(t=4) = -42 \frac{\text{rad}}{\text{sec}^2} \quad \text{ג.}$$

$$(9) \quad a_r = \frac{(a_t \cdot t)^2}{R} \quad \text{א.} \quad a_r = 2a_t \theta \quad \text{ב.}$$

$$(10) \quad a_\theta = 12 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}, a_r = (4t+1)^2 \cdot 3 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}, a = \sqrt{12^2 + 9(4t+1)^4}$$

$$(11) \quad |F| = \sqrt{(80t)^2 + 4000^2}, \text{ הכביש מפעיל כוח זה.}$$

$$(12) \quad |F| = \sqrt{(80t)^2 + 4000^2} \quad \text{החיכוך מהכביש:}$$

$$(13) \quad \text{א.} \quad v_A \approx 10.95 \frac{\text{m}}{\text{sec}}, v_C \approx 8.94 \frac{\text{m}}{\text{sec}}, v_D \approx 7.975 \frac{\text{m}}{\text{sec}}, v_E \approx 6.32 \frac{\text{m}}{\text{sec}}, v_F \approx 6.73 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$$

$$\text{ב.} \quad a_r = \frac{v^2}{R} \quad \text{לפי הנוסחה וכו',} \quad a_{r_A} = 60 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}, a_{r_B} = 40 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$$

$$\text{ג.} \quad a_{\theta_A} = 0, a_{\theta_C} = -g, a_{\theta_D} = -10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}, a_{\theta_E} = 0, a_{\theta_F} = 5 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$$

$$\text{ד.} \quad |\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{a_r^2 + a_\theta^2}$$

(14) א.  $v = \sqrt{0.58gl}$     ב.  $T = 1.58mg$   
 ג. מהירות:  $v_B = \sqrt{0.32gl}$ , מתיחות:  $T = mg(1.19)$   
 ד. בשניהם:  $T = mg \frac{1}{\sqrt{2}}$   
 (15)  $\theta = 41.8^\circ$

## הכוח הצנטריפוגלי

### רקע

$$F_r = m\omega^2 R$$

בכיוון החוצה מהמעגל


שימו לב שהכוח הצנטריפוגלי הוא כוח מדומה והוא מגיע מדרך הסתכלות שונה על תנועה מעגלית של צופה המסתובב עם המערכת. בצורת ההסתכלות הזו אין לגוף תאוצה רדיאלית.

### שאלות

#### 1) מסה על שולחן מסתובב

מסה  $m$  מונחת על דיסק המסתובב על שולחן במהירות זוויתית קבועה  $\omega$ . המסה מחוברת לחוט העובר דרך מרכז השולחן ומחובר למסה  $m$ . בין המסה  $m$  לדיסק יש חיכוך ומקדם החיכוך הסטטי הוא  $\mu_s$ . נתון:  $\omega, \mu, m, \mu_s$ .

מהו הרדיוס המינימלי והרדיוס המקסימאלי שבו ניתן להניח את המסה כך שלא תזוז בכיוון הרדיאלי?



## תשובות סופיות

$$r_{\max}^{\min} = \frac{Mg \pm \mu_s mg}{m\omega^2} \quad (1)$$

## וקטורים בתנועה מעגלית

### רקע

וקטור המיקום:  $\vec{r} = R \cos \theta \hat{x} + R \sin \theta \hat{y}$


הקשר בכללי בין המהירות הקווית לזוויתית:  $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$

הקשר הכללי בין התאוצה המשיקית לתאוצה הזוויתית:  $\vec{a}_\theta = \vec{\alpha} \times \vec{r}$

### שאלות


#### (1) מציאת הכיוון של אומגה

במקרים הבאים נתון כיוונה של המהירות הקווית של גוף הנע במעגל. מצא את הכיוון של המהירות הזוויתית בכל מקרה:



#### (2) תרגיל לנוסחה $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$

מצא את כיוון המהירות הקווית של הגוף במקרים הבאים בהנחה כי הגוף נע בתנועה מעגלית.



#### (3) תאוצה זוויתית קבועה כוקטור

גוף נע במעגל בעל רדיוס קבוע שאינו ידוע.

התאוצה הזוויתית של הגוף קבועה ונתונה לפי:  $\vec{\alpha} = 2\hat{x} + 3\hat{y} + 1\hat{z}$  ביחידות של רדיאן לשנייה בריבוע.

המיקום ההתחלתי והמהירות הזוויתית ההתחלתית הם:  $\vec{r}_0 = 5\hat{x} + 3\hat{y} - 2\hat{z}$

במטרים ו-  $\vec{\omega}_0 = -2\hat{x} + 3\hat{y} - 4\hat{z}$  ברדיאן לשנייה.

מצא את גודל המהירות הקווית של הגוף ב-  $t = 2 \text{ sec}$ .

**(4) דוגמה-וקטור המיקום של נהג המרוצים**

מצא את וקטור המיקום כתלות בזמן בדוגמה עם נהג המרוצים :  
 נהג מרוצים נוסע במסלול מעגלי שרדיוסו 50 מטר. מהירותו של הנהג כתלות בזמן היא  $v(t) = 4t$ .

א. מצא את המהירות הזוויתית של הנהג כתלות בזמן, ומצא את הזווית של הנהג לאחר 5 שניות (בהנחה כי התחיל מזווית אפס).  
 ב. מתי ישלים הנהג את הסיבוב הראשון?


**(5) תנועה מעגלית שאינה סביב הראשית**

גוף נע על מעגל ברדיוס 3m.

הגוף חולף דרך הנקודה (5,4) ביחס לראשית הצירים O.

נתון כי מרכז המעגל נמצא ב- (5,7) והמהירות הזוויתית היא :  $\omega = \frac{2\pi \text{ rad}}{20 \text{ sec}}$

- מצא את וקטור המיקום של הגוף כפונקציה של הזמן.
- מצא את וקטור המהירות של הגוף כפונקציה של הזמן.
- מצא את וקטור התאוצה של הגוף כפונקציה של הזמן.
- מצא את המהירות הממוצעת בין  $t = 5\text{sec}$  ל-  $t = 10\text{sec}$ .
- מצא את תחום הזווית ביחס לראשית בו נע וקטור המקום.
- מצא את תחום הגדלים של וקטור המקום.



## תשובות סופיות

$$(1) \quad \text{א. } \otimes \quad \text{ב. } \downarrow \quad \text{ג. } \swarrow$$

$$(2) \quad \text{א. } \hat{y} \quad \text{ב. } -\hat{z}$$

$$(3) \quad 63.63 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$$

$$(4) \quad \vec{r} = 50 \cos\left(\frac{t^2}{25}\right) \hat{x} + 50 \sin\left(\frac{t^2}{25}\right) \hat{y}$$

$$(5) \quad \text{א. } \vec{r} = \left( 5 + 3 \cos\left(\frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{10}t\right), 7 + 3 \sin\left(\frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{10}t\right) \right)$$

$$\text{ב. } \vec{v} = \dot{\vec{r}} = \left( -3 \sin\left(\frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{10}t\right) \frac{\pi}{10}, 3 \cos\left(\frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{10}t\right) \frac{\pi}{10} \right)$$

$$\text{ג. } \vec{a} = \dot{\vec{v}} = -\omega^2 \vec{r} \quad \text{ד. } \vec{v} = \left( \frac{-3}{5}, \frac{3}{5} \right)$$

$$\text{ה. } \theta_{\min} = 34.5^\circ, \theta_{\max} = 74.9^\circ \quad \text{ו. } r_{\max} = 8.6 + 3, r_{\min} = 8.6 - 3$$


## תרגילים מסכמים:

### שאלות:




#### (1) מטוטלת מסתובבת אופקית

מטוטלת בעלת אורך  $l$  מסתובבת סביב ציר האנך לתקרה בזווית מפתח קבועה  $\theta$ . נתון:  $\theta, l$ . מצא את התדירות וזמן המחזור של הסיבוב.



#### (2) מכונית במחלף

מכונית נוסעת על מחלף משופע. זווית השיפוע של המחלף היא  $15^\circ$  מעלות. רדיוס הסיבוב של המחלף הוא  $15$  מטרים. אם נניח שלמכונית אין חיכוך עם הכביש, מה המהירות בה צריכה לנסוע המכונית על מנת לא להחליק?



#### (3) הילוכי אופניים

הילוכים של אופניים מורכבים משני גלגלי שיניים ברדיוסים שונים ושרשרת המקיפה את שני הגלגלים. כאשר השרשרת מתוחה האורך שלה קבוע. מצאו את הקשר בין מהירות הסיבוב של גלגלי השיניים אם הרדיוסים שבהם מקיפה השרשרת כל אחד מהגלגלים ידועים.

#### (4) שני גופים על מסילה מעגלית אנכית (כולל עבודה ואנרגיה)

מסילה מעגלית חלקה, דקה ובעלת רדיוס  $R$  מוצבת במישור אנכי. מישור משופע וחלק משיק למסילה ומשתלב בה כמתואר בתרשים. מציבים את בול A בגובה  $2R$  ואת בול B על המישור המשופע בגובה זהה מהרצפה. נותנים ל-A דחיפה קלה ועוזבים את B ממצב מנוחה. שני הגופים מחליקים, גוף A בצידה החיצוני של המסילה ואילו גוף B משתלב ונכנס לתוך המסילה. בשלב מסוים כל אחד מהגופים מתנתק מהמסילה. התייחסו לגופים כאל גופים נקודתיים.

א. באיזו זווית  $\theta_1$  עם ציר ה-y, יתנתק גוף A מהמסילה?


ב. באיזו זווית  $\theta_2$  יתנתק גוף B מהמסילה?

ג. אם שני הגופים מתנתקים מהמסילה בו זמנית.

מה גודל המהירות היחסית בניהם?


ד. מה יהיה המרחק בין הגופים לאחר הניתוק,

אחרי פרק זמן  $\Delta t$  (הניחו שהגופים עדיין באוויר).



**(5) מציאת מיקום כפונקציה של הזמן**

חלקיק מוגבל לנוע על מעגל ברדיוס  $R$ .  
נתון שגודל המהירות של החלקיק:  $V(t) = Ct^2$  כאשר  $C$  קבוע.  
מצאו ופתרו את משוואת המיקום של החלקיק.

**(6) מסובבים פיצה בתנועה מעגלית**

מסובבים פיצה בתנועה מעגלית כך שמתקיים:  $\theta = 4t^2 + 5t$   
כאשר  $\theta$  נמדדת ברדיאנים ו- $t$  בשניות.

א. מצאו את המהירות הזוויתית של הבצק.

ב. מצאו את התאוצה הזוויתית של הבצק.

ג. לאחר שהוסיפו את הזיתים מסובבים עוד פעם את הפיצה באותו אופן.

מצאו את הרדיוס בו נמצא זית הנע בתאוצה משיקית של  $0.2 \frac{m}{sec^2}$ .

ד. חזור על סעיף ג' אם ידוע שהתאוצה הקווית הכוללת ב- $t = 1sec$  היא:  $0.2 \frac{m}{sec^2}$ .

**(7) תאוצה משיקית קבועה**

נקודה נעה במסלול מעגלי שרדיוסו 30 ס"מ.

הנקודה נעה בתאוצה משיקית קבועה של 4 מטר לשנייה בריבוע.

לאחר כמה זמן מתחילת התנועה התאוצה הרדיאלית של הנקודה תהיה:

א. גדולה פי 2 מהתאוצה המשיקית?

ב. שווה לתאוצה המשיקית?

**(8) זווית בין משיקית לכוללת**

גוף נקודתי מתחיל לנוע ממנוחה במסלול מעגלי בעל רדיוס 2 מטר בתאוצה משיקית קבועה. ידוע כי לאחר שני סיבובים שלמים הגיע הגוף למהירות קווית של 2 מטר לשנייה.

א. תוך כמה זמן השלים הגוף את שני הסיבובים הראשונים?

ב. מה הייתה התאוצה המשיקית של הגוף?

ג. מה הייתה הזווית בין וקטור התאוצה המשיקית לווקטור התאוצה השקולה לאחר שני הסיבובים הראשונים?

ד. מתי, החל מעת תחילת התנועה, תהיה התאוצה המשיקית שווה בגודלה לתאוצה המרכזית של הגוף?

ה. איזה מרחק יעבור הגוף עד אז? (ראה סעיף ד').


**9 חמישה סיבובים**

נקודה שנמצאת במרחק 15 ס"מ ממרכז הגלגל, מתחילה להסתובב בתאוצה משיקית קבועה. הנקודה מגיעה למהירות זוויתית של  $20 \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$  לאחר 5 סיבובים. מצא את:

- התאוצה המרכזית של הנקודה כעבור 5 שניות.
- התאוצה המשיקית של הנקודה כעבור 5 שניות.
- התאוצה השקולה של הנקודה כעבור 5 שניות.

**10 טנק יורה פגז מדיסקה מסתובבת**

- טנק נמצא בקצה של דיסקה ברדיוס R היכולה להסתובב במקביל לקרקע. הדיסקה מתחילה להסתובב ב- $t = 0$  בתאוצה זוויתית  $\ddot{\theta} = kt^2$ . כעבור זמן  $t_0$  הטנק נמצא במיקום שבאיור ויורה פגז. מהירות הלוע של הפגז היא  $v_0$ . התותח מכיוון בכיוון הרדיאלי כלפי חוץ, ובזווית  $\varphi$  מעל הקרקע (במאונך למישור שבו מסתובבת הדיסקה).
- באיזה מהירות ביחס לצופה נייח יוצא הכדור מלוע הטנק?
  - באיזה מרחק מנקודת הירי יפגע הפגז?

**11 חוט נקרע במעגל אנכי גבוה**

- כדור קטן שמסתו  $m$  קשור לקצהו של חוט שאורכו  $l$ . הכדור מסתובב במעגל אנכי שמרכזו בגובה  $2l$  מעל הרצפה. כאשר החוט מתוח והכדור נמצא אנכית מעל ציר סיבוב מעניקים לו מהירות אופקית  $v_0$ .
- מה המהירות המינימלית  $v_0$  הנדרשת כדי שהכדור יבצע תנועה מעגלית שלמה?
  - מעניקים לכדור מהירות התחלתית:  $v_0 = 1.5\sqrt{gl}$ , אם החוט נקרע ברגע שמתוחותו עולה על  $5.25mg$  מצאו את הזווית  $\theta$  שבה יקרע החוט.
  - מה המהירות הכדור ברגע שהחוט נקרע, אם נתון ש:  $l = 2m$ ?
  - תוך כמה זמן מרגע קריעת החוט יפגע הכדור ברצפה?

## תשובות סופיות:

$$f = \frac{\omega}{2\pi}, T = \frac{2\pi}{\omega} \quad (1)$$

$$V \approx 6.34 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \quad (2)$$

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2}{r_1} \quad (3)$$

$$d = \sqrt{\frac{8}{3}} g R \Delta t \quad \text{ז} \quad |\vec{V}_{AB}| = \sqrt{\frac{8}{3}} g R \quad \text{ג} \quad \theta_2 = \theta_1 = 48.2^\circ \quad \text{ב} \quad \theta_1 = 48.2^\circ \quad \text{א} \quad (4)$$

$$x = R \cos \frac{C \cdot t^3}{3R}, y = R \sin \left( \frac{C \cdot t^3}{3R} \right) \quad (5)$$

$$R = 2.5 \text{ cm} \quad \text{ג} \quad \alpha = \dot{\omega} = 8 \frac{\text{rad}}{\text{sec}^2} \quad \text{ב} \quad \omega = \dot{\theta} = 8t + 5 \quad \text{א} \quad (6)$$

$$1.18 \cdot 10^{-3} \text{ m} \quad \text{ז} \quad t \approx 0.27 \text{ sec} \quad \text{ב} \quad t \approx 0.39 \text{ sec} \quad \text{א} \quad (7)$$

$$t_2 = 5 \text{ sec} \quad \text{ז} \quad \alpha = 87.73^\circ \quad \text{ג} \quad a_\theta \approx 0.08 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} \quad \text{ב} \quad t_1 \approx 25.1 \text{ sec} \quad \text{א} \quad (8)$$

$$S = 1 \text{ m} \quad \text{ה}$$

$$|a| \approx 150 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} \quad \text{ג} \quad a_\theta \approx 0.95 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} \quad \text{ב} \quad a_r \approx 150 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} \quad \text{א} \quad (9)$$

$$v_x = v_0 \cos \varphi, v_y = \frac{kt_0^3 R}{3}, v_z = v_0 \sin \varphi \quad \text{א} \quad (10)$$

$$d = \left( (v_0 \cos \varphi)^2 + \left( \frac{kt_0^3 R}{3} \right)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left( t_0 + \frac{2v_0 \sin \varphi}{g} \right) \quad \text{ב}$$

$$t \approx 0.3 \text{ sec} \quad \text{ז} \quad v \approx 10 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \quad \text{ג} \quad \theta \approx 110^\circ \quad \text{ב} \quad v_{\min} = \sqrt{gl^5} \quad \text{א} \quad (11)$$

## תרגילים מסכמים למתקדמים:

### שאלות:

#### (1) נקודה על גלגל

מיקומו של גוף כתלות הזמן נתון ע"י:  $x(t) = R\omega t - R \sin(\omega t)$ ,  $y(t) = R - R \cos(\omega t)$ , כאשר  $R$  ו- $\omega$  קבועים.


- מצאו את וקטורי המהירות והתאוצה של הגוף.
- מצאו את גודל התאוצה המשיקית והנורמאלית.
- ציירו את מסלול הגוף.

#### (2) חבל עם מסה מסתובב\*

נתון חבל אחיד בעל מסה  $m$  ואורך  $l$ .  
 החבל קשור בקצה אחד ומסתובב במישור אופקי במהירות זוויתית  $\omega$ .  
 מצא את גודל המתחים לאורך החבל (כתלות במרחק מהקצה הקשור).  
 רמז: יש לחלק את החבל לחתיכות קטנות ולעשות משוואת תנועה על כל חתיכה.

#### (3) מטוטלת כפולה מסתובבת אופקית\*

גוף בעל מסה  $m_1$  מחובר באמצעות חוט באורך  $l_1$  לתקרה.  
 גוף בעל מסה  $m_2$  מחובר באמצעות חוט באורך  $l_2$  לגוף הראשון.  
 שני הגופים מסתובבים יחדיו בתדירות זוויתית קבועה  $\omega$  סביב ציר האנך לתקרה.  
 הזוויות בין החוטים לאנכים הן:  $\alpha$ ,  $\beta$  (ראה איור).  
 א. רשום את משוואת התנועה לכל גוף.  
 ב. מצא מהי הזווית  $\alpha$  עבור המקרה בו  $m_2 = 0$  ו- $m_1 \neq 0$ .




מהי תדירות הסיבוב המינימלית האפשרית?  
 ג. דני ויוסי ניסו למצא את  $\omega$  במקרה הכללי.  
 דני הציב את גדלי המתחיות של החוטים  
 במשוואת התנועה של גוף 2

$$\text{וקיבל: } \omega^2 = \frac{g \tan \beta}{l_1 \sin \alpha + l_2 \sin \beta}$$

יוסי הציב את המתחיות במשוואת התנועה

$$\text{של גוף 1 וקיבל: } \omega^2 = \frac{g}{l_1} \cdot \frac{\frac{m_1 + m_2}{m_1} \tan \alpha - \frac{m_2}{m_1} \tan \beta}{\sin \alpha}$$

ישב את הסתירה.

**(4) מים בכלי מסתובב\*\***

תיבה באורך  $2L$  ורוחב  $\omega$  כך ש-  $\omega \ll L$  מכילה מים. גובה המים בתיבה הוא  $h$ . מסובבים את התיבה במהירות זוויתית  $\omega$  סביב ציר העובר במרכזה. הנח כי המים לא נשפכים מהתיבה.

א. מצאו את הפונקציה המתארת את פני המים במרחב (רמז: חשבו את השיפוע של המשיק לפני המים בנקודה כלשהיא, שיפוע זה הוא הנגזרת של הפונקציה).


- ב. מהו הפרש הגבהים בין המים במרכז התיבה למים במרחק אופקי  $d$  מהמרכז?  
 ג. מה יהיה הפרש הגבהים אם נגדיל את מהירות הסיבוב פי 2?  
 ד. מהו התנאי שתחתית התיבה תתייבש בנקודה כלשהיא?

**תשובות סופיות:**

$$\vec{v} = (R\omega - R \cos(\omega t) \cdot \omega) \hat{x} + R \sin(\omega t) \cdot \omega \hat{y} \quad \text{א.} \quad (1)$$

$$\vec{a} = R\omega^2 \sin(\omega t) \hat{x} + R\omega^2 \cos(\omega t) \hat{y}$$

$$|\vec{a}_t| = \frac{R\omega^2 (\sin \omega t)}{\sqrt{2(1 - \cos \omega t)}}, \quad |\vec{a}_n| = \frac{R\omega^2 (\cos(\omega t) - \cos(2\omega t))}{\sqrt{2(1 - \cos(\omega t))}} \quad \text{ב.}$$



$$T(x) = \frac{m\omega^2}{2l} (l^2 - x^2) \quad \text{ג.} \quad (2)$$

$$\sum F_x = m_1 \omega^2 l_1 \sin \alpha, \quad \sum F_y = 0 \quad \text{גוף 1} \quad (3)$$

$$\sum F_x = m_2 \omega^2 (l_1 \sin \alpha + l_2 \sin \beta), \quad \sum F_y = m_2 g \quad \text{גוף 2}$$

$$\Delta y = \frac{2\omega^2 d^2}{g} \quad \text{ג.} \quad \Delta y = \frac{\omega^2 d^2}{2g} \quad \text{ב.} \quad y = \frac{\omega^2 x^2}{2g} + h - \frac{\omega^2 L^2}{6g} \quad \text{א.} \quad (4)$$

$$h = \frac{\omega^2 L^2}{6g} \quad \text{ד.}$$

# פיזיקה 1 מכניקה

פרק 7 - קואורדינטות פולריות

תוכן העניינים

1. הרצאות ותרגילים ..... 104

## הרצאות ותרגילים

### רקע

$$\begin{aligned}x &= r \cos \theta \\y &= r \sin \theta\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}r &= \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan \theta &= \frac{y}{x}\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}\hat{r} &= \cos \theta \hat{x} + \sin \theta \hat{y} \\ \hat{\theta} &= -\sin \theta \hat{x} + \cos \theta \hat{y}\end{aligned}$$

$$\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} = r\hat{r}$$

$$\vec{v} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}$$

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{r} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\hat{\theta}$$

### שאלות



#### 1) מסה קשורה עם קפיץ לקיר מסתובב

גוף נקודתי מחובר ע"י קפיץ לקיר שמסתובב במהירות זוויתית קבועה  $\omega$  במישור האופקי. אורך הקפיץ משתנה בזמן ונתון

לפי:  $l(t) = l_0 + A \sin(\Omega t)$  כאשר  $A$ ,  $\Omega$  ו- $l_0$

הם קבועים חיוביים ומתקיים  $A < l_0$ .

א. מהי תאוצת הגוף בקואורדינטות פולריות?

ב. נניח ש- $A$ ,  $\Omega$  ו- $\omega$  ידועים, מהו התנאי על  $l_0$  כך שבנקודות זמן

מסוימות כיוון התאוצה יהיה רק בכיוון  $\hat{\theta}$ ?

ג. מהי התשובה המספרית לסעיף ב' אם:  $\omega = 1 \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$ ,  $A = 0.2\text{m}$ ,  $\Omega = 3 \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$ ?


**(2) דני מסתובב במעגלים**

דני בן השלוש מתחיל לרוץ במעגלים ממנוחה.  
 דני מתרחק מהנקודה בה התחיל לרוץ לפי:  $r = At^2$  והוא מסתובב במהירות זוויתית הולכת וגדלה:  $\omega = Bt$ .  
 $\left( A = 0.4167 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}, B = 1 \frac{\text{rad}}{\text{sec}^2} \right)$ .

- מצא את המהירות של דני כתלות בזמן בקואורדינטות פולריות.
- מצא את התאוצה של דני כתלות בזמן בקואורדינטות פולריות.
- כאשר דני מגיע לתאוצה השווה ל- $g$  הוא מקבל סחרחורת ונופל (על הטוסיק כמובן), מתי ייפול דני?

**(3) כוח מסתורי בצינור**


צינור מסתובב במהירות זוויתית קבועה  $\omega$  סביב מרכזו.  
 כדור קטן בעל מסה  $m$  נמצא ב- $t = 0$  במרכז הצינור.  
 לכדור מהירות התחלתית  $v_0$  בכיוון הרדיאלי.  
 כוח מסתורי  $F$  (לא בהכרח קבוע) פועל על הכדור  
 ושומר על מהירות הכדור ביחס לצינור להיות קבועה  
 ושווה ל- $v_0$ . בין הצינור לכדור אין חיכוך.



- מה מיקום הכדור כתלות בזמן?
- מהו הכוח  $F$  כתלות בזמן הפועל על הכדור?

**(4) מנוע מושך כדור בתוך דיסקה מסתובבת**


דיסקה ברדיוס  $R$  מונחת על שולחן ומקובעת במרכזו  
 אך מסתובבת סביב מרכזו במהירות זוויתית קבועה  $\omega$ .  
 בתוך הדיסקה ישנה תעלה, כדור בעל מסה  $m$  מונח  
 בקצה של התעלה ויכול לזוז רק בתוך התעלה.  
 במרכז הדיסקה נמצא מנוע המחובר בחוט לכדור.  
 המנוע מושך את הכדור למרכז הדיסקה כך שתאוצת  
 הכדור ביחס לדיסקה היא  $a_0$ .



- מצא את מיקום המסה כתלות בזמן ביחס לדיסקה וביחס למעבדה, בקואורדינטות פולריות.
- מה הכוח שמפעיל המנוע על הכדור כתלות בזמן?
- מה הכוח שמפעילים הקירות על הכדור?

**(5) מכ"מ מזהה טיל**

מכ"מ מזהה טיל הנמצא מעט מעל האטמוספירה עם מנוע כבוי. הבעיה דו מימדית.



נתון כי:  $r = 70\text{km}$ ,  $\theta = 30^\circ$ ,  $\dot{r} = 1100 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ ,  $\dot{\theta} = 1.5 \cdot 10^{-2} \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$

החיכוך עם האוויר זניח בגובה רב והתאוצה היחידה היא

תאוצת הכובד השווה ל-  $\frac{9.6\text{m}}{\text{sec}^2}$  (התאוצה קטנה מעט בגלל

המרחק ממרכז כדור הארץ).

א. מהו גודלה של מהירות הטייל?

ב. מצאו את הערך של  $\ddot{r}$  ושל  $\ddot{\theta}$ .

**(6) כדור חופשי בתוך צינור מסתובב**

צינור מסתובב במהירות זוויתית קבועה  $\omega$  סביב מרכזו.

כדור קטן בעל מסה  $m$  נמצא בתוך הצינור.

ב-  $t = 0$  הכדור נמצא במנוחה ביחס לצינור ובמרחק  $d$  ממרכז הצינור.

בין הצינור לכדור אין חיכוך.


א. רשום את הכוחות הפועלים על הכדור בצירים פולריים.

ב. רשום את משוואת התנועה בכיוון הרדיאלי.

ג. בדוק כי הפתרון:  $r(t) = Ae^{\omega t} + Be^{-\omega t}$  מתאים

למשוואה שמצאת ומצא את הקבועים  $A$ ,  $B$ .

ד. מהו הכוח הנורמאלי הפועל מהצינור על כדור?

**(7) משוואות לתנועת חלקיק**

תנועת חלקיק מתוארת ע"י המשוואות:  $r = A \cdot t^\alpha$  ו-  $\dot{\theta} = \omega = \text{const}$

כאשר  $A$ ,  $\alpha$  קבועים.

א. הביעו את  $r$  כתלות ב-  $\theta$ .

ב. שרטטו את התנועה עבור:  $\alpha = 0$ ,  $\alpha < 0$ ,  $\alpha > 0$ .

ג. הניחו כי הגוף מתחיל מהראשית וכי:  $\alpha = 1$ ,  $A = 4 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ ,  $\omega = 2 \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$ .

כמה סיבובים יעבור הגוף עד שהרדיוס יהיה  $30\text{m}$ ?

**(8) חללית במסלול ספיראלי**

חללית 1 נעה במסלול ספיראלי (בדו מימד) כך ש-  $r_1(t) = At^\alpha$ , כאשר  $A$  ו-  $\alpha$  הם קבועים חיוביים נתונים.

$$\ddot{r}(t) \cdot \hat{r} = A\alpha(\alpha-1)t^{\alpha-2} - AC^2t^\alpha e^{2Ct}$$

החללית נעה נגד כיוון השעון ו-  $C$  הוא גם קבוע חיובי נתון. בזמן  $t = 0$  החללית חוצה את ציר ה-  $x$  השלילי.

א. מצאו את מיקום החללית בקואורדינטות קרטזיות.

ב. חללית 2 נעה על מסלול ספיראלי כך ש-  $r_2(t) = \frac{1}{2}r_1(t)$  ובאותה זווית

כמו חללית 1.

מצאו את המיקום, המהירות והתאוצה של חללית 1 ביחס לחללית 2.

ג. תארו באופן מילולי את תנועתה של חללית 1 ביחס לחללית 2 אם  $\alpha = 2$ .

**(9) עכביש הולך על דיסקה מסתובבת**

עכביש נמצא במרכז של דיסקה המסתובבת במהירות זוויתית  $0.2 \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$ .

העכביש מתחיל לנוע במהירות קבועה ובקו ישר ביחס לדיסקה עד לקצה הדיסקה ברדיוס  $2\text{m}$ . הזמן שלוקח לעכביש להגיע לקצה הוא 4 שניות.

א. מצאו את וקטורי מהירותו ותאוצתו של העכביש (ביחס למעבדה).

ב. הסבירו מדוע יש לעכביש תאוצה אם הוא הולך במהירות קבועה ביחס לקרוסלה.

ג. הסבירו באופן איכותי את כל אחד מהרכיבים של תאוצת העכביש.


**(10) מהירות מינימאלית ללווין**

לווין שעובר בסמוך לפני כדה"א מרגיש תאוצה  $\hat{a} = -g\hat{r}$  (בהזנחת התנגדות האוויר).

מצאו מה צריכה להיות המהירות המינימלית של הלווין כך שלא יתנגש בפני כדה"א וישלים סיבוב.

**(11) משחק תופסת\***


ארבעה ילדים משחקים תופסת, הם מתחילים לרוץ מארבע פינות של ריבוע בגודל  $d \times d$ . כל ילד רץ במהירות קבועה  $v$  לעבר הילד שמשמאלו (הכיוון הוא תמיד לכיוון הילד שמשמאלו).



- תאר את תנועת הילדים וקבע היכן ייפגשו.
- כעבור כמה זמן ייפגשו?
- כמה סיבובים עשה כל ילד עד למחצית מהזמן שנפגשו?
- מצא את וקטור המיקום של הילד המתחיל ברביע הראשון כפונקציה של הזמן בקואורדינטות קרטזיות. רמזים: מהי הסימטריה בבעיה? איזה צורה יוצרים הילדים בכל רגע? רשום את המהירות של כל ילד בקואורדינטות פולריות.

**(12) שתי מסות מחוברות בחוט בתוך דסקה מסתובבת\***

על דסקה המסתובבת במהירות זוויתית קבועה  $\omega$  ישנה מסילה העוברת דרך מרכז הדסקה. במסילה ישנן שתי מסות  $m_1$ ,  $m_2$  המחוברות בחוט באורך  $l$ . המערכת מונחת על שולחן אופקי (ז"א כיוון כוח הכובד לתוך הדף).



- מצא את היחס בין המסות על מנת שרדיוס כל מסה יישאר קבוע במהלך התנועה.
- כעת חותכים את החוט.
- נסמן את הזמן שבו חותכים את החוט ב- $t = 0$ .
- רשום משוואה דיפרנציאלית שפתרונה ייתן את  $r_1(t)$ .
- פתור את המשוואה ומצא את  $r_1(t)$ .
- הנח כי  $r_1$  הוא מיקום המסה ברגע השחרור.


**(13) רוכב אופנוע\***

רוכב אופנוע מתחיל את תנועתו ממנוחה. מרחקו מנקודת ההתחלה משתנה לפי  $r = Ct$ , כאשר  $C$  קבוע. בנוסף הרוכב מסתובב במהירות זוויתית קבועה  $\omega$ . מצא את המרחק המקסימלי אליו יגיע הרוכב אם נתון מקדם החיכוך הסטטי  $\mu_s$ .

### 14 סטודנט ומרצה על גלגל ענק\*

סטודנט נמרץ פוגש מרצה בעת ביקורו בפארק שעשועים. הסטודנט נחוש בדעתו להראות שהוא יודע מכניקה ומשכנע את המרצה לטפס למרכז גלגל ענק. הסטודנט עולה על הקרון של הגלגל. הגלגל מסתובב במהירות זוויתית קבועה  $\omega$  עם כיוון השעון ורדיוסו  $R$ . כשהסטודנט מגיע לשיא הגובה המרצה זורק כרית במהירות התחלתית  $v_0$  ובזווית  $\alpha$  ביחס לאופק. בזמן מסוים לאחר זריקת הכרית הסטודנט קופץ מהקרון כך שמהירותו היא המהירות המשיקית של הקרון ביחס למרצה. הסיכוי היחידי של הסטודנט לא להיפצע בעת הפגיעה בקרקע הוא אך ורק אם ינחת על הכרית. הנח שתנועת הכרית היא כתנועת אבן. לפני הזינוק של הסטודנט:

- רשמו את ווקטור המיקום של הכרית בקואורדינטות קרטזיות ביחס למרצה.
- רשמו את ווקטור המיקום של הכרית בקואורדינטות פולריות ביחס למרצה.
- רשמו את ווקטור המיקום של הסטודנט בקואורדינטות קרטזיות ביחס למרצה.
- רשמו את ווקטור המיקום של הסטודנט בקואורדינטות פולריות ביחס למרצה.
- רשמו את ווקטור המיקום של הכרית בקואורדינטות קרטזיות ביחס לסטודנט.
- מה צריכה להיות גודלה של המהירות ההתחלתית  $v_0$  והזווית  $\alpha$  כדי שהכרית תעבור ליד הסטודנט לאחר זמן  $t_0$ .
- הסטודנט מחליט לקפוץ כשהכרית עוברת לידו (אסור לו לתפוס אותה כשהיא לידו).
  - הכרית יכולה לעבור ליד הסטודנט כשהיא לפני שיא הגובה, בשיא הגובה או אחרי. באיזה משלושת המקרים על הסטודנט לקפוץ על מנת לחסוך את הוצאות החיוב של האמבולנס? (נמקו את תשובתכם).
  - על פי הסעיף בהינתן שהסטודנט והכרית בקרקע באותו הזמן. מה הוא הקשר בין ווקטורי המהירויות של הסטודנט והכרית בעת הקפיצה כך שהסטודנט לא יפגע?
  - חשבו את הגובה בו תתרחש הקפיצה.
- בטאו את הגובה הנ"ל בעזרת קבועי הבעיה בלבד ( $t_0$  הוא לא קבוע בעיה עבור שאלה זו).



**(15) קרוסלה\*\***

- חיפושית נעה על קרוסלה המסתובבת במהירות זוויתית קבועה  $\omega_0$ .  
 רדיוס הקרוסלה R. החיפושית נעה מקצה הקרוסלה למרכז במהירות  
 קבועה  $v_0$  ביחס לקרוסלה.
- א. מצא את מיקום החיפושית בקורדינטות קרטזיות ובקורדינטות פולריות  
 ביחס לצופים הבאים:
- i. צופה A - הנמצא על הקרוסלה בנקודת ההתחלה של החיפושית.
  - ii. צופה B - הנמצא על הקרוסלה במרכז.
  - iii. צופה C - הנמצא במרכז הקרוסלה אך אינו מסתובב איתה.
  - iv. צופה D - הנמצא בקצה הקרוסלה ואינו מסתובב עם הקרוסלה.
- ב. מצא את המהירות והתאוצה ביחס לאותם צופים.

## תשובות סופיות

$$\vec{a} = -\left((\Omega^2 + \omega^2)A \sin \Omega t + \omega^2 l_0\right) \hat{r} + (2\Omega A \cos \Omega t) \hat{\theta} \quad \text{א.} \quad (1)$$

$$\theta < l_0 \leq 2m \quad \text{ג.} \quad \theta < l_0 \leq \frac{\Omega^2 + \omega^2}{\omega^2} \cdot A \quad \text{ב.}$$

$$\vec{a} = (2A - B^2 A t^4) \hat{r} + (5AB t^2) \hat{\theta} \quad \text{ב.} \quad \vec{r} = 2At \hat{r} + At^2 \cdot Bt \hat{\theta} \quad \text{א.} \quad (2)$$

$$t = 2 \text{ sec} \quad \text{ג.}$$

$$F_r = m(0 - \omega^2 v_0 t) \quad \text{ב.} \quad r = v_0 \cdot t, \theta(t) = \omega \cdot t \quad \text{א.} \quad (3)$$

$$r'(t) = R - \frac{1}{2} a_0 t^2, \theta'(t) = 0 \quad \text{א. ביחס לדיסקה:} \quad (4)$$

$$T = m \left( a_0 + \omega^2 \left( R - \frac{1}{2} a_0 t^2 \right) \right) \quad \text{ב.} \quad r(t) = R - \frac{1}{2} a_0 t^2, \theta(t) = \omega t \quad \text{ביחס למעבדה:}$$

$$N_z = mg \quad \text{ג.}$$

$$\vec{v} \approx 7.44 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}, \vec{\theta} \approx -4.03 \cdot 10^{-4} \frac{\text{rad}}{\text{sec}^2} \quad \text{ב.} \quad |\vec{v}| \approx 1521 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \quad \text{א.} \quad (5)$$



$$\vec{r} = 0 \quad \text{ב.} \quad \sum F_r = 0, \sum F_\theta = N_\theta, \sum F_z = N_z - mg \quad \text{א.} \quad (6)$$

$$N_\theta = m\omega^2 d(e^{\omega t} - e^{-\omega t}), N_z = mg \quad \text{ג.} \quad \vec{r} = \omega A e^{\omega t} - \omega B e^{-\omega t}, A = B = \frac{d}{2}$$

$$\alpha < 0$$


$$\alpha > 0 \quad \text{ב.}$$

$$r = A \left( \frac{\theta}{\omega} \right)^\alpha \quad \text{א.} \quad (7)$$



$$N \approx 2.39 \quad \text{ג.}$$

$$\alpha = 0$$



$$\vec{r}(t) = At^\alpha \left( -\cos(e^t - 1) \hat{x} - \sin(e^t - 1) \hat{y} \right) \quad \text{א.} \quad (8)$$

$$x(t) = -\frac{1}{2} At^\alpha, y(t) = 0 \quad \text{ב.}$$

$$v_x(t) = -\frac{1}{2} A \alpha t^{\alpha-1}, a_x(t) = -\frac{1}{2} A \alpha (\alpha-1) t^{\alpha-2}$$

ג. תנועה בתאוצה קבועה בקו ישר.

$$\text{א. } \vec{r} = 0.5\hat{r} + 0.1t\hat{\theta}, \quad \vec{a} = -0.02 \cdot t\hat{r} + 0.2\hat{\theta} \quad (9)$$

ב. כי הוא לא זז במהירות קבועה ביחס למעבדה.

ג. רכיב רציאלי: תאוצה רציאלית מהתנועה.

רכיב  $\theta$ :  $v_\theta = \omega r$  בגלל ש- $r$  משתנה צריך תאוצה בכיוון  $\theta$  שתגדיל את

המהירות בכיוון  $\theta$  אפילו ש- $\omega$  קבוע.

$$\sqrt{gR_E} \quad (10)$$

(11) א. התנועה היא של הפינות של ריבוע הקטן ומסתובב. המפגש יהיה במרכז.

$$\text{ב. } \frac{d}{v} \quad \text{ג. } \frac{\ln 2}{2\pi}$$

$$\vec{r}(t) = \left( -\frac{vt}{\sqrt{2}} + \frac{d}{\sqrt{2}} \right) \left[ \cos \left( \ln \left( \frac{d}{d-vt} \right) + \frac{\pi}{4} \right) \hat{x} + \sin \left( \ln \left( \frac{d}{d+vt} \right) + \frac{\pi}{4} \right) \hat{y} \right] \quad \text{ד.}$$

$$\text{א. } \frac{m_1}{m_2} = \frac{r_2}{r_1} \quad \text{ב. } \omega^2 r_1 \quad \text{ג. } r_1(t) = \frac{r_1}{2} (e^{\omega t} + e^{-\omega t}) \quad (12)$$

$$r_{\max} = \sqrt{(\mu_s g)^2 - (2C\omega_0)^2} \left( \frac{1}{\omega_0} \right) \quad (13)$$

$$\text{א. } x_1 = v_0 \cos \alpha \cdot t, \quad y_1 = v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 \quad (14)$$

$$\text{ב. } r = \sqrt{(v_0 \cos \alpha \cdot t)^2 + \left( v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2} g t^2 \right)^2}, \quad \tan \theta = \frac{v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2} g t^2}{v_0 \cos \alpha t}$$

$$\text{ג. } x_2 = R \cos \left( \frac{\pi}{2} - |\omega| t \right), \quad y_2 = R \sin \left( \frac{\pi}{2} - |\omega| t \right) \quad \text{ד. } r = R, \quad \theta = \frac{\pi}{2} - |\omega| \cdot t$$

$$\text{ה. } x_{1,2} = v_0 \cos \alpha t - R \cos \left( \frac{\pi}{2} - |\omega| t \right), \quad y_{1,2} = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2} g t^2 - R \sin \left( \frac{\pi}{2} - |\omega| t \right)$$

$$\text{ו. } \tan \alpha = \frac{\frac{1}{2} g t_0^2 + R \sin \left( \frac{\pi}{2} - |\omega| t_0 \right)}{R \cos \left( \frac{\pi}{2} - |\omega| t_0 \right)}$$

$$\text{ז. אחריו. } v_0^2 t_0^2 = \left( \frac{1}{2} g t_0^2 + R \sin \left( \frac{\pi}{2} - |\omega| t_0 \right) \right)^2 + R^2 \cos^2 \left( \frac{\pi}{2} - |\omega| t \right)$$

ח. וקטורי המהירות חייבים להיות שווים בגודל ובכיוון.

$$\text{ט. } y = \frac{v_0 \cos \alpha}{|\omega|}$$

$$\text{א. ראו סרטון. ב. ראו סרטון. } \quad (15)$$

# פיזיקה 1 מכניקה

## פרק 8 - עבודה ואנרגיה

### תוכן העניינים

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 113 | 1. שימור אנרגיה ומשפט עבודה ואנרגיה  |
| 117 | 2. חישוב עבודה לכוח לא קבוע          |
| 119 | 3. חישוב כוח משמר מאנרגיה פוטנציאלית |
| 120 | 4. איך בודקים האם כוח הוא משמר       |
| 121 | 5. נקודת שיווי משקל                  |
| 123 | 6. ניתוח באמצעות גרפים של אנרגיות    |
| 125 | 7. חישוב אנרגיה פוטנציאלית מכוח משמר |
| 126 | 8. הספק ונצילות                      |
| 129 | 9. תרגילים מסכמים                    |
| 133 | 10. תרגילים מסכמים כולל תנועה מעגלית |

## שימור אנרגיה ומשפט עבודה ואנרגיה

### רקע

עבודה של כוח קבוע :

$$W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r} = |\vec{F}| \cdot |\Delta \vec{r}| \cdot \cos \alpha = F_x \Delta x + F_y \Delta y + F_z \Delta z$$

כאשר  $\alpha$  היא הזווית בין הכוח להעתק

הערות :

1. העבודה של כוח שמאונך להעתק (לתנועה) מתאפסת.
2. אם הגוף לא זז אז אין עבודה (לכן העבודה של החיכוך הסטטי היא תמיד אפס).

הקשר בין עבודה כוללת לאנרגיה קינטית :

$$W_{\Sigma F} = \Delta E_k$$

העבודה של כל הכוחות שפועלים על הגוף

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2$$

אנרגיה קינטית

כוח משמר :

1. **העבודה שמבצע הכוח אינה תלויה במסלול.** היא תלויה רק בנקודה בה התחיל הגוף ובנקודה בה סיים הגוף את התנועה.
2. העבודה במסלול סגור מתאפסת.

$$W_c = -\Delta U$$

3. יש לו אנרגיה פוטנציאלית

$$U_g = mgh$$

האנרגיה הפוטנציאלית הכובדית

$$U_{el} = \frac{1}{2} k x^2$$

האנרגיה הפוטנציאלית האלסטית

כאשר  $x$  הוא ההתארכות של הקפיץ ממצב רפוי ו- $k$  הוא קבוע הקפיץ

$$E = E_k + U$$

אנרגיה (מכאנית) כללית :

$U$  היא סכום כל האנרגיות הפוטנציאליות שקיימות בבעיה.

משפט עבודה אנרגיה:  $E_i + W_{NC} = E_f$

$W_{NC}$  העבודה של הכוחות הלא משמרים


חוק שימור האנרגיה:

אם כל הכוחות משמרים (או העבודה של הכוחות הלא משמרים שווה לאפס) אז האנרגיה הכללית נשמרת

## שאלות

### (1) אדם מושך ארגז

אדם מושך ארגז שמסתו  $M = 5\text{kg}$  באמצעות חבל ובזווית  $30^\circ$  מעלות ביחס לקרקע. מקדם החיכוך הקינטי בין הארגז לקרקע הוא:  $\mu_k = 0.2$ . האדם מושך את הארגז לאורך שני מטרים. הכוח שמפעיל האדם הוא  $80\text{N}$ .



- מהי העבודה שביצע האדם?
- מהי העבודה שביצע כוח החיכוך?
- מהן העבודות שביצעו כוח הכובד והנורמל מהמשטח?
- מהי העבודה הכוללת שנעשתה על הארגז?


### (2) מהירות הארגז

בדוגמה הקודמת, אדם מושך ארגז, חשב את מהירות הארגז לאחר שהאדם משך אותו 2 מטרים אם ידוע שהוא התחיל ממנוחה.


### (3) חישוב עבודה של כוח הכובד

אבן בעלת מסה  $2\text{kg}$  נופלת מגג בניין בגובה 10 מטרים. חשבו את העבודה שביצע כוח הכובד על האבן עד הפגיעה בקרקע. חשבו פעם אחת באופן מפורש דרך המכפלה הסקלרית ופעם נוספת דרך האנרגיה הפוטנציאלית.


### (4) עגלה במדרון




עגלה נעה על משטח ללא חיכוך. העגלה מתחילה במעלה המדרון בגובה  $H$  עם מהירות התחלתית  $v_0$ . מצא את מהירות העגלה בתחתית המדרון. נתונים:  $v_0$ ,  $H$ .

**(5) קופסה במדרון עם חיכוך**

קופסה יורדת במדרון משופע בעל זווית  $\theta$ .  
 הנח כי מהירות הקופסה במעלה המדרון היא  $v_0$   
 וגובה ההתחלתי הוא  $H$ .  
 מצא את מהירות העגלה בתחתית המדרון.  
 הנח שהחיכוך הוא רק על החלק המשופע של התנועה.  
 נתונים:  $v_0$ ,  $\theta$ ,  $\mu_k$ ,  $H$ .

**(6) מסה נופלת על קפיץ**

קפיץ חסר מסה, בעל קבוע קפיץ של  $50 \frac{\text{N}}{\text{m}}$ , מחובר לרצפה.  
 משחררים ממנוחה מסה של  $m = 2 \text{ kg}$  הנמצאת  
 בגובה 3 מטר מעל הקפיץ.  
 א. מצא את הכיוון המקסימאלי של הקפיץ.  
 ב. מה הגובה המקסימאלי אליו תגיע המסה  
 לאחר הפגיעה בקפיץ.

**(7) שתי מסות מחוברות, מדרון וקפיץ**

מסה  $m_1$  נמצאת על מדרון משופע בזווית  $\theta$ .  
 המסה מונחת על קפיץ בעל קבוע קפיץ  $k$  המכווץ ב- $\Delta x = d$ .  
 אל המסה קשור חוט העובר דרך גלגלת אידיאלית ומחובר  
 למסה  $m_2$  הנמצאת בגובה  $H$  מעל הרצפה.  
 המערכת משוחררת ממנוחה.  
 מצא את מהירות הפגיעה בקרקע של  $m_2$ .  
 נתון:

$$m_1 = 1 \text{ kg}, m_2 = 2 \text{ kg}$$

$$H = 3 \text{ m}, k = 100 \frac{\text{N}}{\text{m}}$$

$$\theta = 30^\circ, d = 30 \text{ cm}$$

## תשובות סופיות

$$(1) \quad W = 139 \text{ J} \quad \text{א.} \quad W_{fk} = -4 \text{ J} \quad \text{ב.} \quad W_N = W_g = 0 \quad \text{ג.} \quad W_T = 135 \text{ J} \quad \text{ד.}$$

$$(2) \quad V_F \approx 7.35 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$$

$$(3) \quad W_C = |\vec{F}| \cdot |\Delta \vec{r}| \cos \alpha = 200 \text{ J}, \quad W_C = -\Delta U = -(U_F - U_i) = 200 \text{ J}$$

$$(4) \quad V_F = \sqrt{v_0^2 + 2gH}$$

$$(5) \quad V_F = \sqrt{v_0^2 + 2gH(1 - \mu_k \cot(\theta))}$$

$$(6) \quad \Delta x = 2 \text{ m} \quad \text{א.} \quad mgH = mgh \quad \text{ב.}$$

$$(7) \quad V = 5.745 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$$

## חישוב עבודה לכוח לא קבוע

### רקע

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int (F_x dx + F_y dy + F_z dz)$$

צריך גם משוואה של המסלול

### שאלות

#### 1) חישוב עבודה במסלולים שונים

חשב את העבודה שמבצע הכוח:  $\vec{F} = xx + yxy$  בין הנקודה  $A(0,0)$  לנקודה  $B(2,4)$ :

- דרך המסלול של הקו הישר המחבר בין הנקודות.
- דרך מסלול המקביל לציר ה- $x$  עד לנקודה  $C(2,0)$  ולאחר מכן דרך המסלול המקביל לציר ה- $y$  עד לנקודה  $B$ .
- דרך המסלול  $y = x^2$ .
- דרך המסלול  $x(t) = 2t$ ,  $y(t) = 4t^2$ .

#### 2) כוח בשלושה מימדים

נתון הכוח:  $\vec{F} = zx^2\hat{x} + xzy\hat{y} + 2yz\hat{z}$ .

- חשב את העבודה של הכוח דרך המסלול היוצא מהנקודה  $A(1,2,3)$  עד לנקודה  $B(2,3,5)$  כאשר המסלול יוצא מ- $A$  במקביל לציר ה- $Y$  עד לנקודה  $C(1,3,3)$  ולאחר מכן מ- $C$  במקביל לציר ה- $Z$  ועד לנקודה  $D(1,3,5)$  ולאחר מכן מהנקודה  $D$  במקביל לציר ה- $X$  עד לנקודה  $B$ .
- חשב את העבודה של הכוח מהנקודה  $A(0,0,-1)$  עד הנקודה  $B(4,4,5)$  לאורך המסלול הנתון לפי המשוואות:  $x(t) = 2t$ ;  $y(t) = t^2$ ;  $z(t) = 3t - 1$ .

**(3) חישוב עבודה של כוח במסלול מעגלי ואלפטי**

$$\vec{F} = a(2x + 4y)x + b(4x - 2y)y : \text{נתון הכוח הבא}$$

א. מצא תנאי על  $a$  ו- $b$  כך שהכוח יהיה משמר.

ב. מצא את העבודה שעושה הכוח על גוף הנע במסלול סגור לאורך מעגל

המתואר ע"י:  $\vec{r} = R \cos \theta x + R \sin \theta y$  כאשר הגוף מתחיל את תנועתו מהנקודה  $(R, 0)$ .

ג. מצא את העבודה שעושה הכוח על גוף הנע במסלול סגור לאורך אליפסה

המתוארת ע"י:  $\vec{r} = d \cos \theta x + k \sin \theta y$  כאשר הגוף מתחיל את תנועתו מהנקודה  $(d, 0)$ .

**תשובות סופיות**

$$(1) \quad \text{א. } W_{A \rightarrow B} = \frac{4}{2} + \frac{4 \cdot 8}{3} \quad \text{ב. } W_{A \rightarrow B} = 18 \quad \text{ג. } W_{A \rightarrow B} = 2 + \frac{64}{5}$$

$$\text{ד. } W_{A \rightarrow B} = 2 + \frac{64}{5}$$

$$(2) \quad \text{א. } 26.67 \text{ J} \quad \text{ב. } 128 \text{ J}$$

$$(3) \quad \text{א. } \vec{\nabla} \times \vec{F} = 0 \Rightarrow a = b \quad \text{ב. } W = R^2(0 - 4a\pi + 4b\pi) \quad \text{ג. } W = k \cdot d(0 - 4a\pi + 4b\pi)$$

## חישוב כוח משמר מאנרגיה פוטנציאלית

רקע

$$\vec{F} = -\vec{\nabla} \cdot U$$

שאלות

- (1) חישוב עבודה מתוך אנרגיה פוטנציאלית  
 על גוף מסוים פועל כוח משמר המתאים לאנרגיה הפוטנציאלית  
 הבאה:  $U(x, y) = 2x^2 - 6y^3$ .  
 מצא את העבודה אותה צריך לבצע על מנת להביא את הגוף מהנקודה  $(1, 0)$   
 אל הנקודה  $(2, 3)$ .

תשובות סופיות

$$W_{\text{ext}} = 156\text{J} \quad (1)$$

## איך בודקים האם כוח הוא משמר

### רקע

אם ורק אם  $\vec{V} \times \vec{F} = 0$ , אז הכוח משמר.

הערה: צריך שכל רכיב יתאפס בנפרד

### שאלות

#### (1) דוגמה

נתון הכוח  $F$ :  $\vec{F} = -2xy\hat{x} + (x^2 - z)\hat{y} + y\hat{z}$ .

בדקו האם הכוח  $F$  משמר.

### תשובות סופיות

(1) משמר.

## נקודת שיווי משקל:

### שאלות:

#### 1) שעון תלוי




- שעון קיר תלוי באמצעות מסמר הנמצא בקצהו העליון. ניתן לסובב את כל השעון (לא את המחוגים) סביב המסמר. א. מצא באילו מצבים השעון יהיה בשיווי משקל וקבע עבור כל מצב איזה סוג שיווי משקל הוא. ב. חזור על סעיף א' אם המסמר תקוע במרכז השעון (השעון עדיין יכול להסתובב סביב המסמר).

#### 2) אנרגיה פוטנציאלית בשיווי משקל

- האנרגיה הפוטנציאלית של הגוף נתונה לפי הפונקציה הבאה:  $U = (x-4)^2 + x^3$ . מצא את נקודת שיווי המשקל ומיין אותה לסוגים הרלוונטיים.

#### 3) קפיץ וחרוזים על תיל קשיח מכופף



- תיל קשיח מכופף בצורת פרבולה המתאימה לפונקציה:  $y = -Ax^2$  כאשר A קבוע נתון. על התיל מושחלים שני חרוזים זהים בעלי מסה m, אחד בכל צד. קפיץ אופקי בעל קבוע k ואורך רפוי l מחבר בין החרוזים (ראה איור). חשב את המרחק האופקי  $x_0$  של כל חרוז מציר ה-y במצב של שיווי משקל. הנח כי הקפיץ והחרוזים נמצאים תמיד באותו הגובה. הדרכה: כתוב ביטוי לאנרגיה הפוטנציאלית כפונקציה של x בלבד.

### תשובות סופיות:

(1) א. כשהשעון למטה שיווי משקל יציב וכשהשעון הפוך ב-  $180^\circ$  שיווי משקל רופף.  
 ב. השעון בשיווי משקל אדיש.

$$(2) \quad x_1, U''(x_1) = 6 \cdot \frac{4}{3} + 2 > 0 \quad \text{נק' מינימום} \Leftarrow \text{ש.מ. יציב.}$$

$$x_2, U''(x_2) = -2 \cdot 6 + 2 < 0 \quad \text{נק' מקסימום} \Leftarrow \text{ש.מ. רופף.}$$

$$(3) \quad x_0 = \frac{kl}{2k - 2mgA}$$

## ניתוח באמצעות גרפים של אנרגיות:

### שאלות:

#### (1) נקודה הכי ימנית

גוף שמסתו 6 ק"ג נע לאורך ציר  $x$  בהשפעת כוח יחיד הנגזר מהאנרגיה הפוטנציאלית:  $U(x) = 2x^4 - 36x^2$ .


נתון שכאשר הגוף מגיע לנקודה בה  $x = -1.5\text{m}$  מהירותו שווה ל-  $v = 3 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ .

א. מהי הנקודה הימנית ביותר במסלול של הגוף?

ב. חזור על סעיף א', אם ערך המהירות היה:  $v = 3 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ .

#### (2) גמל דו דבשתי

כוח משמר פועל על כדור בעל מסה 625gr. הגרף הבא מתאר את האנרגיה הפוטנציאלית של הכדור כתלות במיקומו:



א. שרטטו באופן איכותי את הגרף של הכוח כתלות במיקום.

ב. תארו באופן מילולי את תנועת הכדור אם הוא משוחרר מ-  $x = 7\text{m}$  ממנוחה.

ג. מהי המהירות המינימלית שצריך לתת לכדור במצב של סעיף ב' על מנת שהכדור יגיע לאינסוף?

ד. מהן נקודות שיווי המשקל?

מיינו אותן לפי יציבותן וציינו מה המשמעות של כל סוג של שיווי משקל.

#### (3) שני גופים בפוטנציאל אקספוננציאלי ריבועי

שני גופים נמצאים על ציר ה- $x$  ונתונים להשפעת הפוטנציאל:  $U(x) = Axe^{-Bx^2}$  כאשר  $A, B$  הם קבועים חיוביים. נתון כי ברגע מסוים גוף אחד נמצא ב- $x=0$  והאנרגיה שלו היא אפס, והגוף השני נמצא ב- $x = -\sqrt{\frac{1}{B}}$  והאנרגיה שלו היא:  $E = -\frac{A}{e} \sqrt{\frac{1}{B}}$ . היכן ייפגשו הגופים? (בחר את התשובה הנכונה):

א. בתחום  $-\sqrt{\frac{1}{B}} \leq x \leq 0$ .

ב. הגופים לא ייפגשו אף פעם.


ג. בנקודה  $x = -\sqrt{\frac{1}{B}}$ .

ד. ב- $x=0$ .

### תשובות סופיות:

(1) א.  $x = -1.202\text{m}$       ב.  $x = 6.81\text{m}$

(2) א.



ב. מתחיל בתאוצה בכיוון החיובי עד  $x = 9\text{m}$  ואז מתחיל להאט עד  $x = 11\text{m}$   
 שם עוצר רגעית ומסתובב חזרה. כך חוזר עד אינסוף.

ג. 2 מטר לשנייה.

ד.  $x = 6\text{m}$  לא יציבה,  $x = 9\text{m}$  יציבה,  $x = 12\text{m}$  לא יציבה.

(3) א'.

## חישוב אנרגיה פוטנציאלית מכוח משמר:

שאלות:

(1) דוגמה

מצא את האנרגיה הפוטנציאלית של הכוח:  $\vec{F} = -2xyx + (2 - x^2)y$   
 אם נתון ש:  $U(0,0) = 0$ .

תשובות סופיות:

(1)  $U = x^2y - 2y$

## הספק ונצילות

### רקע

$$P_{avg} = \frac{W}{\Delta t}$$

הספק ממוצע:

$W$  - העבודה

$$P = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

הספק רגעי:

$F$  – הכוח ו- $v$  היא מהירות הגוף

### שאלות

#### (1) כמה עולה להפעיל מזגן

כמה עולה להפעיל מזגן שההספק שלו 1 כוח סוס למשך שעה אחת?  
יש לבדוק את תעריף חברת החשמל.

**פירוט החיובים / הדיכויים**

**חשבון דו-חודשי**

מספר חשבון חוזה: XXXXXXXXXX

חשבון לתקופה מ- 13/01/2020 עד 15/03/2020

גבאי מני

חייב בגין צריכה מחח"י (לא כולל מע"מ)

קריאות מונה מספר XXXXXXXXXX גורם הכפלה: 1

| תעריף           | סוג קריאה<br>נכחית | תאריך קריאה<br>נכחית | תאריך קריאה<br>קודמת | ימים<br>לחייב | קריאה<br>נכחית | קריאה<br>קודמת | צריכה<br>בקוט"ש | מחיר<br>לקוט"ש<br>באגרות | סה"כ בש"ח  |
|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|------------|
| ביתי            | רגילה              | 15/03                | 12/01                | 63            | 47387          | 46267          | 1120            | 44.84                    | 502.21     |
| סה"כ            |                    |                      |                      |               |                |                | 1120            |                          | 502.21     |
| סה"כ בגין צריכה |                    |                      |                      |               |                |                | 1120            |                          | 502.21 ש"ח |

#### (2) מכונית מאיצה מ-0 ל-100

מכונית מתחילה לנסוע ממנוחה ומגיעה למהירות של 100 קמ"ש ב-10 שניות.  
מסת המכונית היא 1 טון. הניחו כי אין חיכוך עם האוויר.

א. מהי העבודה שהתבצעה על המכונית?

ב. מהו ההספק של המנוע בהנחה שהוא קבוע ומנוצל במלואו (הנחה לא נכונה)?

#### (3) אופנוע נוסע במהירות קבועה כנגד התנגדות אוויר

אופנוע נוסע במהירות קבועה של 100 קמ"ש.

כנגדו פועל כוח ההתנגדות מהאוויר של 300 ניוטון.

מהו ההספק של המנוע, אם נניח שההספק מנוצל במלואו?

#### (4) נצילות של 40 אחוז בדוגמה של המכונית המאיצה

בדוגמה "מכונית מאיצה מ-0 ל-100" מה ההספק של המנוע אם הנצילות שלו היא 40%?

**(5) הספק ממוצע לשנות מהירות**

איזה כוח קבוע יש להפעיל על מכונית בעלת מסה של 2 טון,

כדי לשנות את מהירותה מ-  $9 \frac{\text{km}}{\text{hr}}$  ל-  $27 \frac{\text{km}}{\text{hr}}$  בתוך 4 sec ?

מהו ההספק הממוצע של כוח זה?

**(6) רכבת צעצוע חשמלית**

רכבת צעצוע חשמלית מורכבת מ-10 קרונות.

הקרון הראשון והשני מכילים מנוע חשמלי ושוקלים 2 ק"ג כל אחד.

שאר הקרונות עמוסים בצעצועים ושוקלים 3 ק"ג כל אחד.

כל אחד מן המנועים מייצר הספק קבוע של 0.2KW.

א. כמה זמן ייקח לרכבת להגיע למהירות של 10 מטר לשנייה אם התחילה לנוע ממנוחה?

ב. מהי האנרגיה הקינטית של הקרון הראשון ומהי האנרגיה הקינטית של הקרון השני, כאשר הרכבת נעה במהירות שחישבת בסעיף א'?

ג. חשב את העבודה שביצע הכוח שפעל בחיבור בין הקרון הראשון לשני על הקרון השני בזמן ההאצה.

ד. חשב את העבודה שביצע הכוח שפעל בחיבור בין הקרון השני לשלישי על הקרון השלישי בזמן ההאצה.

ה. הרכבת מגיעה לעלייה עם שיפוע של 2 מעלות, מה צריך להיות הספק המנועים (בהנחה שהם שווים) על מנת שהרכבת תישאר במהירות קבועה של 10 מטר לשנייה?

**(7) הספק כאשר נתון מיקום כתלות בזמן**

כוח יחיד פועל על גוף שמסתו 4kg, הכוח פועל בכיוון התנועה

והמיקום כתלות בזמן של הגוף הוא:  $x(t) = 2 + 3t + t^2$  ביחידות m.k.s.

א. מהי העבודה שמבצע הכוח במשך 3 השניות הראשונות של התנועה?

ב. מהו ההספק של הכוח ב-  $t = 2 \text{ sec}$  ?

### תשובות סופיות

- (1) 45 אגורות.
- (2) א.  $\Delta E_k \approx 385,800 \text{ J} = W_{\Sigma \vec{F}}$  ב.  $p = 51.7 \text{ HP}$
- (3)  $p = 11.18 \text{ HP}$
- (4) 135 כ"ס.
- (5)  $F = 2500 \text{ N}$ ,  $\bar{p} = 16.76 \text{ HP}$
- (6) א.  $\Delta t = 3.5 \text{ sec}$  ב.  $E_{k_1=100 \text{ J}} = E_{k_2}$  ג.  $W_{1 \rightarrow 2} = 600 \text{ J}$
- ד.  $W_{3 \rightarrow 2} = 1200 \text{ J}$  ה.  $p = 97.7 \text{ W}$
- (7) א.  $W = 144 \text{ J}$  ב.  $p(t=2) = 56 \text{ W}$

## תרגילים מסכמים:

### שאלות:

#### 1) קפיץ יורה כדור

הלוע של רובה צעצוע מורכב מקפיץ בעל קבוע  $k$  ובוכנה בעלת מסה  $m_1$ .

בטעינה דוחפים כדור בעל מסה  $m_2$  ודורכים את הקפיץ.

הכיווץ של הקפיץ הוא  $d$ .

ברגע הירי הקפיץ משוחרר ממנוחה.

א. באיזה רגע הכדור מנתק מגע מהבוכנה?

ב. מהי מהירות הכדור ברגע הזה?



#### 2) כוח כפונקציה של מיקום, קפיץ וחיכוך\*

מסה  $m$  נמצאת על מישור אופקי לא חלק ומחוברת לקפיץ בעל קבוע  $k$ .

החל מ- $t=0$  פועל על המסה כוח התלוי במיקום:  $\vec{F}(x) = (30x^2 - 4x)\hat{x}$ .

כל היחידות בשאלה הן יחידות סטנדרטיות.

ב- $t=0$  המסה נמצאת בראשית עם מהירות התחלתית  $v_0$  והקפיץ רפוי.

נתונים:  $m = 2\text{kg}$ ,  $k = 10\frac{\text{N}}{\text{m}}$ ,  $\mu_k = 0.3$ ,  $v_0 = 5\frac{\text{m}}{\text{sec}}$ .


א. רשמו ביטוי לתאוצת המסה כתלות במיקום  $a(x)$ , הנח כי התנועה תמיד

בכיוון החיובי.

ב. מצאו את המיקום בו התאוצה של המסה מתאפסת.

ג. מהי העבודה שביצע הכוח מתחילת התנועה ועד אשר  $x = 0.5\text{m}$ ?

ד. מהי המהירות של המסה כאשר מיקומה  $x = 0.5\text{m}$ ?



**(3) כוח כפונקציה של זמן במישור משופע\***

מסה  $m = 5\text{kg}$  נמצאת על מישור משופע לא חלק.

על המסה פועל כוח התלוי בזמן  $F(t)$  שדוחף אותה במעלה המישור.

מהירות המסה ידועה והיא נתונה לפי הפונקציה:  $v(t) = 3t^2 + 2t$ .


מקדם החיכוך הוא:  $\mu_k = 0.2$  ונתון כי:  $x(t=0) = 0$ .

כל היחידות הן יחידות סטנדרטיות.

זווית המישור היא  $30^\circ$  מעלות.

א. (1) היכן נמצא הגוף ב-  $t = 2\text{sec}$ ?

(2) מהו גודל הכוח  $F$  ברגע זה?



ב. מהו מיקום הגוף כאשר תאוצתו היא:  $8 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$ ?

ג. מהי האנרגיה הקינטית של הגוף ברגע של סעיף ב'?

ד. מהי עבודת הכוח  $F$  מרגע  $t = 0\text{sec}$  ועד ל-  $t = 3\text{sec}$ ?

**(4) קופסה מחליקה על מקטעים ישרים\***

קופסה משוחררת ממנוחה ומתחילה להחליק לאורך מסלול שאינו ידוע,

אך מורכב מקטעים ישרים בלבד.


בין הקופסה למשטח עליו היא מחליקה קיים

חיכוך והקופסה נעצרת בנקודה

המרוחקת  $900\text{m}$  אופקית ו-  $90\text{m}$  מתחת

לנקודה בה התחילה.

חשבו את מקדם החיכוך, לא חסרים נתונים.

**(5) שרשרת על גלגלת**

שרשרת בעלת מסה  $M$  ואורך  $L$  מונחת על גלגלת

אידיאלית התלויה מהתקרה.

השרשרת מונחת כך שרבע מהשרשרת בצד אחד של


הגלגלת ושאר השרשרת בצד השני.


הנח שהחלק על הגלגלת עצמה זניח.

המערכת משוחררת ממנוחה.

מצאו את מהירות השרשרת ברגע שהקצה האחרון

שלה עובר את הגלגלת.





**(6) חבל מחליק משולחן אנרגיה ומשוואת תנועה\***

חבל באורך  $L$  ומסה  $M$  מונח על שולחן חסר חיכוך כך שהקצה של החבל באורך  $d$  נשמט מחוץ לשולחן. החבל מוחזק ומשוחרר ממנוחה.

א. רשמו את האנרגיה הקינטית והאנרגיה הפוטנציאלית במהלך החלקת החבל.

ב. השתמשו בשימור אנרגיה ומצאו את משוואת התנועה של החבל.

ג. השתמשו במשוואת התנועה ומצאו את מהירות החלקת כל החבל מהשולחן למטה.


**(7) חוט מושך שתי מסות מחוברות בחוט\*\***

חוט חסר מסה באורך  $2L$  מחבר שתי מסות הנעות במישור אופקי ללא חיכוך.

כוח אופקי קבוע ונתון מושך את החוט במרכזו, בכיוון מאונך לחוט.

הנח שהמסות מתנגשות ונדבקות בהתנגשות. כמה אנרגיה הלכה לאיבוד בהתנגשות?

## תשובות סופיות:

$$(1) \quad \text{א. בנקודת הרפיון של הקפיץ.} \quad \text{ב. } V = \sqrt{\frac{kd^2}{m_1 + m_2}}$$

$$(2) \quad \text{א. } a_{(x)} = 15x^2 - 7x - 3 \quad \text{ב. } x = 0.738\text{m} \quad \text{ג. } W = 0.75\text{J}$$

$$\text{ד. } V = 4.64 \frac{m}{s}$$

$$(3) \quad \text{א. (1) } x = 12 \quad (2) F = 103.7\text{N} \quad \text{ב. } x = 2\text{m} \quad \text{ג. } E_k = 62.5\text{J}$$

$$\text{ד. } W = 3935\text{J}$$

$$(4) \quad 0.1$$

$$(5) \quad V = \sqrt{\frac{3gL}{8}}$$

$$(6) \quad \text{א. } E = \frac{1}{2}MV^2 - \frac{M}{2}g\frac{y^2}{2} \quad \text{ב. } \ddot{y} = \frac{gy}{L}$$

$$\text{ג. } V(y=L) = \sqrt{\frac{g}{L}(L^2 - d^2)}$$

$$(7) \quad \Delta E = F \cdot l$$

## תרגילים מסכמים כולל תנועה מעגלית:

### שאלות:

#### (1) תנאי להשלים סיבוב עם החיכוך במישור משופע

גוף בעל מסה  $m$  מחליק על גבי מסילה המתוארת באיור.


מקדם החיכוך בין הגוף למישור המשופע הוא  $\mu_k$ .

זווית המישור היא  $\theta$ .

החלק המעגלי חסר חיכוך.

מצא את  $h$  הנמוך ביותר עבורו הגוף ישלים

סיבוב בחלק העגול.



#### (2) שני חרוזים על טבעת מתרוממת\*

טבעת בעלת רדיוס  $R$  ומסה  $M$  תלויה מהתקרה


באמצעות חוט. מניחים בקצה העליון של הטבעת שני

חרוזים בעלי מסה  $m$  זהה.

החרוזים מתחילים ליפול ממנוחה לשני צדי הטבעת.

מצא את היחס בין המסות הדרוש על מנת שהטבעת

תתרומם במהלך נפילת הכדורים.



#### (3) מסה מסתובבת על שולחן ונמשכת למרכז\*

מסה  $m$  נעה על שולחן חסר חיכוך בתנועה מעגלית ברדיוס  $R$  ובמהירות  $v_0$ .

חוט קשור אל המסה הולך למרכז השולחן ועובר דרך גלגלת אידיאלית וחור בשולחן.

מושכים את החוט כך שהמסה מתקרבת למרכז.


א. מהי המהירות הזוויתית כתלות ב- $r$  (המרחק ממרכז הסיבוב).

השתמשו בשיקולי כוחות בלבד. רמז: אין כוחות בציר  $\hat{\theta}$ .

ב. הוכיחו שהעבודה שהושקעה במשיכת החוט עד לרדיוס  $R_2$  כלשהו הקטן

מ- $R$  זהה לשינוי באנרגיה הקינטית של המסה.

בסעיף זה ניתן להניח שהמהירות הרדיאלית קבועה.



### תשובות סופיות:

$$h_{\min} = \frac{2.5R}{1 - \frac{\mu_k}{\tan \theta}} \quad (1)$$

$$\frac{m}{M} \geq \frac{3}{2} \quad (2)$$

$$\omega(r) = \frac{v_0 R}{r^2} \text{ א.} \quad (3) \quad \text{ב. הוכחה.}$$

# פיזיקה 1 מכניקה

פרק 9 - מתקף ותנע

תוכן העניינים

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 1. מהו תנע והחוק השני של ניוטון  | (ללא ספר) |
| 2. מתקף                          | 135       |
| 3. חוק שימור תנע וכוחות חיצוניים | 136       |
| 4. סוגי התנגשויות                | 137       |
| 5. שימור תנע בהתנגשויות קצרות    | 138       |
| 6. תנע, סיכום                    | 139       |
| 7. תרגילים ישנים                 | 140       |
| 8. התנגשויות קצרות ללא שימור תנע | 143       |
| 9. תרגילים מסכמים                | 144       |

## מתקף:


### שאלות:



#### 1) דוגמה לחישוב מתקף

שחקן בועט בכדור בעל מסה 2 ק"ג בכוח קבוע של 50 ניוטון. זמן המגע בין הכדור לשחקן הוא 0.2 שניות. מהי מהירות הכדור לאחר הבעיטה?

#### 2) דוגמה 2- שני כוחות על גוף



נתון גוף בעל מסה של 3 קילוגרם. על הגוף פועלים הכוחות כמתואר בציור במשך זמן של 0.5 שניות.

- מצא את המתקף שמפעיל כל כוח.
- מצא את המתקף השקול הפועל על הגוף.

ג. מצא את מהירות הגוף לאחר פעולת הכוחות אם התחיל ממנוחה.

#### 3) מתקף של כוח ממוצע דוגמה

כדור בעל מסה של 1 ק"ג נזרק לעבר קיר במהירות של 2 מטר לשנייה. הכדור פוגע בקיר וחוזר באותה המהירות.

- חשב את המתקף שפעל על הכדור.
- מי מפעיל את המתקף הנ"ל?
- חשב את הכוח הנורמאלי הממוצע שמפעיל הקיר אם זמן הפגיעה הוא 0.2 שניות.

### תשובות סופיות:

$$V_f = \frac{5m}{sec} \quad (1)$$

$$\vec{J}_1 = 5N \cdot sec \hat{x}, |\vec{J}_2| = 7.5N \cdot sec \quad (2)$$

$$V_x = \frac{11.5}{3} \frac{m}{sec}, V_y = \frac{3.75}{3} \frac{m}{sec} \quad ג.$$

$$\vec{J} = \Delta \vec{P} = -4N \cdot sec \hat{x} \quad (3)$$

$$\vec{N} = -20N \hat{x} \quad ג. \quad ב. \quad \text{הכוח הנורמלי.}$$

## חוק שימור תנע וכוחות חיצוניים:

### שאלות:


#### (1) דוגמה לשימור תנע

כדור בעל מסה  $m_1$  ומהירות  $V_0$ , פוגע בכדור שני בעל מסה  $m_2$ . לאחר ההתנגשות, כדור 2 עף בזווית של 30 מעלות עם ציר ה- $x$  וכדור 1 עף בזווית של 45 מעלות מתחת לציר ה- $x$ .

נתון:  $m_1 = 3\text{kg}$ ,  $m_2 = 2\text{kg}$ ,  $V_0 = 3\frac{\text{m}}{\text{sec}}$ .

א. מצא את גודל מהירות הגופים לאחר ההתנגשות.

ב. מצא את המתקף שפעל על כל גוף.



### תשובות סופיות:

(1) א.  $V_1 = 1.55\frac{\text{m}}{\text{sec}}$ ,  $V_2 = 3.29\frac{\text{m}}{\text{sec}}$

ב.  $\vec{J}_1 = -5.71\text{N} \cdot \text{sec} \hat{x} - 3.29\text{N} \cdot \text{sec} \hat{y}$ ,  $\vec{J}_2 = -\vec{J}_1$


## סוגי התנגשויות:

### שאלות:


#### (1) פיזור

כדור מספר 1 בעל מסה  $m$  ומהירות  $V_0$  מתנגש אלסטית בכדור מספר 2 בעל מסה  $3m$  הנמצא במנוחה. הזווית של כדור מספר 2 עם ציר ה- $x$  היא  $45^\circ$ . מצא את הזווית של כדור מספר 1 לאחר ההתנגשות.

לפני ההתנגשות



אחרי ההתנגשות



### תשובות סופיות:

(1)  $\theta = 71.56^\circ$

## שימור תנע בהתנגשויות קצרות:

### שאלות:

#### (1) זיקוק מתפוצץ

זיקוק נורה לאוויר בכיוון אנכי לקרקע.  
ברגע שהזיקוק מגיע לשיא הגובה הוא מתפוצץ לשלושה חלקים שווים בגודלם.  
משך זמן הפיצוץ הוא:  $0.5\text{sec}$ .  
מהירות החלק הראשון לאחר הפיצוץ היא:  $50 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$  ומהירות החלק השני

היא:  $20 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \hat{x} - 10 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \hat{y} + 50 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \hat{z}$ .  
מהי מהירות החלק השלישי?

### תשובות סופיות:

$$\vec{u}_3 = 70\hat{x} - 25\hat{y} + 50\hat{z} \quad (1)$$

## תנע, סיכום:

### שאלות:

#### (1) דוגמה עם מקדם תקומה

גוף בעל מסה  $m$  נע במהירות  $V$  על משטח אופקי חלק ומתנגש בגוף בעל מסה  $3m$  הנמצא במנוחה.  
נתון כי ההתנגשות חד ממדית ומקדם התקומה הוא  $0.8$ .  
מצא את מהירות הגופים לאחר ההתנגשות.


### תשובות סופיות:

$$u_2 = 0.45V, u_1 = -0.35V \quad (1)$$

## תרגילים ישנים:

## שאלות:


## (1) גובה למעבר מכשול לשני כדורים



כדור משוחרר ממנוחה על פי הנתונים בשרטוט.  
מה צריך להיות הגובה המינימלי ממנו הכדור  
משוחרר על מנת ששני הכדורים יעברו את  
המכשול כאשר:

- ההתנגשות פלסטית.
- ההתנגשות אלסטית.
- (אין צורך לפתור את המשוואות).

## (2) מהירות למעבר מכשול לשני כדורים



בשאלה זו אין צורך לפתור את המשוואות.  
שני כדורים מונחים כמתואר בשרטוט.  
מה צריכה להיות המהירות ההתחלתית המינימלית של הכדור הימני על מנת  
שהכדור השמאלי יעבור את המכשול:

- בהתנגשות פלסטית.
- בהתנגשות אלסטית.
- כעת נתון כי המסה השמאלית כבדה  
פי 100 מהמסה הימנית.  
בהינתן שההתנגשות אלסטית,  
מה צריכה להיות המהירות המינימלית ההתחלתית על מנת ש:
- הכדור השמאלי יעבור את המכשול השמאלי.
- הכדור הימני יעבור את המכשול הימני.

## (3) לא אלסטי לא פלסטי



שני קרונות בעלי מסה 1 מונחים על גבי משטח  
ללא חיכוך. יורים את המסה הימנית  
במהירות 10 שמאלה.  
נתון כי ההתנגשות הינה אי אלסטית/אי פלסטית.  
מהי מהירותה של כל אחת מהמסות לאחר הפגיעה  
אם נתון כי בהתנגשות אבדה חצי מהאנרגיה ההתחלתית?

**(4) יחסי מסות בהתנגשות אלסטית**

שני כדורים מונחים על שולחן.

הכדור השמאלי נורה במהירות 10 אל עבר הכדור הימני בהתנגשות אלסטית.

תאר את מהירויות הגופים לאחר ההתנגשות במקרים הבאים :

א. מסת הכדורים שווה.

ב. מסת הכדור השמאלי כפולה פי 100 מזו של הימני.


ג. מסת הכדור הימני כפולה פי 100 מזו של השמאלי.

**(5) קליע לקפיץ בלי חיכוך**

קליע נורה אל קפיץ לפי הנתונים המופיעים בשרטוט.

מהו הכיוון המקסימלי?

(אין חיכוך בשאלה).

**(6) רתע באקדח**

אקדח בעל מסה M יורה קליע בעל מסה m במהירות V.

מהי מהירות האקדח לאחר יציאת הקליע?

כמה אנרגיה נוצרה בתהליך?

**(7) תנע לבעיטה בכדור**

כדורגלן מניף את רגלו לעבר כדור.

מסת הכדור m ומסת הרגל M והפגיעה אלסטית.

א. מה צריכה להיות מהירות הרגל על מנת

שהכדור יצא לדרכו אל השער במהירות U?

ב. פרשני ספורט רבים נוהגים לומר כי על דשא רטוב


הכדור מאיץ מהר יותר. האם כך הדבר?

**(8) מהירות למעבר מכשול בפלסטי**

מהי המהירות המינימלית שצריך לתת למסה

הימנית על מנת שלאחר התנגשות פלסטית

הגוף יעבור את המכשול?


**(9) קליע לקפיץ עם חיכוך**

קליע נורה אל קפיץ לפי הנתונים

המופיעים בשרטוט.

מהו הכיוון המקסימלי בקפיץ,

אם נתון מקדם החיכוך בין המסה M לרצפה?




## תשובות סופיות:

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \text{א. } \frac{1}{2}u_1^2 = gh_1 \quad \text{ב. } \frac{1}{2}u_2^2 = gh_1 \\
 (2) \quad & \text{א. } gh_2 = \frac{1}{2}u^2 \quad \text{ב. } \frac{1}{2}u_2^2 = gh_2 \quad \text{ג. } \frac{1}{2}u_2^2 = gh_2 \\
 & \text{ד. } \frac{1}{2}u_1^2 = gh_1 \\
 (3) \quad & u_1 = 100 - u_2, \quad 0 = 2u_2^2 - 200u_2 + 9950 \\
 (4) \quad & \text{ראה סרטון.} \\
 (5) \quad & \frac{1}{2}(m+M)u^2 = \frac{1}{2}k\Delta^2 \\
 (6) \quad & V_2 = -\frac{m}{M}V, \quad E = \frac{1}{2}mV^2 + \frac{1}{2}MV_2^2 \\
 & P \Rightarrow MV_1 = Mu_1 + mu \\
 (7) \quad & \text{א. } E \Rightarrow \frac{1}{2}MV_1^2 = \frac{1}{2}Mu_1^2 + \frac{1}{2}mu^2 \quad \text{ב. לא.} \\
 & P \Rightarrow MV_1 = (m_1 + m_2)u \\
 (8) \quad & E \Rightarrow \frac{1}{2}\{m+M\}u^2 = (m+M)gh \\
 (9) \quad & \frac{1}{2}(m+M)u^2 + (m+M)g \cdot \mu \cdot \Delta \cdot \cos(180) = \frac{1}{2}k\Delta^2
 \end{aligned}$$

## התנגשויות קצרות ללא שימור תנע:


### שאלות:

#### (1) התנגשות קצרה במדרון



כדור בעל מסה  $m$  נופל אל מדרון לפי המתואר בשרטוט. נתון כי הכדור אינו מתרומם חזרה מעל המדרון לאחר הפגיעה. מצא את מהירות הכדור רגע לאחר הפגיעה.

#### (2) טנק וחיכוך קינטי



טנק בעל מסה  $M$  יורה פגז בעל מסה  $m$  בזווית  $\alpha$  מעל האופק במהירות  $V$ . הטנק מוצב על מישור בעל מקדם חיכוך קינטי נתון. מה תהיה מהירותו של הטנק רגע לאחר הירייה?


### תשובות סופיות:

$$u_p = \frac{m\sqrt{2gh} \sin \theta - \mu m\sqrt{2gh} \cos \theta}{m} \quad (1)$$


$$u = \frac{mv \cos \alpha - \mu mv \sin \alpha}{M} \quad (2)$$

## תרגילים מסכמים:


### שאלות:




- (1) גוף יורד במדרון מתנגש ועולה חזרה  
 גוף בעל מסה  $m_1 = 2\text{kg}$  משוחרר ממנוחה על  
 מדרון משופע בגובה  $h = 1\text{m}$ .  
 בתחתית המדרון מונח גוף בעל מסה  $m_2 = 5\text{kg}$ .  
 הוגף הראשון פוגע בגוף השני בהגיעו  
 למישור האופקי והגופים מתנגשים התנגשות  
 אלסטית, עד לאיזה גובה יגיע הגוף הראשון  
 בחזרה במעלה המדרון? אין חיכוך בין הגופים למשטחים.



- (2) קליע חודר מטוטלת בליסטית  
 בול עץ בעל מסה  $2\text{kg}$  קשור לחוט ותלוי אנכית במנוחה.  
 קליע בעל מסה  $5\text{gr}$  נע במהירות  $v_1 = 450 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$  פוגע  
 בבול העץ, חודר אותו, ויוצא מצידו השני  
 במהירות  $u_1 = 150 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ .  
 לאיזה גובה מקסימאלי יגיע בול העץ?



- (3) פצצה  
 פצצה בעלת מסה  $M = 13\text{kg}$  נעה באוויר במהירות  
 קבועה  $v_0 = 100 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ . ברגע מסוים, הפצצה מתפוצצת  
 לשלושה חלקים קטנים יותר.  
 מסת החלק הראשון היא  $m_1 = 4\text{kg}$  והוא נע  
 במהירות  $v_1 = 80 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$  בזווית של  $40^\circ$  ביחס לכיוון המקורי.  
 מסת החלק השני היא  $m_2 = 2\text{kg}$  והוא נע במהירות  $v_2 = 10 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$  בזווית של  $120^\circ$   
 ביחס לכיוון המקורי.  
 מסת החלק השלישי היא  $7\text{kg}$ .  
 מצא את מהירות החלק השלישי.

**(4) איבוד אנרגיה**

כדור בעל מסה  $m_1 = 2\text{kg}$  ומהירות  $v_1 = 10 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$


מתנגש בכדור בעל מסה  $m_2 = 3\text{kg}$  הנמצא במנוחה.

לאחר ההתנגשות הכדור הראשון נע בכיוון  $30^\circ$

מעל לכיוון הפגיעה, והכדור השני נע בזווית  $60^\circ$  מתחת לכיוון הפגיעה (ראה איור).

א. מצא את מהירות הגופים לאחר ההתנגשות.

ב. האם ההתנגשות אלסטית? אם לא - כמה אנרגיה נאבדה בהתנגשות?

**(5) קליע חודר בול עץ וגורם לסיבוב אנכי (כולל תנועה מעגלית)**

בול עץ בעל מסה  $M$  תלוי אנכית באמצעות מוט קשיח

חסר מסה באורך  $L$ . המוט ביחד עם בול העץ יכולים

להסתובב במעגל אנכי (ראה איור).

יורים קליע בעל מסה  $m$  במהירות אופקית  $v$  לעבר בול העץ.

הקליע חודר את הבול ויוצא מצידו השני במהירות  $v_f$ .

יחד עם הקליע יוצאת גם חתיכה מהעץ (במהירות הקליע) ובמסה של 5 אחוז

ממסת בול העץ.

מהי המהירות המינימלית של הכדור עבורה בול העץ יוכל להשלים סיבוב אנכי

(שימו לב שהמוט קשיח)?

**(6) אדם יורד מכדור פורח**

אדם נמצא בכדור פורח בגובה קבוע באוויר.

משקלו של האדם הוא 70 ק"ג ומסתו של הכדור פורח

(ללא האדם) היא 280 ק"ג (כולל הסל וכל אביזר אחר בכדור).

האדם משלשל חבל מהסל של הכדור פורח ומתחיל לרדת

באמצעות החבל כלפי מטה.

א. אם מהירותו של האדם בזמן הירידה בחבל היא 3 מטר

לשנייה כלפי מטה וביחס לקרקע, מהי המהירות של

הכדור פורח (גודל וכיוון)?

ב. מהי מהירות הכדור פורח אם האדם נעצר לפתע באמצע


(לפני שהוא מגיע לקרקע)?

**(7) מסה על קרונית ואיבוד אנרגיה**

נתון כוח  $F$  קבוע המושך עגלה בעלת מסה  $m_1$  ללא חיכוך.

מעל העגלה נמצאת מסה  $m_2$  ובין המסות יש חיכוך.

נתון:  $\mu_s, \mu_k, F, m_1, m_2$ .



א. מה הכוח  $F$  המקסימאלי עבורו המסה העליונה תחליק ביחס לתחתונה?

נניח כי הכוח  $F$  גדול מזה שחישבת בסעיף א'.

נניח גם כי הכוח הפועל במשך זמן  $T$  נתון והמסה העליונה אינה נופלת מהתחתונה.

ב. מה הכוח  $F$  המקסימאלי?

ג. מהי תאוצת הגופים, מהירותם ומיקומם כפונקציה של הזמן עד לזמן  $T$ ?

ד. כמה אנרגיה הלכה לאיבוד בזמן הזה?

ה. מצא את מהירותם הסופית של הגופים (ב- $t > T$ ) בהנחה שהמסה העליונה עדיין לא נופלת.

**(8) מסה על שני קרונות**

נתונים שני קרונות על משטח חלק.

הקרון הימני במנוחה והקרון השמאלי נע לעברו במהירות  $v$ .

על הקרון השמאלי מונחת מסה הנעה יחד עד הקרון.

מקדם החיכוך בין המסה לקרון הימני נתונה.

בין המסה לקרון השמאלי אין חיכוך.

בזמן  $t = 0$  הקרון השמאלי פוגע בקרון הימני

ונצמד אליו (אך הוא יכול להיפרד ממנו לאחר מכן).

א. מתי תעבור המסה לקרון הימני?

ב. מה תהיה מהירותו הסופית של הקרון הימני?

ג. מהי תאוצת הקרון הימני? כמה זמן תאוצה זו נמשכת?

ד. האם סעיף ב' וג' תואמים בתשובותיהם?

**(9) מסות שומרות תנע ונדבקות לקיר**

המסה  $m$  מונחת על גבי הקרונית  $M$  (אך אינה מחוברת אליה).

שתי המסות נעות יחד במהירות  $v$  על גבי משטח


חלק לעבר קיר. התנגשות בקיר אלסטית.

מקדם החיכוך בין המסות הוא  $\mu$ .

א. מה תהיה מהירות המסה  $M$  לאחר זמן


רב בהנחה שהיא גדולה מהמסה  $m$ .

ב. ענה על סעיף א' בהנחה שהמסה  $M$  קטנה מהמסה  $m$ .



**(10) כדור בקרונית**

כדור בעל מסה  $m$  ומהירות  $v_0$  נע בתוך קרונית בעלת מסה  $M = \alpha m$  ואורך  $L$ . הכדור מתנגש בדופן הימנית של הקרונית התנגשות אלסטית. (אין חיכוך בין הקרונית לרצפה).



א. מהי מהירות הגופים לאחר ההתנגשות?

בדוק עבור:  $\alpha = 0, 1, \infty$ .

ב. כמה זמן יעבור מהפגיעה הראשונה בדופן לפגיעה השנייה בדופן השמאלית?


**(11) שתי מסות על גלגלת וחוט רפוי**

שתי מסות  $m_1, m_2$  תלויות על גלגלת אידיאלית חסרת חיכוך.

המסה  $m_1$  נמצאת על הקרקע במנוחה בעוד שהמסה  $m_2$  תלויה באוויר.

מרימים את מסה  $m_2$  גובה  $H$  נוסף כך שהחוט מתרופף ומשחררים אותה ממנוחה.

א. מצא את מהירות המסה  $m_2$  לפני שהיא מגיעה לנקודה בה החוט נמתח.



ב. כעת החוט נמתח. הנח שהחוט אינו אלסטי,

כלומר, האורך שלו קבוע ללא תלות בגודל

המתיחות שלו כל עוד קיימת בו מתיחות כלשהי

(והוא אינו רפוי כמו בסעיף א').

מצא את השינוי הכולל בתנע של שתי המשקולות

(בין הקטע מיד לפני שהחוט נמתח לבין הקטע

מיד אחרי שהחוט מתוח ושתי המסות זזות).

ג. מצא את המתקף שהפעילה התקרה על הגלגלת

בזמן מתיחות החוט.

ד. לאיזה גובה תעלה  $m_1$  בהנחה ש-  $m_1 > m_2$  ו-  $m_2$

אינה פוגעת ברצפה.

ה. מהו המתקף שמפעילה התקרה על הגלגלת מהרגע  $t = 0$

ועד לרגע בו  $m_1$  הגיעה לשיא הגובה?

**(12) מסה מתנגשת במשאית ונופלת**

מסה  $m$  מונחת על עגלה חסרת חיכוך בעלת אורך  $L$

ומסה  $5m$ . המסה נוסעת במהירות  $v$  לכיוון שמאל

והעגלה נייחת.

נתון כי ההתנגשות בין המסה לבין העגלה היא

התנגשות אלסטית.

לאחר כמה זמן מרגע ההתנגשות תיפול המסה מהעגלה?




**(13) רתע בתוך עגלה**

בתוך עגלה ללא חיכוך עומדים שני חברים המקובעים לרצפת הקרון.

מסת האנשים והקרון  $M$  ואורך הקרון  $L$ .

האדם זורק כדור בעל מסה  $m$  במהירות  $v$  אל עבר חברו.



א. מה תהיה מהירות העגלה והאנשים שעליה לאחר זריקת הכדור?

ב. מה תהיה מהירות העגלה לאחר שהחבר יתפוס את הכדור?

ג. כמה זמן הכדור ישהה באוויר?

ד. מהו המרחק אותו עברה העגלה במהלך זמן זה?

ה. תאר מה יקרה אם החבר ימסור חזרה את הכדור לחברו.

**(14) אדם הולך על עגלה (מכיל תנועה יחסית)**

אדם בעל מסה  $M$  עומד על עגלה בעלת מסה  $m$ .

האדם מתחיל ללכת במהירות  $v_R$  ביחס לעגלה.

מצא את מהירות האדם והעגלה ביחס לקרקע אם אין חיכוך בין העגלה לרצפה.


**(15) אדם על רמפה (מכיל תנועה יחסית)\***

אדם שמסתו  $m$  רץ במעלה רמפה משופעת בזווית  $\theta$ .

מסת הרמפה היא  $M$ , והיא מונחת על מישור חלק.

האדם מתחיל ממנוחה והזמן הדרוש לו בכדי לעבור

דרך שאורכה  $L$  על פני הרמפה הוא  $T$ .



א. מהי תאוצת האדם ביחס לרמפה?

ב. עקב הריצה נהדפת הרמפה ימינה, בתאוצה לא ידועה  $A$  יחסית לקרקע.

בטאו את רכיבי התאוצה של האדם יחסית לקרקע בעזרת התאוצה  $A$ .

ג. כמה זזה הרמפה ימינה בזמן  $T$ ?

**(16) כדור עולה על מדרון משולש**

מדרון משולש בעל גובה  $h = 3m$  חופשי לנוע


מעל משטח אופקי חלק (ללא חיכוך).

מסת המדרון היא:  $M = 15kg$ .

מגלגלים כדור בעל מסה  $m = 5kg$

על המשטח לכיוון המדרון.

התייחס לכדור כאל גוף נקודתי.



א. מה צריכה להיות המהירות שבה מגלגלים את הכדור כך שהוא יעצור

(ביחס למדרון) בדיוק לפני שהוא עובר את שיא הגובה של המדרון?

ב. מהי המהירות המדרון ברגע שהכדור מגיע לשיא הגובה?


ג. מהי המהירות הסופית של המדרון והכדור?

**(17) מסה מחליקה בין שני טריזים**

גוף בעל מסה  $m$  מחליק על שני טריזים זהים בעלי מסה  $M$  כל אחד. המעבר מהטריז למשטח האופקי הוא חלק, המשטחים חסרי חיכוך וחופשיים לנוע על השולחן (ראו סרטוט). לאיזה גובה מקסימאלי יטפס הגוף על הטריז השני אם גובהו ההתחלתי הוא  $h$ ?


**(18) כדור גולף על כדורסל**


כדור גולף וכדור כדורסל מוחזקים במנוחה אחד מעל השני בגובה  $H = 1.5\text{m}$ . משחררים אותם ליפול ממנוחה. מה יהיה הגובה המרבי אליו יגיע כדור הגולף אם נניח שכל ההתנגשויות אלסטיות ומצחיות. מסת כדור הגולף היא:  $m = 46\text{gr}$  ומסת הכדורסל היא:  $M = 624\text{gr}$ .


**(19) התנגשויות אלסטיות זהה בכל המערכות**


במערכת אינרציאלית מסוימת האנרגיה הקינטית של שני גופים  $m_1$  ו-  $m_2$  היא  $E_k$ . מצאו את האנרגיה הקינטית של הגופים במערכת אינרציאלית אחרת הנעה במהירות  $v_0$  ביחס למערכת המקורית. השתמשו בתוצאה שקיבלתם והראו כי אם במערכת מסוימת ההתנגשות היא אלסטית אז היא חייבת להיות אלסטית גם בכל מערכות הייחוס האינרציאליות האחרות.

**(20) דיסקה מתנגשת בשתי דיסקות זהות**

על מישור חלק נמצאות 3 דיסקות זהות בעלות מסה  $M$  ורדיוס  $R$  כל אחת. הדיסקה השמאלית באיור נעה במהירות  $v$  ומתנגשת התנגשות אלסטית בזמנית עם שתי הדיסקות האחרות כפי שמתואר באיור. המרחק בין הדיסקות שנמצאות במנוחה לפני ההתנגשות מתואר על ידי  $2Rk$  כאשר  $1 \leq k \leq 2$ .



- מהי גודלה של מהירות הדיסקה הפוגעת לאחר ההתנגשות כתלות בזווית  $\alpha$  שבאיור?
- עבור אילו ערכים של  $k$  הדיסקה תחזור אחורה/תיעצר במקום/תמשיך קדימה?

**(21) סירה יורה פגז על מטרה בקצה השני**

סירה באורך  $l$  נמצאת על מים שקטים, בקצה השמאלי של הסירה נמצא תותח צעצוע ובקצה הימני נמצאת מטרה. התותח יורה פגז צעצוע בזווית  $\theta$  ובמהירות  $v$  ביחס לקרקע.

מסת הפגז היא  $m$  ומסת הסירה היא  $M$ .


מצא את המהירות  $v$  הדרושה בשביל לפגוע בדיוק במטרה (הזנח את גובה התותח וגובה המטרה והנח כי התותח מחובר לסירה).

**(22) שרשרת מחליקה משולחן**

שרשרת בעלת אורך  $l$  ומסה  $m$  מחליקה ממנוחה משולחן כאשר חציה עדיין מונח על השולחן.

א. מה תהיה מהירות השרשרת ברגע הניתוק מהשולחן, בהנחה שאין חיכוך?

ב. ענה על סעיף א' בהנחה שמקדם חיכוך  $\mu$  קיים בין השרשרת לשולחן.


**(23) שתי מסות ושני קפיצים**

מסות מתחילות ממנוחה כבשרטוט.

המסה הימנית נמתחת מרחק  $D$  ימינה ומשוחררת. כשהיא פוגעת במסה השנייה היא נדבקת אליה ושתיהן ממשיכות יחד.

א. מהו הכיוון המקסימלי של הקפיץ השמאלי?

ב. מהו הכיוון המקסימלי של הקפיץ הימני כאשר שתי המסות חוזרות ימינה?

**(24) טנק יורה פגזים ועולה במדרון\*\***

טנק שמסתו  $800 \text{ ק"ג}$  (טנק קל מאוד) נמצא ברגע מסוים במנוחה על מדרון משופע בזווית של  $15^\circ$  מעלות. הטנק יורה שני פגזים במרווח של  $2$  שניות בין הירי הראשון לשני.

מסת כל פגז היא  $20 \text{ ק"ג}$  והוא נורה במהירות לוע של  $400 \text{ מטר לשנייה}$  במקביל ובמורד למדרון. הניחו שלטנק גלגלים והחיכוך בינו למדרון זניח. מה ההעתק המקסימאלי שיעשה הטנק במעלה המדרון?

## תשובות סופיות:

$$0.18\text{m} \quad (1)$$

$$0.028\text{m} \quad (2)$$

$$u = 155 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \quad (3)$$

$$Q = 8.27\text{J}, \text{ ב. לא אלסטית, } u_1 = 8.66 \frac{\text{m}}{\text{sec}}, u_2 = 3.34 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \quad (4)$$

$$v_{\min} = \left[ (m + 0.05M) v_f + 0.95M \cdot 2\sqrt{gL} \right] \cdot \frac{1}{m} \quad (5)$$

$$0.75 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \text{ כלפי מעלה. ב. } 0 \quad (6)$$

$$F \leq \mu_s g (m_1 + m_2) \quad \text{ב. תאוצה: } a_1 = \frac{F}{m_1} - \frac{m_2}{m_1} \mu_k g, a_2 = \mu_k g \quad (7)$$

$$\text{מהירות: } v_1(t) = a_1 t, v_2(t) = a_2 t, \text{ מיקום: } x_1(t) = \frac{1}{2} a_1 t^2, x_2(t) = \frac{1}{2} a_2 t^2$$

$$u_f = \frac{F \cdot T}{m_1 + m_2} \quad \text{ד. } E = F \cdot \frac{1}{2} a_1 T^2 - \left( \frac{1}{2} m_2 v_2^2(T) + \frac{1}{2} m_1 v_1^2(T) \right) \quad \text{ג.}$$

$$\tilde{u} = \frac{v \left( m + \frac{M}{2} \right)}{M + m} \quad \text{ב. } t = \frac{2l}{v} \quad (8)$$

$$M \cdot v \cdot \left( m + \frac{M}{2} \right) = (m + M) \cdot M \cdot \frac{v}{2} + (m + M) \cdot mg \mu \cdot \tilde{t}, a = \frac{mg \mu}{M} \quad \text{ג. } \text{ד. כן.}$$

$$\tilde{u} = \frac{v(M - m)}{M + m} \quad \text{ב. חיובי, } \tilde{u} = \frac{v(M - m)}{M + m} \quad (9)$$

$$u_1 = -v_0, u_2 = 0 : \alpha = \infty, u_1 = 0, u_2 = v_0 : \alpha = 1, u_1 = v_0, u_2 = 2v_0 : \alpha = 0 \quad (10)$$

$$t = \frac{L}{u_2 - u_1} \quad \text{ב.}$$

$$J_{\text{ceiling}} = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} \sqrt{2gH} \hat{y} \quad \text{ג. } \Delta P_{\text{Total}} = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} \sqrt{2gH} \quad \text{ב. } v_2 = \sqrt{2gH} \quad \text{א. } (11)$$

$$J_{\text{Totalceiling}} = 0 + \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} \sqrt{2gH} + \frac{m_1 (m_1 + m_2)}{m_1 - m_2} \sqrt{32gH} \quad \text{ה. } h = \frac{m_2}{m_1 - m_2} \sqrt{\frac{H}{2g}} \quad \text{ד.}$$

$$t = \frac{L}{v} \quad (12)$$

$$L = t \cdot (v - u) \quad \text{ג. } mv + Mu = (m + M) \cdot 0 \quad \text{ב. } 0 = mv + Mu \quad \text{א. } (13)$$

$$x = u \cdot t \quad \text{ד. ה. ראה סרטון.}$$

$$u_2 = \frac{mv_R}{m + M}, u_1 = \frac{-Mv_R}{m + M} \quad (14)$$

$$x_{ramp}(T) = \frac{m}{m+M} L \cos \theta \quad \text{ג.}$$

$$a_{p_x} = \frac{2L}{T^2} \cos \theta - A \quad \text{ב.}$$

$$a'_p = \frac{2L}{T^2} \quad \text{א. (15)}$$

$$u_1' = 2\sqrt{5} \frac{m}{\text{sec}}, u_2' = -2\sqrt{5} \frac{m}{\text{sec}} \quad \text{ג.}$$

$$u = \sqrt{5} \frac{m}{\text{sec}} \quad \text{ב.}$$

$$v_0 = 8.94 \frac{m}{\text{sec}} \quad \text{א. (16)}$$

$$h'_{\max} = \frac{M^2 h}{(M+m)^2} \quad \text{(17)}$$

$$h \approx 12.3m \quad \text{(18)}$$

$$E_k' = E_R - (m_1 v_1 + m_2 v_2) v_0 + \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_0^2 \quad \text{(19)}$$

$$u_1 = v \frac{1 - 2 \cos^2 \alpha}{1 + 2 \cos^2 \alpha} \quad \text{א. (20)}$$

$$\text{ב. קדימה: } \sqrt{2} < k \leq 2, \text{ במקום: } k = \sqrt{2}, \text{ אחורה: } 1 \leq k < \sqrt{2}$$

$$v = \sqrt{\frac{gL}{1 + \frac{m}{M} \sin 2\theta}} \quad \text{(21)}$$

$$v = gl \left( \frac{3 - \mu}{4} \right) \quad \text{ב.}$$

$$v = \sqrt{\frac{3}{4}} gl \quad \text{א. (22)}$$

$$\text{(23) ראה סרטון.}$$

$$x(t=5.82) \approx 60m \quad \text{(24)}$$

# פיזיקה 1 מכניקה


פרק 10 - מרכז מסה

תוכן העניינים


|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| 153       | 1. הסבר בסיסי על מרכז מסה.                      |
| 154       | 2. דוגמה מרכז מסה של דיסקה עם חור.              |
| (ללא ספר) | 3. תנועה לפי הכוחות החיצוניים                   |
| 155       | 4. שני תרגילים.                                 |
| (ללא ספר) | 5. חישוב מרכז מסה של גופים גדולים בעזרת אינטגרל |
| 156       | 6. דוגמאות לחישוב מרכז מסה בעזרת אינטגרלים.     |
| 158       | 7. מערכת מרכז המסה.                             |
| 161       | 8. תרגילים מסכמים.                              |

## הסבר בסיסי על מרכז מסה:


### שאלות:



- (1) **דוגמה - מרכז מסה של שני מוטות בזווית**  
 המערכת המתוארת באיור מורכבת משני מוטות בעלי צפיפות אחידה.  
 מוט ראשון באורך  $3c.m$  נמצא לאורך ציר ה- $x$  ומסתו  $2kg$ , מוט שני נמצא בזווית  $60^\circ$  עם ציר ה- $x$  החיובי ואורכו  $5c.m$  ומסתו  $3kg$ .  
 מצאו את מרכז המסה של המערכת (ביחס לראשית).



- (2) **דוגמה - מרכז מסה של האות נ**  
 המערכת המתוארת באיור מורכבת ממוט בעל צפיפות מסה אחידה המכופף בצורת האות "נ" בתמונת מראה. מצאו את מיקום מרכז המסה של המערכת ביחס לפינה השמאלית התחתונה.



- (3) **דוגמה - מרכז מסה של F**  
 מרכיבים את האות F מלוחות בעלי צפיפות מסה אחידה ליחידת שטח.  
 המימדים של כל הלוחות נתונים באיור.  
 א. מצאו את מרכז המסה של המערכת ביחס לפינה השמאלית התחתונה של האות.  
 ב. מהו מרכז המסה של המערכת ביחס לפינה הימנית התחתונה של האות?

### תשובות סופיות:


- (1)  $x_{c.m} = 1.35c.m$  ,  $y_{c.m} = 1.3c.m$   
 (2)  $x_{c.m} = 1.2c.m$  ,  $y_{c.m} = 1.875c.m$   
 (3) א.  $x_{c.m} = 31mm$  ,  $y_{c.m} = 62mm$  . ב.  $x_{c.m} = 14mm$  ,  $y_{c.m} = 62mm$

## דוגמה מרכז מסה של דיסקה עם חור:

### שאלות:

#### (1) דוגמה מרכז מסה של דיסקה עם חור

בדיסקה בעלת רדיוס  $R$  ומסה  $M$  קדחו חור עגול בעל רדיוס  $r$  במרחק  $a$  ממרכז הדיסקה. הנח כי צפיפות המסה אחידה בכל הדיסקה. מצא את מרכז המסה של הדיסקה עם החור.




### תשובות סופיות:

$$x_{c.m.} = \frac{-a(\rho\pi r^2)}{M - (\rho\pi r^2)} \quad (1)$$

## שני תרגילים:


### שאלות:

#### (1) נער על סירה



אדם עומד בקצה סירה באורך 3 מטר.  
 מסת האדם היא 70 קילוגרם ומסת  
 הסירה 100 קילוגרם.  
 האדם התקדם 2 מטרים לאורך הסירה.  
 כמה זזה הסירה?  
 (הזנח את החיכוך בין המים לסירה).  
 נתון:  $m_1 = 70\text{kg}$ ,  $m_2 = 100\text{kg}$ .

#### (2) כדור על קרונית



כדור מונח על קרונית משופעת הנמצאת במנוחה.  
 הכדור מונח בגובה  $H = 1\text{m}$  ובמרחק של 5m מטר  
 מקצה הקרונית.

מסת הקרונית:  $m_1 = 10\text{kg}$ , מסת הכדור:  $m_2 = 2\text{kg}$ .

א. מצא את העתק הקרונית כאשר הכדור מגיע לקצה.

ב. מצא את מהירות הגופים אם נתון שמהירות הכדור בקצה הקרונית

היא רק בכיוון ציר ה- $x$ .

### תשובות סופיות:

$$x = \frac{14}{17} \text{ m} \quad (1)$$


$$\Delta x_1 = -\frac{10}{12} \text{ m} \quad \text{א.} \quad (2) \quad \text{ב.} \quad u_2 \approx 4.08 \frac{\text{m}}{\text{sec}}, u_1 \approx -0.82 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$$

## דוגמאות לחישוב מרכז מסה בעזרת אינטגרלים:

### שאלות:

**(1) מרכז מסה של מוט עם צפיפות לא משתנה**

חשב את מרכז המסה של מוט בעל אורך  $L$  וצפיפות מסה  $\lambda(x) = \lambda_0 \frac{x}{L}$ .



**(2) מרכז מסה של משולש**


מצא את מרכז המסה של המשולש שבתמונה.

**(3) מרכז מסה של שער**

שער חשמלי בעל מסה  $m$  ואורך  $l$  מונח על ציר שמרחקו  $d$  מסופו.



הסבר מדוע מחוברים לקצה השער משקולת כבדה ומצא את מסתה אם נתון כי אורכה  $L$ .




**(4) מרכז מסה של גיזרה וחצי דיסקה**

חשב את מרכז המסה של גיזרה עם צפיפות אחידה וזווית  $\theta$ .

**(5) חישוב שטח גיזרה**


נתון מעגל שרדיוסו  $R$ .

חשב שטח של גיזרה עם זווית  $\theta$ .




**(6) מרכז מסה של חצי כדור מלא**

חשב את מרכז המסה של חצי כדור מלא בעל צפיפות אחידה.



**(7) מרכז מסה של חרוט מלא**

חשב את מרכז המסה של חרוט מלא בעל צפיפות אחידה.




**(8) דיסקה עם חור**

חשב את מרכז המסה של חרוט מלא בעל צפיפות אחידה.

**(9) חצי חישוק ושתי מסות**

מצאו את מרכז המסה של חצי החישוק בעל מסה  $M$  ורדיוס  $R$  אשר בקצותיו חוברים שני כדורים קטנים בעלי מסה  $m$ .

**תשובות סופיות:**

$$x_{c.m.} = \frac{2}{3}L \quad (1)$$

$$r_{c.m.} = \left( \frac{1}{3}b, \frac{1}{3}a \right) \quad (2)$$

$$\frac{\left( \frac{L}{2} - d \right)m + \left( d + \frac{1}{2} \right)M}{m + M} = 0 \quad (3)$$

$$x_{c.m.} = \frac{4R \sin \frac{\theta_0}{2}}{3\theta_0} \quad (4)$$

$$S = \frac{\theta R^2}{2} \quad (5)$$

$$z_{c.m.} = \frac{3R}{8} \quad (6)$$


$$z_{c.m.} = \frac{H}{4} \quad (7)$$

$$z_{c.m.} = -\frac{1}{30}R \quad (8)$$

$$y_{c.m.} = \frac{2RM}{\pi(M + 2m)} \quad (9)$$

## מערכת מרכז המסה:

### שאלות:



#### (1) שני גופים מחוברים בקפיץ ונעים

שני גופים עם מסות  $m_1 = m$ ,  $m_2 = 2m$  קשורים בקפיץ בעל קבוע  $k$  ומונחים על משטח חסר חיכוך.

ברגע מסוים מעניקים לגוף  $m_1$  מהירות  $v_0$  כך שהוא מתרחק מהמסה  $m_2$ .

א. מה מהירות מרכז המסה  $v_{c.m.}$ ?

ב. מה מהירויות שני הגופים במערכת מרכז המסה מיד עם תחילת התנועה?

ג. מה האנרגיה הקינטית הכוללת מיד עם תחילת התנועה במערכת המעבדה ובמערכת מרכז המסה?

ד. מהי ההתארגות המקסימלית של הקפיץ? מה מהירויות שני הגופים במצב זה (גם במערכת מרכז המסה וגם במערכת המעבדה)?

ה. מה מהירויות שני הגופים (בשתי מערכות הייחוס) בפעם הראשונה בה הקפיץ חוזר לאורכו המקורי?

#### (2) התנגשות לא חזיתית

שתי דיסקות ברדיוס זהה  $R$  נמצאות על משטח ללא חיכוך.

הדיסקה  $m_1 = m$  נמצאת במנוחה


והדיסקה  $m_2 = 3m$  נעה במהירות  $v$  כלפיה.

המרחק בין מרכז דיסקה 1, למסלול של מרכז

דיסקה 2 הוא  $\sqrt{2}R$  כמתואר באיור.

אין חיכוך בין שפות הדיסקות במהלך

ההתנגשות וההתנגשות האלסטית.



א. תארו את תנועתן במערכת מרכז המסה לפני ההתנגשות.


ב. באיזו נקודה על פני כל דיסקה תהיה ההתנגשות ביניהן?

מה כיוון הכוח ביניהן בעת ההתנגשות?

ג. מה היו וקטורי המהירות אחרי ההתנגשות במערכת מרכז המסה?

ד. מה יהיו המהירויות, גודלן וכיוון אחרי ההתנגשות במערכת המעבדה?

ה. מה המתקף שהפעיל כדור 2 על כדור 1? חשבו בשתי המערכות.



### (3) גוף מתנגש בדפנות עגלה

גוף שמסתו  $m$  מונח בתוך עגלה שמסתה  $M$ . העגלה נמצאת במנוחה על משטח אופקי ואין חיכוך בינה לבין המשטח. מקנים לגוף מהירות התחלתית  $v_0$  והוא נע הלך ושוב בין דפנות העגלה ללא חיכוך. ההתנגשות של הגוף עם הדפנות היא התנגשות אי-אלסטית. מה תהיה מהירות הגוף ביחס לקרקע לאחר זמן רב?

### (4) זווית פיזור אפשרית באיבוד אנרגיה\*\*

- חלקיק בעל מסה  $M$  נע במהירות קבועה לאורך ציר ה- $x$ . כאשר האנרגיה הקינטית שלו היא  $K$ . החלקיק פוגע בחלקיק אחר, בעל מסה זהה הנמצא במנוחה. האנרגיה של כל המערכת לאחר ההתנגשות היא  $\alpha K$  כאשר  $\alpha$  קבוע חיובי נתון, הקטן מ-1.
- מהי מהירות מרכז המסה לפני ואחרי ההתנגשות?
  - האם ניתן לדעת את כיוון המהירות של החלקיק הפוגע, במערכת מרכז המסה, לפני ואחרי ההתנגשות?
  - אם  $\alpha = 0.6$ , מה תחום זוויות הפיזור האפשריות? מומלץ לצפות בסרטון ההוכחה שהזווית בין שני גופים בעלי מסות זהות המתנגשים התנגשות אלסטית היא 90 מעלות.

## תשובות סופיות:

$$(1) \quad \text{א. } v_{c.m.} = \frac{v_0}{3} \quad \text{ב. } v_{1.c.m.} = \frac{2v_0}{3}, v_{2.c.m.} = -\frac{v_0}{3}$$

$$\text{ג. מעבדה: } E_k = \frac{1}{2}mv_0^2, \text{ מרכז המסה: } E_k = \frac{1}{3}mv_0^2$$

$$\text{ד. מעבדה: } \Delta x_{\max} = \sqrt{\frac{2mv_0^2}{3k}}, \frac{v_0}{3}, \Delta u_{c.m.} = 0, \text{ מרכז המסה: } 0$$

$$\text{ה. מעבדה: } u_1 = -\frac{1}{3}v_0, u_2 = \frac{2v_0}{3}, \text{ מרכז המסה: } u_{1.c.m.} = -\frac{2v_0}{3}, u_{2.c.m.} = \frac{v_0}{3}$$

$$(2) \quad \text{א. } v_{1.c.m.} = -\frac{3}{4}v, v_{2.c.m.} = \frac{1}{4}v \quad \text{ב. } \alpha = 45^\circ \quad \text{ג. בכיוון ציר y השלילי - } |\vec{v}_{1.c.m.}| = \frac{3}{4}v$$

$$\text{בכיוון ציר y החיובי - } |u_{2.c.m.}| = \frac{1}{4}v \quad \text{ד. } \alpha_1 = -45^\circ, u_1 = \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot 3v$$

$$\text{ה. במעבדה: } \vec{J}_{2 \rightarrow 1} = \Delta \vec{P}_1 = mv \cdot \frac{3}{4}(1, -1) \quad u_2 = \frac{\sqrt{10}}{4}v, \alpha_2 = 18.4^\circ$$

$$\text{במרכז המסה: } \vec{J} = \int N dt = m \frac{3}{4}v(1, -1)$$

$$(3) \quad u = \frac{mv_0}{m+M}$$

$$(4) \quad \text{א. } v_{c.m.} = \frac{v}{2} \quad \text{ב. לפני: באותו כיוון, אחרי: לא ניתן.} \quad \text{ג. } -48.2^\circ \leq \theta \leq 48.2^\circ$$

## תרגילים מסכמים:

### שאלות:


#### (1) שני גופים מחוברים בקפיץ נלחצים לקיר

שני גופים מחוברים בקפיץ בעל קבוע  $k$  ונמצאים על משטח אופקי חסר חיכוך. מסת הגוף הימני היא  $m_1$ , מסת הגוף השמאלי היא  $m_2$  והוא צמוד לקיר. האורך הרפוי של הקפיץ הוא  $l_0$ .

לוחצים את הגוף הימני עד שהקפיץ מתכווץ לאורך  $\frac{l_0}{3}$  ומשחררים ממנוחה.

- מתי תתנתק המסה השמאלית מהקיר?
- מהו מיקום מרכז המסה כתלות בזמן?

#### (2) מנוע מושך מסה בסירה




על סירה (ללא חיכוך עם המים) מונחת מסה. המסה מחוברת בחוט למנוע המחובר לסירה. כוח המשיכה של המנוע משתנה בזמן, מקדם החיכוך הסטטי ומקדם החיכוך הקינטי נתונים.


- מתי תתחיל לנוע המסה?
- מה תהיה תאוצת מרכז המסה? תאוצת הסירה? תאוצת המסה?
- לאחר שהמסה נעה החוט ניתק. ענה שוב על סעיף ב'.
- האם המסה והסירה ייעצרו בו זמנית?

#### (3) חרוז מסתובב על חישוק שחופשי לנוע

חישוק בעל רדיוס  $R$  ומסה  $m$  מונח על שולחן אופקי חלק. על החישוק ישנו חרוז המתחיל לנוע מהנקודה  $A$  ומסתו  $m$  גם כן. ב- $t=0$  החישוק נמצא במנוחה ומהירותו ההתחלתית של החרוז היא  $v_0$  ימינה.



- מצא את מיקום מרכז המסה של המערכת בתחילת התנועה.
- מצא את מהירות מרכז המסה כפונקציה של הזמן ואת מסלולה.
- מהן מהירויות החרוז והצינור כאשר החרוז נמצא בנקודות  $B, C, D$  ושוב ב- $A$  ביחס לחישוק?

**(4) שני גופים על מדרון שני**


שני גופים בעלי מסות  $m$  ו- $3m$  נמצאים על מדרון דו-צדדי בעל זווית נטייה  $\alpha$  משני צדדיו.

שני הגופים קשורים זה לזה בחוט אידיאלי דרך גלגלת אידיאלית המחוברת למדרון. למדרון מסה  $12m$  והוא יכול לנוע על הרצפה. אין חיכוך בין הגופים למדרון ובין המדרון לרצפה. משחררים את המערכת ממנוחה.

- א. חשב את העתק המדרון, לאחר שהגוף הכבד עבר מרחק  $L$  במורד המדרון.
- ב. מהי העבודה שביצע משקל הגוף הכבד ומשקל הגוף הקל במהלך התנועה?
- ג. חשב את מהירות המדרון ביחס לרצפה ברגע זה.

**(5) מסה מתנגשת במסה עם קפיץ**

גוף שמסתו  $2m$  נע במהירות  $v$  על משטח חסר חיכוך לעבר גוף נוסף שמסתו  $m$  הנמצא במנוחה. בצידו השמאלי של הגוף במנוחה ישנו קפיץ רפוי בעל קבוע  $k$ . הבעיה חד מימדית.



- א. מהי מהירות מרכז המסה של הגופים?
- ב. מהי ההתכווצות המקסימאלית של הקפיץ?

## תשובות סופיות:

$$(1) \quad \text{א. כאשר הקפיץ מגיע לנקודת רפיון או ב-} t = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{m_1}{k}}.$$

$$\text{ב. } x_{\text{c.m.}}(d) = \frac{m_1 l_0}{m_1 + m_2} \left( 1 + \frac{2}{3} \sqrt{m_1 k t} \right)$$

$$(2) \quad \text{א. } \mu \cdot mg = t \quad \text{ב. } a = \frac{t}{m}, -a = \frac{t}{M} \quad \text{ג. } a = \mu \cdot g \frac{m}{M}, -a = \mu \cdot g$$

ד. כן.

$$(3) \quad \text{א. } y_{\text{c.m.}}(t=0) = \frac{R}{2} \quad \text{ב. } \vec{v}_{\text{c.m.}}(t) = \frac{1}{2} v_0 \hat{x}$$

$$\text{ג. בנקודה B: } u_{1x} = \frac{1}{2} v_0 = u_{2x}, u_{1y} = \frac{-v_0}{2} = -u_{2y}$$

$$\text{בנקודה C: } u_{1y} = 0 = u_{2y}, u_{2x} = v_0, u_{1x} = 0$$

$$\text{בנקודה D: } u_{1x} = u_{2x} = \frac{1}{2} v_0, u_{1y} = \frac{v_0}{2} = -u_{2y}$$

$$(4) \quad \text{א. } x_2 = -\frac{L \cos \alpha}{4} \quad \text{ב. הכבד: } W = 3mgL \sin \alpha, \text{ הקל: } W = mg(-L \sin \alpha)$$

$$\text{ג. } v_{2x} = \sqrt{\frac{gL \sin \alpha}{4(4 \tan^2 \alpha + 3)}}$$

$$(5) \quad \text{א. } v_{\text{c.m.}} = \frac{2}{3} v \quad \text{ב. } \Delta x_{\text{max}} = \sqrt{\frac{10m}{3k}} \cdot v$$

# פיזיקה 1 מכניקה

פרק 11 - מומנט התמד

תוכן העניינים


1. הקדמה - גוף קשיח וציר סיבוב ..... (ללא ספר)
2. מומנט התמד, הסבר בסיסי וחישוב עבור גוף נקודת ..... (ללא ספר)
3. משפט שטיינר ..... (ללא ספר)
4. אדטיביות ..... 164
5.  $I_z = I_x + I_y$  ..... (ללא ספר)
6. סימטריה ל  $z$  ..... (ללא ספר)
7. חישוב מומנט ההתמד של דיסקה סביב ציר  $Z$  וציר  $X$  ..... (ללא ספר)
8. תרגילים שונים לחישוב מומנט התמד ..... 165

## אדטיביות:

### שאלות:

#### (1) דוגמה

לדסקה בעלת מסה  $M$  ורדיוס  $R$  מחברים דסקה נוספת זהה בקצה התחתון של הדסקה. מצא את מומנט ההתמד של המערכת סביב ציר המאונך למישור הדסקה והעובר בקצה העליון של הדסקה (הראשונה).



### תשובות סופיות:

$$I = 11mR^2 \quad (1)$$

## תרגילים שונים לחישוב מומנט התמד:

### שאלות:




- (1) חישוב אינטגרל של מוט לא אחיד  
חשב את מומנט ההתמד של מוט עם צפיפות ליחידת

$$\text{אורך } \lambda(x) = \lambda_0 \frac{x}{L} \text{ סביב קצה המוט.}$$


$x$  הוא המרחק מהקצה,  $L$  הוא אורך המוט ו- $\lambda_0$  נתון.

$$m, l, \lambda = Ax^2$$

- (2) חישוב נוסף מוט בצפיפות לא אחידה  
מצא את מומנט ההתמד של מוט סביב מרכזו לפי  
הנתונים שבשרטוט.  
הצפיפות הנתונה מתייחסת למרכז המוט כראשית הצירים.



- (3) שלושה מוטות מחוברים בקצה  
שלושה מוטות זהים באורך  $l$  ומסה  $m$  כל אחד מחוברים  
באופן המוצג באיור.  
מצא את מומנט ההתמד של המערכת סביב ציר הנמצא  
בנקודת החיבור בין המוטות ובמאונך למישור.



- (4) מסגרת ריבועית  
נתונה מסגרת ריבועית בעלת אורך צלע  $a$  ומסה  $M$ .  
מצא את מומנט ההתמד של מסגרת.  
א. סביב ציר העובר במרכז ומאונך למישור המסגרת.  
ב. סביב ציר העובר במרכז המסגרת ודרך מרכז שתי  
צלעות ומקביל לשתי הצלעות האחרות.




- (5) מומנט התמד של שער חשמלי  
מצא את מומנט ההתמד של שער חשמלי בעל מסה  $m$   
ואורך  $l$  אשר בסופו מחוברת משקולת בעלת מסה  $M$   
ואורך  $L$  המסתובב סביב מרכז המסה שלו.



- (6) מומנט התמד של ריש  
מצא את מומנט ההתמד של הגוף שבשרטוט סביב מרכז המסה  
שלו בשתי דרכים שונות. אורך כל מוט  $l$  ומסתו  $m$ .

### 7) דיסקה עם חור




- א. מצא את מומנט ההתמד של דיסקה בעלת מסה  $M$  ורדיוס  $R$ , אם ידוע כי במרחק  $R$  חצי ממרכז הדיסקה קדחו חור ברדיוס רבע  $R$ . הדיסקה מסתובבת סביב ציר במרכזה (ולא במרכז המסה של המערכת).
- ב. מצא את מומנט ההתמד של הגוף סביב מרכז המסה שלו.

### 8) חצי חישוק ושתי מסות




- מצא את מומנט ההתמד של חצי החישוק שבתמונה. רדיוסו  $R$ , מסתו  $M$  ובקצותיו חוברו שתי מסות  $m$ . החישוק סובב סביב מסמר בקודקודו.

### 9) חישוב אינטגרל של ריבוע




- חשב את מומנט ההתמד של לוח ריבוע בעל אורך צלע  $a$ , מסה  $M$  וצפיפות אחידה בכל אחד מהמצבים הבאים:
- א. ציר הסיבוב הוא אחת הפאות של הריבוע.
- ב. ציר הסיבוב מקביל לפאות ועובר במרכז.
- ג. ציר הסיבוב אנך למשטח הריבוע ועובר במרכזו.

### 10) מומנט התמד של משולש



- מצא את מומנט ההתמד של המשולש סביב קודקודו הישר.

### 11) מומנט התמד של כדור מלא



- חשב את מומנט ההתמד של כדור מלא בעל רדיוס  $R$ , מסה  $M$  וצפיפות אחידה, סביב ציר העובר במרכז הכדור.

### 12) מומנט התמד של קליפה כדורית

- מצאו את מומנט ההתמד של קליפה כדורית ברדיוס  $R$  ומסה  $m$  סביב ציר העובר דרך מרכז המסה של הקליפה.

## תשובות סופיות:

$$I_0 = M \frac{L^2}{2} \quad (1)$$

$$I = \frac{12ml^2}{80} \quad (2)$$

$$I_{c.m.} = ml^2 \quad (3)$$

$$I = \frac{M}{8} \left( a^2 + \frac{l^2}{3} \right) \quad \text{ב.} \quad I_{c.m.} = \frac{M}{4} \left( \frac{l^2}{3} + a^2 \right) \quad \text{א.} \quad (4)$$

$$I = \left( \frac{1}{12} ml^2 + m \left( \frac{m \cdot 0 + \frac{M(1+L)}{2}}{m+M} \right)^2 \right) + \left( \frac{1}{12} (L^2 + L^2) M + M \left( \frac{1}{2} - \left( \frac{m \cdot 0 + \frac{M(1+L)}{2}}{m+M} \right) + \frac{L}{2} \right)^2 \right) \quad (5)$$

$$I = \frac{5}{12} ml^2 \quad (6)$$

$$I_0 = I_{c.m.} + \frac{15}{16} M \cdot \left( \frac{R}{30} \right)^2 \quad \text{ב.} \quad I_0 = \frac{247}{512} MR^2 \quad \text{א.} \quad (7)$$

$$I_1 = I_{c.m.} + m'b^2 \quad (8)$$

$$I = M \frac{1}{6} a^2 \quad \text{ג.} \quad I = \frac{1}{12} Ma^2 \quad \text{ב.} \quad I = \frac{1}{3} Ma^2 \quad \text{א.} \quad (9)$$

$$I_0 = \frac{1}{6} m(a^2 + b^2) \quad (10)$$

$$I = \frac{2}{5} MR^2 \quad (11)$$

$$\frac{2MR^2}{3} \quad (12)$$

# פיזיקה 1 מכניקה


פרק 12 - מומנט כוח

תוכן העניינים

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 168       | 1. מומנט כוח - הסבר                                      |
| (ללא ספר) | 2. מכפלה וקטורית                                         |
| 169       | 3. תרגיל - מומנטים על משולש                              |
| (ללא ספר) | 4. פיתוח, מדוע מתייחסים לכוח הכובד כאילו פועל במרכז המסה |
| (ללא ספר) | 5. משוואת מומנטים                                        |
| 170       | 6. תרגיל - שני פועלים מחזירים מנשא                       |
| 171       | 7. תרגילים מסכמים                                        |

## מומנט כוח - הסבר:

### שאלות:




#### 1) דוגמה לחישוב מומנט (מוט)

נתון מוט אשר מקובע בקצהו ומסתובב נגד כיוון השעון.

מופעל כוח  $F$ .

חשב את מומנט הכוח.



#### 2) מרחק אפקטיבי דוגמה

אדם דוחף ארגז בגובה 0.5m ומפעיל כוח  $F$

(ראה תמונה).

לארגז אין חיכוך עם המשטח.

האדם דוחף את הארגז ללא כל בעיה עד

שנתקע באבן והארגז מתהפך

(מיקום האבן הופך לציר הסיבוב).

חשב את מומנט הכוח.

### תשובות סופיות:

$$\vec{\tau} = F_0 \times \hat{z} \quad (1)$$

$$|\vec{\tau}| = 10 \cdot 0.5m \quad (2)$$

## תרגיל - מומנטים על משולש:

### שאלות:

#### (1) מומנטים על משולש

המשולש בתמונה הוא משולש שווה צלעות עם אורך צלע נתונה  $a$ .


א. חשב את המומנטים של הכוחות בתמונה סביב הפינה השמאלית של המשולש.

ב. נתונה המסה של המשולש  $M$  ונתון גם כי מרכז המסה של המשולש

$$\text{נמצא בנק': } \left( \frac{1}{2}a, \frac{1}{2\sqrt{3}}a \right)$$

חשב את מומנט הכוח של כוח הכובד.

ג. חשב שוב את המומנטים סביב ציר העובר במרכז המסה של המשולש, הנח כי הזווית בין  $F_1$  לדופן המשולש היא  $60^\circ$  מעלות.



### תשובות סופיות:

$$\tau_g = -Mg \frac{1}{2}a \quad \text{ב.} \quad \tau_1 = 0!, \quad \vec{\tau}_2 = -5 \cdot \sqrt{3}a, \quad \vec{\tau}_3 = 0!, \quad \tau_4 = 10a \quad \text{א.} \quad (1)$$


$$\tau_1 = \frac{-10a}{\sqrt{3}}, \quad \tau_2 = -10 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}a, \quad \tau_3 = -\frac{1}{\sqrt{3}}a \cdot 10 \cdot \sin 30^\circ, \quad \tau_4 = 10 \cdot \frac{1}{2}a, \quad \tau_g = 0 \quad \text{ג.}$$

## תרגיל - שני פועלים מחזיקים מנשא:

### שאלות:

#### (1) שני פועלים מחזיקים מנשא

שני פועלים מחזיקים מנשא מעץ שמסתו 12kg ואורכו 1.5m. על המנשא, במרחק של 0.5m מהפועל הימני, מונח ארגז בעל מסה של 8kg. בהנחה כי המערכת במנוחה, מצאו את הכוח שמפעיל כל פועל (ראה איור).




### תשובות סופיות:

$$F_2 = 113.333\text{N}, F_1 = 86.666\text{N} \quad (1)$$

## תרגילים מסכמים:

### שאלות:


#### (1) מוט עומד מחובר לחוט ומשקולת



מוט אחיד מונח על משטח אופקי לא חלק, כמוראה בתרשים. המוט מחובר במרכזו לחוט אידיאלי שקצהו השני קשור למשטח ויוצר עימו זווית של  $37^\circ$ . הקצה העליון של המוט מחובר באמצעות חוט אופקי אידיאלי וגלגלת אל משקולת שמסתה  $m = 7\text{ kg}$ . המערכת נמצאת במנוחה.

- מהי המתיחות בחוט המחבר אל המשטח?
- מהו כוח החיכוך שמפעיל המשטח האופקי על המוט?


#### (2) קורה על קיר אנכי



באיור לשאלה זו מתוארת קורה אחידה שאורכה הכולל הוא 23.5 m. מסת הקורה היא 140 kg. הקורה נשענת בנקודה A על קיר אנכי חלק שגובהו 8 m.

קצה הקורה מונח על הרצפה בנקודה B במרחק 18 m מהקיר ובקצה הזה פועל כוח אופקי  $F$ , כמתואר באיור. מקדם החיכוך הסטטי שבין הקורה הרצפה הוא  $\mu_s = 0.3$ . מהו  $F$  המקסימלי הניתן להפעיל כך שהקורה תישאר במנוחה?


#### (3) מוט נשען על כדור



נתון מוט דק שאורכו  $L = 3.5\text{ m}$  ומסתו  $m = 7\text{ kg}$ . הנשען על כדור חסר חיכוך המודבק לרצפה כמתואר בשרטוט. נקודת המגע של המוט בכדור היא הנקודה K. בקצהו השמאלי נוגע המוט בקיר בעל חיכוך בנקודה P, הזווית שיוצר המוט יחסית לקיר היא  $48^\circ$ . מקדם החיכוך הסטטי שבין הקיר למוט הוא  $\mu_s = 0.15$ .


- מהו הכוח שמפעיל הכדור על המוט אם נתון שקצהו הימני של המוט נמצא על סף תנועה כלפי מטה?
- מהו המרחק בין הנקודות P ו-K במצב זה?

(4) **טבלה מעץ**




- טבלה העשויה עץ בעלת עובי אחיד שמסתה 400 גר' וצורתה כמתואר בתרשים, תלויה בשני חוטים בנקודות K ו-P.
- א. חשב את מרכז הכובד של הטבלה ביחס למערכת צירים שראשיתה ממוקמת בנקודה P.
- ב. מצא את המתוחות בשני החוטים.

(5) **שלט בצורת האות ש**




- שלט העשוי מחומר אחיד בצורת האות "ש" (כמשורטט), שמסתו 4 ק"ג, נתלה בשני חוטים בנקודות K ו-M.
- א. חשבו את מרכז המסה של השלט ביחס למערכת צירים שראשיתה ממוקמת בנקודה K.
- ב. מצאו את המתוחות בשני החוטים.

(6) **מסה תלויה על קורה שמחוברת לקיר**



- קורה בעלת מסה  $m_1$  ואורך  $l$  מחוברת לקיר באמצעות ציר.
- בקצה הקורה קשורה מסה  $m_2$  התלויה במנוחה.
- מאמצע הקורה יוצא חוט בזווית הקשור חזרה לקיר, הזווית שיוצר החוט עם הקורה היא  $\alpha$ .
- א. מהי המתוחות בחוטים?
- ב. מהו הכוח (גודל וכיוון) שמפעיל הציר?

(7) **סולם נשען על קיר**



- סולם נשען על קיר.
- קיים חיכוך סטטי בין הסולם לרצפה וגם בין הסולם לקיר.
- מקדם החיכוך הסטטי בין הסולם לרצפה ובין הסולם לקיר הוא  $\mu_s$ .
- אורך הסולם הוא  $L$  וניתן להניח שמסתו מפולגת בצורה אחידה.
- מהי הזווית המינימלית עם הרצפה כך שהסולם לא יחליק?

**(8) אדם עומד על סולם שנשען על קיר**

אדם עומד על סולם שנשען על קיר.

אורך הסולם הוא  $L$  וניתן להניח שמסתו מפולגת


בצורה אחידה. האדם עומד על הסולם כשמרחקו מהקצה התחתון של הסולם הוא שני שליש מאורך הסולם.

קיים חיכוך סטטי בין הסולם לרצפה וגם בין הסולם לקיר.

מקדם החיכוך הסטטי בין הסולם לרצפה ובין הסולם לקיר

הוא  $\mu_s$ . מסת האדם כפולה ממסת הסולם.

מהי הזווית המינימלית עם הרצפה כך שהסולם לא יחליק?

**(9) מומנטים על שער**

שער שגובהו  $h$  ואורכו  $l$  מחובר לקיר בשני צירים  $a$  ו- $b$ .


על מנת להקל על הציר העליון חיברו לשער כבל ומתחו

אותו עד אשר הכוח האופקי בנקודה  $a$  מתאפס.

א. מהי המתיחות בכבל?


ב. מהו הכוח האופקי הפועל על הציר  $b$ ?

ג. מהו סכום הכוחות האנכיים המופעלים על שני הצירים?

**(10) גגון מוחזק אל קיר**

גגון מוחזק אל קיר בעזרת חבל וחיכוך כמתואר בשרטוט.


מצא את הכוחות הפועלים על הגגון.

**(11) מסה על גגון מחליק**

גגון מוחזק לקיר בעזרת חיכוך בלבד לפי הנתונים שבשרטוט.


מהו המרחק הקטן ביותר מהקיר בו ניתן לשים את המסה  $m$

מבלי לגרום לגגון להחליק מהקיר?

**(12) מטוטלת מתמטית**

מצא את מומנט הכוח המופעל על מטוטלת מתמטית


כפונקציה של הזווית מהאנך.

**(13) מנוף מדיסקה כפולה**


נתונה המערכת שבשרטוט.

רשום את כל הכוחות הפועלים על הדיסקה

ומצא את יחס הרדיוסים בין שתי הדיסקות.



### 14) אדם על קורה מחזיק בחוט ושתי גלגלות




אדם שמסתו 65kg עומד בקצה קורה שמסתה 40kg. הקורה מונחת על ציר הנמצא במרחק 1m מהאדם. האורך הכולל של הקורה הוא 6m. האדם מחזיק בחוט העובר דרך שתי גלגלות כפי שמתואר באיור. הגלגלת השמאלית מחוברת לתקרה, הגלגלת הימנית לקורה במרחק 1m מהקצה השני.

- מהו הכוח בו האדם צריך למשוך את החבל כדי לשמור על מצב של שיווי משקל?
- מהם רכיבי הכוח שהציר מפעיל על הקורה?
- מהו מקדם החיכוך הסטטי המינימאלי בין האדם לקורה כדי שהאדם לא יחליק מהקורה?

### 15) L על מישור משופע\*

באיור נתון גוף משטחי בצורת L.

צפיפות המסה של הגוף היא:  $\sigma = 5 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$ .




- מהו מרכז המסה של הגוף ביחס לפינה התחתונה השמאלית?
- מניחים את הגוף על מישור משופע. מהי הזווית המקסימאלית של המישור עבורה הגוף לא יתהפך?
- קושרים את הגוף למישור באמצעות חוט אופקי מהפינה הימנית העליונה ומותחים את החוט עד שהגוף מתיישר במקביל לקרקע.


מהי המתיחות בחוט במצב זה אם זווית המישור היא  $30^\circ$  והגוף במנוחה.

### 16) מוט נשען על דף נייר\*

מוט בעל אורך L ומסה M מחובר לתקרה בציר. בקצהו השני המוט מונח על דף נייר המונח על הרצפה. מסת דף הנייר זניחה. הזווית בין המוט לאנך היא  $\beta$  ומקדם החיכוך הסטטי בין המוט לנייר ובין הנייר לרצפה הוא  $\mu_s$ .




- מושכים את הנייר ימינה בכוח F. מהו הכוח המינימלי הדרוש בשביל להוציא את הנייר מתחת למוט? הנח שהמוט נשאר במנוחה.
- חזור על סעיף א' אם הכוח פועל שמאלה.




### 17) ערימת קוביות 1

ערימת קוביות מורכבת מ-4 קוביות זהות באורך  $L$ . הקוביות מסודרות באופן שמתואר באיור. מהו המרחק  $d$  המקסימאלי האפשרי כך שהערימה לא תיפול מהשולחן. מהם  $x_1$  ו- $x_2$  במצב זה?




### 18) ערימת קוביות \*2

ערימת קוביות מורכבת מ-4 קוביות זהות באורך  $L$ . הקוביות מסודרות באופן שמתואר באיור. מהו המרחק  $d$  המקסימאלי האפשרי כך שהערימה לא תיפול מהשולחן. מהם  $x_1$  ו- $x_2$  במצב זה?



### 19) מוט עם שני מעצורים מגומי\*\*

באיור ישנו מוט באורך 13c.m. המחובר בציר הנמצא במרחק 5c.m. מהקצה הימני. בשני הקצוות של המוט ישנם מעצורים זהים העשויים מגומי. מפעילים כוח  $F = 200\text{N}$  במרחק 4c.m. שמאלה מהציר, הכוח גורם לכיווץ קטן של המעצורים. המערכת אופקית, כלומר כוח הכובד פועל לתוך הדף וניתן להתעלם ממנו. מהו הכוח שפועל על כל מעצור? רמז: התייחס למעצורים כמו קפיצים בעלי קבוע  $k$  זהה.



### 20) אדם על סולם עם שתי רגליים\*\*

אדם עומד על סולם בעל שתי רגליים המחוברות באמצעות כבל במרכז הסולם. משקל האדם הוא 800 ניוטון וניתן להזניח את משקל הסולם ואת החיכוך עם הרצפה. נתונים אורכי הקטעים הבאים:  $KM = OM = 2.34\text{m}$ ,  $KP = 1.70\text{m}$ ,  $LN = 0.746\text{m}$ . א. מצא את הכוחות שפועלים בנקודות O ו-K. ב. מצאו את המתוחות בכבל. רמז: יש לעשות משוואה רק על חלק מהסולם.

## תשובות סופיות:

$$(1) \quad T_2 \approx 180 \text{ N} \quad \text{א.} \quad \text{ב.} \quad f_s = T_1 = 70 \text{ N}, \text{ ימינה.}$$

$$(2) \quad F_{\max} \approx 521 \text{ N}$$

$$(3) \quad N_2 \approx 110 \text{ N} \quad \text{א.} \quad \text{ב.} \quad PK \approx 0.84 \text{ m}$$

$$(4) \quad x_{\text{c.m.}} = 6.6 \text{ c.m.}, y_{\text{c.m.}} = 3.75 \text{ c.m.} \quad \text{א.} \quad \text{ב.} \quad T_2 = 3 \text{ N}, T_1 = 1 \text{ N}$$

$$(5) \quad x_{\text{c.m.}} = 5 \text{ c.m.}, y_{\text{c.m.}} \approx 4.4 \text{ c.m.} \quad \text{א.} \quad \text{ב.} \quad T_K = 6.7 \text{ N}, T_M = 33.3 \text{ N}$$

$$(6) \quad T_1 = \frac{(m_1 + 2m_2)g}{\sin \alpha}, T_2 = m_2 g \quad \text{א.}$$

$$\text{ב.} \quad F = \sqrt{((m_1 + 2m_2)g \cot \alpha)^2 + (m_2 g)^2}, \tan \theta = -\frac{m_2}{m_1 + 2m_2} \tan \alpha$$

$$(7) \quad \tan \theta = \frac{1 - \mu_s^2}{2\mu_s}$$

$$(8) \quad \tan \theta = \frac{11 - 7\mu_s^2}{18\mu_s}$$

$$(9) \quad \text{ראה סרטון.}$$

$$(10) \quad \text{ראה סרטון.}$$

$$(11) \quad \text{ראה סרטון.}$$

$$(12) \quad \sum \tau = -mgl \sin \theta + Tl \sin \theta = -mgl \sin \theta$$

$$(13) \quad \sum \tau = \frac{m}{M} = \frac{r}{R}$$

$$(14) \quad T_1 = 20 \text{ N} \quad \text{א.} \quad \text{ב.} \quad F_x = 10\sqrt{3} \text{ N}, F_y = 1000 \text{ N} \quad \text{שמאלה}$$

$$\mu_{s_{\min}} = 0.027 \quad \text{ג.}$$

$$(15) \quad x_{\text{c.m.}} = 0.15 \text{ m}, y_{\text{c.m.}} = 0.25 \text{ m} \quad \text{א.} \quad \text{ב.} \quad \alpha = 31^\circ$$

$$\text{ג.} \quad T = 3.3 \text{ N}$$

$$(16) \quad F_{\min} = \frac{\mu_s mg \sin \beta}{\sin \beta + \mu_s \cos \beta} \quad \text{א.} \quad \text{ב.} \quad F_{\min} = \frac{\mu_s mg \sin \beta}{\sin \beta + \mu_s \cos \beta}$$

$$(17) \quad x_1 = \frac{5L}{8}, x_2 = \frac{L}{2}, d = \frac{9L}{8}$$

$$(18) \quad x_1 = \frac{L}{2}, x_2 = \frac{2L}{3}, d = \frac{7L}{6}$$

$$(19) \quad F_R \approx 45 \text{ N}, F_L \approx 72 \text{ N}$$

$$(20) \quad N_O \approx 291 \text{ N}, N_k = 509 \text{ N} \quad \text{א.} \quad \text{ב.} \quad T_L \approx 196 \text{ N}$$

# פיזיקה 1 מכניקה

פרק 13 - תנע זוויתי

תוכן העניינים

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 177       | 1. נוסחאות וחוקי שימור       |
| 180       | 2. תנע זוויתי ביחס למרכז מסה |
| (ללא ספר) | 3. פרסציה                    |
| 182       | 4. תרגילים בפרסציה           |

## נוסחאות וחוקי שימור:

### שאלות:

#### (1) תנ"ז בזריקה משופעת

אבן נזרקת בזריקה משופעת במהירות  $v_0$  ובזווית  $\alpha$ ,

כוח הכובד שפועל על האבן  $\vec{F} = -mg\hat{y}$ .

א. מהו התנ"ז של האבן ביחס לנקודת המוצא כתלות בזמן?

ב. מהו מומנט הכוח של כוח הכובד?

ג. הראה כי השינוי של התנ"ז בזמן שווה למומנט הכוח של כוח הכובד.

#### (2) גוף מסתובב על שולחן ונמשך למרכז

מסה  $m_1$  מחוברת לחוט המחובר למרכז שולחן.

המסה נעה במסלול מעגלי ברדיוס קבוע  $r_1$


ובמהירות קבועה  $v_0$ .

ברגע מסוים מושכים את המסה למרכז המעגל (מקצרים את אורך החוט) ומפסיקים כאשר אורך החוט שווה  $r_2$  והמסה מסתובבת שוב בתנועה מעגלית קבועה.

רגע לאחר מכן מניחים מסה נוספת  $m_2$  במסלול של  $m_1$

והמסות מתנגשות התנגשות פלסטית.

מצאו את מהירות המסות לאחר ההתנגשות.



#### (3) שתי מחליקות על הקרח

שתי מחליקות תאומות בעלות מסה  $m$  זהה

מחליקות בכיוונים מנוגדים ובמהירות  $v_0$ .

המחליקות נעות על קווים ישרים והמרחק בין

הקווים הוא  $d$ . באמצע ביניהן שמים חבל.

כאשר הן מגיעות לחבל, שתיהן תופסות את


החבל ומתחילות להסתובב סביב המרכז ביניהן.

א. מה המהירות הזוויתית שהן מסתובבות?

ב. כעת המחליקות מושכות את החבל ומתקרבות זו לזו עד אשר המרחק

ביניהן הוא  $\frac{d}{2}$ .


מצא את המהירות הזוויתית החדשה של המחליקות.



**(4) כדור מסתובב אנכית**

כדור בעל מסה  $m$  מחובר לחוט בעל אורך  $l$  ומסתובב במעגל אנכי.

נתון כי מהירות הכדור בשיא הגובה היא  $v_0$ .



א. מצא את מומנט הכוח הפועל על הכדור כפונקציה של הזווית  $\alpha$ .

ב. מצא את התנע הזוויתי של הכדור כפונקציה של הזווית  $\alpha$ .

**(5) כדור בתוך חרוט**

כדור קטן נע בתוך חרוט המחובר הפוך למשטח.


נתון כי מהירות הכדור ההתחלתית היא  $v_0$

בכיוון אופקי ומשיק לדופן החרוט.

גובהו ההתחלתי  $H$ .

מצא את הגובה המקסימאלי אליו יגיע הכדור (החרוט אינו זז).

הנחיות: מספיק להגיע למשוואה ממעלה שלישית על  $h$  אין צורך לפתור אותה.

**(6) כדור מסתובב מחובר למסה תלויה**

מסה  $m$  נעה על שולחן חסר חיכוך ומחובר באמצעות חוט העובר דרך מרכז השולחן למסה  $M$  התלויה באוויר.

אורך החוט הוא  $L$ . נתון כי ב-  $t=0$  המסה  $M$


נמצאת במנוחה והמסה  $m$  נמצאת במרחק  $R$

ממרכז הלוח, במהירות התחלתית  $v_0$ ,

בכיוון מאונך לרדיוס.

רשום את משוואת שימור האנרגיה והתנע הזוויתי


ומצא משוואה דיפרנציאלית התלויה רק בגודל  $r$ , מרחק המסה  $m$  ממרכז השולחן.

**(7) מומנט הכוח לא תלוי בנקודת הייחוס**

הוכיחו כי אם הכוח השקול על קבוצת גופים מתאפס אז מומנט הכוח על קבוצת הגופים אינו תלוי בנקודת הייחוס.

**(8) תנע זוויתי לא תלוי בנקודת ייחוס**

הוכיחו כי אם התנע הקווי של קבוצת גופים מתאפס אז התנע הזוויתי שלהם לא תלוי בנקודת הייחוס.



### 9) זבוב הולך על מוט\*

שתי מסות נקודתיות  $m_1$  ו- $m_2$  מחוברות באמצעות מוט חסר מסה באורך  $d$ .  
 על המסה  $m_1$  נמצא זבוב בעל מסה  $m_3$ .  
 כל המערכת נמצאת על שולחן אופקי ומסתובבת סביב מרכז המסה שלה במהירות זוויתית קבועה  $\omega_0$ .  
 ברגע מסוים הזבוב מתחיל ללכת על המוט במהירות  $v$  ביחס למוט ונעצר כאשר הוא מגיע למרכז המסה של שלושת הגופים (שימו לב שהמוט לא מחובר לשולחן).  
 מהי המהירות הזוויתית של המערכת כאשר הזבוב נעצר?

### תשובות סופיות:

$$\text{א. } -\frac{1}{2}gt^2v_0m\cos\alpha\hat{z} \quad \text{ב. } -mgv_0\cos\alpha\hat{z} \quad \text{ג. שאלת הוכחה.} \quad (1)$$

$$u = \frac{m_1r_1v_0}{r_2(m_1+m_2)} \quad (2)$$

$$\omega' = \frac{2v_0}{d} \quad \text{א.} \quad \omega'' = \frac{8v_0}{d} \quad \text{ב.} \quad (3)$$

$$\sum \vec{\tau} = -mgl\sin\alpha \quad \text{א.} \quad \vec{L} = lmv(-\hat{z}) \quad \text{ב.} \quad (4)$$

$$(2gH + v_0^2)h_{\max}^2 + 2gh_{\max}^3 + v_0^2H^2 \quad (5)$$

$$a + br + \frac{c}{r^2} = \dot{r}^2 \quad (6)$$

$$\text{שאלת הוכחה.} \quad (7)$$


$$\text{שאלת הוכחה.} \quad (8)$$

$$\omega' = \frac{(m_1+m_3)(m_1+m_2)}{m_1(m_1+m_2+m_3)}\omega_0 \quad (9)$$

## תנע זוויתי ביחס למרכז מסה:

### שאלות:


#### (1) מסה מתנגשת במוט עם שתי מסות



שתי מסות נקודתיות  $m_1$  ו- $m_2$  מחוברות באמצעות מוט חסר מסה באורך  $2d$ . המערכת נמצאת במנוחה על שולחן אופקי חסר חיכוך (שתי המסות על השולחן, המוט אופקי). מסה שלישית  $m_3$  נעה במהירות  $v_0$  ומתנגשת התנגשות פלסטית במסה  $m_1$ . נסמן את רגע ההתנגשות ב- $t = 0$ .  
 $d = 3\text{m}$ ,  $v_0 = 6 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ ,  $m_1 = m_2 = m_3 = 0.2\text{kg}$

- חשבו את מיקום מרכז המסה ברגע  $t_1 = 0.5\text{sec}$  ביחס לראשית הנמצאת במרכז המוט בהתחלה ואינה נעה עם המוט.
- חשבו את התנע הזוויתי של המערכת ביחס לראשית הצירים ברגע  $t_1$ .
- חשבו את התנע הזוויתי של המערכת ביחס למרכז המסה שלה ברגע  $t_1$ .
- מצאו את המהירות הזוויתית של המוט ביחס למרכז המסה לאחר ההתנגשות.
- מהי המהירות הקווית של  $m_1$  ומהי המהירות הקווית של  $m_2$  מיד לאחר ההתנגשות?


#### (2) שתי מסות מחוברות מסתובבות ומתנגשות בשלישית



שתי מסות זהות  $m$  מחוברות במוט חסר מסה באורך  $d$  ומסתובבות סביב מרכז המסה שלהן במהירות זוויתית קבועה  $\omega$ . אחת המסות מתנגשת התנגשות פלסטית במסה זהה נוספת הנמצאת במנוחה. מצא את מהירות מרכז המסה של שלושת המסות המחוברות לאחר ההתנגשות ואת המהירות הזוויתית שלהן סביב מרכז המסה של שלושתן.

**(3) מסה נפרדת ממוט עם שתי מסות**

שלוש מסות  $m_1, m_2, m_3$  נתונות ומחוברות לקצה של מוט באורך  $l$ .



המסות  $m_2, m_3$  מחוברות בקצה התחתון

באיור והמסה  $m_1$  בקצה העליון.

המוט נמצא על שולחן חסר חיכוך (באיור המבט מלמעלה) ובמנוחה.

ברגע מסוים יש פיצוץ בין המסות  $m_2, m_3$

והמסה  $m_3$  מתנתקת מהמוט וממשיכה

במהירות  $v$  נתונה (ביחס לשולחן) ובמאונך למוט.

המסה  $m_2$  נשארת מחוברת למוט.

נתון כי:  $m_1, m_2 = M, m_3 = 3M$ .

א. מצא את מהירות מרכז המסה של המוט (עם המסות המחוברות).

ב. מצא את המהירות הזוויתית של המוט סביב מרכז המסה שלו.

**תשובות סופיות:**

$$(1) \quad \text{א. } \vec{r}_{cm}(t_1) = (1_m - 1_m) \quad \text{ב. } L = 3.6 \text{ kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{sec}} \quad \text{ג. } L_{c.m.} = 4.8 \text{ kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{sec}}$$

$$\text{ד. } \omega = 1 \frac{\text{rad}}{\text{sec}} \quad \text{ה. } V_1 = 4 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \hat{x}, V_2 = -2 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \hat{x}$$


$$(2) \quad u_{1,2,3,cm} = 0, \omega' = \frac{3}{4} \omega$$

$$(3) \quad \text{א. } v_{1,2,cm} = \frac{3}{2} v \quad \text{ב. } \omega = \frac{3v}{l}$$

## תרגילים בפרסציה:


### שאלות:

#### (1) נקודה על גלגל



נתון גלגל בעל רדיוס  $r$  המסתובב במהירות זוויתית  $\omega$  קבועה. לגלגל עובי  $a$  וראשית הצירים נמצאת במרכז העובי של הגלגל. אל הקצה העליון של הגלגל מחוברת מסה נקודתית  $m$  (ראה ציור) המסתובבת ביחד עם הגלגל. א. הראה כי התנע הזוויתי של המסה תלוי בזמן. ב. הראה כי שינוי התנע הזוויתי ניתן ע"י מומנט הכוח של הכוח הצנטריפטלי.

#### (2) מוט מסתובב בזווית עם הציר האנכי



מוט בעל אורך  $l$  ומסה  $M$  מונח בזווית  $\varphi$  ביחס לציר ה- $z$ . המוט מסתובב סביב ציר ה- $z$  במהירות זוויתית קבועה  $\omega$ . מצא את מומנט הכוח שפועל על המוט.

### תשובות סופיות:

(1) שאלת הוכחה.

$$\sum \vec{\tau} = -\frac{\omega^2 M l^2 \sin \varphi}{3} \hat{\theta} \quad (2)$$

# פיזיקה 1 מכניקה


פרק 14 - גוף קשיח

תוכן העניינים

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| 1. הגדרות, ציר סיבוב ותנע קווי               | (ללא ספר) |
| 2. תנע זוויתי של גוף קשיח                    | 183       |
| 3. אנרגיה סיבובית של גוף קשיח                | 185       |
| 4. ניתוח לפי כוחות ומומנטים וגלגול ללא החלקה | 187       |
| 5. גלגול עם החלקה                            | 189       |
| 6. תרגילים מסכמים                            | 190       |
| 7. תרגילים מסכמים כולל פרסציה                | 197       |

## תנע זוויתי של גוף קשיח:


### שאלות:



#### (1) כדור מתנגש בדיסקה

דסקה בעלת מסה  $M$  ורדיוס  $R$  מחוברת באמצעות ציר העובר במרכזה לשולחן אופקי חסר חיכוך. כדור פלסטלינה בעל מסה  $m$  נע במהירות  $v_0$  לעבר הדסקה.


הכדור פוגע בדסקה משמאלה, ובמרחק  $d$  ממרכזה. הכדור נדבק לדסקה ושניהם מתחילים להסתובב יחדיו (סביב הציר במרכז הדסקה). הדסקה נמצאת במנוחה לפני הפגיעה וכוח הכובד אינו משפיע על הגופים (המערכת אופקית). מצא את המהירות הזוויתית בה יסתובבו הגופים לאחר הפגיעה.



#### (2) אדם קופץ מדיסקה

נתונה דסקה בעלת רדיוס  $R$  המסתובבת סביב מרכזה במהירות זוויתית קבועה  $\omega$ . בקצה הדסקה עומד איש נקודתי ומסתובב ביחד עם הדסקה. ברגע מסוים האיש קופץ מהדסקה ונתון כי מהירותו מיד לאחר הקפיצה היא  $V_0$  בכיוון הראדיאלי, ביחס לקרקע.


מצא את המהירות הזוויתית של הדסקה לאחר הקפיצה אם נתונים מסת האיש  $m$  ומסת הדסקה  $M$ .



#### (3) דוגמה - תנע זוויתי של תנועה משולבת

נתון מוט בעל אורך  $L$  ומסה  $M$ . המרחק בין הקצה התחתון של המוט עד ראשית הצירים הוא  $d$ . המוט מסתובב בכיוון השעון מסביב לראשית. חשב את התנע הזוויתי.

#### (4) שלושה כדורים



שלושה כדורים זהים בעלי מסה  $m$  נמצאים בפינותיו של משולש שווה צלעות. הכדורים מחוברים באמצעות שלושה מוטות חסרי מסה ואורך  $L$  (צלעות המשולש).

- חשב את מיקום מרכז המסה של המערכת.
- כעת, נתון כי הגוף מסתובב במהירות זוויתית  $\omega$  נתונה, סביב מרכז המסה שלו. ברגע מסוים, כאשר הגוף נמצא במצב המתואר בצור, הכדור התחתון ניתק מהגוף.
- מצא את מהירות הכדור שניתק לאחר הניתוק.
- מצא את מהירות מרכז המסה של החלק הנותר.
- מצא את המהירות הזוויתית של החלק הנותר סביב מרכז המסה שלו.

### 5) מסמר נועץ דיסקה מסתובבת

דיסקה ברדיוס  $R$  ומסה  $m$  מונחת על שולחן אופקי במנוחה. מסובבים את הדיסקה במהירות זוויתית  $\omega$  סביב מרכז המסה של (סביב ציר  $z$ ). מסמר נופל מהשמים ופוגע בקצה של הדיסקה ונועץ אותה לשולחן. א. מהי המהירות הזוויתית של הדיסקה סביב המסמר לאחר הנעיצה? ב. ענו שוב על השאלה רק הפעם הניחו שבנוסף לסיבוב, מרכז המסה של הדיסקה נע במהירות  $v$  לפי הנעיצה.

### תשובות סופיות:

$$\omega = \frac{mv_0 d}{I} \quad (1)$$

$$\omega' = \frac{\left(\frac{1}{2}M + m\right)\omega_0}{\frac{1}{2}M} \quad (2)$$

$$\left(\frac{L}{2} + d\right)^2 M \omega + I_{c.m.} \omega_{c.m.} = L \quad (3)$$

$$v_{1,2,c.m.} = \frac{1}{2} \omega R \hat{x} \quad \text{ג.} \quad v_3 = -\omega R \hat{x} \quad \text{ב.} \quad y_{c.m.} = \frac{1}{2\sqrt{3}}, \quad x_{c.m.} = \frac{L}{2} \quad \text{א.} \quad (4)$$


$$I_{1,2,3} \omega = m|v_3|R + 2mv_{1,2}y_{c.m.} + 2m\left(\frac{1}{2}L\right)^2 \omega \quad \text{ד.}$$

$$\frac{1}{3} \left(\omega + 2\frac{v}{R}\right) \quad \text{ב.} \quad \frac{1}{3} \omega \quad \text{א.} \quad (5)$$

## אנרגיה סיבובית של גוף קשיח:


### שאלות:

#### (1) מוט מסתובב



מוט באורך  $L$  ומסה  $M$  מחובר לתקרה באמצעות ציר ויכול להסתובב. למוט מהירות זוויתית התחלתית  $\omega$ . מהי הזווית המקסימלית אליה יגיע המוט?


#### (2) דיסקה מחוברת למוט נופלת ממצב אנכי



גוף קשיח מורכב ממוט בעל אורך  $L$  ומסה  $M$  המחובר בקצה אחד לדיסקה מלאה בעלת מסה  $m$  המפולגת באופן אחיד ורדיוס  $R$ . בקצה השני, המוט מחובר לציר אופקי.

המוט חופשי להסתובב סביב הציר (כלומר הגוף יכול לעשות סיבוב אנכי סביב הציר). הגוף מתחיל מהמצב המתואר באיור (מצב אנכי לא יציב) ומקבל דחיפה קטנה לתוך הדף. מה תהיה המהירות הזוויתית של הגוף כאשר יגיע לנקודה הנמוכה ביותר?

#### (3) כדור פוגע במוט שתלוי מהתקרה (כולל תנז)




כדור בעל מסה  $m$  פוגע במוט שתלוי מהתקרה במרחק  $x$  מציר הסיבוב של המוט. המוט בעל אורך  $L$  ובעל מסה  $M$ . מהירותו ההתחלתית של הכדור היא  $\mu_0$  והוא מתנגש פלסטית עם המוט.

א. מהי המהירות הזוויתית של המערכת מיד לאחר ההתנגשות?

ב. מהי הזווית המקסימלית אליה יגיע המוט?

ג. מצא  $x$  כך שהכוח שמפעילה התקרה על המוט יתאפס.

#### (4) מסה מתנגשת בשתי מסות מחוברות במוט (כולל תנז)



שני גופים נקודתיים בעלי מסה  $M$  כל אחד מחוברים בשני קצותיו של מוט דק חסר מסה באורך  $l$ . המערכת נמצאת במנוחה על גבי משטח אופקי חלק לאורך ציר  $y$ .

כדור נוסף שמסתו  $m$  פוגע במוט במאונך למוט ובמרחק  $d$  ממרכז המוט. מהירות הכדור הנוסף היא  $v$  וההתנגשות עם המוט היא אלסטית.

מה צריכה להיות מהירותו של הכדור הנוסף, כך שישאר במנוחה לאחר ההתנגשות.

## תשובות סופיות:

$$\cos \theta = 1 - \frac{L\omega_0^2}{3g} \quad (1)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{2MgL + 2mg(L+R)}{\frac{ML}{3} + \frac{1}{4}mR^2 + m(L+R)^2}} \quad (2)$$

$$\omega = \frac{mv_0 x}{mx^2 + \frac{ML^2}{3}} \quad \text{א.} \quad (3)$$

$$\text{ב.} \quad \cos \theta = 1 - \frac{I\omega^2}{(M+m)gx_{c.m.}} \quad \text{כאשר:} \quad I = \frac{ML^2}{3} + mx^2, \quad x_{c.m.} = \frac{M\frac{L}{2} + mx}{M+m}$$


ו- $\omega$  מצאנו בסעיף א'.

$$\mu u_0 = M\frac{L}{r} + mx \quad \text{ג.} \quad (4)$$

$$m = \frac{2M}{1 + \frac{4d^2}{l^2}} \quad (5)$$


## ניתוח לפי כוחות ומומנטים וגלגול ללא החלקה:

### שאלות:




#### (1) דוגמה - כדור על מדרון משופע

- כדור בעל רדיוס  $R$  מונח בגובה  $H$  על מדרון משופע בעל זווית  $\alpha$ . הכדור מתחיל להתגלגל ללא החלקה.
- א. מצאו את מהירות הכדור בתחתית המדרון.
- ב. מצאו את תאוצת הכדור.



#### (2) גלובוס

- גלובוס (כדור) מונח ומקובע לשולחן ויכול להסתובב סביב ציר המאונך לשולחן.
- מלפפים חוט סביב מרכז הגלובוס (סביב קו המשווה) והחוט ממשיך מהגלובוס דרך גלגלת לא אידיאלית למסה תלויה  $m_1$ .
- נתונים גם:  $m_2$  ו- $R_2$  מסה ורדיוס הגלגלת,  $m_3$  ו- $R_3$  מסה ורדיוס הגלובוס.
- המערכת מתחילה ממנוחה.
- מצא את תאוצת כל הגופים, קווית וזוויתית ואת המתרחות בחוט.



#### (3) יויו במישור מחובר למסה

- יויו (כדור שמלופף סביבו חוט) בעל מסה  $m_2$  ורדיוס  $R$  מונח על מישור משופע בעל זווית  $\theta$ .
- החוט של היויו מחובר דרך גלגלת אידיאלית למסה  $m_1$ .
- נתון כי היויו מתגלגל ללא החלקה על המישור וכי קיים חיכוך בין היויו למישור.
- א. מצא לאן תנוע המערכת וכיוון החיכוך הסטטי.
- ב. מצא את תאוצות הגופים וגודל כוח החיכוך.

**(4) מוט אופקי נופל**

מוט בעל מסה  $M$  (צפיפות אחידה) ואורך  $L$  תלוי בקצהו לקיר וחופשי להסתובב סביב נקודת התלייה.

משחררים את המוט ממצב אופקי.



א. מצא את התאוצה הזוויתית ואת תאוצת מרכז

המסה של המוט ברגע השחרור.

כעת המוט נופל עד להגיעו למצב מאונך לקרקע.


ב. מצא את הכוח שמפעיל הציר שמחבר את המוט

לקיר על המוט, ברגע השחרור.

ג. מצא את המהירות הזוויתית של המוט ברגע זה

(כשהוא מאונך לקרקע).

ד. חזור על סעיפים א' ו-ב' עבור רגע זה.

**(5) משטח מלמעלה ומשטח מלמטה**

כדור בעל רדיוס  $R$  לחוץ בין שני משטחים נעים.

המשטח מתחת לכדור נע במהירות  $v_1$  והמשטח

מעליו נע במהירות  $v_2$ .

א. מהי מהירות מרכז המסה של הכדור אם

ידוע שהוא מתגלגל ללא החלקה ביחס לשני המשטחים?

ב. חזור על סעיף א' אם המשטח העליון נע בכיוון ההפוך.

**תשובות סופיות:**

$$(1) \quad \text{א. } mgH = \frac{1}{2}mv_{c.m.}^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}mR^2\right)\left(\frac{v_{c.m.}}{R}\right)^2 \quad \text{ב. } a = \frac{5}{7}g \sin \theta$$

(2) ראה סרטון.

(3) ראה סרטון.

$$(4) \quad \text{א. } a_{c.m.} = \frac{3}{4}g = a_y, a_x = a_r = 0, \alpha = \frac{3}{2}\frac{g}{L} \quad \text{ב. } \sum F_y = ma_{y_{c.m.}}, \sum F_x = ma_{x_{c.m.}}$$


$$\text{ג. } mg \frac{L}{2} = \frac{1}{2}I\omega^2$$

$$\text{ד. } \sum F_y = ma_{y_{c.m.}}, \sum F_x = ma_{x_{c.m.}}, a_\theta = 0 = a_{x_{c.m.}}, a_y = a_r = -\omega^2 \frac{L}{2}, \alpha = 0$$

$$(5) \quad \text{א. } v_{c.m.} = \frac{v_1 + v_2}{2} \quad \text{ב. } v_{c.m.} = \frac{v_1 - v_2}{2}$$

## גלגול עם החלקה:


### שאלות:



#### (1) כדור מחליק ללא סיבוב

כדור הומוגני בעל מסה  $M$  מתחיל תנועתו עם מהירות  $V_0$  ללא סיבוב (מהירות זוויתית).

מצא את מהירותו הסופית אם נתון מקדם החיכוך הקינטי.



#### (2) כדור מסתובב מונח על רצפה

כדור הומוגני בעל מסה  $M$  מוחזק באוויר ומסתובב סביב מרכז המסה שלו במהירות זוויתית  $\omega_0$ .

הכדור מונח על הרצפה בעודו מסתובב.

מצא את מהירותו הסופית אם נתון מקדם החיכוך הקינטי  $\mu_k$ .


### תשובות סופיות:

$$V_{\text{final}} = \frac{5}{7} V_0 \quad (1)$$

$$V_{\text{final}} = \frac{2}{7} \omega_0 R \quad (2)$$

## תרגילים מסכמים:

### שאלות:




#### (1) חישוק מתגלגל מחבל

חבל מלופף סביב חישוק בעל רדיוס  $R$  ומסה  $m$ .  
(החבל מחובר לתקרה).

א. מהי תאוצת מרכז המסה של החישוק?

ב. לאחר כמה זמן ירד החישוק גובה של  $h$  אם התחיל תנועתו ממנוחה?




#### (2) מסות וגלגלת

שתי מסות שונות  $m_1, m_2$  תלויות משני הצדדים של גלגלת לא אידיאלית המקובעת במרכזה.  
המסות משוחררות ממנוחה.

מצא את תאוצת המסות אם נתון:


$M$  מסת הגלגלת,  $R$  רדיוס הגלגלת וכי החוט אינו מחליק על הגלגלת.



#### (3) שתי דיסקות שונות במדרון

בגן המדע שבמכון ויצמן יש שתי דיסקות קלות אליהן מודבקות 4 מסות כבדות כמתואר בשרטוט. את הדיסקות מניחים על שני מדרונים ובודקים מי תנוע בהגיעה למישור מהר יותר.

הסבר כיצד ניתן לחשב מהירות זו על פי נתוני המערכת.



#### (4) שני חישוקים מתגלגלים מחבל

חישוק בעל מסה  $m$  ורדיוס  $R$  תלוי מחבל המלופף סביבו.


א. מה תהיה מהירותו לאחר שנפל מגובה  $h$ ?

מה תהיה תאוצתו? כמה זמן תארך הנפילה?

חישוק אחר חסר מסה בעל רדיוס  $R$  מכיל מסה נקודתית במרכזו בעלת מסה  $m$ .

ב. מה תהיה מהירותו לאחר שנפל מגובה  $h$ ?


ג. מה תהיה מהירותו אם החבל יהיה ללא חיכוך?

**(5) מצמד**

בכלי עבודה רבים קיים מנגנון הקרוי מצמד (קלאץ'). תפקיד המצמד הוא להעביר את הכוח המניע אל החלק המונע בצורה הדרגתית (למשל להעביר את כוח המנוע ברכב אל הגלגלים מבלי לגרום לתנועה פתאומית בגלגלים). המצמד מופעל ע"י הצמדת דסקה מסתובבת אל דסקה נייחת והעברת אנרגיה מזו לזו בעזרת כוח החיכוך. לפניך מצמד הבנוי משתי דסקות בעלות מומנט התמד שונה. הדסקה התחתונה מסתובבת במהירות התחלתית נתונה. בשלב מסוים הדסקה העליונה מונחת על הדסקה התחתונה ובעזרת כוח המשיכה וכוח החיכוך מתחילה לנוע בעצמה עד ששתי הדיסקות ינועו ביחד.

א. מצא את המהירות הסופית של הדיסקות.


ב. כמה אנרגיה אבדה בתהליך זה?

**(6) מכה בכדור ללא החלקה**

כדור סנוקר ברדיוס  $R$  נמצא במנוח על שולחן ללא חיכוך (חיכוך נמוך מאוד). מצא באיזה גובה מעל תחתית הכדור יש לתת מכה אופקית עם המקל כך שהכדור יתגלגל ללא החלקה.

$$I_{c.m} = \frac{2}{5} mR^2 \quad \text{מומנט ההתמד של הכדור הוא :}$$

הדרכה : ערוך תרשים כוחות ונתח את הבעיה בשלב המכה עצמה.


**(7) חוט מושך דיסקה ללא החלקה - תרגיל פשוט**

חוט מלופף מסביב לגליל המונח על מישור שאינו חלק. רדיוס הגליל הוא  $R$  ומסתו  $M$ . כוח  $F$  נתון מושך את הגליל. מצא את תאוצת הגליל במקרים הבאים אם ידוע שהגליל מתגלגל ללא החלקה :

א. הכוח פועל בכיוון אופקי.

ב. הכוח פועל בזווית  $\theta$  ביחס לאופק וידוע שהגליל אינו מתרומם.

ג. מה כיוון החיכוך בכל מקרה?




### (8) מחליקה על קרח סוגרת ידיים

- מחליקה על הקרח מסתובבת במהירות  $w_0$ . המחליקה בעלת מסה זניחה אך היא מחזיקה מסה  $m$  בכל יד. הידיים פרוסות לצדדים ואורך כל יד  $l$ . לפתע המחליקה סוגרת את ידיה לחצי מאורכן המקורי. א. מה תהיה מהירות הסיבוב החדשה? ב. כמה אנרגיה הושקעה בתהליך?



### (9) גלגול עם החלקה

- אל עבר דסקה בעלת מסה  $M$  ורדיוס  $R$  נורה קליע בעל מסה  $m$  במהירות  $v$ . הדסקה מונחת על מישור בעל מקדם חיכוך נתון. מצא כמה זמן תימשך ההחלקה.




### (10) מוט משוחרר בזווית פוגע במסה

- מוט המחובר לציר משוחרר ממנוחה מזווית נתונה. כשהמוט מגיע לנקודה הנמוכה ביותר הוא פוגע במסה ודוחף אותה במהירות לא ידועה לעבר מסילה מעגלית. נתון כי הקצה התחתון של המוט נע מיד לאחר ההתנגשות במהירות משיקית  $u$ . א. מהי הזווית המקסימלית אליה יגיע המוט לאחר הפגיעה? ב. מהי מהירות המסה מיד לאחר הפגיעה? ג. מהו הכוח אותו מפעילה המסילה על המסה מיד לאחר ההתנגשות?

### (11) צמד לוליינים בטרפז




- בקרס ישנו מכשיר הקרוי טרפז. על הטרפז נתלה לולייני המחזיק בידיו לולייני אחר. נתון כי צמד הלוליינים התחילו את תנועתם ממנוחה במצב מאוזן וניתקו ידיהם במצב מאונך. הניחו כי אורך כל לולייני  $l$  ומסתו  $m$ . לאחר הניתוק הלולייני המנותק סוגר את גופו לחצי מאורכו. א. מהי המהירות הזוויתית ברגע הניתוק? ב. מהי המהירות הזוויתית של הלולייני המנותק מיד לאחר הניתוק ולפני שסגר את גופו? ג. מהי המהירות הזוויתית לאחר שסגר את גופו?

**(12) מוט מתגלש - מציאת מהירות**

מוט בעל מסה  $m$  ואורך  $l$  מונח על רצפה וקיר חלקים בזווית נתונה  $\theta_0$ . מיד לאחר שהניחו את המוט, המוט מתחיל להחליק עד הפגיעה ברצפה. אין חיכוך בין המוט לקיר או לרצפה. מצאו את מהירות מרכז המסה של המוט בזמן פגיעתו ברצפה.

**(13) יויו מתגלגל (חוט מלמעלה)**

יויו מורכב מגליל ברדיוס  $r$  ומסה  $m$ . משתי צידי הגליל מחוברות דסקות ברדיוס  $R > r$  ומסה  $M$  כל אחת. סביב הגליל ובמרכזו מלופף חוט. היויו מונח על משטח לא חלק ומושכים את החוט בכוח  $F$  קבוע בכיוון ציר ה- $x$ .




- נתון כי היויו מתחיל את תנועתו ממנוחה וכי הוא מתגלגל ללא החלקה (היויו זז בציר ה- $x$ ).  
 כמו כן כל אות בגוף השאלה נתונה.  
 א. מהו מומנט ההתמד של היויו?  
 ב. מהי תאוצת מרכז המסה של היויו?  
 ג. מהו מיקום היויו כפונקציה של הזמן?  
 ד. הנקודה B נמצאת על קצה הגלגל ובדיוק מעל מרכזו ב- $t = 0$ . מצא את מיקום הנקודה כתלות בזמן.

**(14) עיפרון נופל\***

עיפרון באורך  $L$  ניצב אנכית על משטח. ברגע מסוים הוא מתחיל ליפול ימינה. כאשר הזווית בינו לבין האנך למשטח מגיעה ל- $\theta_1$  העיפרון מתחיל להחליק.




- א. עבור זוויות  $\theta$  שבהן עדיין אין החלקה  $\theta < \theta_1$ .  
 i. מצאו את המהירות הזוויתית של העיפרון  $\omega$ .  
 ii. מצאו את התאוצה הזוויתית של העיפרון  $\alpha$ .  
 iii. מצאו את התאוצה הקווית של מרכז המסה של העיפרון.  
 iv. מצאו את גודלו וכיוונו של כוח החיכוך.  
 v. מצאו את הכוח הנורמלי.  
 ב. מצאו את מקדם החיכוך הסטטי  $\mu_s$ .

**15) גליל בתוך גליל\***

גליל מלא ברדיוס  $R$  ומסה  $M$  המפולגת אחידה מתגלגל ללא החלקה בתוך גליל גדול ודק שרדיוסו  $4R$ . הגליל הגדול מקובע במקומו.

א. נתון שמהירות מרכז המסה של הגליל הקטן כאשר הוא בגובה מרכז הגליל הגדול ובדרכו מטה היא  $v_0$ . מהו גודלו וכיוונו של כוח החיכוך הפועל על הגליל בנקודה זו? ומהו התנאי על  $v_0$  כך שיתאפשר גלגול ללא החלקה אם מקדם החיכוך  $\mu_s$  נתון?

ב. מהי מהירות מרכז המסה של הגליל הקטן כאשר הוא בתחתית הגליל הגדול?  
ג. כאשר הגליל הקטן נמצא בתחתית הגדול, פוגע בו קליע נקודתי, גם הוא בעל מסה  $M$  הנע ישר כלפי מטה. הקליע נדבק לשפת הגליל בדיוק מעל מרכזו ונע עמו (זמן ההתנגשות קצר מאוד וניתן להזניח את השפעת החיכוך עם הגליל הגדול בהתנגשות).  
שים לב שלאחר הפגיעה הגלגול כבר לא חייב להיות ללא החלקה. מצא את מהירות מרכז הגליל (לא מרכז המסה) לאחר הפגיעה.


**16) תיבה מתנגשת באבן\***

תיבה דו מימדית בגודל  $a \times b$  ומסה  $M$  נעה על משטח אופקי חלק במהירות  $v_0$ . ברגע מסוים התיבה מתנגשת אלסטית באבן עם מסה  $m$  הנמצאת במנוחה על המשטח. כתוצאה מההתנגשות התיבה ממשיכה בתנועה ימינה אך גם מתחילה להסתובב.

ניתן להניח שהפינה הימנית תחתונה של התיבה כל הזמן נוגעת בקרקע.

א. מה התנאי על  $v_0$  כך שהתיבה לא תתהפך?

ב. מה קורה לתנאי של סעיף א' אם  $a \ll b$ ?

**17) שני גלילים מחוברים בחוט על מדרון משופע\***

שני גלילים בעלי מסה  $m = 3\text{ kg}$  ורדיוס  $R = 20\text{ cm}$  כל אחד, מחוברים בחוט אידיאלי ומתגלגלים יחד ללא החלקה במורד מדרון. זווית המדרון היא  $30^\circ$ . התפלגות המסה של הגלילים אינה אחידה ומומנטי

ההתמד שלהם סביב מרכז המסה נתונים:  $I_1 = 50\text{ kg} \cdot \text{cm}^2$ ,  $I_2 = 90\text{ kg} \cdot \text{cm}^2$ .

מהי המתיחות בחוט המחובר בין הגלילים?

## תשובות סופיות:

$$(1) \quad a = \frac{g}{2} \quad \text{א.} \quad t = \sqrt{\frac{4h}{g}} \quad \text{ב.}$$

$$(2) \quad a = \frac{(m_1 - m_2)g}{\frac{1}{2}M + m_1 + m_2}$$

(3) ראה סרטון.

$$(4) \quad \text{א.} \quad t = \frac{1}{2} \left( \frac{g}{2} \right) t^2, \quad a = \frac{g}{2}, \quad mgh = mv^2, \quad \text{ב.} \quad mgh = \frac{1}{2}mv'^2 \quad \text{ג.} \quad \text{נפילה חופשית.}$$

$$(5) \quad \omega_1 = \omega_0 \frac{I_1}{I_1 + I_2} \quad \text{א.} \quad \Delta E = \frac{1}{2}I_1\omega_0^2 - \frac{1}{2}(I_1 + I_2)\omega_1^2 \quad \text{ב.}$$

$$(6) \quad h = \frac{2}{5}R$$

$$(7) \quad a = \frac{4}{3} \frac{F}{m} \quad \text{א.} \quad a = \frac{4}{3} \frac{F}{m} \quad \text{ב.} \quad F \frac{1}{3}(1 + \cos \varphi), \quad \frac{1}{3}F \quad \text{ג.}$$

$$(8) \quad \omega_1 = \omega_0 \cdot 4 \quad \text{א.} \quad \Delta E = \frac{1}{2}I_1\omega_1^2 - \frac{1}{2}I_0\omega_0^2 \quad \text{ב.}$$

(9) ראה סרטון.

(10) ראה סרטון.

$$(11) \quad \sqrt{\frac{g}{6l}} \quad \text{א.} \quad \sqrt{\frac{8g}{3l}} \quad \text{ב.} \quad \text{אין שינוי.} \quad \text{ג.}$$

$$(12) \quad \sqrt{\frac{3}{4}gl \sin \theta_0}$$

$$\text{ב.} \quad F + \frac{Fr - I \frac{a}{R}}{R} = (m + 2M)(a)$$

$$(13) \quad \text{א.} \quad I = 2 \frac{1}{2}MR^2 + \frac{1}{2}mr^2$$

$$\text{ג.} \quad x_{(t)} = \frac{1}{2}at^2 \quad \text{ד.} \quad B_x = \frac{1}{2}at^2 + R \sin \left( \frac{1}{2}at^2 \right), \quad B_y = R \cos \left( \frac{1}{2}at^2 \right)$$

$$(14) \quad \text{א.} \quad \omega = \sqrt{3 \frac{g}{L}(1 - \cos \theta)} \quad \text{i.} \quad \alpha = \frac{3g}{2L} \sin \theta \quad \text{ii.} \quad \vec{a} = -\omega^2 r \hat{r} + \alpha r \hat{\theta} \quad \text{iii.}$$

$$\text{iv.} \quad \sum F_x = m(-a_r \sin \theta + a_\theta \cos \theta) \quad \text{v.} \quad \sum F_y = m(-a_r \cos \theta - a_\theta \sin \theta)$$

$$\text{ב.} \quad f_{s \max}(\theta_1) = \mu_s N(\theta_1)$$

$$(15) \quad \text{א.} \quad f_s = \frac{mg}{3}, \quad v_0 \geq \sqrt{\frac{Rg}{\mu_s}} \quad \text{ב.} \quad v_1 = \sqrt{v_0^2 + 4gR} \quad \text{ג.} \quad v_0 = \frac{1}{2}v_1$$

$$v_0 = \frac{1}{b} \sqrt{\frac{g}{3} (\sqrt{a^2 + b^2} - b)} \cdot \left( \frac{2(a^2 + b^2)}{\sqrt{(2a)^2 + b^2}} + \frac{M\sqrt{4a^2 + b^2}}{2m} \right) \quad \text{א. (16)}$$


$$v_0 = \sqrt{\frac{g}{6b}} \cdot a \cdot \left( 2 + \frac{M}{2m} \right) \quad \text{ב.}$$

$$T \approx 0.22N \quad \text{(17)}$$

## תרגילים מסכמים כולל פרסציה:


### שאלות:

#### (1) מטבע בזווית



נתונה דסקה המתגלגלת ללא החלקה במעגל ברדיוס  $R$  במהירות זוויתית  $\omega$ . נתון גם רדיוס הדסקה. מצא את זווית ההטיה של הדסקה.

#### (2) גלגל קשור בחוט עם זווית



גלגל ברדיוס  $R$  ומסה  $m$  מחובר במרכזו לציר חסר מסה באורך  $D$ . הציר מחובר בקצהו השני לחוט באורך  $d$  הקשור לתקרה ויוצר זווית  $\beta$  עם האנך לתקרה. מסובבים את הגלגל סביב הציר הרדיאלי העובר במרכזו במהירות זוויתית קבועה:  $\vec{\omega} = -\omega_0 \hat{r}$ .

א. לאן ינוע מרכז המסה של הגלגל ברגע הראשון?

ב. מצא את גודלה של הזווית  $\beta$ .

הנח שהזווית קטנה וניתן להשתמש בקירוב של זוויות

קטנות:  $\sin \beta \approx \beta$ ,  $\cos \beta \approx 1$ .

התייחס לגלגל כחישוק.

### תשובות סופיות:

$$\tan(\varphi) = \frac{2gR}{3v^2} \quad (1)$$

$$\beta = \frac{gD^3}{\omega_0^2 R^4 - dgD^2} \quad (2) \quad \text{א. מרכז המסה ייצא מהדף.} \quad \text{ב.}$$

# פיזיקה 1 מכניקה


## פרק 15 - תנועה הרמונית

### תוכן העניינים

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 198       | 1. תנועה הרמונית פשוטה            |
| 201       | 2. תנועה הרמונית מרוסנת           |
| 203       | 3. תנועה הרמונית מאולצת           |
| 205       | 4. תרגילים מסכמים                 |
| 208       | 5. תרגילים מסכמים (מטוטלות שונות) |
| 211       | 6. תרגילים למתקדמים               |
| 214       | 7. תרגילים לבקשת סטודנטים         |
| (ללא ספר) | 8. מסות מצומדות                   |


## תנועה הרמונית פשוטה:

### שאלות:



#### (1) מסה מתנגשת במסה


מסה  $m$  מונחת על שולחן ללא חיכוך ומחוברת לקפיץ המחובר לקיר בעל קבוע קפיץ  $k$ . מותחים את המסה מרחק  $d$  מהמיקום בו הקפיץ רפוי ומשחררים ממנוחה. מצא את  $x(t)$  של המסה.



#### (2) מסה על שולחן מחוברת למסה תלויה


מסה  $m_1$  מונחת על שולחן ללא חיכוך ומחוברת לקפיץ בעל קבוע  $k$ . מהמסה יוצא חוט העובר דרך גלגלת אידיאלית וקשור למסה נוספת התלויה באוויר  $M$ .

- מצא את נקודת שיווי המשקל של המערכת (קבע את הראשית בנקודה שבה הקפיץ רפוי).
- מצא את תדירות התנודה של המערכת.
- מהי האמפליטודה המקסימלית האפשרית לתנועה כך שהמתיחות בחוט לא תתאפס במהלך התנועה?




#### (3) דוגמה - מטוטלת מתמטית (עם מומנטים)

נתונה מטוטלת (מתמטית) התלויה מהתקרה. אורך החוט של המטוטלת הוא  $l$ . מצא את תדירות התנודות הקטנות ואת הזווית כפונקציה של הזמן. הנח כי המטוטלת מתחילה את תנועתה ממנוחה בזווית ידועה  $\theta$  (דרך מומנטים).



#### (4) דוגמה - דיסקה עם חור


מצא את תדירות התנודות הקטנות של דיסקה בעלת מסה  $M$  ורדיוס  $R$  אם ידוע כי במרחק  $R$  ממרכז הדיסקה קדחו חור ברדיוס רבע  $R$  (הדיסקה מחוברת במסמר במרכזה אל הקיר).




- (5) **דוגמה - מטוטלת מתמטית (עם אנרגיה)**  
 נתונה מטוטלת (מתמטית) התלויה מהתקרה.  
 אורך החוט של המטוטלת הוא  $l$ .  
 מצא את תדירות התנודות הקטנות ואת הזווית כפונקציה של הזמן.  
 הנח כי המטוטלת מתחילה את תנועתה ממנוחה בזווית ידועה  $\theta$  (דרך אנרגיה).



- (6) **גליל מחובר לקפיץ מתגלגל ללא החלקה**  
 גליל בעל מסה  $m$  ורדיוס  $R$  נמצא על משטח אופקי לא חלק ומחובר באמצעות קפיץ אל הקיר. קבוע הקפיץ הוא  $k$  והוא מחובר למרכז הגליל. הנח שתנועת הגליל אופקית בלבד ושהוא מתגלגל ללא החלקה על המשטח.  
 מצא את תדירות התנודות הקטנות.  
 פתור פעם אחת באמצעות אנרגיה ופעם נוספת באמצעות כוחות ומומנטים.



- (7) **גלגלת מסה וקפיץ**  
 במערכת הבאה, המסה  $m_1$  קשורה בחוט דרך גלגלת אל קפיץ המחובר לקרקע. הגלגלת אינה אידאלית. נתון:  $R$  רדיוס הגלגלת,  $m_2$  מסת הגלגלת,  $k$  קבוע הקפיץ. הנח כי החוט לא מחליק על הגלגלת.  
 א. מצא את נקודת שיווי המשקל.  
 ב. מצא את תדירות התנודה.  
 ג. מושכים את המסה אורך  $d$  מנקודת שיווי המשקל. מהו  $d_{\max}$  המרחק המקסימלי שניתן למשוך את המסה מבלי שהמתיחות בחוט תתאפס במהלך התנועה?



- (8) **מוט תלוי מחובר עם קפיץ לקיר**  
 מוט בעל אורך  $L$  ומסה  $M$  (התפלגות אחידה) תלוי מהתקרה וחופשי להסתובב סביב נקודת התלייה. קצהו השני של המוט מחובר בקפיץ, בעל קבוע  $k$  לקיר. הקפיץ רפוי כאשר המוט נמצא מאונך לתקרה.  
 א. הראה כי תנועת המוט בזוויות קטנות היא תנועה הרמונית ומצא את תדירות התנועה.  
 ב. מצא את הזווית של המוט כפונקציה של הזמן אם המוט משוחרר ממנוחה בזווית נתונה  $\theta_0$ .

## תשובות סופיות:

$$x(t) = -\frac{v_0}{2} \sqrt{\frac{2m}{k}} \cos\left(\sqrt{\frac{k}{2m}}t + \frac{\pi}{2}\right) + x_0 \quad (1)$$

$$A_{\max} = \frac{g}{\omega^2} \quad \text{ג.} \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m_1 + m_2}} \quad \text{ב.} \quad x = \frac{m_2 g}{k} \quad \text{א.} \quad (2)$$

$$\theta(t=0) = -\omega A \sin \varphi \quad (3)$$

$$-\left(\frac{16}{247} \frac{g}{R}\right)(\theta - 0) = \ddot{\theta} \quad (4)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}, \quad \theta(t) = A \cos(\omega t + \varphi) \quad (5)$$

$$E = \frac{3}{4} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k x^2 \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{2k}{3m}} \quad \text{באמצעות אנרגיה:} \quad (6)$$

$$\sum F_x = -k(x - x_3) = m\ddot{x} \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{2k}{3m}} \quad \text{באמצעות כוחות ומומנטים:}$$


$$d_{\max} = \frac{m_1 g}{k} \quad \text{ג.} \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m_1 + \frac{1}{2}m_2}} \quad \text{ב.} \quad x_0 = \frac{m_1 g}{k} \quad \text{א.} \quad (7)$$

$$\theta(t) = \theta_0 \cos\left(\sqrt{\frac{k^+}{m^+}}t\right) \quad \text{ב.} \quad \omega = \sqrt{\frac{k^+}{m^+}} \quad \text{א.} \quad (8)$$

## תנועה הרמונית מרוסנת:

### שאלות:

#### (1) כדור במיכל מים




כדור בעל מסה  $m$  ורדיוס  $R$  נמצא בתוך מיכל מים ומחובר באמצעות קפיץ אופקי לדופן המיכל. קבוע הקפיץ הוא  $k$ . בתנועת הגוף במים, מפעילים המים על הכדור כוח התנגדות המתכונתי והפוך למהירותו. כוח זה נקרא כוח סטוקס וגודלו

הוא:  $\vec{F} = -6\pi R\eta\vec{v}$ . כאשר  $\eta$  היא צמיגות המים ו- $R$  הוא רדיוס הכדור.

התייחס ל- $k$ ,  $\eta$ ,  $m$ ,  $R$  כנתונים ומצא את תדירות התנודות של הכדור

בהנחה ש- $R < \frac{\sqrt{mk}}{3\pi\eta}$ . הזנח את החיכוך בין הכדור לתחתית המיכל.

#### (2) שני קפיצים בנוזל



כדור נמצא בתוך תיבה מלאה במים ומחובר עם קפיץ אידיאלי לקצה העליון של התיבה ועם קפיץ אידיאלי נוסף זהה לקצה התחתון של התיבה.

נתון:  $R$  - רדיוס הכדור,  $\rho_b$  - צפיפות המסה של הכדור,

$\rho_l$  - צפיפות המסה של המים,  $K$  - קבוע שני הקפיצים ו- $\eta$  - צמיגות המים.

(תזכורת: כאשר כדור נמצא בתוך נוזל פועלים עליו

כוח ציפה:  $F = \rho_l V g$  וכוח סטוקס:  $F = -6\pi\eta R v$ ).

א. מצא את נקודת שיווי המשקל של המערכת.

ב. מה התנאי שיהיו תנודות הרמוניות?

מצא את התדירות בהנחה שתנודות אלו מתקיימות.

ג. מצא את התנאי בו יחזור הכדור הכי מהר לנקודת שיווי המשקל.

#### (3) איבוד אנרגיה במחזור

בתנועה הרמונית מרוסנת קיים ריסון חלש כך שהאמפליטודה של התנועה יורדת ב-2.5 אחוז כל מחזור.

בכמה אחוז יורדת האנרגיה בכל מחזור?

**(4) משקולת במיכל מים תלויה מהתקרה**

משקולת שמסתה:  $M = 1\text{kg}$  נמצאת במיכל מים ומחוברת לתקרה באמצעות קפיץ בעל קבוע:  $k = 20 \frac{\text{N}}{\text{m}}$ . כוח ההתנגדות שמפעילים המים הוא מהצורה של:  $\vec{F} = -\lambda \vec{v}$  כאשר:  $\lambda = 4 \frac{\text{kg}}{\text{sec}}$  ו-  $\vec{v}$  היא מהירות המסה. הניחו שהמשקולת אינה יוצאת מהמים ואינה פוגעת ברצפה.

א. תוך כמה זמן תרד האמפליטודה לחמישית מגודלה ההתחלתי? (הניחו שהפאזה היא אפס)

ב. לאחר כמה מחזורים זה יקרה?

**(5) מסה באמבט מים ודבש**

מסה:  $m = 1\text{kg}$  נמצאת באמבט מלא מים, המסה מחוברת באמצעות שני קפיצים זהים בעלי קבוע:  $k = 25 \frac{\text{N}}{\text{m}}$  לשתי דפנות האמבט ונעה ללא חיכוך עם ריצפת האמבט. מזיזים את המסה  $0.5\text{m}$  מנקודת שיווי המשקל ומשחררים ממנוחה. התנגדות המים מפעילה כוח גרר:  $\vec{F} = -\lambda \vec{v}$  כאשר:  $\lambda = 10 \frac{\text{kg}}{\text{sec}}$ .

א. מהו העתק המסה כתלות בזמן?

ב. מחליפים את המים בדבש מה שמגדיל את  $\lambda$  פי  $\sqrt{2}$ . מזיזים שוב את המסה  $0.5\text{m}$  ומשחררים, מהו העתק המסה כתלות בזמן?

**תשובות סופיות:**

$$\tilde{\omega} = \sqrt{\frac{k}{m} - \left(\frac{3\pi R \eta}{m}\right)^2} \quad (1)$$

$$y_{eq} = \frac{F_b}{2K} \quad \text{א.} \quad \omega^* = \sqrt{\frac{2K}{m} - \left(\frac{6\pi\eta R}{2m}\right)^2} \quad \text{ב.} \quad \frac{2K}{m} = \frac{6\pi\eta R^2}{2m} \quad \text{ג.} \quad (2)$$

$$5\% \quad (3)$$


$$1.6\text{sec} \quad \text{א.} \quad \text{ב. בערך מחזור אחד.} \quad (4)$$

$$x(t) = \frac{1}{2} + \frac{5}{\sqrt{2}} t e^{-5\sqrt{2}t} \quad \text{ב.} \quad x(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-5t} \cos\left(5t + \frac{\pi}{4}\right) \quad \text{א.} \quad (5)$$

## תנועה הרמונית מאולצת:

### שאלות:

#### (1) מסה בין קירות זזים



מסה  $m$  מחוברת לשני קפיצים זהים בעלי קבוע  $k$  ואורך רפוי  $L$  משני צידיה. הקפיצים מחוברים לקירות הנמצאים במרחק  $L$  מהמסה משמאלה ומימינה והמערכת כולה מונחת על שולחן חלק (כוח הכובד לתוך הדף).

על המסה פועל כוח גרר:  $F = -bv$ . ב- $t = 0$  הקירות מתחילים לזוז. ראשית הציירים ממוקמת במרכז התנועה של הקיר השמאלי והכיוון החיובי ימינה. מיקום הקירות כתלות בזמן הוא:  $x_1(t) = d \sin(\omega t)$ ,  $x_2(t) = 2L + 2d \sin(\omega t)$ . נתונים:  $d \ll L$ ,  $d, L, \omega, k, b, m$ .

א. מהי תדירות התנועה ומהי האמפליטודה?

ב. מה התנאי לתהודה בהנחה כי הריסון חלש מאוד?


#### (2) מציאת תדירות ברבע אמפליטודה

מסה  $m$  מחוברת לקפיץ אופקי בעל קבוע  $k$ , המסה נעה על מישור חלק ללא חיכוך. על המסה פועל כוח גרר:  $f = -bv$  וכוח מאלץ:  $F(t) = d \cdot \cos(\omega t)$ . מצא את תדירות הכוח בה אמפליטודת התנועה במצב העמיד תהיה רבע מהאמפליטודה המקסימלית. הנח כי:  $d \ll \sqrt{mk}$ ,  $\omega, b, k, m, d$  נתונים וכי:  $b \ll \sqrt{mk}$ .

#### (3) מסה תלויה על קרש נע

מסה  $M$  מחוברת באמצעות קפיץ אנכי לקרש אופקי הנע בציר ה- $y$ . לפי:  $y(t) = y_0 \cos(\omega t)$ .

קבוע הקפיץ  $k$  ואורכו הרפוי  $l_0$  נתונים. מצא את מיקום המסה כפונקציה של הזמן.



## תשובות סופיות:

$$\omega \sim \sqrt{\frac{2k}{m}} \quad \text{ב.} \quad A(\omega) = \frac{\frac{3kd}{m}}{\sqrt{\left(\frac{2k}{m} - \omega^2\right)^2 + \left(\frac{b}{m}\right)^2} \omega^2} \quad \text{א.} \quad (1)$$


$$\omega_{1,2} = \sqrt{\frac{B \pm \sqrt{B^2 - 4C}}{2}} \quad (2)$$

$$y(t) = \frac{\frac{F_0}{m}}{\frac{k}{m} - \omega^2} \cos \omega t + y'_0 \quad (3)$$

## תרגילים מסכמים:


### שאלות:

#### (1) דיסקה כפולה מסה וקפיץ




- נתונה דיסקה ממוסמרת במרכזה לקיר (כלומר הדיסקה יכולה להסתובב אך לא לנוע מעלה ומטה).  
 הדיסקה בנויה משתי דיסקות מודבקות בעלות רדיוס  $r$  לדיסקה הקטנה ו- $R$  לדיסקה הגדולה.  
 סביב הדיסקות מלופפים חוטים כמתואר בשרטוט.  
 עוד נתון כי אין החלקה לחוטים.  
 א. מצאו את תדירות התנודות.  
 ב. מהי האנרגיה הכוללת של המערכת?

#### (2) מוט על שני גלגלים



- מוט בעל מסה  $M$  מונח על שני גלגלים המקובעים במרכזם.  
 הגלגלים מסתובבים במהירות זוויתית  $\omega$  כך שהגלגל הימני מסתובב נגד כיוון השעון והשמאלי עם כיוון השעון.  
 בין המוט והגלגלים קיים חיכוך ומקדם החיכוך הקינטי נתון.  
 מניחים את המוט כך שמרכזו נמצא במרחק  $A$  מהמרכז בין הגלגלים.  
 מצא את תדירות התנודה של המוט.

#### (3) מסה על משטח על קפיץ אנכי




- על קפיץ שקבועו  $k$  מונח משטח שמסתו  $m_1$ , המשטח צמוד לקצהו של הקפיץ.  
 על המשטח מונח גוף שמסתו  $m_2$ .  
 מכווצים את הקפיץ בשיעור  $\Delta y$  ומשחררים.  
 א. מה צריך להיות  $\Delta y_{\min}$  כדי שהגוף יתנתק מן המשטח באיזה שהוא שלב?


ב. הניחו:  $\Delta y = 2\Delta y_{\min}$ ,  $k = 10 \frac{Nr}{m}$ ,  $m_1 = 0.04 \text{ kg}$ ,  $m_2 = 0.06 \text{ kg}$

ומצאו את רגע הניתוק.

- ג. באמצעות הנתונים המספריים מסעיף ב', מהו מקומו ומהירותו של המשטח ברגע שהגוף ניתק מן המשטח?



- (4) משטח על דיסקה מחובר לקפיץ נתונה מערכת כבשרטוט (אין החלקה במערכת). מהי התדירות?



- (5) תנודה בתעלה בכדור"א בתוך כדור הארץ נחפרה תעלה כבשרטוט. מסת כדור הארץ M. מהי תדירות התנודות הקטנות של מסה החופשיה לנוע בתעלה?

- (6) שתי מסות מחוברות בקפיץ\*\* שתי מסות  $m_1$  ו- $m_2$  מחוברות בקפיץ בעל קבוע  $k$  ואורך רפוי  $l$ . המסות נמצאות במנוחה על מישור אופקי חלק. נותנים דחיפה ימינה למסה  $m_1$  המקנה לה מהירות התחלתית  $v_0$ .  
 א. מהי תדירות התנודות של התנועה (כתלות בנתוני הבעיה)?  
 רמז: על מנת לפתור את המשוואות יש להחליף משתנים ל-  
 ב. מצאו את מיקום המסה  $m_2$  כתלות בזמן.

$$x_{c.m.} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}; \quad x_{rel} = x_1 - x_2$$

## תשובות סופיות:

$$E_{\text{total}} = \frac{1}{2} Kx^2 - mgx + \frac{1}{2} I\omega^2 + \frac{1}{2} m\dot{x}^2 \quad \text{ב.} \quad \sqrt{\frac{2kR}{\frac{1}{2}MR + \frac{r^2}{R}}} \quad \text{א.} \quad (1)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{\mu_k g}{d}} \quad (2)$$

$$t_1 = \frac{1}{\omega} \cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) \quad \text{ב.} \quad \Delta y_{\min} = \frac{(m_1 + m_2)}{k} \quad \text{א.} \quad (3)$$

$$v(t) = \dot{y}(t) = -2\Delta y_{\min} \omega \sin(\omega t), \Delta y_{\min} = \frac{(m_1 + m_2)}{k} \quad \text{ג.}$$

$$\ddot{x} = -\left(\frac{K}{m + 2M}\right)x \quad (4)$$

$$\ddot{x} = -\left(\frac{M}{R^3}\right)(x - 0) \quad (5)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}}, \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad \text{א.} \quad (6)$$

$$, A = \frac{\sqrt{v_0^2 + l^2 \omega^2}}{\omega}, x_2(t) = \frac{m_1}{m_1 + m} (l + v_0 t) - \frac{m_1}{m_1 + m_2} A \cos(\omega t + \varphi) \quad \text{ב.}$$

$$\tan \varphi = -\frac{v_0}{\omega l}$$

## תרגילים מסכמים (מטוטלות שונות):

### שאלות:

#### (1) שני חצאי דיסקה




נתונים שני חצאי דיסקה התלויים על מסמר כמתואר בשרטוט. מסת הדיסקה ורדיוסה נתונים. מצא את התדירות של כל אחד מחצאי הדיסקה.

#### (2) חצי חישוק ושתי מסות



מצא את תדירות חצי החישוק שבתמונה. רדיוס R ומסתו M, בקצוותיו חוברו שתי מסות m. החישוק תלוי ממסמר בקודקודו.

#### (3) מטוטלת על עגלה נעה



עגלה בעלת מסה  $m_2$  חופשיה לנוע על משטח אופקי ללא חיכוך. אל העגלה מחובר מוט אנכי עליו תלויה מטוטלת מתמטית עם מסה  $m_1$  ואורך חוט a. משחררים את המסה (של המטוטלת) בזווית נתונה כאשר כל המערכת נמצאת במנוחה.

א. רשמו את מהירות המטוטלת במערכת העגלה כפונקציה של  $\theta$  ו- $\dot{\theta}$ .


ב. רשמו את מהירות העגלה והמטוטלת כפונקציה של  $\theta$  ו- $\dot{\theta}$ .

ג. רשמו את משוואת שימור האנרגיה המכאנית של המערכת.

ד. רשמו את משוואת שימור האנרגיה בתנודות קטנות.

ה. מצאו את תדירות התנודה של המסה M.

#### (4) קפיץ מוט ומסה




נתונה מסה m המחוברת לקפיץ בעל קבוע k.

המסה גם מחוברת למוט חסר מסה בעל אורך l. המוט מחובר לרצפה בציר המאפשר לו להסתובב. המערכת בשרטוט נמצאת במצב שיווי משקל.

א. מהי תדירות התנודות הקטנות של המערכת?

ב. מהי המסה המקסימלית שתאפשר תדירות זו?

**(5) מטוטלת בשדה מגנטי**

מטוטלת מתמטית שאורכה  $L$ , מסתה  $m$  ומטענה  $q$

נתונה בשדה מגנטי אופקי  $B$  היוצא מהדף.

השדה המגנטי יוצר כוח מגנטי על המטוטלת כאשר

היא בתנועה לפי הנוסחה:  $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ .

א. מצא את הכוחות הפועלים על המטוטלת במהלך

התנועה כתלות בזווית  $\theta$  ובמהירות  $v$ .

ב. מסיטים את המטוטלת זווית קטנה  $\theta_0$  ומשחררים במנוחה.

מצא את משוואת התנועה של המטוטלת ומשם את מיקום המטוטלת

כתלות בזמן עבור זוויות קטנות.

ג. מהי המתיחות בחוט כתלות בזמן.

ד. מהי המתיחות המקסימאלית בחוט ובאיזו זווית ומהירות מצב זה מתרחש?

## תשובות סופיות:

$$(1) \text{ דיסקה 1: } -\left(\frac{A}{B}\right) \cdot (\theta - (0)) = \ddot{\theta}, \text{ דיסקה 2: ראה סרטון.}$$

$$(2) -\frac{(2m+M) \cdot gb}{I} \theta = \ddot{\theta}$$

$$(3) \text{ א. } v_x = \dot{\theta} a \cos \theta, v_y = \dot{\theta} a \sin \theta$$

$$\text{ב. } v_{1x} = \left(1 + \frac{m_1}{m_2}\right)^{-1} a \dot{\theta} \cos \theta, v_{1y} = \dot{\theta} a \sin \theta$$

$$\text{ג. } E = \frac{1}{2} m_1 \left( \left(1 + \frac{m_1}{m_2}\right) \left(1 + \frac{m_1}{m_2}\right) \right)^{-2} a^2 \dot{\theta}^2 \cos^2 \theta + \dot{\theta}^2 a^2 \sin^2 \theta - m_1 g a \cos \theta$$

$$\text{ד. } \omega = \sqrt{\frac{\frac{ga^2}{2}}{\left(1 + \frac{m_1}{m_2}\right)^{-1} a^2}} \quad \text{ה. } E = \frac{1}{2} m_1 \left( \left(1 + \frac{m_1}{m_2}\right)^{-1} a^2 \dot{\theta}^2 + \frac{ga}{2} \theta^2 \right) - m_1 g a \frac{1}{2} \quad \text{ו.}$$

$$(4) \text{ א. } \omega = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{g}{l}} > 0 \quad \text{ב. } m < \frac{lk}{gv}$$


$$(5) \text{ א. } |\vec{F}| = qvB, \text{ כיוון החוצה מהמעגל.} \quad \text{ב. } \theta(t) = \theta_0 \cos\left(\sqrt{\frac{g}{L}} t\right)$$

$$\text{ג. } T(t) = -qB\sqrt{gL}\theta_0 \sin\left(\sqrt{\frac{g}{L}} t\right) + mg \quad \text{עבור } \theta_0 \ll \frac{2qB}{m} \sqrt{\frac{L}{g}}$$


$$\text{ד. } T_{\max} = mg + qB\sqrt{gL}\theta_0$$

## תרגילים למתקדמים:


### שאלות:



- (1) **מסה בין שני קפיצים עם אורך זניח**  
 בין שני קירות במרחק  $2L$  נמצאת מסה  $m$  המחוברת לקירות בקפיצים בעלי מקדם  $k$  ואורך רפוי זניח.  
 א. מצא את תדירויות התנודות הקטנות בציר ה- $x$ .  
 ב. מצא את תדירויות התנודות הקטנות בציר ה- $y$ .




- (2) **מסה בין שני קפיצים\*\* (אורך רפוי לא זניח)**  
 בין שני קירות במרחק  $2L$  נמצאת מסה  $m$  המחוברת לקירות בקפיצים בעלי מקדם  $k$  ואורך רפוי  $l_0$ .  
 מצא את תדירות התנודות הקטנות בציר ה- $y$ .



- (3) **מוט על חצי כדור\*\***  
 מוט בעל אורך  $l$  ומסה  $m$  מונח על כדור בעל רדיוס  $R$ .  
 א. מצא את תדירות התנודות הקטנות של המוט.  
 ב. מצא את גובה מרכז המסה של המוט כפונקציה של זווית ההטיה.




- (4) **עכביש בשיווי משקל יציב\***  
 מוט בעל מסה  $M$  ואורך  $l$  מחובר ברבע מגובהו לציר. מתחתית המוט עכביש בעל מסה  $m$  מטפס כלפי מעלה. מצא את תדירות המערכת כפונקציה של מיקום העכביש ומצא את משקל העכביש המקסימלי שישאיר את המערכת בשיווי משקל יציב.




- (5) **תיבה על כיפה חצי כדורית\*\***  
 תיבה שמסתה  $M$  מונחת על כיפה גלילית חצי עגולה ברדיוס  $R$ . גודל התיבה הוא  $2a \times 2b$ . מניחים את התיבה על ראש הכיפה כך שמרכזה בדיוק מעל מרכז הכיפה. לאחר מכן מטים את התיבה מעט הצידה כך שהיא מתגלגלת ללא החלקה על הכיפה. מצא את תדירות התנודות הקטנות של התיבה על ראש הכיפה. מה התנאי שיהיו תנודות?

**6) מסה בתוך חישוק מסתובב****(כולל קוריאוליס וקורדינטות פולריות)**

גוף שמסתו  $m$  נמצא במרכז תעלה הנמצאת לאורך קוטרו של חישוק. המערכת מונחת על השולחן כך שכוח הכובד לתוך הגוף. הגוף מחובר לשני קפיצים זהים אחד מכל צד המצויים במצב הרפוי כאשר הגוף במרכז החישוק. קבוע הקפיצים הוא  $k$ . מסובבים את החישוק במהירות זוויתית  $\Omega$  ומרחיקים את המסה מעט מהמרכז. רשום משוואת כוחות במערכת החישוק, מה התנאי לתנועה הרמונית ומהי תדירות התנועה אם התנאי מתקיים? (מומלץ לפתור גם באמצעות ק. פולריות).

**7) מסה בתוך חישוק מסתובב עם חיכוך****(כולל קואורדינטות פולריות, קוריאוליס, ותנועה מרוסנת)**

גוף שמסתו  $m$  נמצא במרכז תעלה הנמצאת לאורך קוטרו של חישוק. המערכת מונחת על השולחן כך שכוח הכובד לתוך הגוף. הגוף מחובר לשני קפיצים זהים אחד מכל צד המצויים במצב הרפוי כאשר הגוף במרכז החישוק. קבוע הקפיצים הוא  $k$ . מסובבים את החישוק במהירות זוויתית  $\Omega$  ומשחררים את המסה ממנוחה במרחק  $d$  מהמרכז. בין המסה והדופן של התעלה קיים חיכוך (אין חיכוך עם הבסיס). מקדמי החיכוך הסטטי והקינטי הם:  $\mu_s, \mu_k$ .



- א. רשום משוואת כוחות במערכת החישוק, מהם התנאים לתנועה הרמונית? האם צריך את מקדם החיכוך הסטטי?
- ב. מצא את המיקום כתלות בזמן בהנחת התנאים של סעיף א', מהו מקדם האיכות של המערכת? (מומלץ לפתור גם באמצעות ק. פולריות).

## תשובות סופיות:

$$\omega_x = \sqrt{\frac{2k}{m}} \quad \text{א.} \quad \omega_y = \sqrt{\frac{2k}{m}} \quad \text{ב.} \quad (1)$$

$$-\left(2k \frac{L \cdot l_0}{L}\right) y = \ddot{y} \quad (2)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{12gR}{l^2}} \quad \text{א.} \quad y_{c.m} = R \left(1 + \frac{\theta^2}{2}\right) \quad \text{ב.} \quad (3)$$

$$-\left(m' g \frac{C}{I}\right) \theta = \ddot{\theta} \quad (4)$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g(R-a)}{\frac{1}{3}(a^2+b^2)+a^2}} \quad (5)$$

$$(-2k - \Omega^2 m) x = m \ddot{x}, \quad 2k - \Omega^2 m > 0, \quad \omega = \sqrt{\frac{2k - m\Omega^2}{m}} \quad (6)$$


$$-2kx + m\Omega^2 x - 2\mu_k m\Omega \dot{x} = m \ddot{x}, \quad \Omega^2 (1 + \mu_k^2) < \frac{2k}{m} \quad \text{א.} \quad N=0 \quad \text{לא כי } N=0 \quad \text{כשהגוף נעצר.} \quad (7)$$

$$Q = \frac{\omega_0}{\Gamma} = \frac{\sqrt{\frac{2k}{m}}}{2\mu_k \Omega}, \quad x(t) = e^{-\frac{\Gamma}{2}t} \left( d \cos(\tilde{\omega}t) - \frac{d\sqrt{1-\omega_0^2}}{\tilde{\omega}} \sin(\tilde{\omega}t) \right) \quad \text{ב.} \quad (8)$$

## תרגילים לבקשת סטודנטים:

### שאלות:

#### (1) כדור מתגלגל בצינור




דיסקה בעלת רדיוס  $r$  מתגלגלת בתוך צינור מקובע לרצפה בעל רדיוס  $R$ . מותר להשתמש בקירוב זוויות קטנות ומותר להזניח את הרדיוס הקטן ביחד לגדול.

א. מה תהיה תדירות התנודות הקטנות של הדיסקה, בהנחה שאין חיכוך?

ב. מה תהיה התשובה לסעיף א' אם יוסיפו חיכוך עם הרצפה והגלגול יהיה ללא החלקה?

ג. מה תהיה התדירות עם בנוסף לחיכוך עם הרצפה יתווסף כוח חיכוך:  $F = -bv$ ?

#### (2) קפיץ נמתח להתארכות מקסימלית



קליע בעל מסה זניחה נע במהירות לא ידועה לעבר מסה  $m_2$  שמחוברת למסה  $m_1$  דרך קפיץ בעל מקדם אלסטי  $k$ .



המסה  $m_1$  ניצבת בצמוד לקיר כמתואר בשרטוט.

א. לאחר פגיעת הקליע הקפיץ מתכווץ במצב המקסימלי ומאבד  $d$  מאורכו.


מהי מהירות מרכז המסה מייד לאחר שהמערכת מתנתקת מהקיר?

ב. על מערכת בעלת נתונים זהים ואורך קפיץ רפוי  $l$  מופעל כוח קבוע

ואופקי  $F$  לכיוון המסומן בציור.

מה ההתארכות המקסימלית של הקפיץ?

#### (3) דיסקה כפולה מסה וקפיץ



נתונה דיסקה ממוסמרת במרכז לקיר (כלומר הדיסקה יכולה להסתובב אך לא לנוע מעלה ומטה).


הדיסקה בנויה משתי דיסקיות מודבקות בעלות רדיוס  $r$  לדיסקה הקטנה ו- $R$  לדיסקה הגדולה.

סביב הדיסקות מלופפים חוטים כמתואר בשרטוט. עוד נתון כי אין החלקה לחוטים.

א. מצא את תדירות התנודות.

ב. מהי האנרגיה הכוללת של המערכת?

(4) הרמונית עם גזירה של חוט (רק למי שמכיר את הנושא של תאוצות לא שוות) במערכת הבאה הגלגלות והקפיץ אידיאליים.



קבוע הקפיץ הוא:  $k = 50 \frac{\text{N}}{\text{m}}$  והמסה:  $M = 4\text{kg}$ .

- מצאו את התארכות הקפיץ במצב שיווי המשקל.
- מה ההעתק של המשקולת במצב שיווי המשקל (ביחס למצבה כשהקפיץ רפוי).
- מהי תדירות התנודות של המערכת?
- מותחים את המשקולת מטה 20cm מנקודת שיווי המשקל ומשחררים ממנוחה. רשמו ביטוי למיקום של המשקולת כתלות בזמן.

### תשובות סופיות:

$$\omega' = \sqrt{\omega_0^2 \cdot \left(\frac{b}{2}\right)^2} \quad \text{ג.} \quad \omega = \sqrt{\frac{2g}{3R}} \quad \text{ב.} \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{R}} \quad \text{א.} \quad (1)$$

$$\Delta = \frac{F}{2k + k \frac{m_2 - m_1}{m_1}} \quad \text{ב.} \quad v_{\text{c.m.}} = \frac{\sqrt{\frac{k}{m_2} d}}{m_1 + m_2} \quad \text{א.} \quad (2)$$

$$E_{\text{total}} = \frac{1}{2} kx^2 - mgx + \frac{1}{2} I\omega^2 + \frac{1}{2} m\dot{x}^2 \quad \text{ב.} \quad \omega = \sqrt{\frac{kR}{\frac{1}{2}MR + \frac{r^2}{R}}} \quad \text{א.} \quad (3)$$

$$3.54 \frac{\text{rad}}{\text{sec}} \quad \text{ג.} \quad 0.05\text{m} \quad \text{ב.} \quad 0.2\text{m} \quad \text{א.} \quad (4)$$

$$x(t) = 0.2 \cos(3.54t) \quad \text{ד.} \quad \text{משיווי משקל.}$$

# פיזיקה 1 מכניקה

פרק 16 - כבידה וכוח מרכזי

תוכן העניינים

1. תנועה תחת כוח מרכזי וכוח הכובד ..... 216
2. חוקי קפלר ..... 217


## תנועה תחת כוח מרכזי וכוח הכובד:

### שאלות:




#### (1) טיל יוצא מכדה"א וחוזר

- טיל נורה מכדור הארץ.  
הטיל מתרחק מכדור הארץ וחוזר אליו בחזרה.  
נתון שבאיזושהי נקודה במסלול המרחק של הטיל מכדה"א הוא  $R_1$ .  
נתונה הזווית בין  $R_1$  למהירות באותו הרגע  $v_1$  היא 30 מעלות.  
רדיוס כדה"א הוא  $R_E$  וזווית הפגיעה של הטיל בכדה"א היא  $\theta$ .  
א. מצא את:  $v_0, v_1, v_2, \theta_0$ . (מהירות פגיעת הטיל בכדה"א).  
ב. חשב את:  $R_{\max}$  (המרחק המקסימלי של הטיל מכדה"א).  
ג.  $v_{\min}$  (המהירות באותה נקודה).



#### (2) חלק עף במהירות מילוט

- חללית בעלת מסה  $m$  סובבת את כדה"א במסלול מעגלי ברדיוס  $R$ . ברגע מסוים החללית מתפצלת לשני חלקים. אחד החלקים בעל מסה של שליש  $m$  עף בכיוון הרדיאלי במהירות המילוט.  
מצא את הרדיוס המינימלי והמקסימלי של החלק השני.



#### (3) גוף זז במנהרה במרחק מהמרכז

- גוף נע במנהרה הנמצאת במרחק  $\frac{R}{2}$  ממרכז כדור בעל מסה  $M$ .  
הגוף מתחיל ממנוחה בקצה המנהרה ואין חיכוך.  
מצא את מיקום הגוף כפונקציה של הזמן.

### תשובות סופיות:

(1) ראה סרטון.

(2) ראה סרטון.


$$x(t) = -\frac{\sqrt{3}}{2} R \cos\left(\sqrt{\frac{GM}{R^3}} t\right) \quad (3)$$

## חוקי קפלר:

### שאלות:

#### (1) מציאת זמן מחזור

גוף נע סביב השמש במסלול אליפטי כך שמהירותו המקסימאלית ומרחקו המינימלי מהשמש נתונים. נתון גם שטח האליפסה שעושה הגוף. מצא את זמן המחזור של הגוף.



### תשובות סופיות:

$$T = \left( \frac{r_{\min} v_{\max}}{2S} \right)^{-1} \quad (1)$$

# פיזיקה 1 מכניקה


פרק 17 - תרגילים ברמת מבחן

תוכן העניינים

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 218 | 1. שאלות הבנה קצרות  |
| 221 | 2. תרגילים ברמת מבחן |

## שאלות הבנה קצרות:


### שאלות:



#### (1) עזית הכלבה הצנחנית

עזית הכלבה הצנחנית רצה במהירות  $v$ .  
כעת עזית מונחת על דיסקה במהירות  $\omega$   
בעלת רדיוס  $R$ .

מהו מקדם החיכוך המינימלי שצריך להיות בין עזית  
לדיסקה על מנת למנוע את החלקתה של עזית?



#### (2) זמן מחזור למטוטלת של שתי מסות

מטוטלת בנויה משתי מסות וציר כמתואר בשרטוט.  
מצא את זמן המחזור של המטוטלת.


$$\text{נתון: } 2\pi = \omega T, \quad \omega^2 = mg \frac{C}{I}$$



#### (3) שחיין ממהר להגיע לקצה

שחיין מנסה לשחות בין שתי גדות הנהר.  
השחיין שוחה במהירות  $V$  (ביחס למים כמובן)  
והנהר זורם במהירות  $Z$ .


לאיזה כיוון השחיין צריך לשחות, על מנת לשמור על כוחותיו  
ולהגיע במהירות מירבית לגדת הנהר?



#### (4) שני בולים מתגלשים ומתנגשים

שני הבולים שבשרטוט נעזבים בו זמנית  
ומתנגשים התנגשות אלסטית.


א. חשב מה יהיה שיא הגובה של הבולים אם  
נתון כי מסת הבול הימני גדולה פי 5 ממסת הבול השמאלי.  
ב. חזור על החישוב במקרה של התנגשות פלסטית.



#### (5) מסה נייחת בכוח מדומה

קרון בעל מסה  $M$  נמשך במהירות  $F$ .  
בתוך הקרון קיים מדרון חלק חסר מסה ועליו  
מונחת מסה  $m$ .

מצא את הכוח  $F$ , אם נתון כי המסה  $m$  נייחת ביחס למדרון.

**(6) תנע זוויתי אלסטי ופלסטי**

שלושה כדורים מונחים על גבי שולחן חלק כמתואר בשרטוט. שני גופים מחוברים ביניהם במוט חסר מסה באורך  $d$ , והמסה השלישית נעה במהירות נתונה אל עבר שני הגופים, ומתנגשת התנגשות אלסטית. מה תהיה מהירות הכדור הפוגע לאחר ההתנגשות? כיצד הייתה משתנה תשובתך אם היה מדובר בהתנגשות פלסטית?

**(7) נחש יוצא מכד**

בתוך כד, נח לו נחש בעל מסה  $M$  ואורך  $L$ . ברגע  $t_0 = 0$ , הנחש מעוניין לצאת מהכד, ומתחיל לעלות במהירות קבועה  $v$ . מהו הכוח הנורמלי שיופעל על הנחש ברגע  $t_0$ ?

**(8) פרה ודיסקה במהירות קבועה**

על משטח המסתובב במהירות קבועה  $\omega$ , עומדת פרה בעלת מסה  $M$ . הפרה מעוניינת להגיע לדשא הנמצא בציר הסיבוב של המשטח. ידוע כי הפרה נמצאת במרחק  $R$  מציר הסיבוב.  
 א. מהי העבודה שמבצע המשטח על הפרה בדרכה לציר הסיבוב?  
 ב. מהי עבודת קוריוליס על הפרה בדרכה לציר הסיבוב?

**תשובות סופיות:**

$$\mu = 1 \quad (1)$$

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{l_1 - l_2}{l_1^2 + l_2^2}}} \quad (2)$$

$$(3) \text{ השחיין צריך לשחות לכיוון הגדה השנייה.}$$

$$(4) \text{ ראה סרטון.}$$

$$\tilde{F} = (M + m) \cdot a \quad (5)$$

$$(6) \text{ ראה סרטון.}$$


$$N = Mg + \frac{M}{L} V^2 \quad (7)$$

$$(8) \text{ א. } W = \frac{1}{2} m \omega^2 R^2 \quad \text{ב. ראה סרטון.}$$

## תרגילים ברמת מבחן:

### שאלות:

#### (1) ארץ סובב שמש




כדור הארץ סובב סביב השמש בהקפה אליפטית. נתונים המרחקים בשיא האליפסה (המרחק הקצר ביותר והארוך ביותר). נתונה גם מהירות כדור הארץ בנקודה הקרובה ביותר.

- מצא את מהירות כדור הארץ בנקודה הרחוקה ביותר.
- רשום את משוואת שימור האנרגיה לשתי נקודות אלה.
- מצא את מסת השמש, אם נכון קבוע הגרביטציה  $G$ .


#### (2) חישוק ומשולש בתוכו

נתון גוף הבנוי מחישוק ברדיוס  $R$  בעל מסה  $M$ , ובתוכו משולש שווה צלעות שאורך כל צלע  $3R$  ומסתו  $m$ . עובי החלקים בגוף זניח וצפיפותם אחידה.



- מהו מומנט ההתמד של הגוף?
- מהו כוח  $F$  במצב של שיווי המשקל?
- בזמן  $t = 0$  מתחיל לפעול הכוח  $F$ , כך ש-  $F = (m + M)3g$ . הטבעת מתגלגלת מעלה ללא החלקה.
- מצאו את התאוצה הזוויתית של הטבעת.
- מהי האנרגיה הקינטית של הגוף כפונקציה של הזמן?

#### (3) מסה נופלת על משולש




- נתון משולש שווה צלעות בעל מסה  $M$  (צפיפותו אחידה) ועליו מוט חסר מסה ובסופו מסה  $m$ . גודל כל האורכים בשרטוט הוא  $L$ . המשולש מחובר בבסיסו לשני גלגלים קטנים כך שהוא חופשי לנוע לצדדים. המסה מתחילה ליפול ממנוחה כך שברגע  $p$  היא נמצאת מאוזנת לקרקע. שלושת הסעיפים מתייחסים לרגע זה.
- מצא את מרכז המסה של העגלה.
  - מצא את מהירות המסה  $m$ .
  - מצא את הנורמלים שמפעילים שני הגלגלים על העגלה.

**(4) מתנועה מעגלית לפגיעה במטרה (מבט מלמעלה)**

חוט מסובב מסה ממנוחה עם תאוצה זוויתית. המתרחות המקסימלית בחוט היא  $p$  ומעבר למתיחות זו החוט נקרע.

א. מה צריכה להיות התאוצה על מנת שהמסה תפגע במטרה?



ב. מה תהיה מהירות הפגיעה?

התייחס לנתונים כפי שמופיעים בשרטוט.

השרטוט מתאר את רגע תחילת התרגיל.

על המסה להשתחרר לפני שהיא מסיימת הקפה אחת של המעגל.

**(5) תנועה תחת פיי**


גוף נקודתי בעל מסה  $m$  נע במסלול ציקלואידי המתואר

$$x = \alpha(\theta - \sin \theta), \quad y = \alpha(1 - \cos \theta)$$

כאשר  $\alpha$  קבוע ו- $\theta$  הינו משתנה של הבעיה.

הגוף מתחיל את תנועתו ממנוחה מנק'  $(0,0)$ ,

נע בשדה גרביטציה  $g$  כמתואר בשרטוט.



נקודת החוט לאנרגיה הפוטנציאלית תהיה בתחתית המסלול (בנקודה בה:  $y = 2\alpha$ ).

א. מהי מהירותו של הגוף בתחתית המסלול?

ב. כתבו את משוואת התנועה עבור הגוף  $\theta$  לאורך המסלול.

יש לבטא את משוואת התנועה וקבועי השאלה  $(g, \alpha)$ .

ג. פתור את משוואת התנועה של סעיף ב' על פי תנאי ההתחלה

עבור:  $\theta(t), x(t), y(t)$ .

ד. הראו שהגוף יבצע תנועה מחזורית עם זמן מחזור המתאים למטוטלת

מתמטית בעלת אורך  $l$ .

מהו  $l$  המתאים לבעיה הנ"ל?

**(6) נחום תקום, מבחן ת"א**

גוף מורכב מחרוט בעל זווית מפתח  $\alpha$ , בסיס הרדיוס  $a$

וגובה  $h$  היושב על חצי כדור בעל רדיוס דומה כמתואר בשרטוט.

לחצי חרוט ולכדור צפיפות מסה אחידה וזוהי  $p$ .

א. חשב את מרכז המסה של החרוט ביחס לראשית  $O$

הנמצאת על משטח החיבור בין הגופים.



(ראה ציור עם הגדרת ראשית הצירים).

ב. חשב את מרכז המסה של כל המערכת בהינתן מרכז

$$Z_{c.m} = \frac{-3a}{8} \quad \text{המסה של חצי כדור:}$$

ג. מטים את הגוף הנ"ל בזווית  $\theta$  ביחס לאנך.


מהי האנרגיה הפוטנציאלית כתלות בזווית זו?



ד. מצאו תחת אילו תנאים (נתונים גיאומטריים  $(h, a, \alpha)$  המערכת תהיה ב:

- שיווי משקל אדיש ( $E_p = \text{const}$ ).
- שיווי משקל יציב המאפשר תנודות קטנות.
- שיווי משקל לא יציב.

### 7) מסות על חרוט, מבחן ת"א



מסה  $m_1$  נמצאת בתוך קונוס, בעל זווית מרכזית  $\alpha$ , המסתובבת במהירות קבועה  $\omega$ . המסה מחוברת במסילה לקונוס, הגורמת לה להסתובב יחד איתו במהירות קבועה.

בנוסף המסה יכולה לנוע מעלה ומטה על הדופן של הקונוס ללא חיכוך.


א. מהו רדיוס הסיבוב  $r$  שבו  $m_1$  תהיה בשיווי משקל, כלומר המסה המסתובבת לא תנוע מעלה או מטה על גבי דופן הקונוס? (כמתואר בשרטוט א').

ב. כעת מניחים על גבי מסה  $m_1$  מסה נוספת,  $m_2$  (כמתואר בשרטוט ב').

מקדם החיכוך הסטטי בין המסות הוא  $\mu_s$ . מהירות הסיבוב של מסה  $m_1$  אינה משתנה כתוצאה מהוספת המסה  $m_2$  למערכת, ובנוסף המסה החדשה אינה מחליקה על גבי מסה  $m_1$ .

האם רדיוס התנועה, שבו נמצאת המערכת בשיווי משקל, ישתנה? הסבר.

ג. מהו ערכו המינימלי של מקדם החיכוך הסטטי  $\mu_s$  שימנע החלקה בין המסות? הנח כי החלק העליון של  $m_1$  הוא אופקי.



### 8) כדורים פוגעים במוטות, מבחן ת"א

שני מוטות דקים וארוכים במנוחה, בעלות מסה  $m$  ואורך  $L$  כל אחד מחוברים בזווית ישרה בנק'  $O$ , ראשית הצירים, כמתואר בשרטוט.

שתי המסות  $m$  נעות בניצב למוטות ומתנגשות בקצה המוטות במהירות:  $\vec{v}_1 = -v_0 \hat{x}$ ,  $\vec{v}_2 = v_0 \hat{y}$ .

נתון כי בזמן  $t = 0$  המסות נצמדות למוטות בבת אחת.

א. מצאו את וקטור המיקום של מרכז המסה  $\vec{r}_{c.m.}(t)$  עבור  $t = 0$ .

ב. מצאו את וקטור המיקום של מרכז המסה  $\vec{r}_{c.m.}(t)$  עבור  $t > 0$ , ביחס למיקום מרכז המסה בזמן  $t = 0$  (ברגע הצמדות המוטות למוטות):


$$\vec{r}_{c.m.}(t > 0) - \vec{r}_{c.m.}(t = 0) = ?$$

ג. מהי המהירות הזוויתית  $\omega(t)$  של המערכת בתנועה הסיבובית ביחס

למרכז המסה שחושב בסעיף ב'  $\vec{r}_{c.m.}(t)$ ?

ד. מצאו את וקטור המיקום  $\vec{r}(t)$  של הנקודה O, ביחס למיקומה בזמן  $t = 0$ .

### 9) מצוף בתנועה הרמונית, מבחן ת"א



נתונים מסה כדורית קטנה  $m$  שרדיוסה  $R$  וקפיץ אנכי, אידיאלי וחסר מסה, בעל קבוע קפיץ  $k$ .  
הקפיץ ממוקם בתוך נוזל צמיגי שצפיפותו  $\rho$  וצמיגותו  $\eta$ .  
המצב הרפוי של הקפיץ הוא כאשר הוא בגובה פני הנוזל, כמתואר בשרטוט.

זכרו כי ערכי כוח העילוי וכח סטוקס הם:  $\rho V g$

(כאשר  $V$  הוא נפח הכדור) ו-  $-6\pi\eta R\dot{y}$ , בהתאמה.

א. כאשר המסה ממוקמת על שפת הנוזל, כמתואר בשרטוט, מעניקים לה

מהירות התחלתית  $v_0$  כלפי מעלה, מה יהיה הגובה המקסימלי אליו תגיע המסה?

ב. מהי משוואת התנועה של המסה, כאשר היא נעה בתוך הנוזל?

הניחו כי מרגע נגיעת המסה בפני הנוזל כשהכדור נכנס במלואו לנוזל (יש להתעלם משלבי כניסת המסה לנוזל).

כמו כן יש להניח כי פני הנוזל לא השתנו בשל כניסת הכדור לנוזל.

רמז: לפישוט המשוואה, יש לבצע החלפת משתנים.

ג. בהנחת ריסון חלש, מהו הפתרון הכללי של משוואת התנועה בתוך הנוזל?

מהם תנאי ההתחלה של התנועה?


את התשובות הסופיות יש להציג במונחי המשתנה בו השתמשתם לפני החלפת המשתנים.

רמז: בפתרון המד"ר יש להעזר בדף הנוסחאות הנתון.

ד. כעבור כמה זמן, מרגע כניסת המסה למים, תחזור המסה לפני המים

(המצב המתואר בתחילת סעיף ב')?


### 10) מגדל קוביות



דני מנסה לבנות מגדל מ-5 קוביות זהות בעלות פאה באורך  $a$ .  
מהו המרחק המקסימאלי הניתן להניח את הקובייה העליונה ביותר כך שהמגדל לא ייפול?


(מדוד את המרחק בין הצלע השמאלית של הקובייה הראשונה לצלע השמאלית של הקובייה העליונה).

רמז: התחל את החישוב מהקובייה העליונה.

**11) זבוב על דיסקה**

דיסקה עגולה שטוחה שמסתה  $M$  ורדיוסה  $R$  מסתובבת במהירות זוויתית התחלתית  $\omega_0$  סביב מרכזה הנמצא במנוחה על גבי שולחן חסר חיכוך (הדיסקה אינה מחוברת לשולחן!). מתחת למרכז הדיסקה, על השולחן מצוירת נקודה ירוקה (להלן הנקודה  $O$ ). במרכז הדיסקה ישן זבוב נקודתי ירוק שמסתו  $m$ . על הדיסקה קו רדיאלי ירוק.

- ברגע  $t = 0$  מתעורר הזבוב והוא מתחיל ללכת על גבי הקו הרדיאלי. מצאו את מיקום הנקודה  $O$  (שעל השולחן) ביחס לזבוב כפונקציה של המרחק  $h$  בין הזבוב למרכז הדיסקה. הניחו כי הזבוב נמצא בראשית, ציר  $x$  שלו מכוון בכיוון מרכז הדיסקה וציר  $y$  מאונך לו במישור הדיסקה.
- מצאו את המהירות הזוויתית של הדיסקה כאשר הזבוב מגיע לשפתה. בדקו את תשובתכם לסעיף ב' עבור  $m \ll M$  ו-  $m \gg M$ .
- אם הזבוב נע במהירות קבועה  $V_0$  ביחס לדיסקה, מהו כוח החיכוך בין הזבוב לדיסקה רגע לפני שהזבוב הגיע לשפת הדיסקה?

**12) חצי כדור בתנועה הרמונית**

חצי כדור ברדיוס  $R$  ומסה  $M$  מונח על משטח. מסיטים את החצי כדור בזווית קטנה ממצב שיווי המשקל ומשחררים ממנוחה. מצא את תדירות התנודות הקטנות אם הכדור מתגלגל

ללא החלקה (מרכז המסה של חצי כדור נמצא במרחק:  $d = \frac{3}{8}R$  ממרכז הכדור המלא).

**13) אנרגיה אבודה בהחלקה**

על מסוע בעל מקדם חיכוך קינטי נתון מונחת מסה  $m$ . כוח חיצוני מושך את המסוע במהירות קבועה  $u$ . נתון כי המסה הונחה בזמן  $t = 0$  במנוחה. א. מהו הכוח המופעל על המסוע?




- מהי תאוצת המסה?
- כמה זמן תמשך ההחלקה?
- מהו המרחק אותו עבר המסוע בזמן זה?
- מהו המרחק אותו עברה המסה בזמן זה?
- כמה עבודה השקיע הכוח החיצוני?
- כמה עבודה השקיע כוח החיכוך?
- כמה אנרגיה עבדה לחוס?

**(14) גולש על סקייטבורד**

גולש על סקייטבורד נכנס למסלול כמתואר בשרטוט.

רדיוס המעגל  $R$ , גובה האנכי של המקפצה גם

כן  $R$  ואורך הקפיצה הוא  $d$ .



א. מהו הגובה המינימלי של  $L$  על מנת

שהפעלולן ישלים סיבוב במעגל?

ב. מהו הגובה המינימלי של  $L$  על מנת שהגולש יחצה בשלום את המקפצה?

כעת נתון כי הגולש יכול לקפוץ מהסקייטבורד בעודו באוויר במהירות אופקית

של  $p$  יחסית לסקייטבורד, בהנחה שהוא מתחיל מהגובה שמצאנו בסעיף א'.

ג. כמה זמן לאחר הקפיצה הגולש צריך להתחיל את הקפיצה על מנת להגיע

בדיוק לקצה התעלה?


ד. מהו המרחק המקסימלי אותו הגולש יחצה בשלום?

**(15) מטרונום**

מצא את תדירות המטרונום שבשרטוט המשתנה על פי

מיקום המסה הנעה על גביו.

נתון כי ציר המטרונום נמצא רבע אורך מעל קצהו התחתון.

**(16) התנגשות במשולש על רצפה**

מסה  $m$  נזרקת במהירות אופקית  $v_0$  מראש מגדל.

אחרי שעברה גובה  $h$  מנקודת הזריקה, המסה


מתנגשת בגוף משולש שנמצא במנוחה ומסתו  $M$ .

נתון כי ההתנגשות בין שתי המסות לא אלסטית

ובמהלך ההתנגשות אובדת שליש מהאנרגיה הקינטית.

נתון גם כי לאחר ההתנגשות המסה  $m$  נעה במהירות

אופקית שמאלה  $u_1$  והגוף  $M$  נע במהירות אופקית ימינה  $u_2$ .



א. מצא את מהירות הפגיעה של המסה  $m$  בגוף  $M$ , יש למצא גודל ורכיבים בשני

הצירים.


ב. מצא את גודל המהירויות של המסות לאחר ההתנגשות  $(u_1, u_2)$ .

ידוע כי זמן ההתנגשות הוא  $\Delta t$ .

ג. מצא את הגודל של הכוח הנורמלי הממוצע שמפעילה הקרקע במהלך ההתנגשות.

**17) לוויין יורה זנב בכיוון התנועה**

לוויין שמסתו  $M$  נע במסלול אליפטי סביב כדור הארץ כך שמרחקו המינימלי ממרכז כדור הארץ הוא  $R_A$  ומרחקו המקסימלי הוא  $R_B$ . הלוויין נע בכיוון השעון (ניתן לראות בשרטוט המצורף). כאשר הלוויין נמצא בנקודה  $A$  הלוויין מתפרק לשניים ויורה את זנבו בכיוון משיק למסלול. מסת הזנב הנורה היא  $m$ .



$$U_g = -G \frac{m_1 m_2}{r}$$


$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

לאחר הירי החלק שנותר מהלוויין נכנס למסלול מעגלי סביב כדור הארץ.  $M_E$  - מסת כדור הארץ.  $R_E$  - רדיוס כדור הארץ.

- הביעו את מהירות הלוויין בנקודה  $A$  לפני הירי.
- הביעו את מהירות שארית הלוויין (החלק ללא הזנב) לאחר הירי.
- האם הלוויין יורה את זנבו ימינה או שמאלה, לאורך המשיק למסלול בנקודה  $A$ ? נמקו!
- הביעו את מהירות זנב החללית מיד לאחר הירי.

**18) עבודה לאורך דרך במסילה**

חרוז בעל מסה  $m$  מושחל על מסילה חלקה. המסילה נמצאת במישור  $XY$ . כוח הכובד פועל בכיוון השלילי. צורת המסילה מתוארת בשרטוט.



- מהי המהירות ההתחלתית המינימלית שיש להעניק לחרוז בראשית הצירים כדי שיוכל להגיע לנקודה  $A$ ?
- נותנים לחרוז מהירות התחלתית  $v_0$ .


מהו שיא הגובה שאליו יגיע החרוז אם נתון כי החרוז עבר את הנקודה  $A$ ?

ג. כעת, במקום כוח הכובד מופעל על החרוז כוח:  $F = (x, e^{x^2})$

והחרוז משוחרר ממנוחה בראשית הצירים. מה תהיה מהירות החרוז בקצה המסילה?

**19) מסה וקפיץ בתוך מסגרת**

בציור הבא מתואר מתקן ניסוי-מסגרת ABCD ומטוטלת קפיץ שמחוברת למסגרת. קבוע הקפיץ  $K$  ומסת המשקולת  $m$  נתונים, מסת הקפיץ קטנה מאוד וזניחה. כל אלו גורמים למשקולת להתנדנד. ידוע כי כשהמשקולת מגיעה לנקודה העליונה אורך הקפיץ ברגע זה הוא המצב הרפוי.



- מצא את האמפליטודה בתנועה של המשקולת? בטא את תשובתך בפרמטרים  $(K, m)$ .

ב. תנועת המשקולת מתוארת לפי הפונקציה הבאה:  $x = A \sin(\omega t + \varphi_0)$ .


הכיוון של ציר ה- $x$  מוגדר בשרטוט. הפרמטר  $A$  מסמן את האמפליטודה. רגע תחילת המדידה הוא ב- $t = 0$ . ידוע שבתחילת המדידה המשקולת נמצאת בנקודה  $x = 0.9A$  ונעה כלפי מטה.

מצא את הפאזה  $\varphi_0$  כביטוי של הפונקציה  $x(t)$ ? בטא את תשובתך בראדיאנים.

ג. המישור התחתון מפעיל כוח נורמלי על מסגרת ABCD בגלל תנודות המשקולת. כוח זה הוא לא קבוע אלא משתנה עם הזמן. נתונה מסה  $m_2$  של המסגרת.

מצא את הגודל המינימלי והמקסימלי של הכוח הנורמלי  $(N_{\min}, N_{\max})$ .

בטא את תשובתך בפרמטרים  $(K, m, m_2)$ .



## 20 שתי מסות גלגלת נעה וכוח חיצוני

שני גופים שמסתם  $m_1, m_2$  מונחים זה על זה על פני מדרון משופע בזווית  $\theta$ .

ניתן לראות כמתואר באיור שהגופים תלויים ומחוברים ביניהם בעזרת מערכת גלגלות חסרות מסה.

בין שני הגופים קיים חיכוך בעוד שבין  $m_2$  למדרון אין חיכוך.

נתון כי מקדם החיכוך הקינטי בין שני הגופים הוא  $\mu_k$ .

ברגע  $t = 0$  המערכת משוחררת ממנוחה ומתחילה לנוע כך שהגוף הגדול  $m_2$  יורד במדרון (בכיוון ציר  $x$  החיובי).

ברגע זה מתחיל גם לפעול על  $m_1$ , כלפי המדרון ובמאונך לו, כוח התלוי בזמן:

$$F(t) = \frac{mg}{2}(1 + \sin(\omega t))$$

כאשר  $\omega$  הוא קבוע חיובי.

יש להניח ש- $m_2$  מספיק ארוך כדי ש- $m_1$  לא יפול ממנו.

א. יש נמק ולהוכיח כי במערכת הנתונה מתקיים הקשר:  $a_1 = -3a_2$ .


ב. מצאו את תאוצות הגופים:  $a_1(t)$ ,  $a_2(t)$  כפונקציה של הזמן.

אין צורך לפתור את המשוואות.

ג. מצאו את השינוי  $\Delta x$ , שחל במרחק שבין הגופים לאורך המדרון, מרגע

תחילת התנועה ועד לרגע  $t$  כלשהוא.

אין צורך לפתור את המשוואות.

**(21) כדור נזרק בשיפוע**

כדור ברדיוס  $R = 20 \text{ cm}$  העשוי מחומר אחיד ואלסטי נזרק

במהירות  $v_0 = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$  בניצב למישור חלק (ללא חיכוך),

המשופע בזווית  $\alpha = 30^\circ$  לאופק.

א. מצא היכן ייפול הכדור על המישור המשופע.


ב. מצא את וקטור המהירות של הכדור מיד לאחר הפגיעה במישור.

כעת נתון שבין המשטח לכדור יש חיכוך ומקדם החיכוך הוא  $\mu_k = 0.2$ , נתון כי ההתנגשות בניצב למישור היא עדין אלסטית.

ג. חזור על סעיף ב'.

ד. מהי המהירות הסיבובית של הכדור אחרי הפגיעה?

ה. מהי מהירות נקודת המגע של הכדור עם המישור מיד לאחר הפגיעה?

**(22) מסה קשורה למסה ולקפיץ אנכי**

גוף שמסתו  $m_2 = 4 \text{ kg}$  נקשר לגוף נוסף שמסתו  $m_1 = 2 \text{ kg}$  בחוט.

הגוף שמסתו  $m_1$  קשור לקפיץ אנכי בעל קבוע קפיץ  $k = 100 \frac{\text{N}}{\text{m}}$ .

המערכת נמצאת בשיווי משקל ובמנוחה.


ב- $t = 0$  נקרע החוט הקושר בין המסות.

א. מהי משרעת התנודות?

ב. מהו זמן המחזור של התנודות?

ג. מהו הביטוי למיקום כתלות בזמן?

ד. מהי האנרגיה האלסטית האגורה במערכת בנקודת שיא הגובה?

**(23) מסה תלויה גלגלת ושלוש מסות על שולחן**

שלוש מסות:  $2m_1 = m_2 = m_3 = 15 \text{ kg}$  נמצאות על

שולחן אופקי ומחוברות בחוט דק למסה  $M = 20 \text{ kg}$ .

החוט עובר דרך גלגלת אחידה בעלת רדיוס  $R = 15 \text{ cm}$

ומומנט התמד  $I = 0.7 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$  כמתואר באיור.

החוט אינו מחליק על הגלגלת ואין חיכוך בין המסות  $m_1, m_3$  לשולחן.

בין המסה  $m_2$  לשולחן ישנו חיכוך ומקדם החיכוך הוא:  $\mu_s = \mu_k = 0.23$ .

א. מצא את תאוצת המסה  $M$  ברגע שמשחררים את המערכת ממנוחה.

ב. מהו יחס המתחיות  $\frac{T_1}{T_3}$  ברגע שמשחררים את המערכת ממנוחה?

ג. כמה זמן ייקח לגלגלת להשלים סיבוב אחד מרגע שחרור המערכת?

## תשובות סופיות:

$$(1) \quad v_2 = v \frac{R_1}{R_2} \quad \text{א.} \quad \frac{1}{2}mv^2 - G \frac{m \cdot \tilde{M}}{R_1} = \frac{1}{2}mv_2^2 - G \frac{m \cdot \tilde{M}}{R_2} \quad \text{ב.}$$

$$M = \frac{v^2 \cdot R_1}{2G \cdot R_2} \cdot (R_1 + R_2) \quad \text{ג.}$$

$$(2) \quad I_{\text{total}} = R^2 \left( M + \frac{1}{2}m \right) \quad \text{א.} \quad F = \frac{(m+M)g}{2} \quad \text{ב.} \quad a = \alpha R \quad \text{ג.}$$

$$E_{k(t)} = \frac{1}{2}ma^2t^2 + \frac{1}{2}I\alpha^2t^2 \quad \text{ד.}$$

$$(3) \quad x_M = \frac{ml}{M+m} \quad \text{א.} \quad -v_g = \sqrt{2gl} \quad \text{ב.}$$

$$N_2 = \frac{\sqrt{3}Mg - 4mg}{2\sqrt{3}}, \quad N_1 = M \cdot g - \left( \frac{\sqrt{3}Mg - 4mg}{2\sqrt{3}} \right) \quad \text{ג.}$$

$$(4) \quad \frac{6P}{7\pi Rm} \quad \text{א.} \quad v_\theta = \sqrt{\frac{PR}{m}} \quad \text{ב.}$$

$$(5) \quad v_F = 2\sqrt{ga} \quad \text{א.} \quad \dot{\phi}^2 = \frac{g}{a} \quad \text{ב.} \quad \phi = \sqrt{\frac{g}{a}}t + c \quad \text{ג.} \quad l = 4a \quad \text{ד.}$$

$$(6) \quad Z_{c.m} = \frac{h}{4} \quad \text{א.} \quad Z_{c.m} = \frac{h^2 - 3a^2}{4h + 8a} \quad \text{ב.} \quad U(\theta) = m_T g Z_{c.m} \cos \theta \quad \text{ג.}$$

$$h = \sqrt{3}a \quad \text{ד.} \quad h < \sqrt{3}a \quad \text{ii.} \quad h > \sqrt{3}a \quad \text{iii.}$$

$$(7) \quad R = \frac{g}{\tan \alpha \cdot \omega^2} \quad \text{א.} \quad r \text{ לא משתנה.} \quad \text{ב.} \quad \mu_s \geq \frac{1}{\tan \alpha} \quad \text{ג.}$$

$$(8) \quad \vec{r}_{c.m} = \frac{3}{8}L(1,1) \quad \text{א.} \quad \vec{r}_{c.m} = \frac{v_0 t}{4}(\hat{y} - \hat{x}) \quad \text{ב.} \quad \omega = \frac{30}{37} \frac{v_0}{l} \quad \text{ג.}$$

$$\vec{r}_0 = \frac{v_0 t}{4}(\hat{y} - \hat{x}) + \frac{3l}{8}\sqrt{2} \left( \cos \left( \frac{30}{37} \frac{v_0}{l} t + \frac{5\pi}{4} \right) \hat{x} + \sin \left( \frac{30}{37} \frac{v_0}{l} t + \frac{5\pi}{4} \right) \hat{y} \right) \quad \text{ד.}$$

$$(9) \quad h = \Delta x = \frac{-mg + \sqrt{(mg)^2 + kmv_0^2}}{k} \quad \text{א.} \quad \ddot{z} + \frac{\lambda}{M}\ddot{z} + \frac{k}{M}z = 0 \quad \text{ב.}$$

$$, y(t) = Ae^{-\frac{\Gamma}{\alpha}t} \cos(\omega t + \varphi) + y_0, \quad z(t) = Ae^{-\frac{\Gamma}{\alpha}t} \cos \left( \left( \sqrt{\frac{k}{M} - \frac{\lambda^2}{4}} \right) t + \varphi \right) \quad \text{ג.}$$

$$y(0) = 0, \quad \dot{y}(0) = -v_0$$

$$0 = \frac{g(m - \rho V)}{k} \sqrt{1 + \left( \frac{\Gamma}{2\omega} + \frac{kv_0}{\omega g(m - \rho V)} \right)^2} \quad \text{ד.}$$

$$e^{\frac{\Gamma}{2}t} \cos \left( \omega t - \tan^{-1} \left( \frac{\Gamma}{2\omega} + \frac{kv_0}{\omega g(m - \rho V)} \right) \right) - \frac{g(m - \rho V)}{k}$$

$$x_{\max} = \frac{25a}{24} \quad (10)$$

ג. ראה סרטון.  $\omega_p = \frac{(M+m)^2 \omega_0}{3m^2 + 4mM + M^2}$  ב.  $x_0 = \frac{Mh}{M+m}$  א. (11)

$$f_s = -\frac{mM(M+m)^3 \omega_0^2 R}{(3m^2 + 4mM + M^2)^2} \hat{r} + mMv_0 \omega_0 \left( \frac{(M+m)2}{3m^2 + 4mM + M^2} - \frac{4m}{(M+3m)^2} \right) \hat{\theta} \quad \text{ד.}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{15g}{26R}} \quad (12)$$

א.  $F_{\text{ext}} = \mu mg$  ב.  $a' = \mu g$  ג.  $T = \frac{u}{\mu g}$  ד.  $x = u \cdot \frac{u}{\mu g}$  (13)

א.  $\Delta E = mu^2 - \frac{1}{2}u^2$  ב.  $W' = \frac{1}{2}mu^2$  ג.  $W = mu^2$  ד.  $x' = \frac{1}{2}\mu g \cdot \left( \frac{u}{\mu g} \right)^2$  ה. (14)

ראה סרטון. (15)

$$\frac{-\left( -m_1 g \left( x - \frac{L}{4} \right) + m_2 g \frac{L}{4} - m_3 g \frac{L}{4} \right) \theta}{I} = \ddot{\theta}$$

ראה סרטון. (16)

ראה סרטון. (17)

א.  $\frac{1}{2}mv_i^2 = mgh$  ב.  $mgh + \frac{1}{2}mv_y^2 = mgH$  (18)

ג.  $\frac{1}{2}x_A^2 + 5 \left( e^{\frac{1}{5}(5x_1^2)} - e \right) = \frac{1}{2}mv_s^2$

א.  $\Delta = \frac{mg}{K} = A$  ב.  $\varphi_0 = \pi - 1.12 \approx 2$  (19)

ג.  $N_{\min} = m_2 g, N_{\max} = m_2 g + 2m_1 g$

א. שאלת הוכחה. ב. ראה סרטון. ג.  $\Delta = \frac{4}{3}x_{1(t)}$  (20)

א.  $x(t) \approx 53.3 \frac{m}{sec}$  ב.  $\vec{v} = 23.1 \frac{m}{sec} \hat{x} + 20 \frac{m}{sec} \hat{y}$  (21)

ג.  $u_x = 17.1 \frac{m}{sec}$  ד.  $\omega_F = -75 \frac{rad}{sec}$  ה.  $v_{Ax} = 2.1 \frac{m}{sec}, v_{Ay} = 20 \frac{m}{sec}$

(22) א.  $A = 0.4\text{m}$     ב.  $T \approx 0.89\text{sec}$     ג.  $y(t) = 0.4\cos(\sqrt{50}t + 0) + 0.2$

ד.  $U_{el} = 2\text{J}$

(23) א.  $a \approx 1.87 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$     ב.  $\frac{T_1}{T_3} \approx 11.63$     ג.  $t \approx 1\text{sec}$