


פיזיקה 1 מכניתה



$$\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$
A square frame containing a right-angled triangle. The vertical leg is labeled '1' and the horizontal leg is also labeled '1'. The hypotenuse is labeled $\sqrt{2}$. A diagonal line through the triangle has a slash through it, indicating it is not a valid diagram for the Pythagorean theorem.



$$\{\sqrt{x}\}^2$$
An orange diamond shape containing the mathematical expression $\{\sqrt{x}\}^2$.



תוכן העניינים

1	1. מבוא מתמטי -	1
19	2. וקטוריים -	19
40	3. קינטיקה -	40
63	4. תנועה יחסית -	63
71	5. דינמיקה - חוקי ניוטון.	71
89	6. כוח גראר וכוח ציפה -	89
95	7. תנועה מעגלית -	95
112	8. תנועה תחת השפעה של שדה אלקטרו מגנטי.	112
120	9. קווארידינטות פולריות -	120
129	10. כוחות מודומים (עקרון דלאמבר) -	129
139	11. עבודה ואנרגיה -	139
161	12. מתקף ותנע -	161
176	13. בעיות שני הגוף (מסות מצומדות) חלק א.	176
178	14. מרכז מסה -	178
189	15. מסה משתנה -	189
197	16. מומנט כוח -	197
206	17. תנע זוויתי -	206
212	18. מומנט התמד -	212
218	19. גוף קשיח -	218
233	20. תנועה הרמוניית -	233
253	21. כבידה וכוח מרכזי -	253
260	22. מסות מצומדות-	260
263	23. יחסות פרטית -	263

תוכן העניינים

24. תרגילים במכניקה ברמת מבחן -	279
25. הידרו-סטטיקה והידרו-динמיקה -	291
26. טמפרטורה התפשטות תרמית וחוק הגז האידיאלי	294
27. התיאוריה הקינטית של הגזים	299
28. חום וחוק הראשון של התרמודינמיקה	300
29. החוק השני של התרמודינמיקה	319

פיזיקה 1 מכניתה

פרק 1 - מבוא מתמטי -

תוכן העניינים

1	. סינוס קוסינוס ומה שביניהם
5	. נגזרות ואיינטגרלים בסיסיים.
11	. אינטגרל כפול ומשולש.
13	. מעברי ייחדות
15	. קווארדיינטות ואלמנטים דיפרנציאליים
16	. צפיפות
17	. צפיפות אינפיטיסימלית
18	. נספח-נגזרת סטומה ואלמנט אורך בהחלפת קווארדיינטות

סינוס קוסינוס ומה שביניהם:

רקע

במשולש ישר זווית:


$$\sin \alpha = \frac{a}{c} = \frac{\text{ניצב שמול}}{\text{יתר}}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c} = \frac{\text{ניצב ליד}}{\text{יתר}}$$

$$\tan \alpha = \frac{a}{b} = \frac{\text{ניצב שמול}}{\text{ליד ניצב}}$$

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\cot \alpha = \frac{b}{a} = \frac{\text{ניצב ליד}}{\text{ניצב שמול}} = \frac{1}{\tan \alpha}$$



משפט פיתגורס:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

זהויות:

$\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$	$90^\circ - \alpha$
$\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$	
$\tan(90^\circ - \alpha) = \cot \alpha$	
$\cot(90^\circ - \alpha) = \tan \alpha$	
$\sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha$	$90^\circ + \alpha$
$\cos(90^\circ + \alpha) = -\sin \alpha$	
$\tan(90^\circ + \alpha) = -\cot \alpha$	
$\cot(90^\circ + \alpha) = -\tan \alpha$	
$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$	$180^\circ - \alpha$
$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$	
$\tan(180^\circ - \alpha) = -\tan \alpha$	
$\cot(180^\circ - \alpha) = -\cot \alpha$	
$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$	$-\alpha$
$\cos(-\alpha) = \cos \alpha$	
$\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$	
$\cot(-\alpha) = -\cot \alpha$	
$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$	2α
$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$	
$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \sin \beta \cos \alpha$	$\alpha \pm \beta$
$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$	

סיכום והפרש של פונקציות:

$$\sin \alpha \pm \sin \beta = 2 \sin \left(\frac{\alpha \pm \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha \mp \beta}{2} \right)$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

ערכיהם שווה לזכור:


הزاوية והפונקציה	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \alpha$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	לא מוגדר

פתרונות עבור:


$x_1 = \alpha + 2\pi k$ $x_2 = \pi - \alpha + 2\pi k$	$\sin x = \sin \alpha$
$x_1 = \alpha + 2\pi k$ $x_2 = -\alpha + 2\pi k$	$\cos x = \cos \alpha$
$x = \alpha + \pi k$	$\tan x = \tan \alpha$

שאלות:**1) דוגמה 1- חישוב אלפא**


חשב את הזווית אלפא במקיריים הבאים:



א.




ב.




ג.

2) דוגמה 2- מושולשים משורטטים אחרה


חשב את הזווית אלפא במקיריים הבאים:




א.




ב.




ג.




ד.

3) דוגמה-2- מציאת ניצבים


א.



ב.



ג.



ד.

תשובות סופיות:

(1) א. $\alpha = 69^\circ$ ב. $\alpha = 53^\circ$ ג. $\alpha = 22^\circ$

(2) א. $\alpha = 55^\circ$ ב. $\alpha = 68.2^\circ$ ג. $\alpha = 60^\circ$ ד. $\alpha = 45^\circ$

(3) א. $1.53m$ ב. $\frac{5\sqrt{3}m}{2}$ ג. $2\sqrt{2}m$ ד. $\sqrt{3}m$

נגזרות ואינטגרלים בסיסיים:

רקע

נגזרות:

הנגזרת נותנת את שיפוע המשיק לפונקציה בנקודה כלשהיא.

אם u היא פונקציה של x אז הסימן של הנגזרת של u לפני x הוא $\frac{dy}{dx}$ או y' .

נגזרת של פולינום:

$$y(x) = x^n \rightarrow y'(x) = nx^{n-1}$$

כפל בקבוע אפשר להוציא מהנגזרת:

$$(Ay(x))' = Ay'(x)$$

נגזרת של מכפלה:

$$y(x) = f(x)g(x) \rightarrow y'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

כלל שרשרת:

אם u היא פונקציה של x ו- x הוא פונקציה של t אז :

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$$

נגזרות של פונקציות נוספות:

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2} ; \quad \frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x ; \quad \frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x ; \quad \frac{d}{dx}(\ln(x)) = \frac{1}{x}$$

אינטגרל:

פעולה הפוכה לנגזרת.

אינטגרל של פולינום

$$\int A x^n \, dx = A \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

אינטגרל לא מסוים, מוסיפים קבוע להתוצאה האינטגרל.
אינטגרל מסוים, מציבים גבולות בתוצאה של האינטגרל.

$$\int_a^b x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \Big|_a^b = \frac{b^{n+1}}{n+1} - \frac{a^{n+1}}{n+1}$$

מה עושה האינטגרל?

האינטגרל מבצע סכימה על ערכי הפונקציה.
האינטגרל נותן את השטח מתחת לגרף הפונקציה.

שאלות:**1) דוגמה 1**

חשב את הנגזרות הבאות :

$$y = 5x^4, \frac{dy}{dx} = ? . \text{א}$$

$$y = ax^5, \frac{dy}{dx} = ? . \text{ב}$$

$$y = 5x + 2x^{18}, \frac{dy}{dx} = ? . \text{ג}$$

$$f(x) = 8x^2 + 2, \frac{df}{dx} = ? . \text{ד}$$

$$y = 6t^2, \frac{dy}{dt} = ? . \text{ה}$$

$$x = 5t^3, \frac{dx}{dt} = ? . \text{ו}$$

$$x = 5t^4 + t^3 + 4, \frac{dx}{dt} = ? . \text{ז}$$

$$f(t) = At^6 + Bt + C, \frac{df}{dt} = ? . \text{ח}$$

2) דוגמא 2

חשב את הנגזרות הבאות :

$$y = (5x^4 + 2)(5x + 2x^{18}), \frac{dy}{dx} = ? . \text{א}$$

$$y = Ax^5(B + Cx^3), \frac{dy}{dx} = ? . \text{ב}$$

$$y = 5x + 2x^2(4x + 5x^5), \frac{dy}{dx} = ? . \text{ג}$$

$$y = (5t^2 + 1)(2t + 27 + 5t^3), \frac{dy}{dt} = ? . \text{ד}$$

$$x = (2t^3 + 7)(4t + 3 + 6t^2), \frac{dy}{dt} = ? . \text{ה}$$

(3) דוגמא 3-נגזרת פנימית

חשב את הנגזרות הבאות:

$$y = (x+2)^4, \frac{dy}{dx} = ? \text{ א.}$$

$$y = 5(8x^2 + x)^5, \frac{dy}{dx} = ? \text{ ב.}$$

$$y = 5t + 2(5t^4 + 4)^{14}, \frac{dy}{dx} = ? \text{ ג.}$$

$$f(t) = 8(5t^4 + t^3 + 4)^2 + 2, \frac{df}{dt} = ? \text{ ד.}$$

(4) דוגמא 4-כלל שרשרת

חשב את הנגזרות הבאות:

$$y = (x+2)^4, x = 2t, \frac{dy}{dt} = ? \text{ א.}$$

$$y = 5(8x^2 + x)^5, x = 5t^4 + 4, \frac{dy}{dt} = ? \text{ ב.}$$

$$y = 5x + 2(5x^4 + 4)^{14}, x = 3t^2 + t, \frac{dy}{dt} = ? \text{ ג.}$$

$$y = x^2, x = t^2, \frac{dy}{dt} = ? \text{ ד.}$$

(5) דוגמא 5-נגזרות של פונקציות נוספות

מצאו את הנגזרות של הפונקציות הבאות:

$$\text{א. } y = \sin(ax) \text{ כאשר } a \text{ קבוע.}$$

$$\text{ב. } y = e^{-x^2}$$

(6) דוגמא 1-אינטגרלים בסיסיים

חשב את האינטגרלים הבאים:

$$\text{א. } \int x^7 dx$$

$$\text{ב. } \int x dx$$

$$\text{ג. } \int dx$$

$$\text{ד. } \int 3dx$$

$$\text{ה. } \int 7x^4 dx$$

$$\text{ו. } \int (5x^2 + 3) dx$$

$$\int (8x^7 + 5x)dx \quad \text{ג.}$$

$$\int Ax^7 dx \quad \text{ח.}$$

$$\int (Ax^7 + Bx)dx \quad \text{ט.}$$

7) דוגמה 2- אינטגרל מסוים

חשב את האינטגרלים הבאים:

$$\int_0^2 x^5 dx \quad \text{א.}$$

$$\int_1^5 4dx \quad \text{ב.}$$

$$\int_{-1}^3 7x^4 dx \quad \text{ג.}$$

$$\int_0^4 (2x^2 + 4)dx \quad \text{ד.}$$

$$\int_{-1}^2 (Ax^7 + Bx)dx \quad \text{ה.}$$

8) דוגמה 3- אינטגרל של פונקציות נוספות

חשב את האינטגרלים הבאים:

$$\int_0^\pi \sin x dx \quad \text{א.}$$

$$\int_0^\pi \cos(2x) dx \quad \text{ב.}$$

$$\int e^{3x} dx \quad \text{ג.}$$

$$\int_0^5 2e^{-3x} dx \quad \text{ד.}$$

$$\int_3^5 \frac{1}{x} dx \quad \text{ה.}$$

$$\int \frac{1}{x^2} dx \quad \text{ו.}$$

$$\int e^{ax} dx \quad \text{ז.}$$

תשובות סופיות:

$$12 \cdot t \cdot \text{ה} \quad 16x \cdot \text{ט} \quad 5 + 36x^{17} \cdot \text{ג} \quad 5a \cdot x^4 \cdot \text{ב} \cdot 20x^3 \cdot \text{א} \quad \text{(1)}$$

$$6At^5 + B \cdot \text{ח} \quad 20t^3 + 3t^2 \cdot \text{ז} \quad 15t^2 \cdot \text{ו}$$

$$5Ax^4(B + Cx^3) + 3ACx^7 \cdot \text{ב} \quad 20x^3 \cdot (5x + 2x^{18}) + (5x^4 + 2)(5 + 36x^{17}) \cdot \text{א} \quad \text{(2)}$$

$$5 + 4x \cdot (4x + 5x^5) + 2x^2(4 + 25x^4) \cdot \text{ג}$$

$$(10t)(2t + 27 + 5t^3) + (5t^2 + 1)(2 + 0 + 15t^2) \cdot \text{ט}$$

$$(6t^2 + 0)(4t + 3 + 6t^2) + (2t^3 + 7)(4 + 0 + 12t) \cdot \text{ה}$$

$$5 + 560t^3(5t^4 + 4)^{13} \cdot \text{ג} \quad 25(8x^2 + x)^4(16x + 1) \cdot \text{ב} \cdot 4(x + 2)^3 \cdot 1 \cdot \text{א} \quad \text{(3)}$$

$$16(5t^4 + t^3 + 4)(20t^3 + 3t^2) \cdot \text{ט}$$

$$500t^3 \left(8(5t^4 + 4)^2 + 5t^4 + 4 \right) \cdot (16(5t^4 + 4) + 1) \cdot \text{ב} \quad 8(2t + 2)^3 \cdot \text{א} \quad \text{(4)}$$

$$4t^3 \cdot \text{ט} \quad \left(5 + 2 \cdot 14(5x^4 + 4)^{13} \cdot (5 \cdot 4x^3 + 0) \right) \cdot (3 + 2t + 1) \cdot \text{ג}$$

$$e^{-x^2} \cdot (-2x) \cdot \text{ב} \quad \cos(ax) \cdot a \cdot \text{א} \quad \text{(5)}$$

$$\frac{7x^5}{5} + C \cdot \text{ה} \quad 3x \cdot \text{ט} \quad x + C \cdot \text{ג} \quad \frac{x^2}{2} + C \cdot \text{ב} \quad \frac{x^8}{8} + C \cdot \text{א} \quad \text{(6)}$$

$$A \frac{x^8}{8} + B \frac{x^2}{2} + C \cdot \text{ט} \quad A \cdot \frac{x^8}{8} + C \cdot \text{ח} \quad x^8 + \frac{5}{2}x^2 + C \cdot \text{ז} \quad \cdot \text{ו}$$

$$31.875A + 1.5B \cdot \text{ה} \quad 58.67 \cdot \text{ט} \quad 341.6 \cdot \text{ג} \quad 16 \cdot \text{ב} \quad 10.67 \cdot \text{א} \quad \text{(7)}$$

$$\ln\left(\frac{5}{3}\right) \cdot \text{ח} \quad \frac{2}{3} \cdot \text{ט} \quad \frac{e^{3x}}{3} + C \cdot \text{ג} \quad 0 \cdot \text{ב} \quad 2 \cdot \text{א} \quad \text{(8)}$$

$$\frac{e^{ax}}{a} \cdot \text{ז} \quad -\frac{1}{x} + C \cdot \text{ו}$$

אינטגרל כפול ומשולש:

שאלות:

פתרו את האינטגרלים הבאים :

$$\int_1^2 \int_0^2 \int_0^3 (zx^2 + 3y) dy dx dz$$

1) אינטגרל משולש – דוגמה 1

$$\int_0^3 \int_0^2 3 \cdot x^3 y^2 dx dy$$

2) דוגמה 1

$$\int_1^2 \int_0^3 (x^2 + 2y) dx dy$$

3) דוגמה 2

$$\int_0^2 \int_0^3 (x^2 + y) dy dx$$

4) דוגמה 3

$$\int_0^1 \int_0^2 x \cdot z^2 dx dz$$

5) דוגמה 4

$$\int_1^5 \int_0^4 2 \cdot y^3 dy dz$$

6) דוגמה 5

$$\int_0^{2\pi} \int_0^3 r^2 dr d\theta$$

7) דוגמה 6

$$\int_a^b \int_0^c 4 \cdot x^2 y dx dy$$

8) דוגמה 7

$$\int_a^b \int_0^c (4z + r^2) dr dz$$

9) דוגמה 8

$$\int_0^{2\pi} \int_0^R 4a \cdot r^2 dr d\theta$$

10) דוגמה 9

$$\int_0^{2\pi} \int_0^R 4yr^2 dr d\theta$$

11) דוגמה 10

$$\int_0^\pi \int_0^{2\pi} r^2 \sin \varphi d\theta d\varphi$$

12) דוגמה 11

תשובות סופיות:

39 (1)

108 (2)

18 (3)

13.33 (4)

$\frac{2}{3}$ (5)

512 (6)

56.55 (7)

$$\frac{4c^3}{3} \left(\frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} \right) \quad (8)$$

$$2cb^2 + \frac{c^3}{3}b - 2ca^2 - \frac{a^3}{3} \quad (9)$$

$$\frac{4aR^3}{3} 2\pi \quad (10)$$

$$\frac{8\pi y R^3}{3} \quad (11)$$

$$4\pi r^2 \quad (12)$$

מעברי יחידות:

שאלות:

1) דוגמה 1

נתון : $A = 2\text{km}$, $B = 10\text{gr}$
מצא את $C = A \cdot B \cdot m \cdot s$ ביחידות של

2) דוגמה 2

נתון : $A = 2\text{m}^2$, $B = 3\text{gr}$, $C = 5\text{c.m} \cdot s$
חשב את הגודלים הבאים ביחידות של s.m.k.s :

- $D = 2 \cdot A$
- $E = \frac{5 \cdot B \cdot C}{A}$

3) מעבר יחידות בחזקות

מצא את הגודלים הבאים ביחידות של ס"מ :

- $A = 1\text{m}^2$
- $B = 1\text{m}^3$

4) סנטימטר בשלישית

הבע את הערכיים הנ"ל ביחידות של c.m^3 :

- 5.2m^3
- 320mm^3
- 0.0054km^3

5) ליטר, דוגמה

הבע את הגודלים הבאים ב- Liter :

- 5m^3
- 5mm^3

תשובות סופיות:

$$20\text{m} \cdot \text{kg} \quad \text{(1)}$$

$$37.5 \cdot 10^{-5} \frac{\text{sec} \cdot \text{kg}}{\text{m}} \quad \text{ב.} \quad 4\text{m}^2 \cdot \text{N} \quad \text{(2)}$$

$$10^6 \text{cm}^3 \quad \text{ב.} \quad 10^4 \text{cm}^2 \cdot \text{N} \quad \text{(3)}$$

$$5.4 \cdot 10^{12} \text{cm}^3 \cdot \text{ג.} \quad 0.32\text{cm}^3 \cdot \text{ב.} \quad 5.2 \cdot 10^6 \text{cm}^3 \cdot \text{א.} \quad \text{(4)}$$

$$5 \cdot 10^{-6} \text{Liter} \quad \text{ב.} \quad 5 \cdot 10^3 \text{Liter} \cdot \text{א.} \quad \text{(5)}$$

קואורדינטות אלמנטיים דיפרנציאליים:

שאלות:

1) דוגמה-זווית בין וקטורים

נתונים שני וקטורי מיקום:

הוקטור הראשון, \vec{r}_1 , נתון בקואורדינטות כדוריות כך ש:

$$r = 2m, \theta = 0^\circ, \varphi = 30^\circ$$

הוקטור השני, \vec{r}_2 , נתון בקואורדינטות גליליות כך ש:

$$r = 1m, \theta = 120^\circ, z = 2m$$

א. חשב את אורךו של כל וקטור.

ב. חשב את הזווית בין הוקטוריים.

2) שטח מעגל

חשב שטח דיסקה בעלת רדיוס R (שטח מעגל) באמצעות אינטגרל על אלמנט שטח בקואורדינטות פולריות.

3) חישוב נפח גליל

חשב נפח גליל באמצעות אינטגרל על אלמנט נפח בקואורדינטות גליליות.

תשובות סופיות:

$$\alpha = 48.5^\circ \quad \text{ב.} \quad |\vec{r}_1| = 2m, |\vec{r}_2| = \sqrt{5}m \quad \text{א.} \quad (1)$$

$$S = \pi R^2 \quad (2)$$

$$V = \pi R^2 h \quad (3)$$

צפיפות:

שאלות:

1) דיסקה עם חור

- א. מצא את הצפיפות של דיסקה בעלת רדיוס R ומסה M ?
- ב. בדיסקה קדחו חור ברדיוס r .
- מצא את המסה שהוצאה מהדיסקה.

תשובות סופיות:

$$M \left(\frac{r}{R} \right)^2 \quad \text{ב.} \quad \frac{M}{\pi R^2} \quad \text{א.} \quad (1)$$

צפיפות אינפיטיסימלית:

שאלות:

1) מוט עם צפיפות לא אחידה

$$\lambda(x) = \lambda_0 \frac{x}{L}$$

כאשר x הוא המרחק מהקצה השמאלי של המוט והפרמטרים: L, λ_0 הם קבועים.

תשובות סופיות:

$$\frac{\lambda_0 L}{2} \quad (1)$$

חשבון דיפרנציאלי:

שאלות:

1) נגזרת סתומה**

נתונה הפונקציה הבאה : $f(x, y) = y^{\sin x} + 6y + e^{x^2+y^2} = 0$

$$\text{ממצא את : } \frac{dy}{dx}$$

2) אלמנט אורך בהחלפת קואורדינטות**

נתונות קואורדינטות חדשות : $r' = \frac{1}{r^2}, \theta' = \frac{1}{2}\theta$

כאשר r ו- θ הם הקואורדינטות הפולריות.

ממצא את גודלו של אלמנט אורך dl כפונקציה של הקואורדינטות החדשות.

תשובות סופיות:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{(\ln y)(\cos x)(y^{\sin x}) + 2xe^{x^2+y^2}}{\sin x \cdot y^{(\sin x-1)} + 6 + 2ye^{(x^2+y^2)}} \quad (1)$$

$$dl^2 = \frac{1}{4} r'^{-3} dr'^2 + \frac{1}{r'} 4d\theta'^2 \quad (2)$$

פיזיקה 1 מכניתה

פרק 2 - וקטורים-

תוכן העניינים


19	1. הגדרות ופעולות בסיסיות
23	2. מכפלה סקלרית
28	3. וקטור יחידה
30	4. וקטור בשלושה ממדים
33	5. מכפלה וקטוריית בשלושה ממדים
37	6. וקטורים קולינריים
38	7. גראדיאנט ורוטור

הגדירות ופעולות בסיסיות:

רקע:

הציג וקטור באמצעות גודל וכיוון נקראת הצגה פולרית.
הציג וקטור באמצעות רכיבי ה- x וה- y נקראת הצגה קרטזית.

פירוק וקטור לריבבים:



כפל בסקלר:

$$\vec{B} = \alpha \vec{A} = \alpha (A_x, A_y) = (\alpha A_x, \alpha A_y)$$

שאלות:**1) חיבור וחיסור בקרטזי**

- נתונים שלושה וקטורים: $\vec{A}(1,3)$, $\vec{B}(4,2)$, $\vec{C}(3,5)$.
- חשבו את: $\vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$.
 - חשבו את: $\vec{A} - \vec{B} - \vec{C}$.
 - חשבו את: $2\vec{A} + 3\vec{B} - 4\vec{C}$.

2) חיבור וקטוריים בפולרי

נתונים שני וקטורים בהצגה הפולרית:

- הוקטור \vec{A} שגודלו 10 והזווית שלו עם ציר ה- x היא 30° .
 הוקטור \vec{B} שגודלו 8 והזווית שלו עם ציר ה- x היא 60° .
 מצאו את $\vec{A} + \vec{B}$.


3) עוד חיבור בפולרי

נתונים שני וקטורים:


- הוקטור \vec{A} שגודלו 10 וכיונו 30° ,
 הוקטור \vec{B} שגודלו לא ידוע וכיונו 350° .
 מהו גודלו של הוקטור \vec{B} אם נתון שסכום הוקטוריים ניתן וקטור ללא
 רכיב בציר ה- y ?

4) משואה של וקטורים

- שישה וקטורים בגודל L כל אחד יוצרים משואה שווה צלעות.
 מצאו את הוקטור השකול (גודל וכיון) בכל אחד מהמקרים הבאים:
 א.



ב.



5) וקטור בין שתי נקודות

הוקטור \vec{A} הוא וקטור מהנקודה (x_1, y_1, z_1) אל הנקודה (x_2, y_2, z_2) .
רשות ביטוי לרכיבים של הוקטור וממצא את גודלו.

6) חיבור באמצעות מקבילית

נתונים הוקטורים \vec{A} ו- \vec{B} .
גודלו של A הוא 8 והזווית שלו עם ציר ה- x החיובי היא: $\theta_A = 130^\circ$.
גודלו של הוקטור B הוא 4 והזווית שלו עם ציר ה- x החיובי היא: $\theta_B = 60^\circ$.
שרטט את הוקטורים על מערכת צירים ומצא את $\vec{B} + \vec{A}$ באמצעות שיטת המקבילית.

7) חיסור באמצעות מקבילית

נתונים הוקטורים \vec{A} ו- \vec{B} .
גודלו של A הוא 8 והזווית שלו עם ציר ה- x החיובי היא $\theta_A = 130^\circ$.
גודלו של הוקטור B הוא 4 והזווית שלו עם ציר ה- x החיובי היא $\theta_B = 60^\circ$.
שרטט את הוקטורים על מערכת צירים ומצא את $\vec{B} - \vec{A}$ באמצעות שיטת המקבילית.

8) מציאת אורך של שקל

אורכם של שני וקטורים הוא 5 ו-10 ס"מ.
הזווית ביניהם היא 30 מעלות.
מהו אורכו של הוקטור השקול שלהם (סכום הוקטורים)?

9) מציאת זווית בין שני וקטוריים

נתונים שני וקטורים שאורכם 10 ו-13 מטר.
אורך השקל שלהם הוא 20 מטר.
מציאת הזווית בין הוקטוריים.

תשובות סופיות:

ג. $(2, -8)$ ב. $(-6, -4)$ א. $(8, 10)$ **(1**

$(12.7, 11.9)$ **(2**

28.8 **(3**

$L \cdot 4 \cos(30)$ **(4**

$|\vec{A}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}, \vec{A} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$ **(5**

$C=10.1, \theta_c=108.1^\circ$ **(6**

$C=7.62, \theta_c=159.5^\circ$ **(7**

$|\vec{a}| = 14.6 \text{c.m}$ **(8**

$\theta = 60^\circ$ **(9**

מכפלה סקלרית:

רקע:

שתי דרכים לביצוע המכפלה:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x \cdot B_x + A_y \cdot B_y$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cdot \cos \alpha$$

α - זווית בין הוקטוריים.

תכונות המכפלה:

- תוצאת המכפלה היא תמיד סקלר (ולא וקטור).

- מכפלה בין וקטורים מאונכים מתאפשר (זו דרך לבדוק האם וקטוריים מאונכים)

- מכפלה סקלרית של וקטור בעצמו נותנת את גודל הוקטור בריבוע

- פתיחת סוגרים והעלאה בריבוע:

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \vec{C}$$

$$(\vec{A} + \vec{B})^2 = |\vec{A}|^2 + 2\vec{A} \cdot \vec{B} + |\vec{B}|^2$$

$$\cos \alpha = \frac{A_x B_x + A_y B_y}{|\vec{A}| \cdot |\vec{B}|} = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}| \cdot |\vec{B}|}$$

נוסחה למציאת זווית בין שני וקטוריים:


שאלות:

1) דוגמה 1

מצא את תוצאת המכפלה הסקלרית בין הוקטוריים הנתונים בכל המקרים הבאים :

א. $\vec{A} = (-1, 2), \vec{B} = (2, 2)$

ב.



(2) דוגמה 2

בדוק עבור זוגות הוקטוריים הבאים האם הם מאונכים:

א. $\vec{A} = (1, 4)$, $\vec{B} = (-2, 5)$

ב. $\vec{A} = (1, 4)$, $\vec{B} = (8, -2)$

ג. $\vec{A} = (-1, -2)$, $\vec{B} = (-2, 1)$

- ד. שרטט כל זוג וקטורים מאונכים על מערכת צירים, חשב את זוויות הוקטוריים עם הצירים והראה שהזווית בין הוקטוריים היא 90° .

(3) דוגמה 3

נתונים הוקטוריים הבאים: $\vec{A} = (-3, 1)$, $\vec{B} = (2, -4)$

- א. מצא את תוצאת המכפלה הסקלרית באמצעות החזויות הקרטזיות הנתונות.
 ב. מצא את הגודל והזווית של כל וקטור.
 ג. מצא את המכפלה הסקלרית שוב, הפעם באמצעות הנוסחה של מכפלת הגדלים בקושינוס הזווית. בדוק כי התוצאה זהה לסעיף א'.

(4) דוגמה 4

נתונים הוקטוריים הבאים: $\vec{A} = (-3, 1)$, $\vec{B} = (2, -4)$

- א. הראה כי החישוב של $\vec{B} \cdot \vec{A}$ זהה לחישוב $\vec{A} \cdot \vec{B}$.
 ב. הוכח בצורה כללית כי המכפלה הסקלרית היא פעולה קומוטטיבית.
 (הדריכה: רשום את הוקטוריים בצורה כללית עם נעלמים).

(5) דוגמה 5

נתונים הוקטוריים הבאים: $\vec{A} = (2, 1)$, $\vec{B} = (-3, 2)$, $\vec{C} = (1, -3)$

חשב את:

א. $\vec{A} \cdot \vec{C}$

ב. $(\vec{A} + \vec{B}) \cdot \vec{C}$

ג. $\vec{A} \cdot \vec{C} + \vec{B} \cdot \vec{C}$

ד. $(\vec{A} \cdot \vec{B}) \cdot \vec{C}$

ה. $\vec{A} \cdot (\vec{B} \cdot \vec{C})$

ו. $(\vec{A} \cdot \vec{B}) \cdot \vec{B}$

ז. $(\vec{A} \cdot \vec{B}) \cdot (\vec{B} \cdot \vec{C})$

6) דוגמה 6

נתונים הווקטורים הבאים : $\vec{A} = (-2, 2)$, $\vec{B} = (1, -3)$, $\vec{C} = (1, 5)$.
חשב את :

$$\frac{(\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{B}}{|\vec{B}|^2} . \text{ א.}$$

$$\frac{(\vec{B} \cdot \vec{C})\vec{C}}{|\vec{C}|^2} . \text{ ב.}$$

7) דוגמה 7

נתונים הווקטורים הבאים : $\vec{A} = (-2, 2)$, $\vec{B} = (1, -3)$, $\vec{C} = (1, 5)$.
מצא את הזווית בין \vec{A} ל- \vec{B} לבין \vec{B} ל- \vec{C} .


8) פירמידה משוכלلت*

באיור מתוארת פירמידה משוכללת שבבסיסה ריבוע בעל אורך צלע a וגובהה $H = 2a$. נקודה 3 נמצאת במרכז הצלע שבין הפינה לקודקוד. נגידיר שני ווקטורים :

הווקטור \vec{A} יוצא מנקודה 1 לנקודה 2.

הווקטור \vec{B} יוצא מנקודה 1 לנקודה 3.

מהי הזווית בין שני הווקטורים?




9) היטלים של וקטורים בתוך תיבה

נתונה תיבה בעלת אורך צלעות : a , $3a$ ו- $4a$. נגידר שני וקטורים : \vec{A} ו- \vec{B} כמתואר באיור.

א. מהו היחס בין ההיטל של \vec{A} על הכיוון של \vec{B} (נסמןו - A_B) להיטל של \vec{B}

$$\text{על הכיוון של } \vec{A} \text{ (נסמןו - } B_A), ? \quad \frac{A_B}{B_A}$$


ב. חשבו את הזווית בין \vec{A} ל- \vec{B} .



10) היטל של אלכסון על אלכסון בקובייה

נתונה קובייה בעלת אורך צלע a , ראו איור.


מהו היחס של הווקטור המצביע מפינה 1 לפינה 4 על הציר המוגדר על ידי
הכיוון מפינה 3 לפינה 2.




תשובות סופיות:

ב. $\vec{C} \cdot \vec{D} = -5.13$ א. $\vec{A} \cdot \vec{B} = 2$ (1)

- ג. הוקטורים מאונכים.
ב. הוקטורים מאונכים.
א. \vec{A} לא מאונך ל- \vec{B} .



לסעיף ג':



לסעיף ב':

. $\theta_A = 26.57^\circ, \theta_B = 26.57^\circ$

. $\theta_A = 75.96^\circ, \theta_B = 14.04^\circ$

ב. $|\vec{B}| = \sqrt{20}, \theta_B = -63.43^\circ, |\vec{A}| = \sqrt{10}, \theta_A = 161.57^\circ$ א. $\vec{A} \cdot \vec{B} = -10$ (3)

א. $\vec{A} \cdot \vec{B} = -10$

ב. שאלת הוכחה.

א. שאלת הוכחה. (4)

ג. $\vec{A} \cdot \vec{C} + \vec{B} \cdot \vec{C} = -10$

ב. $(\vec{A} + \vec{B}) \cdot \vec{C} = -10$

א. $\vec{A} \cdot \vec{C} = -1$ (5)

ה. $(\vec{A} \cdot \vec{B}) \cdot \vec{B} = (12, -8)$ ו. $\vec{A} \cdot (\vec{B} \cdot \vec{C}) = (-18, -9)$ ז. $(\vec{A} \cdot \vec{B}) \cdot \vec{C} = (-4, 12)$ ט.

(ז). $(\vec{A} \cdot \vec{B}) \cdot (\vec{B} \cdot \vec{C}) = 36$

ב. $\frac{(\vec{B} \cdot \vec{C}) \vec{C}}{|\vec{C}|^2} = (-0.54, -2.69)$ ז. $\frac{(\vec{A} \cdot \vec{B}) \vec{B}}{|\vec{B}|^2} = \left(\frac{-8}{10}, \frac{24}{10} \right)$ נ. (6)

א. $\alpha_{\vec{B}\vec{C}} = 150.26^\circ, \alpha_{\vec{A}\vec{B}} = 153.43^\circ$ (7)

ב. 40.6° ג. 59° (8)

ז. $\frac{\sqrt{10}}{5}$ נ. (9)

א. $-\frac{a}{\sqrt{3}}$ (10)

וקטור ייחידה:

רקע:

$$\hat{\mathbf{A}} = \frac{\vec{\mathbf{A}}}{|\vec{\mathbf{A}}|}$$


שאלות:

1) דוגמה וקטור ייחידה

מצא וקטורי ייחידה בכיוון של הוקטוריים הבאים :

א. $\vec{\mathbf{A}} = (-2, -3)$

ב. $\vec{\mathbf{B}} = (3, 4)$



2) הטלת וקטור ייחידה על וקטור ייחידה

נתון וקטור $\vec{\mathbf{A}}$ שבסרטוט.

א. מהו היטל הווקטור על ציר ה- x (וקטור ייחידה)?

ב. מהו היטל הווקטור על ציר ה- y (וקטור ייחידה)?

ג. הסבר כיצד מחשבים היטל הווקטור על הווקטור $\vec{\mathbf{B}} = (2,1)$.

ד. הסבר במילים את משמעותה של הטלה של וקטור על וקטור.

3) וקטור בזמן

נתון וקטור $\vec{\mathbf{A}}(t)$ במישור דו מימדי כך ש- $\vec{\mathbf{A}}(t) = A_0 \sin(\theta(t)) \mathbf{i} + A_0 \cos(\theta(t)) \mathbf{j}$

א. מצא את $\theta(t)$ כאשר $t \in [0, \pi]$ ו- A_0 קבוע.

ב. מצא את $\frac{d\vec{\mathbf{A}}}{dt}$.

ג. מצא את $\frac{d\vec{\mathbf{A}}^u}{dt}$

תשובות סופיות:

$$\hat{\mathbf{B}} = (0.6, 0.8) \text{ נ. ב.} \quad \hat{\mathbf{A}} = (-0.55, -0.83) \text{ נ. א.} \quad (1)$$


$$\text{ג. ראה סרטון} \quad \overset{\mathbf{I}}{\hat{\mathbf{A}}}_{\hat{y}} = (0, 3) \text{ נ. ב.} \quad \overset{\mathbf{I}}{\hat{\mathbf{A}}}_{\hat{x}} = (4, 0) \text{ נ. א.} \quad (2)$$

$$\mathbf{A}_0 (\cos 2t\hat{x} + \sin 2t\hat{y}) \text{ נ. ב.} \quad \mathbf{A}_x(t) = \frac{1}{2} \mathbf{A}_0 \sin 2t, \mathbf{A}_y(t) = \mathbf{A}_0 \sin^2 t \text{ נ. א.} \quad (3)$$

$$-\sin t\hat{x} + \cos t\hat{y} \text{ נ. ג.}$$

וקטור בשלושה ממדים:

רקע:



$$0 \leq \varphi \leq \pi$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi$$

מציאת גודל הוקטור :

$$\cdot |\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

פירוק לרכיבים :

$$\cdot A_z = |\vec{A}| \cos \varphi$$

$$\cdot A_{xy} = |\vec{A}| \sin \varphi$$

$$\cdot A_x = |\vec{A}| \sin \varphi \cos \theta$$

$$\cdot A_y = |\vec{A}| \sin \varphi \sin \theta$$

שאלות:**1) חישוב וקטור יחידה**נתון הווקטור: $\vec{A}(2,3,4)$.

א. מהו גודלו של הווקטור?

ב. מהו וקטור היחידה של הווקטור \vec{A} ?**2) חישוב גודל זווית בקרטזי**נתונים שני וקטורים: $\vec{A}(1,5,10)$, $\vec{B}(3,4,5)$.

א. מהו גודלו של כל וקטור?

ב. מהי הזווית בין שני הווקטורים?

3) מציאת שקל וזווית עם הציריםשני כוחות נתוניים פועלים על גוף: $\vec{A}(1,4,5)$, $\vec{B}(3,6,7)$.

א. מהו הכוח השקל?

ב. מהו גודלו של הכוח השקל?

ג. מהי הזווית בין הכוח השקל ובין כל אחד מהצירים?

4) וקטור בזווית 30° עם ציר Y - ספיר אפק מעבראילו מהו וקטוריים הבאים נמצא בזווית של 30° מכך?


$$\vec{A} = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \quad \vec{B} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}, 1 \right) \quad \vec{C} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{3}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

5) היטל של A על 150 מעלות מכך yנתון הווקטור: $\vec{A} = \hat{x} + \sqrt{3}\hat{y} + 6\hat{z}$.מהו ההיטל של הווקטור \vec{A} על ציר \hat{n}

המצא במשור z-y וכיוונו החיובי

מסובב בזווית של 150° מכך y נגד

כיוון השעון?



6) שהסכום מאונך להפרש

הוכח- אם סכום של שני וקטורים מאונך להפרש אזי אורכם שווה.

7) מציאת וקטור מאונך

נתונים 2 וקטורים : $\vec{A}(1,4,8)$, $\vec{B}(B_x, B_y, 0)$

מצא את מרכיבי וקטור B אם נתון כי הוא ניצב לוקטור A וגודלו 10.

תשובות סופיות:

$$\hat{A} = \left(\frac{2}{\sqrt{29}}, \frac{3}{\sqrt{29}}, \frac{4}{\sqrt{29}} \right) . \quad \text{ב.} \quad |A| = \sqrt{29} . \quad \text{א.} \quad (1)$$

$$\alpha = 23^\circ . \quad \text{ב.} \quad |\vec{A}| = \sqrt{126} , \quad |\vec{B}| = \sqrt{50} . \quad \text{א.} \quad (2)$$

$$\alpha = 75.63 , \beta = 51.67 , \gamma = 41.90 . \quad \text{ג.} \quad |C| = \sqrt{260} . \quad \text{ב.} \quad \vec{C} = (4,10,12) . \quad \text{א.} \quad (3)$$

הוקטור C. **(4)**

1.5 **(5)**

שאלת הוכחה. **(6)**

$$\vec{B} = \left(-4\sqrt{\frac{100}{17}}, \sqrt{\frac{100}{17}}, 0 \right) \quad (7)$$

מכפלה וקטורית בשלושה ממדים:

רקע:


שתי דרכים לביצוע המכפלה:

דרך 1 – דטרמיננטה:

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

דרך 2 – לפי גודל וכיוון בנפרד:
גודל המכפלה - $|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| |\sin \alpha|$

כיוון לפי כלל יד ימין -



יש כמה דרכים לבצע את הכלל, אם מחליפים אצבעות לכל שלושת הוקטוריים הכלל נשאר נכון (אם מחליפים מקום רק לשני וקטוריים – טעות).

דרך נוספת ל כלל יד ימין נקראת כלל הבורג



מסובבים את האצבעות מ- \vec{A} ל- \vec{B} והתוצאה בכיוון האגדול.

שאלות:**1) דוגמה - דטרמיננטה**

נתונים הוקטורים הבאים :


$$\vec{A}(-1,2,-2), \vec{B}(2,0,1)$$

חשבו את $\vec{A} \times \vec{B}$.**2) דוגמה - כלל יד ימין**מצאו את $\vec{B} \times \vec{A}$ במקרים הבאים :

ב.


$$\vec{B} \otimes$$

$$\xrightarrow{\vec{A}}$$


**3) דוגמה - מערכות ציריים**

בדקו האם המערכות הבאות הן ימניות או שמאליות :

א.



ב.



4) דוגמה - כלל הבורגמצאו את $\vec{B} \times \vec{A}$ באמצעות כלל הבורג:

$$\vec{B} \quad \begin{cases} \vec{A} \\ \downarrow \end{cases} \quad \text{א. ג}$$

$$\vec{B} \otimes \quad \text{ב. ע}$$

$$\xrightarrow{\vec{A}}$$

$$\vec{A} \odot \quad \begin{cases} \vec{B} \\ \downarrow \end{cases} \quad \text{ג.}$$

5) מקבילוןנתונים הוקטוריים הבאים: $\vec{a} = 2\hat{x} - 3\hat{y} + \hat{z}$, $\vec{b} = \hat{x} + 2\hat{y} - \hat{z}$, $\vec{c} = 2\hat{x} - \hat{y}$,מרכזיבים מהוקטוריים \vec{a} ו- \vec{b} מקבילית ובוחרים את ראשית הצירים בקודקוד המקבילית (הנח כל היחידות בס"מ).

א. מצאו את מיקומו של הקודקוד שמל回首 הראשית הצירים.

ב. מצאו את אורכי האלכסונים של המקבילית.

ג. מצאו את שטח המקבילית.

ד. יוצרים מקבילון על ידי הוספת הוקטור \vec{c} למקבילית.

חשבו את גובה המקבילון המאונך למקבילית.

רמז: השתמש ב- $\vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$.

תשובות סופיות:

- ג. $2\hat{x} - 3\hat{y} - 4\hat{z}$ (1)
- ב. למעלה (2) א. לתוך הדף
- ב. שמאלית (3) א. שמאלית
- ב. למטה (4) א. לתוך הדף
- $|\vec{a} \times \vec{b}| = \sqrt{59} \text{ c.m}^2$. ג. $|\vec{r}_1| = \sqrt{10}$, $|\vec{r}_2| = \sqrt{30}$ (5) א. $\vec{r}_1 = (3, -1, 0)$
- ד. $\tilde{h} = 0.13 \text{ c.m}$.

וקטוריים קולינריים:

ركע:

וקטוריים מקבילים ומתקיים הקשר $\vec{A} = \alpha \vec{B}$ כאשר α סקלר כלשהו.

שאלות:

1) וקטוריים קולינריים

עבור אילו ערכים של α ו- β הווקטוריים הבאים קולינריים
(מצביים באותו כיוון)?

$$\vec{A} = 3\hat{i} + a\hat{j} + 5\hat{k}$$

$$\vec{B} = -2\hat{i} + a\hat{j} - 2\beta\hat{k}$$

2) מציאת וקטוריים מאונכים

נתונים הווקטוריים הבאים : $\vec{A}(A_x, 4)$, $\vec{B}(6, B_y)$, $\vec{C}(5, 8)$.
מצא את ערכי הווקטוריים כך שהוקטור A והוקטור B יהיו מאונכים לוקטור C.
האם שני הווקטוריים שמצאת מקבילים?

תשובות סופיות:

$$\alpha = -\frac{9}{2}, \beta = \frac{5}{3} \quad (1)$$

$$\vec{A} = \left(-\frac{32}{5}, 4 \right), \vec{B} = \left(6, -\frac{30}{8} \right) \quad (2)$$

גרדיינט ורוטור:

רקע:

גרדיינט בקואורדינטות השונות:

$$\text{גרדיינט בקואורדינטות קרטזיות : } \vec{\nabla}f = \frac{\partial f}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z}\hat{z}$$

$$\text{גרדיינט בקואורדינטות גליליות : } \vec{\nabla}f = \frac{\partial f}{\partial r}\hat{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\hat{\theta} + \frac{\partial f}{\partial z}\hat{z}$$

$$\text{גרדיינט בקואורדינטות כדוריות (*) : } \vec{\nabla}f = \frac{\partial f}{\partial r}\hat{r} + \frac{1}{r \sin \varphi} \cdot \frac{\partial f}{\partial \theta}\hat{\theta} + \frac{1}{r \sin \varphi} \frac{\partial f}{\partial \varphi}\hat{\varphi}$$

(*) שימושו לב שהזווית φ היא עם ציר ה- z והזווית θ עם ציר x .

רוטור (Rot/Curl) בקואורדינטות השונות:

בקרטזיות :

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \hat{x} - \left(\frac{\partial F_z}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial z} \right) \hat{y} + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \hat{z}$$

בגליליות :

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial F_z}{\partial \theta} - \frac{\partial F_\theta}{\partial z} \right) \hat{r} + \left(\frac{\partial F_r}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial r} \right) \hat{\theta} + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(rF_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial F_r}{\partial \theta} \right) \hat{z}$$

בכדוריות (*) :

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \frac{1}{r \sin \varphi} \left(\frac{\partial}{\partial \varphi} (F_\theta \sin \varphi) - \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta} \right) \hat{r} + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r} (rF_\varphi) - \frac{\partial F_r}{\partial \varphi} \right) \hat{\theta} + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin \varphi} \frac{\partial F_r}{\partial \theta} - \frac{\partial}{\partial r} (r \cdot F_\theta) \right) \hat{\varphi}$$

(*) שימושו לב שהזווית φ היא עם ציר ה- z והזווית θ עם ציר x .

שאלות:**1) חישוב גרדיאנט**

$$f(\vec{r}) = f(x, y, z) = \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}} : \text{נתונה פונקציית המיקום } f$$

חשב את הגרדיאנט של הפונקציה f .

2) חישוב השיפוע בכיוון השונה

חשב את גודל השיפוע של הפונקציה $f(x, y) = 2x^2y$ בנקודה $(1, 2)$:

$$\hat{n} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) : \text{בכיוון:}$$

תשובות סופיות:

$$\vec{D}f = \frac{-xz\hat{x} - yz\hat{y} + (x^2 + y^2)\hat{z}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (1)$$

$$\vec{\nabla}f \cdot \hat{n} = \frac{8}{\sqrt{2}} + -\frac{2}{\sqrt{2}} \quad (2)$$

פיזיקה 1 מכניתה

פרק 3 - קינמטיקה -

תוכן העניינים

1. תנועה בקו ישר (מייד אחד)	40
2. תנועה במשור וזריקה משופעת (בליסטיקה)	51
3. משוואת מסלול	55
4. תאוצה נורמלית ומשיקית ורדיויס עקומות	56
5. תרגילים נוספים	59

תנועה בקו ישר (מיינד אחד):

רקע:

הגדרות :

$$\text{מהירות רגעית} - \dot{x} = \frac{dx}{dt}$$

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} - \text{מהירות ממוצעת}$$

$$a = \frac{dv}{dt} = \dot{v} = \frac{d^2x}{dt^2} - \text{תאוצה רגעית}$$

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i} - \text{תאוצה ממוצעת}$$

קשרים הפוכים :

$$x(t) = \int v(t) dt$$

$$v(t) = \int a(t) dt$$

את האינטגרל אפשר לעשות לא מסוים (בלי גבולות) ואז צריך להוסיף קבוע או מסוים (עם גבולות)

מקום ומהירות כתלות בזמן בתאוצה קבועה :

$$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} at^2$$

$$v(t) = v_0 + at$$

שטח מתחת לגרף הפונקציה :

- השטח מתחת לגרף הפונקציה של המהירות (כתלות בזמן) שווה להעתק (כאשר שטח מתחת לציר הזמן מחושב כשלילי , אם מחשבים אותו חיובי אז מקבלים את הדרך)

- השטח מתחת לגרף של התאוצה (כתלות בזמן) הוא שינוי המהירות (שטח מתחת לציר הזמן מחושב כשלילי)

שאלות:**1) דני ודן רצים זה לקראת זו**

דני ודן רצים זה לקראת זו.

שניהם מתחילה לרוץ ממנוחה.

דני רץ בתאוצה של 0.5 מטר לשנייה ברכיבוע ודן בתאוצה של 1 מטר

לשנייה ברכיבוע.

המרחק ההתחלתי ביןיהם הוא 50 מטר.

א. מתי והיכן יפגשו דני ודן?

ב. מה מהירות כל אחד מהם ברגע המפגש?

2) דני שכח את הפלאפון

דני רץ בכו ישר במהירות קבועה שגודלה 14 מטר לשנייה.

ברגע מסוים מבחין יוסי כי דני שכח את הפלאפון שלו.

באותו הרגע נמצא דני כבר במרחק של 64 מטר מjosי.

josי מתחילה לרוץ אחר דני ממנוחה בתאוצה קבועה של 8 מטר לשנייה ברכיבוע.

א. מצא ביטוי למהירות כתלות בזמן עברו דני וjosי.

شرط גרפים עבור שני הביטויים שמצאות על אותה מערכת ציריים.

ב. מתי מהירותו של josי שווה לו של דני? האם הוא מSIG את דני ברגע זה?

ג. מצא ביטוי למקומות כתלות בזמן עברו דני וjosי.


شرط גרפים עבור שני הביטויים שמצאות על אותה מערכת ציריים.

ד. מתי ישיג josי את דני? כמה מרחק עבר josי עד אז?

3) גרף של מהירות אופנווע בזמן

בגרף הבא נתונה מהירותו של אופנווע כתלות בזמן. האופנווע נע על קו ישר.

קבע את ראשית הציריים במקום ההתחלה של האופנווע.



א. תאר את סוג התנועה של האופנווע בכל אחד מקטעי התנועה.


ב. מצא את תאוצת האופנווע כתלות בזמן.

ג. מהי מהירות האופנווע ברגעים: $t = 15$, 40 , 55 ? $t = ?$

ד. מצא את מקום האופנווע באותו רגעים של סעיף ג'.

4) גרפ' מהירות של שני גופים

הגרף הבא מတוארות המהירות של שני גופים כתלות בזמן.
הנח שני הגוף נעים לאורך קו ישר ויוצאים מהראשית.




- תאר את תנועתו של כל גוף.
- רשם נוסחת מקום זמן לכל גוף.
- מצא את המרחק בין הגוף ברגעים: $t = 3s$, $24s$ וציין מי מקדים את מי.
- מתי מהירותם שני הגוף שווות?
- מתי מקום שני הגוף זהה?

5) תרגיל עם הכל

הגרף הבא מתאר את מהירותו של גוף הנע בקו ישר.
הנח שהגוף מתחילה את תנועתו מהראשית. הגוף נע במשך 10 שניות ונעצר.

- תאר את התנועה של הגוף במילימטרים.
- شرط גרפ' של התואча כתלות בזמן של הגוף.
- מתי נמצא הגוף במרחק הגדול ביותר (בכיוון החיובי) מהראשית?
מהו מרחק זה?
- מהו המרחק הכללי שעבר הגוף?
- מהו העתק הכללי שעשה הגוף?
- מתי המהירות הממוצעת של הגוף בתנועה?
- מהו מרחק הגוף מהראשית ב- $t = 6 \text{ sec}$?
- מתי נמצא הגוף במרחק 12 מטרים מהראשית?
- شرط גרפ' של מיקומו של הגוף כתלות בזמן, אין צורך לסמן ערכיהם בציר
האנכי של הגרף.



6) תפוח עץ

תפוח נופל מעץ בגובה 15 מטרים.

(הנח שההתפוח נופל ממנוחה והזנחה את התנגדות האוויר).

א. מצא את המהירות בה יפגע התפוח בקרקע.

ב. מצא את המהירות בה יפגע התפוח בראשו של ניטון היושב מתחת לעץ.

הנח שגובה הראש של ניטון בישיבה הוא אחד מטר.

7) חסידה מביאה חבילה

חסידה מרחתת במנוחה באוויר וمفילה חבילה מגובה של 320 מטרים.

א. מצא את העתק שمبرעת החבילה בשנייה הרביעית של תנועתה.

ב. מצא את העתק שمبرעת החבילה בשנייה האחרונה של תנועתה.

8) דני זורק כדור מחלון גבורה

דני זורק כדור כלפי מעלה מחלון ביתו הנמצא בגובה 105 מטרים מעל הקרקע (בניין גבורה). מהירות הcador ישר אחריו הזירה היא 20 מטר לשנייה.

סמן את כיוון הציר החיווי כלפי מעלה ואת ראשית הצירים בנקודת הזירה.

א. רשום נוסחים מקום זמן ומהירות זמן עברו הcador.

ב. הכן טבלה ורשום בטבלה את הערכיהם של המיקום והמהירות ב-6
השניות הראשונות.

ג. צייר את מיקום הcador בכל שנייה ב-6 השניות.

ד. מתי יפגע הcador בקרקע?

ה. חזר על סעיפים א' ו-ד' במקרה שבו ראשית הצירים בקרקע.

9) גוף נזרק אנכית מגג בניין

גוף נזרק אנכית כלפי מעלה מגג בניין שגובהו 40 מטר.

מהירותו ההתחלתית של הגוף היא 30 מטר לשנייה.

בחר ציר y שראשיתו בקרקע וכיונו החיווי כלפי מעלה.

א. רשום את פונקציית המיקום-זמן, מהירות-זמן ותאוצה-זמן של הגוף.

ב. עורך טבלה של מהירותו ומיומו בזמן: $t = 0, 1, 2, 3, 4, 5 \text{ sec}$.

ג. שרטט גרפים עבור שלושת הפונקציות שחישבת בסעיף א'.

10) כדור נזרק מלמعلת וגוף נזרק מלמיטה

כדור נזרק כלפי מטה מרأس בניין שגובהו 80 מטר. מהירותו ההתחלתית של הכדור היא 15 מטר לשנייה. באותו הרגע נזרק גוף שני מתחתי הבניין כלפי מעלה. מהירותו ההתחלתית של הגוף השני היא 40 מטר לשנייה.

- רשות נוסחת מקום-זמן עבור כל הגוף.
- האם הגוף השני יעבור את גובה הבניין?
- היכן ביחס לרצפת הבניין יחלפו הגוף אחד ליד השני?
- רשות נוסחת מהירות-זמן לכל הגוף.
- מה תהיה מהירות כלגוף ברגע המפגש?
- מהי מהירות הפגיעה בקרקע של כל הגוף?
- شرط גרף מהירות-זמן וגרף מיקום זמן לכל הגוף.

11) מהירות בנקודת של פולינום

גוף נע בקו ישר ומיקומו כתלות בזמן נתון לפי : $x(t) = 2t^3 - 12t + 30$ כאשר הזמן בשניות והמקום במטרים.

- מצאו את המהירות כתלות בזמן.
- מתי הגוף נעצר?

12) תנועה בקו ישר, מהירות בנקודת

מיקומו של הגוף הנע בקו ישר נתון לפי : $x(t) = 32te^{-t}$.

- מצא את הזמן בו הגוף נעצר.
- מצא את מרחק הגוף ברגע זה מהראשית.

13) תנועה בקו ישר, מהירות בנקודת ותאוצה

גוף נע בקו ישר ומיקומו כתלות בזמן נתון לפי : $x(t) = -2t^3 + 6t + 3$ כאשר הזמן בשניות והמקום במטרים.

- מצאו את המהירות כתלות בזמן ואת הרגע בו הגוף נעצר.
- מהו המרחק המקסימלי אליו הגיע הגוף?
- מהי תאוצת הגוף?

14) תאוצה מפוצלת

גוף נקודתי מתחילה לנوع מנוחה ונוע בקו ישר.

$$a(t) = \begin{cases} t \left[\frac{m}{sec^2} \right], & 0 \leq t \leq 3 [sec] \\ 5 - t \left[\frac{m}{sec^2} \right], & 3 < t [sec] \end{cases}$$

תאוצת הגוף תלולה בזמן ונתונה לפי:

תנועת הגוף נמשכת עד לרגע בו הוא עצר.

א. מהי מהירות הגוף בזמן?

ב. מהי המהירות המרבית של הגוף במהלך התנועה?

ג.מתי עצר הגוף?

ד. איזה מרחק (העתק) הוא עובר עד לעצירה?

15) מהירות מינימלית

גוף נע בקו ישר ומיקומו כתלות בזמן נתון לפי: $x(t) = \alpha t^3 - \beta t^2 + \gamma t$

כל היחידות סטנדרטיות (מיקום במטר וזמן בשניות).

א. מהן היחידות של γ , β , α ?

ב. מהו מיקום הגוף ב- $t=0$?

ג. מצאו את המהירות ההתחלתית של הגוף.

ד. מצאו מהי התאוצה ההתחלתית של הגוף.

ה. חשבו את המהירות המינימלית של הגוף כפונקציה של הקבועים בבעיה ומצאו מה התנאי שצרכיים למלא הקבועים על מנת שאכן תהיה מהירות מינימלית.

16) ילד זורק כדור בקפיצה*

ילד מנסה לזרוק כדור לתקраה של הכיתה אך איןו מצליח להגיע עד לתקרה. המורה לפיזיקה שהבחן בניסיונותיו של הילד הציע לו שיזורק את הcador תוך כדי קפיצה בכיוון מעלה.

א. האם המורה צודק? לאיזה גובה הגיע הcador אם הילד קופץ ומיד זורק את הcador כלפי מעלה? הניחו שמהירות הקפיצה של הילד היא v_1 ומהירות

הזריקה של הcador v_2 ביחס לילד היא אותו הדבר.

הניחו שזריקת הcador לא משפיעה על הילד.

ב. בטאו את העתק של הילד ושל הcador כפונקציה של הזמן בו הילד זורק את הcador.

17) זמן מינימלי לסיים מסלול*

מכוניות יכולה להאיץ מאפס ל-100 קמ"ש תוך 10 שניות, כאשר ניתן להניע שקצב ההאצה קבוע. אותה מכוניות יכולה לבולום בקצב של 0.5g מהו הזמן המינימלי לעبور מסלול של 3 ק"מ אם המכונית מתחילה ממנוחה ומסיימת בעצרה מוחלטת? (רמז : השתמש בגרף מהירות זמן).

18) כמה זמן הרכבת נסעה ב מהירות קבועה*

רכבת יוצאת מישוב'A אל יישוב'B.
בשליש הראשון של הדרך הרכבת מאייצה בתאוצה קבועה.
בשליש השני של הדרך הרכבת נוסעת ב מהירות קבועה.
בשליש האחרון של הדרך הרכבת מאטה בקצב קבוע עד לעצרתה ביישוב'B.
זמן הנסעה הכלול הוא T.
כמה זמן נסעה הרכבת ב מהירות קבועה?


19) אדם משחרר כדור מתוך מעלית*

מעלית עולה מגובה הקרקע ב מהירות קבועה.
בזמן T_1 , אדם הנמצא במעלית משחרר כדור מתוך המעלית דרך חרור שברצפת המעלית.
הכדור מגיעה לקרקע מעבר T_2 שניות.
מצאו את גובה המעלית h בזמן T_1 .
נתונים T_1 ו- T_2 .

תשובות סופיות:


1) א. הזמן : $t = 8.16 \text{ sec}$, המיקום : 16.65 m

$$V_{\text{Dana}}(t=8.16) = -8.16 \frac{\text{m}}{\text{sec}}, V_{\text{Dani}}(t=8.16) = 4.08 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$$



2) א. דני - יוסי - . $V(t) = 8t$, $V(t) = 14 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$

ב. לא. $t = 1.75 \text{ sec}$



ד. ב- 149.82m, $t = 6.12 \text{ sec}$

3) א. כאשר $0 \leq t \leq 20$ (חלק I), התאוצה חיובית וקבועה, והמיקום הולך ונגדל.

כasher $20 \leq t \leq 50$ (חלק II), מהירות קבועה (אין תאוצה) והמיקום גדל.

כasher $50 \leq t \leq 60$ (חלק III), התאוצה קבועה ושלילית והמיקום הולך ונגדל.

$$a = \begin{cases} 2 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} & 0 < t < 20 \\ 0 & 20 < t < 50 \\ -4 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} & 50 < t < 60 \end{cases}$$

$$V(t=15) = 30 \frac{\text{m}}{\text{sec}}, V(t=40) = 40 \frac{\text{m}}{\text{sec}}, V(t=55) = 20 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$$

$$x(t=15) = 225 \text{ m}, x(t=40) = 1,200 \text{ m}, x(t=55) = 1,750 \text{ m}$$

4) א. גוף א': תנועה בתאוצה קבועה, האצה. ההתקדמות בכיוון חיובי.

גוף ב': כאשר $8 \leq t < 0$, כמו גוף א'. כאשר $t > 8$,

תנועה ב מהירות קבועה בכיוון חיובי.


$$\text{ב. גוף א': } \frac{2}{3}t^2, \text{ גוף ב': } \text{כasher } 0 \leq t \leq 8, \text{ כמו גוף א'}$$

$$\text{כasher } x(t) = 96 + 24(t-8), 8 \leq t \leq \infty$$

$$\text{ג. כ- 96m, וכ- 7.5m. } \Delta x(t=24) = 96 \text{ m}, \Delta x(t=3) = 7.5 \text{ m}$$

$$\text{ה. כ- 31.42 sec, כ- 18 sec.}$$

- 5) א. כאשר $0 \leq t \leq 3$ (חלק I), תאוצה קבועה, האצה והתקדמות בכיוון החיובי.
 כאשר $3 \leq t \leq 5$ (חלק II), תנועה ב מהירות קבועה, התקדמות בכיוון החיובי.
 כאשר $5 \leq t \leq 9$ (חלק III), תאוצה קבועה שלילית.
 תאוצה עד אשר המהירות מתאפסת, אז מתחילה האצה בכיוון הנגדי.
 התקדמות בכיוון החיובי עד שהמהירות מתאפסת ואז מתחילה לחזור בכיוון הנגדי.
 כאשר $9 \leq t \leq 10$, תאוצה קבועה חיובית, תאוצה. התקדמות בכיוון הנגדי.




ג'. גורן: $a = \begin{cases} 2 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} & 0 < t < 3 \\ 0 & 3 < t < 5 \\ -2.5 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} & 5 < t < 9 \\ 4 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} & 9 < t < 10 \end{cases}$

ה. $\Delta x = 23\text{m}$

ד. $S = 33.4\text{m}$

. 28.2m : 7.4\text{sec} . ו. $\bar{V} = 2.3 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$




ו. $V_F \approx 16.73 \quad \text{ב. } 17.32 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ א. 6

ב. $40 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ א. 80m 7

ג. א. מקום-זמן: $V(t) = 20 - 10t$, $y(t) = 20t - 5t^2$ ב.

7 sec . ד

. ג.



זמן (שניות)	מקום (מטר)	מהירות (מטר לשנייה)
1	15	10
2	20	0
3	15	-10
4	0	-20
5	-25	-30
6	-60	-40

ה. (א) מקום-זמן: $V(t) = 20 - 10t$. מהירות-זמן: $y(t) = 105 + 20t - 5t^2$

ד. 7 sec


9 א. מיקום-זמן : $y(t) = 40 + 30t - 5t^2$, מהירות-זמן : $v(t) = 30 - 10t$

תאוצה-זמן : $a = -10$


.ב.

זמן (שניות)	מקום (מטר)	מהירות (מטר לשנייה)
0	40	30
1	65	20
2	80	10
3	85	0
4	80	-10
5	65	-20


תאוצה-זמן :



מהירות-זמן :



ג. מיקום-זמן :



10 א. גורף 1 - כדור : $y_1(t) = 80 + (-15)t - 5t^2$, גורף 2 - ריבוע : $y_2(t) = 40 - 10t$

ב. $v_1(t) = -15 - 10t$: 1. גורף 1 : 47.74m

ג. גורף 2 : 47.74m

ד. גורף 1 - בדיקת גובהו.



$$25.4 \frac{\text{m}}{\text{sec}} : 2 \text{ גורף 1} , -29.6 \frac{\text{m}}{\text{sec}} : 1 \text{ גורף 2}$$

$$v_2(t) = 40 - 10t : 2 \text{ גורף 2}$$

$$-40 \frac{\text{m}}{\text{sec}} : 2 , -42.72 \frac{\text{m}}{\text{sec}} : 1 \text{ גורף 1}$$

מהירות-זמן :

ז. מיקום-זמן : (גורף 1 בכחול, גורף 2 בירוק)



$$t = \sqrt{2} \text{ sec . ב.}$$

$$v = 6t^2 - 12 \text{ נ. (11)}$$

$$x(t=1) = \frac{32}{e} \text{ ב.}$$

$$t = 1 \text{ sec . נ. (12)}$$

$$a = -12t \text{ נ.}$$

$$X_{\max} = 7 \text{ m . ב.} \quad v(t) = -6t^2 + 6 , t = 1 \text{ sec . נ. (13)}$$

$$V_{\max} = 6.5 \frac{m}{sec} . \text{ג}$$

$$V(t) = \begin{cases} \frac{t^2}{2} \left(\frac{m}{sec} \right) & 0 \leq t \leq 3 \\ \left(5t - \frac{t^2}{2} - 6 \right) \left(\frac{m}{sec} \right) & 3 \leq t \end{cases} . \text{א (14)}$$

$$\Delta x \approx 31.79m . \text{ט} \quad t_2 \approx 8.61 . \text{ג}$$

$$\gamma . \text{ג} \quad 0 . \text{ב} \quad [\alpha] = \frac{m}{sec^3} , \quad [\beta] = \frac{m}{sec^2} , \quad [\gamma] = \frac{m}{sec} . \text{א (15)}$$

$$-\frac{\beta^2}{3\alpha} + \gamma , \quad \alpha > 0 . \text{ה} \quad -2\beta . \text{ט}$$

$$\frac{(v_1 + v_2)^2}{2g} - v_2 t_0 : \text{כדו} \quad , \quad \frac{v_1^2}{2g} : \text{ב. לצד} \quad \text{המורה צודק} \quad \frac{(v_1 + v_2)^2}{2g} . \text{א (16)}$$

$$T \approx 58 \text{ sec} \quad (\text{17})$$

$$t_2 = \frac{T}{5} \quad (\text{18})$$

$$h = \frac{g T_2^2}{2 \left(1 + \frac{T_2}{T_1} \right)} \quad (\text{19})$$

תנועה במשור וזריקה משופעת:

רקע:

. $\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$ - וקטור המיקום

. $\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ - וקטור ההעתק

. $\bar{\vec{v}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$ - (velocity) וקטור המהירות ממוצעת

. $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ - (velocity) וקטור המהירות הרגעית


. $\bar{\vec{a}} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$ - (acceleration) וקטור התאוצה ממוצעת

. $\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt}$ - (acceleration) וקטור התאוצה הרגעית

. גודל המהירות (Speed) $|\vec{v}| = \frac{dS}{dt}$, כאשר S זה הדרך.

שאלות:**1) דוגמה - דן יורה חץ על עץ**

דן יורה חץ מגובה של 2 מטרים לעבר עץ הנמצא במרחק של 8 מטרים. מהירות היציאה של החץ מהקשת היא 30 מטר לשנייה. נמצא באיזה גובה יפגע החץ בעץ אם הזרועה שבה יורה דן את החץ היא 15 מעלות?

**2) כדור מתגלגל מגג משופע**

כדור מתגלגל מגג בניין משופע. הכדור מתחילה תנועתו מנוחה מגובה של 2 מטרים מקצת הגג. שיפוע הגג הוא 30 מעלות מתחת אופק. נתון כי תאוצה הכדור בכיוון תנועתו על הגג היא 5 מטרים לשנייה בריבוע. גובה קצה הגג מעל הקרקע הוא 6 מטרים. נמצא את המרחק האופקי מקצת הגג בו יפגע הכדור בקרקע.

3) תנועת כדור עם רוח נגדית

כדור נבעט מהקרקע במהירות של 20 מטרים לשנייה ובזווית של 45 מעלות מהקרקע. רוח נגדית גורמת לכדור תאוצה בכיוון האופקי של 2 מטרים לשנייה בריבוע (בנוסף לתאוצה הגוף).

א. נמצא את מיקום הכדור ומהירותו ב- $t = 2 \text{ sec}$.

ב. מהו המרחק בו פוגע הכדור בקרקע?

ג. מהו הגובה המקסימלי אליו הגיע הכדור?

ד. מהו המרחק האופקי המקסימלי אליו הגיע הכדור?

4) מסירה בפוטבול

במשחק הפוטבול הרכו' האחורי זורק כדור בזווית של 45 מעלות ביחס לקרקע ובמהירות של 30 מטרים לשנייה. שחkon הקבוצה הנמצאת 15 מטרים קדימה מהרכו' האחורי רץ במהירות של 5 מטרים לשנייה. השחקן רואה את הכדור ומנחיל להאייז בתאוצה קבועה.

מהי התאוצה הדרושה לשחקן כך שיוכל לתפוס את הכדור בדיק בגובה בו הוא נזרק?

אם סימן התאוצה יכול להיות שלילי? מה המשמעות של תאוצה זו?

5) דוגמה מהירות ממוצעת

מיקומו של גוף כתלות בזמן הוא : $\vec{r}(t) = 3t^2 x + (2t+1) y$.
מצא את המהירות הממוצעת ב-5 השניות הראשונות של התנועה.

6) דוגמה - מהירות רגעית

מיקומו של גוף כתלות בזמן הוא : $\vec{r}(t) = 3t^3 x + (4t-5) y$.

- מצא את מהירות הגוף כתלות בזמן.
- מהי מהירות הגוף ב- $t=2$?

7) דוגמה - תאוצה

מהירותו של גוף כתלות בזמן היא : $\vec{v}(t) = 2t^3 x + (6t-5) y$.

- מצא את תאצת הגוף כתלות בזמן.
- מהי התאוצה הממוצעת בחמש השניות הראשונות של התנועה?

8) דרך והעתק

מיקומו של גוף לפי הזמן נתנו לפי : $\vec{r}(t) = 2t^3 x + (t^3 - 2) y$.

- מצא את המהירות הרגעית (velocity) וההתאוצה הרגעית כפונקציה של הזמן.
- מצא את גודל המהירות (speed) כתלות בזמן.
- מצא את הדרך שעה הגוף בחמש השניות הראשונות.
- מצא את המהירות הממוצעת (average velocity) ב-5 השניות הראשונות של התנועה.
- מצא את ה-speed הממוצע של הגוף בחמש השניות הראשונות.

תשובות סופיות:

3.78m **(1)**

4.49m **(2)**

32.01m **ב.** $x = 24.28\text{m}$, $y = 8.28\text{m}$, $V_x = 10.14 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$, $V_y = -5.86 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$. **א.** $x_{\max} = 32.01$ **ד.** 10m . **ג.**

$a = 5.99 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$ **ב.** יכול לצאת שלילי, המשמעות שהשחקן צריך להאט בשבייל להגיע **א.** לנקודה הזאת בדיקן יחד עם הבדור.

$\vec{V} = (15, 2)$ **(5)**

$\vec{V}(t=2) = (36, 4)$ **ב.** $\vec{V} = 9t^2\hat{x} + 4\hat{y}$ **א.** **(6)**

$\vec{a} = 50\hat{x} + 6\hat{y}$ **ב.** $\vec{a}(t) = 6t^2\hat{x} + 6\hat{y}$ **א.** **(7)**

$S \approx 279.5\text{m}$ **ג.** $|\vec{V}| = \sqrt{45t^2}$ **ב.** $\vec{V}_{(t)} = 6t^2\hat{x} + 3t^2\hat{y}$ **א.** **(8)**

$|\vec{V}| \approx 55.9 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ **ה.** $\vec{V} = 50\hat{x} + 25\hat{y}$ **ד.**

משוואת מסלול:

ركע:

משוואת מסלול היא פונקציה מהצורה (x,y) , סרטוט של הפונקציה הוא המסלול של הגוף במישור. ניתן למצוא את המשוואה באמצעות בידוד משתנה הזמן מהפונקציה $x(t)$ והצבה ב $y(t)$.

שאלות:


1) דוגמה-משוואת מסלול

מצא את המשוואת המסלול ושרטט את המסלול על מערכת צירים עבור המסלול הבא: $x(t) = \sqrt{3+t^2}$, $y(t) = \sqrt{7-t^2}$. הנה ש- x ו- y תמיד חיוביים.


2) זריקה משופעת על מישור משופע

איתי עומד על מישור משופע בעל שיפוע m , איתי זורק כדור כלפיו מורד המישור ב מהירות התחלה v_0 ו לזווית θ ביחס לאופק.

- א. מצא מה המרחק מאייתי שבו יפגע הכדור? (התעלם מהגובה של אייתי).
- ב. מהי הזווית θ עבורה מרחק זה יהיה מקסימלי?



תשובות סופיות:



$$\tan 2\theta = \frac{1}{m}.$$

$$x = \frac{2v_0^2 \cos^2 \theta (\tan \theta + m)}{g}.$$

תאוצה נורמלית ומשיקית ורדיוס עקומות:

רקע:

תאוצה משיקית :

$$|\vec{a}_t| = \frac{\vec{a} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|}, \quad \vec{a}_t = \frac{(\vec{a} \cdot \vec{v})}{|\vec{v}|^2} \vec{v}$$

התאוצה המשיקית היא הרכיב של התאוצה שמשיק ל מהירות (או למסלול) והוא משנה רק את גודל המהירות.

$$|\vec{a}_t| = \frac{d|\vec{v}|}{dt}$$

תאוצה נורמלית :

$$|\vec{a}_n| = |\vec{a} - \vec{a}_t| = \frac{|\vec{a} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}, \quad \vec{a}_n = \vec{a} - \vec{a}_t$$

התאוצה הנורמלית היא הרכיב של התאוצה שמאונך ל מהירות (או למסלול) והוא משנה רק את כיוון המהירות.

רדיוס עקומות :

$$R = \frac{|\vec{v}|^2}{|\vec{a}_n|}$$

שאלות:

1) תאוצה משיקית ונורמלית

מיקומו של גוף כתלות בזמן נתון לפיה : $y(t) = (1-t)^2$, $x(t) = 2t^2$,

כאשר הצבה של הזמן בשניות תיתן מיקום במטרים.

א. מצאמתי מהירות הגוף מינימלית?

ב. מצא את מיקום הגוף כאשר מהירותו היא : $\frac{m}{sec}$.

ג. חשב את התאוצה המשיקית והנורמלית ב- $t = 2 sec$.

2) חישוב תאוצה משיקית ונורמלית גודל וכיוון

וקטור המיקום של גוף מסויים נתון ע"י המשוואה: $\hat{z} = t^2 x + 4tx - 5t^2$.

- חישוב את וקטור המהירות של הגוף כתלות בזמן.
- חישוב את וקטור התאוצה של הגוף כתלות בזמן.
- חישוב את גודל התאוצה המשיקית כתלות בזמן.
- חישוב את גודל התאוצה הנורמלית כתלות בזמן.
- חישוב את וקטור התאוצה המשיקית כתלות בזמן.
- חישוב את וקטור התאוצה הנורמלית כתלות בזמן.

3) תאוצה משיקית ונורמלית בциקלואידת

המסלול שמשרטט נקודת על החיקף של גלגל בעט שזה מתגלגל (ללא החלקה) על משטח אופקי נקרא ציקלאידה. מיקום הנקודה בכל רגע נתון על ידי הביטוי: $\hat{y} = R \sin \omega t$, $\hat{x} = R \cos \omega t$, $\hat{z} = 0$ הם קבועים נתונים.

- חישוב את וקטור המהירות של הנקודה בכל רגע.
- מצאו את הרגעו בו הנקודה נמצאת בשיא הגובה (בציר ה- y) ואת הרגעו בו הגובה מינימלי (קיים אינסוף רגעים כי התנועה מחזורת, רשום بصورة כללית).
- מצאו את תאוצת החלקיק בכל רגע.
- חישוב את התאוצה המשיקית והנורמלית כאשר הנקודה מגיעה לגובה מקסימלי ומינימלי.
- חישוב את התאוצה המשיקית והנורמלית ברגע שבו רכיב ה- x של המהירות מתאפס.

4) חרוץ נע על טבעת אליפטית

חרוץ נע על פני טבעת אליפטית, כך שמיומו בכל רגע כתלות בזמן הוא: $\hat{y} = a \cos(\omega t)$, $\hat{x} = b \sin(\omega t)$, $\hat{z} = 0$ קבועים נתונים.

- מצאו את התאוצה המשיקית כתלות בזמן.
 - מצאו את התאוצה הנורמלית כתלות בזמן.
 - כאשר $|a| = |b|$ האליפסה הופכת למעגל.
- במקרה זה, האם גודל המהירות משתך התנועה גדול, קטן, לפעמים גדול ולפעמים קטן או נשאר קבוע?

תשובות סופיות:

$$\overset{\text{ר}}{r} = (4.38, 0.23) \text{ . ב } \quad t = 0.2 \text{ sec . נ } \quad (1)$$

$$\overset{\text{ר}}{a}_b = (4.24, 1.06) \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}, \overset{\text{ר}}{a}_n = (-0.24, 0.94) \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} \text{ . ג}$$

$$\overset{\text{ר}}{a} = \overset{\text{ר}}{v} = 2\hat{x} - 10\hat{z} \text{ . ב } \quad \overset{\text{ר}}{V}_{(t)} = \overset{\text{ר}}{r} = 2t\hat{x} + 4\hat{y} - 10t\hat{z} \text{ . נ } \quad (2)$$

$$|a_n| = \sqrt{\frac{208}{13t^2 + 2}} \text{ . ט} \quad |a_t| = \frac{52t}{\sqrt{26t^2 + 4}} \text{ . ג}$$

$$\overset{\text{ר}}{a} = \frac{4}{13t^2 + 2}(1, -13t, -5) \text{ . י} \quad \overset{\text{ר}}{a}_t = \frac{52t}{26t^2 + 4}(t, 2, -5t) \text{ . ה}$$

$$\overset{\text{ר}}{V} = \overset{\text{ר}}{r} = (R\omega \cdot \cos(\omega t) + R\omega) \hat{x} + (-R\omega \sin(\omega t)) \hat{y} \text{ . נ } \quad (3)$$

$$\overset{\text{ר}}{a} = \overset{\text{ר}}{v} = -\omega^2 R \sin(\omega t) \hat{x} - \omega^2 R \cos(\omega t) \hat{y} \text{ . ג} \quad t_{\max} = \frac{2\pi}{\omega} k, t_{\min} = \frac{\pi}{\omega} + \frac{2\pi}{\omega} k \text{ . ב}$$

$$\text{ה. אי אפשר להגדיר.} \quad \overset{\text{ר}}{a}_t = 0, \overset{\text{ר}}{a}_n = \overset{\text{ר}}{a} = -\omega^2 R \hat{y} \text{ . ט}$$

$$a_t = \frac{\omega^2 \sin(2\omega t)(a^2 - b^2)}{2\sqrt{a^2 \sin^2(\omega t) + b^2 \cos^2(\omega t)}} \text{ . נ } \quad (4)$$

$$a_n = \sqrt{\omega^4 a^2 \cos^2(\omega t) + \omega^4 b^2 \sin^2(\omega t) + \left(-\frac{\omega^4 \sin^2(2\omega t)(a^2 - b^2)}{4(a^2 \sin^2(\omega t) + b^2 \cos^2(\omega t))} \right)} \text{ . ב}$$

$$\text{ג. הגודל נשאר קבוע.} \quad |\overset{\text{ר}}{V}| = \text{const. ג}$$

תרגילים נוספים:

שאלות:

1) גודל מהירות מינימלי

וקטור המיקום של גוף מסוים כתלות בזמן נתון על ידי: $\vec{r}(t) = 2t^2 \hat{i} - 6j + (t-5)^2 k$.

- מהו וקטור מהירות הגוף כתלות בזמן?
- מהו וקטור התאוצה של הגוף כתלות בזמן?
- מתי גודל מהירות הגוף מינימלי?

ד. מהו וקטור המיקום כאשר גודל מהירותו הוא: $\sqrt{160} \frac{\text{m}}{\text{sec}}$?

2) וקטורים בזירה משופעת

גוף נזרק מראשית הצירים במהירות התחלה v_0 ובזווית θ ביחס לציר ה- x .

- מצאו את וקטור המיקום של הגוף כתלות בזמן.
- מצאו את וקטור מהירות והתאוצה של הגוף כתלות בזמן.
- חשבו את הזווית בין וקטור מהירות לוקטור התאוצה כתלות בזמן.

3) וקטור מיקום ומסלול

וקטור המיקום של גוף הנע במישור xy נתון לפי: $\hat{r}(t) = A \sin(\omega t) \hat{x} + B \cos(\omega t) \hat{y}$.

- מצאו את וקטור מהירות והתאוצה של הגוף.
- חשבו את הזווית בין וקטור מהירות לוקטור התאוצה ב- $t=0$.
- הראו שוקטור התאוצה וקטור המיקום הפוכים בכיוון.
- מצאו את מסלול התנועה של הגוף, כולם את (x, y) .

4) וקטור מיקום ומסלול עם זמן בריבוע

וקטור המיקום של גוף הנע במישור $y-x$ נתון לפי: $\vec{r}(t) = A \sin(\alpha t^2) \hat{x} + B \cos(\alpha t^2) \hat{y}$.

- מצאו את וקטור מהירות והתאוצה של הגוף.
- מצאו את מסלול התנועה של הגוף, כולם את (x, y) .
- מה ההבדל בין המסלול בתרגיל זה לבין המסלול בתרגיל הקודם?

5) רובין הוד יורה ותופס חץ

רובין הוד יורה חץ ב מהירות v_0 ו זווית θ ביחס לקרקע .
 ברגע שחרור החץ מתחילה רובין הוד לזרוץ בקו ישר ובתאוצה $a(t) = Ae^{-kt}$.
 רובין הוד רוצה לתפוס את החץ ברגע פגיעהו לקרקע .
 מצאו משווהה עם הפרמטרים A , θ , v_0 והמשתנה k ממנו ניתן לחוץ את k כך שרובין יוכל לפתור את המשווהה .

6) תנועה במעגל*

גוף נקודתי נעה במשור אופקי xy .

בזמן $t=0$ מהירות הגוף הייתה : $\frac{m}{sec} \hat{r}(0)=5\hat{j} m$ יחד עם וקטור המצב :
 תאוצה הגוף כפונקציית זמן החל מרגע זה היא :

$$\ddot{r}(t) = -45\pi^2 \sin(3\pi t) \hat{i} - 45\pi^2 \cos(3\pi t) \hat{j} \frac{m}{sec^2}$$

 א. מצא את וקטור המהירות של הגוף בזמן .
 ב. מצא את וקטור המצב של הגוף בזמן .
 ג. מצא את הזווית בין וקטור המצב לוקטור התאוצה בזמן .
 ד. מצא את משווהת המסלול של הגוף .

7) תנועה על אליפסה*

מיקום של גוף נקודתי נתון במשווהה : $\hat{r}(t) = 4\sin(\pi t)\hat{i} + 3\cos(\pi t)\hat{j}$

(המיקום במטרים, הזמן בשניות) .

- א. מצא את משווהת המסלול של הגוף .
- ב. מצא את רגעי הזמן שבהם המהירות ורדיוס הוקטור מאונכים .
- ג. מצא את תאוצה התנועה והראה שהיא מכונה כלי ראשית הצירים .
- ד. מצא באיזה רגעי זמן גודל התאוצה הוא : $\frac{v^2}{r}$.
- ה. חשבו את המרחק המינימלי של הגוף מראשית הצירים .
 כמה פעמים, במשך מהזור תנועה אחד, מגיע הגוף למרחק מינימלי מראשית?

8) מהירות לפי גזירה תרגיל פשוט

נתון וקטור r של חלקיק מסויים: $\vec{r} = (8t, -5t^2)$.

א. מהו רכיב ה- x של הווקטור בזמן?

ב. מהו רכיב ה- y של הווקטור בזמן?

ג. מהי מהירותו בציר x ?

ד. מהי מהירותו בציר y ?

ה. האם מהירות אלות קבועות בזמן?

ו. מהו מרחק החלקיק מהראשית לאחר שעברו 3 שניות?

9) גזירת מיקום למציאת מהירות

מיקומו של חלקיק נתון ע"י הווקטור r : $\vec{r} = 5\sin(\pi t) \mathbf{i} + 4t^3 + t^2 \mathbf{j} + 8e^t \mathbf{k}$.

א. מצאו את וקטור המהירות כפונקציה של הזמן.

ב. מהי מהירות החלקיק ב- $t = 2$?

10) העתק לפי גזירה

וקטור r מתאר מיקומו של חלקיק בזמן: $\vec{r} = (5t, 10 + t^2)$.

א. מהו מיקום החלקיק בזמן $t = 0$?

ב. מהו מיקום החלקיק בזמן $t = 5$?

ג. מהו ההעתק בחמש השניות הראשונות?

ד. מהי מהירות החלקיק בזמן $t = 5$ (ב>Showcase גודל וכיוון)?

תשובות סופיות:

$$t_{\min} = 1 \text{ sec} \quad \text{ג.} \quad \vec{a} = \dot{\vec{v}} = 4\hat{i} + 2\hat{k} \quad \text{ב.} \quad \vec{v} = \dot{\vec{r}} = 4t\hat{i} + 2(t-5)\hat{k} \quad \text{א.} \quad (1)$$

$$\vec{r}(t_1) = 18\hat{i} - 6\hat{j} + 4\hat{k} \quad \text{ד.}$$

$$\vec{v} = v_0 \cos \theta \hat{x} + (v_0 \sin \theta - 10t) \hat{y} \quad \text{ב.} \quad \vec{r}(t) = v_0 \cos \theta \cdot t \hat{x} + (v_0 \sin \theta \cdot t - 5t^2) \hat{y} \quad \text{א.} \quad (2)$$

$$\cos \alpha = \frac{10t - v_0 \sin \theta}{\sqrt{(v_0 \cos \theta)^2 + (v_0 \sin \theta - 10t)^2}} \quad \text{ג.}$$

$$\vec{v} = \omega A \cos(\omega t) \hat{x} - \omega B \sin(\omega t) \hat{y}, \quad \vec{a} = -\omega^2 A \sin(\omega t) \hat{x} - \omega^2 B \cos(\omega t) \hat{y} \quad \text{א.} \quad (3)$$

$$\left(\frac{y}{B} \right)^2 + \left(\frac{x}{A} \right)^2 = 1 \quad \text{ט. הוכחה.} \quad 90^\circ \quad \text{ב.}$$

$$, \vec{v} = A \cos(\omega t^2) 2\omega t \cdot \hat{x} - B \sin(\omega t^2) (2\omega t) \hat{y} \quad \text{א.} \quad (4)$$

$$\vec{a} = \left[-A \sin(\omega t^2) (2\omega t)^2 + 2\omega A \cos(\omega t^2) \right] \hat{x} - \left[B \cos(\omega t^2) (2\omega t)^2 + 2\omega B \sin(\omega t^2) \right] \hat{y}$$

$$\text{ג. אין הבדל} \quad \left(\frac{y}{B} \right)^2 + \left(\frac{x}{A} \right)^2 = 1 \quad \text{ב.}$$

$$\frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} = \frac{A}{k} \frac{2v_0 \sin \theta}{g} + \frac{A}{k^2} \left(e^{-k \frac{2v_0 \sin \theta}{g}} - 1 \right) \quad (5)$$

$$\vec{r}(t) = 5 \sin(3\pi t) \hat{i} + 5 \cos(3\pi t) \hat{j} \quad \text{ב.} \quad \vec{v}(t=0) = 15\pi \cos(3\pi t) \hat{i} - 15\pi \sin(3\pi t) \hat{j} \quad \text{א.} \quad (6)$$

$$x^2 + y^2 = 25 \quad \text{ט.} \quad \alpha = 180^\circ \quad \text{ג.}$$

$$t_1 = 0, t_2 = 1, t_3 = \frac{1}{2}, t_4 = \frac{3}{2} \quad \text{ב.} \quad \left(\frac{x}{4} \right)^2 + \left(\frac{y}{3} \right)^2 = 1 \quad \text{א.} \quad (7)$$

$$\vec{a} = \dot{\vec{v}} = -4\pi^2 \sin(\pi t) \hat{i} - 3\pi^2 \cos(\pi t) \hat{j} \quad \text{ג.}$$

$$\text{ה. } |\vec{r}|(t=1) = 3 \quad \text{ט.} \quad t_1 = \frac{1}{4} \text{ sec}, t_2 = \frac{5}{4} \text{ sec}, t_3 = \frac{3}{4} \text{ sec}, t_4 = \frac{7}{4} \text{ sec} \quad \text{ט.}$$

$$v_y = \dot{r}_y = -10t \quad \text{ט.} \quad v_x = \dot{r}_x = 8 \quad \text{ג.} \quad r_y = -5t^2 \quad \text{ב.} \quad r_x = 8t \quad \text{א.} \quad (8)$$

ה. מהירות על x קבועה בזמן, מהירות על y לא קבועה בזמן.

$$|r_{t=3}| = \sqrt{2601} \quad \text{ג.}$$

$$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = 5\pi \cos(\pi t) \hat{i} + 12t^2 + 2t \hat{j} + 8e^t \hat{k} \quad \text{א.} \quad (9)$$

$$\vec{v}_{t=2} = 5\pi \cos(2\pi) \hat{i} + 4 \cdot 2^3 + 2^2 \hat{j} + 8e^2 \hat{k} = 5\pi \hat{i} + 36 \hat{j} + 8e^2 \hat{k} \quad \text{ב.}$$

$$|\vec{r}_{t=5} - \vec{r}_{t=0}| = \sqrt{1250} \quad \text{ג.} \quad \vec{r}_{t=5} = (25, 35) \quad \text{ב.} \quad \vec{r}_{t=0} = (0, 10) \quad \text{א.} \quad (10)$$

$$|v_{(t=5)}| = \sqrt{125} \quad \text{ט.}$$

פיזיקה 1 מכניתה

פרק 4 - תנועה יחסית -

תוכן העניינים

1. הסבר על טרנספורמציה גליליי.....	63
2. שיטה שנייה-פתרון באמצעות תרשימי וקטוריים.....	68
3. מהירות יחסית בכיוון הזרפה (מד ליזר).....	70

טרנספורמציה גלילי:

רקע:

$$\begin{aligned}\vec{r}_{1,2} &= \vec{r}_1 - \vec{r}_2 \\ \vec{v}_{1,2} &= \vec{v}_1 - \vec{v}_2 \\ \vec{a}_{1,2} &= \vec{a}_1 - \vec{a}_2\end{aligned}$$

שאלות:

1) כלב קופץ בתוך רכבת

כלב נמצא ברכבת הנעה במהירות $\frac{m}{sec}$ 8 ביחס לקרקע. הכלב קופץ בכיוון התקדמות הקרון מרחק של 7 מטרים ביחס לקרון. במהלך הקפיצה מהירות הכלב קבועה ביחס לקרון ושווה ל- $\frac{m}{sec}$ 3. מהו המרחק שעבר הכלב ביחס לקרקע?

2) מדרגות נעות

כאשר אדם עומד על מדרגות נעות בchnerות, הוא מגיע לקומת הרצואה תוך 50 שניות. יום אחד, המדרגות הנעות מתקללות והאדם צריך לעלות אותן ברגל בכוחות עצמו, כאשר הוא נע במלוא יכולתו שלו, הוא מצליח להגיע לקומת הרצואה תוך 80 שניות. לעומת זאת, המדרגות הנעות עובדות כרגיל, אך האדם מצליח לroz בחן במלוא יכולתו בכל זאת.

א. תוך כמה זמן מגיע לקומת הרצואה?

ב. האדם מנסה עתה לרדת חזרה לקומת המקורית במדרגות העולות

(אליה הוא עלה קודם).

אם הוא יכול להצליח בכך?

אם כן תוך כמה זמן מגיע לקומת המקורית?

(3) כדור נזרק במעלה

מרצפת מעלה הנמצאת במנוחה נזרק כדור כלפי מעלה ב מהירות התחלתית לא ידועה. הכדור עובר ליד שעון עץ, המחבר למעלית, ונמצא בגובה 2 מטרים מרצפת המעלית. שעון העץ מופעל ברגע שהכדור חולף לידו בפעם הראונה ופסיק ברגע שהכדור חולף לידו בפעם השנייה (בדרכו למיטה). השעון מדד זמן של 0.5 שניות.

א. מהו הזמן התנועה של הכדור מרגע הזריקה עד לפגיעה ברצפת המעלית?

ב. מהי הדרך אותה עשה הכדור ביחס למעלית וביחס לכדה"א עד אשר הגיע לשעון בפעם השנייה?

ג. חוזרים על הניסוי, אבל-cut המעלית נעה (מלפנוי זריקת הכדור) ב מהירות קבועה כלפי מעלה של $\frac{m}{sec}$. הזמן שמודד השעון הוא שוב 0.5 שניות.

מהו הזמן התנועה של הכדור מרגע הזריקה ועד לפגיעה ברצפת המעלית?

ד. מהי הדרך אותה עשה הכדור ביחס למעלית וביחס לכדה"א עד אשר הגיע לשעון בפעם השנייה?

ה. מהי מהירות הכדור ביחס לכדה"א ברגע הפגיעה ברצפת המעלית?

(4) כדור נזרק במעלה מאיצה

מעלית נעה בתאוצה קבועה כלפי מעלה של $\frac{m}{sec^2}$.

ברגע שמהירות המעלית היא $\frac{m}{sec}$ נזרק מרצפת המעלית כדור כלפי מעלה ב מהירות התחלתית לא ידועה.

הכדור עובר ליד שעון עץ המחבר למעלית ונמצא בגובה 1 מטר מרצפת המעלית. שעון העץ מופעל ברגע שהכדור חולף לידו בפעם הראונה ופסיק ברגע שהכדור חולף לידו בפעם השנייה (בדרכו למיטה). השעון מדד זמן של 0.5 שניות.

א. מהו הזמן עד לפגיעת הכדור ברצפת המעלית?

ב. מהי הדרך הכלילת שעבר הכדור ביחס למעלית עד אשר עבר ליד השעון בפעם השנייה?

ג. מהי הדרך הכלילת שעבר הכדור ביחס לכדה"א עד אשר עבר ליד השעון בפעם השנייה?

ד. מהי מהירות הכדור יחסית לכדה"א ברגע הפגיעה ברצפת המעלית?

(5) דוגמה - מכוניות ביחס לאוטובוס

מכונית נוסעת ב מהירות של 30 מטר לשנייה בכיוון ציר ה- x .


אוטובוס נוסע ב מהירות של 50 מטר לשנייה בכיוון ציר ה- x .

א. מצא את המהירות היחסית בין האוטובוס למכונית.

ב. מצא את ה佐וית בה האוטובוס יראה את המכונית נוסעת.


6) אבן נזרקת מכדור פורח – תעשייה טכניון

סטודנטית נמצאת על משטח שעולה אנכית ב מהירות קבועה $v_0 = 6 \frac{m}{sec}$. נסמן ב- $t = 0$ את הרגע בו התחיל לעלות המשטח מהקרקע. ברגע $t_1 = 3 \text{ sec}$ הסטודנטית נזרקה אבן ב מהירות $v_1 = 8 \frac{m}{sec}$, אופקית ביחס אליה. מהו הזמן בו האבן פוגעת בקרקע (ביחס לזמן אפס של השאלה)?

7) מרחק מינימלי בין מכוניות

צופה הנמצא ברכב A יוציא מנוקודה מסוימת בכיוון מזרח ב מהירות 30 קמ"ש. באותו הזמןרכב B יוציא מרחק 68 ק"מ צפונית לנוקודה יציאתו של רכב A ונוסע דרומה ב מהירות של 50 קמ"ש, כמתואר באור. א. רשמו את פונקציית המרחק בין שני כלי הרכב כתלות בזמן.
 ב. מצאו תוקן כמה שעות המרחק בין כלי הרכב יהיה מינימלי.
 ג. מצאו את גודלו של מרחק זה.

הראו כי ברגע בו המרחק בין המכוניות מינימלי וקטור המיקום היחסי מאונך לוקטור המהירות היחסית.

8) סירה בנהר

נהר זורם צפונה ב מהירות V_r . יוסי נמצא בגדה המערבית ורוצה להשיט סירה לרוחב הנהר. מהירות הסירה היא V_{br} יחסית לנهر. יוסי מעוניין להגיע לגדה הנגדית לבדוק מזrichtה לנוקודת מוצאו. נתון כי רוחב הנהר d .
 א. באיזה כיוון הוא יהיה חייב להשיט את הסירה?
 ב. מה מהירות הסירה ייחסית לאדמה?
 ג. כמה זמן תארך דרכו?

9) אונייה שטה מערבה וצופה באונייה נוספת

אוניה A השטה מערבה ב מהירות 30 קמ"ש נראית אונייה B כאילו היא שטה בדיק צפונה. כאשר אונייה A מאטה ומורידה את מהירותה ל-10 קמ"ש (באותנו הכיוון) נראית ממנה אונייה B כאילו היא שטה בכיוון היוצר זווית של 42 מעלות מערבית לצפון.
 מהו גודלה וכיוונה של מהירות אונייה B ביחס לקרקע?

10) זווית פגיעה של גשם במכונית

נаг הנושא במהירות 100 קמ"ש רואה טיפות גשם נמרחות על השימוש הצדדי של המכונית בכיוון הפוך לכיוון הנסיעה ובזווית של 45 מעלות עם הציר האנד לכיוון הנסיעה.

נаг אחר הנושא במהירות 70 קמ"ש רואה את טיפות הגשם בזווית 30 מעלות עם אותו הציר.
מצא את מהירות הטיפות ביחס לקרקע (גודל וכיוון).

11) זווית בין מהירות

שני קליעים נורים ברגע $t = 0$. מיקומם ומהירותם ההתחלתית הם :

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1(0) &= -\mathbf{i} + 4\mathbf{j}, \quad \mathbf{v}_2(0) = 2\mathbf{i} + 5(\mathbf{j}), \\ \mathbf{r}_1(0) &= 0, \quad \mathbf{r}_2(0) = \mathbf{i} - 3\mathbf{j}. \end{aligned}$$

על שניהם פועל כוח משיכה הגורם לתאוצה של $\mathbf{a} = -3\mathbf{i} + \mathbf{j}$.

א. מצא את $r_1(t)$, $r_2(t)$.

ב. מצא את המרחק בין הקליעים כפונקציה של הזמן.

ג. מצא את הזווית בין \mathbf{v}_1 ל- \mathbf{v}_2 ברגע $t = 3$.

12) מציאת מהירות בין מערכות

ביחס למערכת ייחוס A, מיקומו של גוף מסוים נתונה על ידי :

$$\mathbf{r}_A(t) = (6t^2 - 4t, -3t^3, 3).$$

מערכת ייחוס B נעה ביחס למערכת הייחוס הראשונה במהירות קבועה, \mathbf{V}_{AB} .

צופה הנמצא במערכת B רואה את הגוף נע כך שמיומו בכל רגע הוא :

$$\mathbf{r}_B(t) = (6t^2 - 3t, 2t - 3t^3, 5).$$

א. חשבו את המהירות של המערכת B ביחס למערכת A, \mathbf{V}_{AB} .

ב. הראו שתאוצרת הגוף זהה בשתי מערכות הייחוס, וחשבו אותה.

תשובות סופיות:

25.7m **(1)**

ב. לא $t = 30.8 \text{ sec}$ **. נ (2)**

S=5.72m **. ת** $t = 1.36 \text{ sec}$ **. ג** S = 2.62m **ב.** $t = 1.36 \text{ sec}$ **. נ (3)**

$v_1 = -2.8 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ **ה.** **(4)**

$v_1 = 0.16 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ **. ת** S=4.46m **. ג** S = 1.76m **ב.** $t = 0.96 \text{ sec}$ **. נ (4)**

$\theta_2' = 148^\circ$ **. ב** $\nu_2' = \left(-24.01 \frac{\text{m}}{\text{sec}}, 15 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \right)$ **. נ (5)**

2.6sec **(6)**

ג. הוכחה. $t = 1\text{hr}$, $|r_{B,A}| = 35\text{km}$ **. ב** $|r_{B,A}| = \sqrt{(30t)^2 + (68-50t)^2}$ **. נ (7)**

$t = \frac{d}{\sqrt{V_{br}^2 - V_r^2}}$ **. ג** $V_{bx} = \sqrt{V_{br}^2 - V_r^2}$ **. ב** $\sin \theta = -\frac{V_r}{V_{br}}$ **. נ (8)**

$V_B \approx 37.3 \text{ km/hr}$, $\alpha \approx 36.5^\circ$ **(9)** צפונה מהמערב

10) מהירות: $V_x = 29.21 \frac{\text{km}}{\text{hr}}$, $V_y = -70.79 \frac{\text{km}}{\text{hr}}$ גודל וכיוון: ראה סרטון.

$r_1(t) = \left(-\frac{3}{2}t^2 + 2t \right) \hat{i} + \left(\frac{t^2}{2} + 5t \right) \hat{j}$, $r_2(t) = \left(-\frac{3}{2}t^2 - t + 1 \right) \hat{i} + \left(\frac{t^2}{2} + 4t \right) \hat{j}$ **. נ (11)**

$\alpha = 13.82^\circ$ **. ג** $|r_{1,2}| = \sqrt{10t^2 - 6t + 1}$ **. ב**

ב. הוכחה. $(1, -2, 0)$ **. נ (12)**

שיטת שנייה-פתרון באמצעות תרשימי וקטורים:

שאלות:

1) שיטה שנייה-פתרון באמצעות תרשימי וקטורים ודוגמה

צופה הנמצא באונייה A השטה מזרחית 15 קמ''ש רואה את אונייה B שטה ב מהירות 20 קמ''ש ובכיוון 60 מעלות צפוןית למזרח. מהי המהירות של אונייה B ביחס לקרקע, גודל וכיוון?

2) סירה בנהר פתרון בשיטה השנייה

נהר זורם צפונה ב מהירות v_r .

יוסי נמצא בגדה המערבית ורוצה להשיט סירה לרוחב הנהר.

מהירות הסירה היא v_{br} יחסית לנهر.


יוסי מעוניין להגיע אל הגדה הנגדית בדיקת מזרחית لنקודת מוצאו.

א. סרטטו תרשימים וקטוריים ובו :

מהירות הסירה ביחס לקרקע, מהירות הנהר

ביחס לקרקע ומהירות הסירה ביחס לנهر.

ב. מצאו את כיוון מהירות הסירה ביחס לנهر.



3) מטוס נראה משתי רכבות

צופה הנמצא ברכבת הינה מזרחית ב מהירות של 50 קמ''ש רואה מטוס חוצה את המסילה בזווית של 30 מעלות מערבית לצפון.

צופה אחר הנוסע ברכבת הינה מערב ב מהירות של 100 קמ''ש רואה את אותו המטוס חוצה את המסילה בזווית 50 מעלות מזרחית לצפון.

א. סרטטו תרשימים וקטוריים ובו :

מהירות הצלפים ביחס לקרקע, מהירות המטוס ביחס לכל צופה ומהירות

המטוס ביחס לקרקע (אין צורך לדעת את כל הנתונים בתרשימים).

ב. מצאו את מהירות המטוס ביחס לקרקע (גודל וכיוון).

4) רכב רואה רכב רואה רכב

צופה היושב ברכב A רואה את הרכב B כאילו הוא נע צפונה ב מהירות v_{BA} .

צופה היושב ברכב B רואה את הרכב C, כאילו הוא נע בכיוון צפון מערב בזווית α מהצפון וב מהירות v_{CB} .

רכב A נע ביחס לקרקע בכיוון צפון מזרחי בזווית β מן הצפון וב מהירות v_A .

מהי המהירות של הרכב C ביחס לקרקע, גודל וכיוון?

(5) שני דאונים

שני דאונים טסים באותוגובה.

באזור טיסתם קיים זרם אוויר ב מהירות 40 קמ"ש ובכוון של 30 מעלות

מזרחה מהצפון.

דאון 1 טס ביחס לזרם ב מהירות 30 קמ"ש ובכוון צפון.

דאון 2 טס ביחס לקרקע ב מהירות לא ידועה אך בכיוון צפון.


בנוסף הטיס שבדאון 1 רואה את דאון 2 כאילו הוא טס מערבה.

מצאו את גודל וכיוון מהירות הדאונים ביחס לקרקע.


תשובות סופיות:

(1) 30.4 קמ"ש ובזווית 34.7 מעלות צפונית למזרח.

$$\text{ב. } \theta = \text{shift} \sin\left(\frac{V_r}{V_{br}}\right) \quad \text{א. } (2)$$



(2) ב. 84.98 קמ"ש ובכוון 2 מעלות מערבית מהצפון.



$$v_c = \sqrt{(v_A \sin \beta - v_{CB} \sin \alpha)^2 + (v_A \cos \beta + v_{BA} + v_{CB} \cos \alpha)^2} \quad (4)$$

$$\tan \theta_C = \frac{v_A \cos \beta + v_{BA} + v_{CB} \cos \alpha}{v_A \sin \beta - v_{CB} \sin \alpha}$$

(3) דאון 1 : 67.7 קמ"ש ובזווית 17.2 מעלות מזרחה מהצפון.

דאון 2 : 64.6 קמ"ש צפונה.

מהירות יחסית בכיוון הצופה (מד ליזר):

רקע:

$$\vec{v} = \frac{\dot{x}\hat{x} + \dot{y}\hat{y}}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{d}{dt} |\vec{r}|$$

שאלות:

1) דוגמה ראשונה

- מהירותה של מכונית נתונה לפי: $\hat{y}(t) = 2t^2\hat{x} + (3t - 1)\hat{y}$
- ב- $t = 0$ המכונית הייתה בראשית.
- א. מצא את וקטור מיקום המכונית כתלות בזמן.
 - ב. מהי מהירות המכונית ב- $t = 2$ כפי שימדוז אותה השוטר הנמצא בראשית, אם השוטר מודד באמצעות אקדח לייזר.
 - ג. חזר על סעיף ב' אם השוטר נושא ב מהירות קבועה $\hat{x}_0 = \vec{v}$ ונמצא גם כן בראשית ב- $t = 0$.

תשובות סופיות:

$$v(t=2) = 9.4 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \quad \vec{r} = \frac{2}{3}t^3\hat{x} + \left(\frac{3}{2}t^2 - t\right)\hat{y} \quad \text{א.}$$

$$v(t=2) = \frac{(8-v_0)\left(\frac{16}{3}-2v_0\right)+20}{\sqrt{\left(\frac{16}{3}-2v_0\right)^2+16}} \quad \text{ג.}$$

פיזיקה 1 מכניתה

פרק 5 - דינמיקה - חוקי ניוטון

תוכן העניינים

71	1. חוקי ניוטון
81	2. גלגולות נעות ומכפלי כוח
82	3. תרגילים נוספים

חוקי ניוטון:

רקע:

כוחות נפוציים:

כוח הכבוד :

סימון : W (קייזר של כדור הארץ).
מופעל ע"י כדור הארץ.
כיוון : למרכז כדור הארץ (או לכיוון האדמה).
גודל : mg.

נורמל :

סימון : N.
מופעל ע"י משטח.
כיוון : תמיד מאונך למישטח ודוחף (מהמשטח כלפי חוץ).
גודל : לא ידוע, תלוי בבעיה (לא שווה ל-mg).

מתיחות :

מופעל על ידי חוט או חבל.
סימון : T (קייזר של חוט).
כיוון : תמיד מושך את הגוף לכיוון החוט.
הערה, חוט תמיד מושך משני צדדיו.
חוט אידיאלי – חוט חסר מסה שאינו משנה את אורכו (לא אלסטי).
בחוט אידיאלי המתיחות אחידה לאורך החוט.

חיכוך :

חיכוך סטטי - f_s :

פועל כאשר אין תנועה יחסית בין המישטחים.
מופעל ע"י המשטח.

כיוון : משיק למישטח (נגד כיוון השלייפה לתנועה).

גודל : $N_s \mu_s = f_s$ (בדי"כ נעלם לא ידוע).

μ_s - מקדם חיכוך סטטי (תלוי בחומר וקבוע).

$f_s \leq \mu_s N$.

$f_{s\max} = \mu_s N$.

לשים לב שאפשר להציב $N_s = \mu_s f_{s\max}$ רק אם ידוע שהמערכת על סף החלקה.

חיכוך קינטי - f_k :
 פועל כאשר יש תנוצה יחסית בין המسطחים.
 מופעל ע"י מسطח.
 כיוון : משיק למسطח (נגד כיוון התנועה היחסית).
 גודל : $N \mu_k = f_k$.
 μ_k - מקדם החיכוך הקינטי – תלוי בסוגי החומרים. בד"כ קבוע.
 N - נורמל שפעיל אותו מسطח.

חוק ראשון של ניוטון – התמדה:

אם גוף נע בקו ישר ובמהירות קבועה (בהתמדה) סכום הכוחות עליו שווה לאפס.
 במקרה פרטי של תנוצה במהירות קבועה הוא מנוחה. לכן, אם גוף נמצא במנוחה סכום הכוחות עליו הוא אפס.

חוק שלישי – עקרון פועלה תגובה:

לכל כוח שגוף A מפעיל על הגוף B יש כוח תגובה שגוף B מפעיל חזרה על הגוף A.
 כוח התגובה שווה בגודלו והפוך בכיוונו.
 שימושו לב: הכוחות פועלים על גופים שונים ולכן אף פעם לא יופיעו באותו תרשימים כוחות.

חוק שני של ניוטון:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

בפועל רושמים את הנוסחה לכל ציר בנפרד.

חוק הוק – הכוח של קפיץ:


$$F = -k \Delta x$$

$$\Delta x = x - x_0$$


x - מיקום הגוף.
 x_0 - מיקום שבו הקפיץ רופיע.

חיבור קפיצים במקביל (שני הקפיצים מחוברים לגוף ולקיר) - $k_{eff} = k_1 + k_2$
 חיבור קפיצים בטור (גוף מחובר לקפיץ אחד שמחובר לקפץ שני שמחובר לקיר) -


$$\frac{1}{k_{eff}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$$


שאלות:

- 1) דוגמה-גוף תלוי מהתקלה**
גוף תלוי במנוחה מהתקלה באמצעות שני חוטים, לפי האיוור הבא.
מהי המתייחסות בכל חוט אם מסת הגוף היא 3 ק"ג?




- 2) דוגמה-גוף תלוי מהתקלה ומהקיר**
גוף תלוי במנוחה מהתקלה באמצעות חוט ומחובר לקיר המאונך לתקלה באמצעות חוט נוסף (הסתכל באיוור).
מהי המתייחסות בכל חוט אם מסת הגוף היא 3 ק"ג?



- 3) דוגמה-מסה על מסה**
במערכת הבאה ישנה מסה של 3 ק"ג הנמצאת במנוחה על שולחן.
על המסה מונחת מסה נוספת של 2 ק"ג.

- א. שרטט תרשימים כוחות לכל אחת מהמסות.
- ב. חשב את הכוח הנורמלי הפועל על המסה העליונה.
- ג. חשב את הכוח הנורמלי הפועל על המסה התחתונה.
- ד. חשב את הכוח הנורמלי הפועל על השולחן.


- 4) דוגמה-מסה על מסה על מסה**
שלוש מסות מונחות אחת על גבי השנייה ועל הקrukע במנוחה, כפי שנראה בציור.



- א. מהו גודלו וכיוונו של הכוח שפעילה המסה הכי תחתונה על המסה מעלה?
- ב. מהו גודלו וכיוונו של הכוח שפעילה הרצפה על המסה הכי תחתונה?




- 5) דוגמה-דני מושך במקביל לקרקע**
דני מושך ארגו במקביל לקרקע. ידוע כי מסת הargo היא 20 ק"ג ומוקדם החיכוך הקינטי בין הארגו לקרקע הוא: $\mu_k = 0.2$.
מצא מהו גודלו של הכוח שפעיל דני, אם הארגו נע במהירות קבועה?

6) ירון מושך בזווית

ירון מושך ארגז באמצעות חבל הנמתק בזווית של 30 מעלות ביחס לקרקע.

ידוע כי מסת הארגז היא 20 ק"ג, ומקדם החיכוך הקינטי בין הארגז לקרקע הוא: $\mu_k = 0.2$.

מצא מהו גודלו של הכוח שפעיל על ירון, אם הארגז נע במהירות קבועה?

7) גוף על שולחן


גוף בעל מסה של 3 ק"ג נמצא במנוחה על שולחן.

מקדם החיכוך הסטטי הוא: $\mu_s = 0.4$.

א. מהו הכוח המקסימלי הנitin להפעיל על הגוף, כך שיישאר במנוחה?

כוח אופקי בגודל 10 ניוטון פועל על הגוף ימינה.

ב. מצא את גודלו וכיונו של החיכוך הסטטי.

8) כוח תלוי בזמן

גוף בעל מסה של 5 ק"ג נמצא במנוחה על שולחן.


כוח אופקי התלויה בזמן $F(t) = 2 \cdot t^2$ פועל על הגוף ימינה.

מקדם החיכוך הסטטי הוא: $\mu_s = 0.3$.

א. מהו הכוח המקסימלי הנitin להפעיל על הגוף, כך שיישאר במנוחה?

ב. מתי יתחל הגוף בתנועה?

ג. שרטט גרף של החיכוך הסטטי כתלות בזמן.

9) מסה בשיפוע


מסה של 3 ק"ג נמצא במנוחה על מישור משופע בעל זווית של 40 מעלות.

בין המסה למדרון קיימים חיכוך,

ומקדם החיכוך הסטטי הוא: $\mu_s = 0.9$.


א. שרטט תרשימים כוחות לבעה.

ב. מצא את גודלם של הכוח הנורמלי והחיכוך.

**10) מסה בשיפוע ומסה באוויר**

מסה של 5 ק"ג מונחת על מישור משופע בעל זווית של 50 מעלות. המסה מחוברת באמצעות חוט אידיאלי ודרך גלגלת אידיאלית למסה נוספת M התלויה באוויר מצידו השני של המישור.

- מצא את גודלה של המסה M, על מנת שהמערכת תשאר במנוחה כאשר אין חיכוך בבעיה. כתת נתון שבין המסה למזרן קיים חיכוך, ומקדמים החיכוך הסטטי הוא: $\mu_s = 0.3$.
- מצא מה הוא גודלה המקסימלי והמינימלי האפשרי של M, על מנת שהמערכת תשאר במנוחה.

**11) דוגמה-כוח בזווית 30 מעלות**

כוח של 20 ניוטון פועל בזווית של 30 מעלות מעלה האופק.

הכוח מופעל על ארוג בעל מסה של 8 ק"ג.

הארוג נמצא במנוחה ונתון כי בין הארגז לרצפה קיים חיכוך. מקדמי החיכוך הסטטי והקינטי הם: $\mu_k = 0.1$, $\mu_s = 0.2$.

- בדוק האם הארגז נשאר במנוחה או מתחילה נוע?
- כמה זמן ייקח להזיז את הארגז למרחק של 30 מטרים באמצעות כוח זה?
- חזור על הסעיפים אם הכוח היה בזווית של 70 מעלות.

12) דוגמה-מרחק עצירה

דני נוסע במכוניתו במהירות של 54 קמ"ש, ולפתע הוא מבחין כי רמזור הנמצא 50 מטרים לפניו הופך לאדום. דני לוחץ על הבלמים ומתחליל בעצירה.

מקדם החיכוך הקינטי בין הגלגלים לרצפה הוא: $\mu_k = 0.3$.


הנחתה שגלגלים ננעלים ואין למוכנית מערכת ABS.

- אם דני יספיק לעצור לפני הרמזור?
- בדוק שוב האם דני יספיק לעצור, אך הפעם הוסף זמן תגובה של שנייה אחת (זמן מהרגע שבו דני מבחין באור עד אשר הוא לוחץ על הבלמים).

13) דוגמה 1-קפיץ

גוף בעל מסה של 2 ק"ג מחובר לקפיץ בעל קבוע

$$\text{קפיץ} = 50 \frac{\text{N}}{\text{m}} = k. \text{ בין הגוף למשטח אין חיכוך.}$$



- א. מושכים את הגוף למרחק 5 ס"מ מהנקודה בה הקפיץ רפואי ומשחררים אותו.


מהי תאוצת הגוף (גודל וכיוון)?

- ב. דוחפים את הגוף למרחק 10 ס"מ מהנקודה בה הקפיץ רפואי ומשחררים אותו.

מהי תאוצת הגוף (גודל וכיוון)?


cut נתון כי בין הגוף למשטח קיים חיכוך, ומוקדם החיכוך הסטטי הוא: $\mu_s = 0.2$.

- ג. מהו המרחק המקסימלי בו ניתן להניח את הגוף קשור לקפיץ כך שיישאר במנוחה?

**14) דוגמה 2-קפיץ**

גוף בעל מסה של 3 ק"ג מחובר לקפיץ בעל קבוע

$$\text{קפיץ} = 100 \frac{\text{N}}{\text{m}} = k. \text{ בין הגוף למשטח אין חיכוך.}$$




על הגוף פועל כוח ימינה שגודלו 50 ניוטון.

קבע את ראשית הצירים בנקודת הרפינו של הקפיץ. היכן נמצאת נקודת שיווי המשקל (הנקודה בה סכום הכוחות שווה לאפס)?

15) דוגמה 3-קפיץ

גוף בעל מסה של 4 ק"ג מחובר לקיר באמצעות קפיץ

$$\text{בבעל קבוע קפיץ} = 50 \frac{\text{N}}{\text{m}} = k. \text{ בין הגוף למשטח אין חיכוך.}$$



אורכו הרפיי של הקפיץ הוא 10 ס"מ.


- א. חשב את הכוח שפעיל הקפיץ על הגוף כאשר הגוף למרחק 15 ס"מ מהקיר.

- ב. חשב את הכוח שפעיל הקפיץ על הגוף כאשר הגוף למרחק 6 ס"מ מהקיר.

- ג. חשב את תאוצת הגוף בכל נקודה אם על הגוף פועל כוח שגודלו 10 ניוטון שמאלה.

16) מסה עם שלושה קפיצים


שלושה קפיצים מחוברים למסה $m = 2\text{kg}$, כפי שנראה באיוור.
אין חיכוך בין המסה לרצפה.



$$\text{נתנו כי: } k_1 = 3 \frac{\text{N}}{\text{m}}, k_2 = 5 \frac{\text{N}}{\text{m}}, k_3 = 12 \frac{\text{N}}{\text{m}}.$$

הנה כי כל הקפיצים רפויים באותו הנקודה.

מהי תאוצת המסה כאשר היא נמצאת במרחק 20 ס"מ מנקודת שיווי המשקל?

17) שלושה קפיצים שווים

באיוור הבא, המסה $m = 4\text{kg}$ מחוברת ושלושה קפיצים בעלי קבועי קפץ שונים. הנה שכל הקפיצים רפויים כאשר המסה נמצאת ב-0 = x.

מהי תאוצת המסה, כאשר מיקומה הוא: $x = 0.2\text{m}$

$$\text{אם קבועי הקפיצים הם: } ? k_1 = 3 \frac{\text{N}}{\text{m}}, k_2 = 5 \frac{\text{N}}{\text{m}}, k_3 = 12 \frac{\text{N}}{\text{m}}$$

18) כוח אופקי תלוי בזמן

כוח אופקי שגודלו $F = 2t$ פועל על גוף, כאשר הזמן t נתון בשניות והכוח F בניוטונים.

מסת הגוף 2kg והוא נמצא במנוחה על משטח אופקי.

מקדמי החיכוך בין הגוף למשטח: $\mu_k = 0.15, \mu_s = 0.2$. מצא את:
א. זמן תחילת התנועה.

ב. כוח החיכוך בזמן $t = 0.5\text{sec}$.

ג. תאוצת הגוף כפונקציה של זמן.

ד. מהירות הגוף לאחר 4 שניות.

ה. מיקום הגוף לאחר 4 שניות.

19) כוח בזווית תלוי בזמן

הגוף שבציור מונח על הרצפה, בזמן $t = 0$ מתחילה לפעול על הגוף כוח שגודלו $F = 2t$ הזמן בשניות והכוח בניוטונים. הכוח פועל בזווית $\alpha = 37^\circ$ יחסית לציר התנועה. מסת הגוף היא 2kg .

נתנו כי מקדם החיכוך הסטטי והקינטי בין הגוף והרצפה הוא: $\mu = 0.2$.

$$\text{לפשטות החישוב קחו: } g = 10 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}, \sin \alpha = 0.6, \cos \alpha = 0.8.$$


א. متى יתחל הגוף לנוע?

ב. מהי מהירות הגוף לאחר 4 שניות?

ג. מה המרחק שהתקדם הגוף עד לnitoku מהקרקע?


(20) אדם על קרוןית על מישור משופע*

אדם בעל מסה m עומד על משקל המחבר בצורה אופקית לקרונית. מסת הקרןית היא M ונתון כי היא מחליקה ללא חיכוך על פני מישור משופע בזווית α .



הניחו שהחיכוך בין רגלי האדם לקרונית מספיק גדול, כך שאיןנו נע ביחס אליה.

- מה מורים המאזניים? הניחו שהחיכוך בין רגלי האדם לקרונית מספיק גדול, כך שאיןנו נע ביחס אליה.
- מצא את מקדם החיכוך המינימלי בין רגלי האדם והקרןית על מנת שהאדם לא יחליק ביחס לקרונית.
- כעת הנה כי אין חיכוך בכלל בין האדם לקרונית. מה תהיה תואצת הקרןית במצב זה? (כל עוד האדם נמצא על הקרןית).
- מה יורה המשקל במצב המתואר בסעיף ג'?

(21) מספריים חותכות חוט**

אדם מנסה לחותך חוט מתכת בעזרת מספריים. החוט חופשי לנעו והוא מחליק על המספריים עד שזווית המפתח של המספריים היא α , בזווית זו המספריים מתחילות לחותך את החוט.


- צייר את הכוחות שפעלים על החוט.
 - מצא את מקדם החיכוך בין המספריים לחוט.
 - הראה שהזווית α אינה תליה בכוח הכבוד כאשר המספריים במצב אופקי.
 - כעת, מסובבים את המספריים בזווית β סביב ציר העובר בבורג המספריים. כיוון הסיבוב הוא נגד השעון, כך שהחותט עולה כלפי מעלה.
- הראה כעת שהשינוי בזווית α הוא לפי: $\mu_0 + \Delta\mu = \mu$ כאשר μ_0 הוא

$$\text{המקדם שמצוות בסעיף ב'} = -\frac{mg \sin \beta}{F \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)}$$

אם המספריים יחתכו יותר מוקדם או יותר מאוחר?

(22) חבל מחליק משולחן משופע**

חבל בעל מסה M ואורך L נמצא על מישור משופע בזווית α שנמצא על שולחן כך שחלק משטלשל מהשולחן מטה. בין החבל לשולחן יש מקדם חיכוך קינטי וסטטי μ . בזמן $t=0$ יש חבל באורך 1 המשטלשל מקצה השולחן, ונמצא במנוחה.





מהו הגובה של קצה החבל (y) מתחת לשולחן כתלות בזמן? הניחו כי החבל בעל עובי אפס ויש חיכוך רק עם החלק העליון של המישור.

תשובות סופיות:

(1) $T_1 \approx 22.0\text{N}, T_2 \approx 26.9\text{N}$

(2) $T_2 \approx 19.6\text{N}, T_1 \approx 26.4\text{N}$

(3) א. מסה 2 ק"ג : 



ד. 50N .

ג. 20N .

ב. 20N .

ב. 60N למעלה

א. 30N (4)

40N (5)

T \approx 41.3N (6)

ב. 10N .


א. 12N . (7)



ב. $\sqrt{10} \text{ sec}$

א. 20N (8)

ב. N (9)



א. $M_{\min} = 2.87\text{kg}, M_{\max} = 4.79\text{kg}$ ב. $M = 3.83\text{kg}$ (10)

ב. $t \approx 6.82\text{ sec}$ (11)

ג. סעיף א': נשאר במנוחה, סעיף ב': אין משמעות.

ב. לא, כי $\Delta x = 52.5\text{m} > 50\text{m}$

א. כן, כי $\Delta x \approx 37.5\text{m} < 50\text{m}$ (12)

ב. גודל: $a = 2.5 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$, הכוון חיובי.

א. גודל: $-1.25 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$, הכוון חיובי. (13)

ג. $x = 8\text{cm}$.

x = $\frac{1}{2}\text{ m}$ (14)

ג. סעיף א': $a = -3.13 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$

ב. F = 2N

א. F = -2.5N (15)

סעיף ב': $a = -2 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$

a = $-2 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$ (16)

$$a \approx 0.326 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} \quad (17)$$

$$a = \begin{cases} 0 & 0 < t < 2 \\ t - \frac{3}{2} & t > 2 \end{cases} \quad f_s = 1\text{N} \quad \text{ב.} \quad t = 2 \text{ sec.} \quad \text{א.} \quad (18)$$


$$x(t=4) = 2.3\text{m} \quad \text{ה.} \quad v(t=4) = 3 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \quad \text{ט.}$$

$$x = 467\text{m} \quad \text{ב.} \quad v(t=4) = 1.53 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \quad t \approx 2.17 \text{ sec.} \quad \text{א.} \quad (19)$$

$$a_x = \frac{(M+m)g \sin \alpha}{M + m \sin^2 \alpha} \quad \text{ב.} \quad \mu_{s \min} = \tan \alpha \quad \text{ב.} \quad N_2 = mg \cos^2 \alpha \quad \text{א.} \quad (20)$$

$$N_2 = m \left(g - \left(\frac{(M+m)g \sin \alpha}{M + m \sin^2 \alpha} \right) \sin \alpha \right) \quad \text{ט.}$$

$$\text{ג. הוכחה.} \quad \mu_k = \tan \frac{\alpha}{2} \quad \text{ב.}$$



ד. הוכחה. החוט יחתך יותר מאוחר.


$$y(t) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\beta}{k} \right) \left(e^{\sqrt{\frac{k}{M}}t} + e^{-\sqrt{\frac{k}{M}}t} \right) - \frac{\beta}{k} \quad (22)$$

גלגלות נעות ומכפלי כוח:


רקע:

נבטא את אורך החוט באמצעות מיקום הגוף וקבועים ונגזר.


שאלות:



- 1) גלגולות וגזרה בזמן של אורך החוט
במערכת הבאה מסות הגוף ידועות.
אין חיכוך בין המסות למשטח.
מצא את תאוצות הגוף ואת המתייחסות בחוטים.



- 2) אחת תליה מהתקלה ואחת על שולחן
במערכת הבאה המסה m_1 נמצאת על שולחן חסר חיכוך
ומחברת באמצעות חוט אידיאלי כפי שמתואר באירור.
הגיגולות אידיאליות ו- m_2 נתונה.
מצא את התאוצה של כל מסה כל עוד הן לא נופלות
מהשולחן או פוגעות ברצפה.



- 3) מערכת גלגולות מסובכת
מצאו את תאוצות הגוף במערכת הבאה.
מה התנאי לכך שהמסה m_3 תנוע כלפי מעלה
אם נתון שהמערכת מתחילה ממנוחה?

תשובות סופיות:

$$a_1 = \frac{2m_2g}{4m_2 + m_1} \quad (1)$$

$$a_1 = \frac{m_2g}{2m_1 + \frac{m_1}{2}}, \quad a_2 = \frac{m_2g}{4m_1 + m_2} \quad (2)$$


$$a_3 < 0, \quad a_3 = \left((m_2 + m_3)(4m_2 + m_1) + 4m_2^2 \right) \quad (3)$$

תרגילים נוספים:

שאלות:

(1) זווית אופטימלית למשיכה

כוח F מושך ארגו בעל מסה m בזווית θ מעלה האופק. מקדם החיכוך בין הארגו לקרקע הוא μ .




- א. מצא את תאוצה הכוח כתלות בפרמטרים הרשומים בשאלת.

- ב. הנח כי מקדם החיכוך הקינטי הוא 0.3. בדוק באילו מהערכים הבאים של הזווית יש את התאוצה הגבוהה ביותר: $45^\circ, 30^\circ, 20^\circ, 10^\circ, 0^\circ = \theta$.
- ג. מצא את הזווית המדויקת בה התאוצה תהיה מקסימלית. השתמש בנגזרת.

(2) מטוטלת מכונית


מטוטלת קשורה לתקרת מכונית. המטוטלת נמצאת בזווית קבועה ונתונה α , ביחס לאנך לתקרת המכונית.




- א. מצא מהי תאוצה המכונית (גודל וכיוון)?
ב. האם ניתן לדעת מה כיוון תנועת המכונית?

(3) מסה של 4 על עגלת של 10

מסה של 4 ק"ג מונחת מעלה עגלת בעלת מסה של 10 ק"ג. החיכוך בין העגלת למשטח זיניח.



- מקדם החיכוך הסטטי בין המסיה לעגלת הוא $\mu_s = 0.2$. כוח אופקי F מופעל על המסיה התחתונה ימינה. מהו הכוח המקסימלי הנitin להפעיל כך שהמסה העליונה לא תחליק על העגלת.

4) מסה מחליקה על עגלה

מסה m מונחת על עגלה בעלת מסה M , הנמצאת במנוחה.

המסה מונחת בקצתה השמאלי של העגלה. נתנים למסה העליונה (בלבד) מהירות ההתחלתית v_0 .


בין המסה לגג העגלה קיים חיכוך, והחיכוך בין העגלה למשטח זניח.

$$\text{נתון : } M = 12\text{kg}, m = 3\text{kg}, \mu_k = 0.2, v_0 = 20 \frac{\text{m}}{\text{sec}}, \mu = ?$$

א. מצא את הביטויו למיקום ולמהירות המסה, כתלות בזמן.

ב. מצא את הביטויו למיקום ולמהירות העגלה, כתלות בזמן.


ג. מהי המהירות הסופית של שני הגוףים, בהנחה שהמסה לא נופלת מהעגלה.

5) מסה צמודה למשאית

מסה m מונחת בצדוד לחילה הקדמי של משאית.

בין המסה למשטח קיים חיכוך. נתון : m, μ .

מהי התאוצה המינימלית הדורשיה למשאית על מנת שהמסה לא תיפול?

**6) קופסה בין מדרונות**

קופסה קטנה עם גלגלים מונחת על מישור משופע בעל זווית של 45 מעלות.

ה קופסה משוחררת ממנוחה מגובה של 3 מטרים ומתחלילה בתנועה.


בתחלת המדרון הקופסה עברה למדרון משופע אחר בעל זווית של 30 מעלות.

הזנח אפקטיבים המתרחשים בעת המעבר והנח כי גודל מהירות הקופסה במעבר בין המדרונות נשאר זהה.

א. מהו הגובה המקסימלי אליו הגיע הקופסה במדרון השני? נחש מה יקרה לאחר מכן.

ב. חזר על סעיף א' אם נdag הקופסה שכח לשחרר את מעצור היד של הגלגלים וקיים חיכוך קינטי בין הקופסה למשטח.


$$\text{מקדם החיכוך הוא : } \mu_k = 0.2$$

7) זריקה אופקית על מישור משופע

מישור משופע חלק ABCD יוצר זווית של 30 מעלות עם הקרקע.
הנקודה E נמצאת במרחק 5m מהצלע AB
ובמרחק 2m מהצלע BC.

מן הנקודה E נזרק כדור קטן על הלוח,
במהירות התחלתית v_0 שכיוונה מקביל לצלע AB.

- צייר מערכת צירים, ורשו את הכוחות הפועלים על הכדור בעת תנועתו על הלוח בכל ציר.
- מהי צורת המסלול של הכדור על הלוח?
- מצא את v_0 , עבורה הכדור יגיע בדיקון לנקודה B.
- מהי מהירות הכדור בנקודה B עבורה ה- v_0 שמצויה בסעיף ג'?


8) כוח דוחף שתי קופסאות צמודות

שתי תיבות נמצאות צמודות זו לזו על משטח אופקי חסר חיכוך.

משקלות התיבות הם: $m_1 = 3\text{kg}$ ו- $m_2 = 5\text{kg}$.

כוח אופקי דוחף את תיבה 2 שדוחפת את תיבה 1, כפי שמתואר בתרשימים.
גודל הכוח הוא $N = 16$.
חשב את:

- התואוצה של כל תיבה.
- הכוח הנורמלי $N_{1 \rightarrow 2}$, שבו התיבה הראשונה דוחפת את השנייה.
- הכוח הנורמלי $N_{2 \rightarrow 1}$, שבו התיבה השנייה דוחפת את הראשונה.

9) גוף על גוף במישור משופע


גוף A בעל מסה m_A , גוף B בעל מסה m_B מחוברים באמצעות חוט וגלגלת, כמוות באוויר.

גוף A מונח על מישור משופע חלק בעל זווית α .

גוף C בעל מסה m_C מונח על הגוף A.

מקדם החיכוך הסטטי בין הגוףים A ל-C הוא μ_s .

- מהי המסה המרבית של הגוף B, כך שהגוףים C ו-A ינועו יחדיו במעלה המישור?
- מהי תאוצת הגוףים והמתיחות בחוט, אם המסה של הגוף B היא זאת שמצויה בסעיף א'?
- מהן תאוצות הגוףים אם המסה של הגוף B גדולה מזו שמצויה בסעיף א'
ומקדם החיכוך הקינטי הוא μ_k ?

10) גליל על שני ארוגזים

גליל אחד, שמסתו m מונח על שני ארוגזים
משמעותיהם : $m_A = 2m$, $m_B = m$.

לאrugזים גבהים שונים והם מונחים על משטח אופקי.
בין הגליל לאrugזים אין חיכוך.


כשהמערכת נמצאת בשיווי משקל יוצרים הרדיוסים
של הגליל, הנוגעים בפינות האrugזים זווית של : $\alpha = 30^\circ$, $\beta = 45^\circ$.

עם האnek לkrk, ראה איור. נתונים : g , m .

א. מה הכוח שפועל כל ארוג על הגליל?

ב. בהנחה שקיים אותו מקדם חיכוך בין הארוגזים והמשטח,

מהו גודלו המינימלי של מקדם החיכוך, כך שהמערכת תישאר בשיווי משקל?

11) כוח דוחף גוף על גוף

שני גופים זהים משמעותם : $m_1 = m_2 = m$, מונחים
זה על גבי זה, על גבי שלוחן אופקי (ראה איור).
בין הגוף קיימים חיכוך, ומקדמי החיכוך הקינטי
והסתטי הם : μ_k , μ_s .

כוח חיצוני \vec{F} מופעל על הגוף העליון בזווית α מתחת לאופק.

. הבינו את תשובתכם באמצעות הפרמטרים : μ_k , μ_s , m , g , F , α .

א. בהנחה שהגוף נעים ייחדיו, מהי התואча המשותפת?


ב. בהנחה שהגוף נעים ייחדיו, מהו גודלו של כוח החיכוך בין הגוף?

ג. מהו גודלו המקסימלי של \vec{F} , כך שהגוף ינוע ייחדיו?

ד. נתון כי : $\mu_k = 0.2$, $\mu_s = 0.15$, $\alpha = 30^\circ$.

מצא את תאוצה כל גוף, כאשר הכוח הדוחף הוא : $F = \frac{1}{2}mg$

ה. חזר על סעיף ד' כאשר $F = 3mg$.

12) מסה על מסה מחוברות בגלגלת

נתונה מערכת הכוללת שני גופים : $m_1 = 4\text{kg}$, $m_2 = 3\text{kg}$ הגופים קשורים על ידי חוט וגלגלת אידיאלית,
ומונחים על מישור משופע בעל זווית $\alpha = 30^\circ$.

מקדמי החיכוך בין הגוף הם : $\mu_k = \mu_s = 0.4$,

ומקדמי החיכוך עם המישור הם : $\mu_k = \mu_s = 0.3$.

כוח אופקי F פועל על m_2 .

א. מהו ה- F המקסימלי, כך שהגוף יישאר במנוחה?

ב. אם $N = 40\text{N}$, מהי תאוצה הגוף?

13) זמן לעלות וירידת מדרון עם חיכוך

גוף נזרק במעלה מדרון משופע ב מהירות התחלתית v_0 .


זווית השיפוע של המדרון היא θ ומקדמ החיכוך בין המדרון לגוף הוא μ_k .

א. מצאו כמה זמן ייקח לגוף לחזור לנקודת ההתחלה
(בנחתה שהוא לא נשאר במנוחה בשיא הגובה)?

ב. מה היחס בין מהירות הסופית ומהירות התחלתית של הגוף?

14) גוף על גוף וכוח מושך

במערכת שבאיור המסות נתונות.



נתונות גם מקדמי החיכוך בין m_1 למשטח μ_{s_1} , μ_{k_1} ,

ומקדמי החיכוך בין m_1 ל- m_2 , μ_{s_2} , μ_{k_2} .

הכוח F באיזור מתיחס רק לסעיף ב.

א. מהן תואכות הגוףים והמתיחות בחוט

בנחתה ש- m_2 נעה בתואוצה יחסית ל- m_1 ?

ב. מהו הכוח המינימלי F שיש להפעיל כדי שהמסות ינועו יחדיו?

15) תיבה על מכונית משולשת

מכונית עם זווית בסיס α נוסעת בתואוצה קבועה.

מניחים תיבה בעלת מסה m על דופן המכונית.


א. מצאו את גודלו של כוח החיכוך

בין המכונית לתיבה אם ידוע

שתואצת המכונית היא a ימינה

והתיבה לא מחליקה על הדופן.

ב. מהו μ_s המינימלי המאפשר מצב זה?

**16) כדור בתא מטען משופע**


למשאית באיזור תא מטען משופע בזווית α

ובסופה דופן אנכית.

בתוך תא המטען יש כדור בעל מסה M .

המשאית נוסעת בתואוצה קבועה a שמאלה.

מצאו את הכוחות הנורמלים שפועלים על הכדור בהנחה שאין חיכוך.



תשובות סופיות:

$$\theta_0 \approx 16.6992^\circ \text{ ג.} \quad \theta = 20^\circ \text{ ב.} \quad a = \frac{F}{m} (\cos \theta + \mu_k \sin \theta) - \theta_k g \text{ נ.} \quad (1)$$

2) א. גודל: α , כיוון: חיובי ב. לא

$$F = \mu_s (m_1 + m_2)g = 28N \quad (3)$$

$$\text{א. מיקום-זמן: } v_1(t) = 20 - 2t, \quad x_1(t) = 0 - 20t - \frac{1}{2}t^2 \quad (4)$$


$$\text{ב. מיקום-זמן: } v_2(t) = 0 + \frac{1}{2}t, \quad x_2(t) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}t^2 \quad (5)$$

$$v_2(t=8) = 4 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \text{ ג.}$$

$$a_{\min} = \frac{g}{\mu_s} \quad (6)$$

$$h_{\max} = 1.78\text{m} \text{ ב.}$$

$$h_{\max} = 3\text{m} \text{ נ.} \quad (7)$$



$$\text{ב. פרבולה כמו בזריקה אופקית.} \quad v_0 = \sqrt{2} \frac{\text{m}}{\text{sec}} \text{ ג.} \quad (8)$$

$$v_{x(t_B)} = \sqrt{2} \frac{\text{m}}{\text{sec}}, \quad v_{y(t_B)} = 7.07 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \text{ ט.}$$

$$N_{2 \rightarrow 1} = 6N \text{ ג.} \quad N_{1 \rightarrow 2} = 6N \text{ ב.} \quad a_1 = a_2 = 2 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} \text{ נ.} \quad (9)$$

$$m_{B_{\max}} = \frac{(m_A + m_C)\mu_s \cos \alpha}{1 + \sin \alpha - \mu_s \cos \alpha} \text{ נ.}$$

$$a = g[\mu_s \cos \alpha -] \sin \alpha, \quad T = g(m_A + m_C)\mu_s \cos \alpha \text{ ב.}$$

$$a_c = (\mu_k \cos \alpha - \sin \alpha)g, \quad a_A = a_B = \frac{g(m_B - \mu_k m_c \cos \alpha - m_A \sin \alpha)}{m_A + m_B} \text{ ג.}$$

$$\mu_{s_{\min}} = 0.464 \text{ ב.} \quad N_A = 0.732mg, \quad N_B = 0.518mg \text{ נ.} \quad (10)$$

$$f_s = \frac{F \cos \alpha}{2} \text{ ב.} \quad a = \frac{F \cos \alpha}{2m} \text{ נ.} \quad (11)$$

$$a = 2.17 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} \text{ ט.} \quad F_{\max} = \frac{2\mu_s mg}{\cos \alpha - 2\mu_s \sin \alpha} \text{ ג.}$$

$$a_1 = 22.2 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}, \quad a_2 = 3.75 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} \text{ ח.}$$

$$a = 1.81 \frac{m}{sec^2} . \blacksquare \quad F_{max} = 31.05N . \text{ נ } (12)$$

$$t = \frac{v_0}{g(\sin \theta + \mu_1 \cos \theta)} + \frac{v_0}{g \sqrt{(\sin^2 \theta - \mu_k^2 \cos^2 \theta)}} . \text{ נ } (13)$$

$$\frac{v_f}{v_0} = \sqrt{\frac{\sin \theta - \mu_k \cos \theta}{\sin \theta + \mu_k \cos \theta}} . \blacksquare$$

$$a_1 = a_3 = \frac{m_3 g - \mu_{k_2} m_2 g - \mu_{k_1} (m_1 + m_2) g}{m_1 + m_3} , \quad a_2 = \mu_{k_2} g . \text{ נ } (14)$$

$$F_{min} = m_3 g - \mu_{s_2} g (m_3 + m_2) - \mu_{s_1} (m_1 + m_2) g . \blacksquare$$

$$\mu_{s_{min}} = \frac{g \sin \alpha - a \cos \alpha}{g \cos \alpha + a \sin \alpha} . \blacksquare \quad f_s = mg \sin \alpha - ma \cos \alpha . \text{ נ } (15)$$

$$N_1 = \frac{Mg}{\cos \alpha} , \quad N_2 = M(a + g \tan \alpha) \quad (16)$$

פיזיקה 1 מכניתה

פרק 6 - כוח גרר וכוח ציפה -

תוכן העניינים

89	1. כוח גרר, הסבר ודוגמה עם צנהן
90	2. כוח ציפה
(לא ספר)	3. כוח סטוקס
91	4. סיכום כוח גרר סטוקס וכוח ציפה
92	5. תרגילים מסכמים

כוח גרר, הסבר ודוגמה עם צנחן

רקע

כוח גרר הוא כוח מהצורה

$$\vec{F} = -k\vec{v}$$

כאשר \vec{v} היא מהירות הגוף ו- k הוא קבוע כלשהו.

משוואת תנועה - משווהה הבלתי את x , v ו- a . בדרך מגאים אליה ממשוואת הכוחות.

מהירות סופית - המהירות הקבועה שהגוף מגיע אליה לאחר זמן רב. (תאוצה שווה לאפס)

כוח סטוקס - כוח גרר שפועל על כדור בתוך נוזל

$$\vec{F}_v = -6\pi\eta R\vec{v}$$

η - צמיגות הנוזל
 R - רדיוס הכדור

שאלות



1) הסבר ודוגמה עם צנחן

צנחן קופץ ממטרס ופותח מצנה.

נתון כי כוח החיכוך עם האויר הוא: $\vec{F} = -kv$.

א. מצאו את משווהת התנועה של הצנחן.

ב. מצאו את המהירות הסופית.

ג. מצאו את המהירות כפונקציה של הזמן אם הנפילה התחילה ממנוחה.

תשובות סופיות

$$v(t) = \frac{mg}{k} \left(1 - e^{-\frac{k}{m}t} \right) \text{ ג.} \quad v_{yfinal} = \frac{mg}{k} \text{ ב.} \quad mg - kv_y = ma_y \text{ א.} \quad (1)$$

כוח ציפה

רקע

כוח ציפה – כוח הפועל על גוף בנוזל. כיוונו הפוך לכוח הכבוד.

$$F_b = \rho_l V g$$

כאשר ρ_l היא צפיפות הנוזל ו- V הוא נפח הגוף.

שאלות

1) שני כדורים קשורים בחוט בתוך המים


שני כדורים בעלי נפח זהה $V = 20\text{ cm}^3$ קשורים בחוט זה לזה.

מניחים את ה כדורים במים ולאחר זמן רב רואים שהמערכת התייצבה כך שכדור 1 נמצא כולו בתחום המים ורך חצי מנפחו של כדור 2 שקע בתחום המים. ראה איור.

המסה של כדור 1 גדולה פי 4 מזו של כדור 2.

א. מהי המסה של כל כדור?

ב. מהי צפיפות המסה של כל כדור?



תשובות סופיות


$$\rho_1 = 1.2 \frac{\text{gr}}{\text{c.m}^3}, \rho_2 = 0.3 \frac{\text{gr}}{\text{c.m}^3} \quad \text{ב.} \quad m_1 = 24\text{gr}, m_2 = 6\text{gr} \quad \text{א. (1)}$$

כדור נזרק לבריכה:

שאלות:

1) כדור נזרק לבריכה

כדור נזרק לתוך בריכה עם מהירות ההתחלתית v_0 בזווית θ עם פני המים.
נתונים :



צמיגות המים - g.

רדיויס הכדור - R.

מהירות ההתחלתית - v_0 .

צפיפות המים - ρ_w .

צפיפות הכדור - ρ_b .

א. רשמו את המשוואת התנועה של הכדור.

ב. מצאו את המהירות הסופית של הכדור.

ג. מצאו את העומק המקסימלי אליו יגיע הכדור אם $\rho_b < \rho_w$.

תשובות סופיות:

1) א. משוואות התנועה הן : $-kv_x = m \frac{dv_x}{dt}$ ו- $C - kv_y = m \frac{dv_y}{dt}$

כאשר : $m = \rho_b \frac{4\pi R^3}{3}$, $C = (\rho_b - \rho_w)g \frac{4\pi R^3}{3}$, $k = 6\pi \eta R$


$$\text{ב. } v_{y\ final} = \frac{C}{k}, v_{x\ final} = 0$$

$$\text{ג. } y_{max} = \frac{mc}{k^2} \left[\frac{v_0 k}{C} \sin \theta - \ln \left(\frac{C}{C - kv_0 \sin \theta} \right) \right]$$

תרגילים מסכימים:

שאלות:

- 1) כוח גורר עם חיכוך קינטי**
 גופ בעל מסה M נע על מישור אופקי ב מהירות התחלהית v_0 ימינה. בין הגוף והמשיר יש חיכוך קינטי ומקדם החיכוך הוא μ . בנוסף פועל על הגוף כוח התנגדות של האוויר $v = -\alpha f$, α קבוע.
 א. מצאו את המשוואת הכוונות על הגוף.
 ב. מהי מהירות הגוף בכל רגע?
 ג. מה מיקום הגוף בכל רגע? הנח כי ברגע $t=0$ מיקום הגוף הוא x_0 .
- 2) רכבת עוצרת**
 רכבת שמסתה 200 טון ומהירותה 30 מ'/'שנ', מתחילה לבטום כאשר כוח עוצר $F = \frac{N \cdot s}{m} - 4000$ פועל עלייה. בעבור איזה מרחק תעוצר הרכבת בתנאים האלה?
- 3) כוח גורר ריבועי ב מהירות**
 ב מהירותים גבוהות, גודל כח החיכוך שפעיל האוויר על כדור הוא: $F_d = kv^2$.
 א. מצאו את המהירות הסופית של כדור הנופל מגובה רב.
 זורקים כדור ישיר לעלה ב מהירות התחלהית השווה ל מהירות הסופית מסעיף א.
 ב. מהי תאוצה הכדור כאשר מהירותו שווה לחצי מהירותו התחלהית אם הכדור בדרכו לעלה?
 ג. מהי תאוצה הכדור כאשר מהירותו שווה לחצי מהירותו התחלהית אם הכדור בדרכו למטה?
- 4) כוח גורר מתכונתי ל מהירות בשלישית**
 קליע בעל מסה m נורה מלוע רובה ועובד דרך בול עץ בעובי H המקובע במקום. בכניסה לבול העץ מהירות הקליע v_0 וביציאה v_1 . במהלך התנועה בתוך העץ פועל על הקליע כוח מתכונתי ל מהירות בשלישית $f = -kv^3$, k קבוע. נתון כי הקליע חודר לבול העץ במקביל לקרקע וכי ההשפעה של כוח הכביד על תנועת הקליע זניחה.



- א. מצאו את מהירות הקליע כתלות בזמן בתוך בול העץ.
- ב. מהו מיקום הקליע כתלות בזמן בתוך בול העץ?
- ג. מהי מהירות הקליע בתוך הבול לאחר זמן אורך ביחס ל- $\frac{m}{kv_0^2}$
- ד. בטאו את מהירות היציאה כתלות ב מהירות הכניסה, אורך הבול, מסת הקליע, ומקדם החיכוך.

5) צוללת

צוללת שمسתה 20 טון שטה בכיוון אופקי ב מהירות 10 מ"ש/נ. ברגע מסוים, הצוללת מכבה את מנועה. מרגע זה פועל על הצוללת כוח עצירה בנתון ביביטוי: $\hat{F} = -\gamma v^2$, כאשר γ זה וקטור היחידה בכיוון התנועה. זהו הכוח היחיד הפועל על הצוללת. הניחו כי בכיוון האנכי אין תנועה. נתון כי 5 דקומות לאחר כיבוי המנוע מהירות הצוללת קטנה פי 4.

א. מהי מהירות הצוללת כפונקציה של הזמן?

ב. חשבו את הקבוע γ .

ג. מהו המרחק שעברה הצוללת בחמש הדקות מרגע כיבוי המנוע?

6) סירה עם כוח גור אקספוננציאלי

סירה שמסתה 50 ק"ג החלה את תנועתה ב מהירות 5 מ"ש/נ וモואatta על ידי כוח חיכוך הנתנו בנוסחה: $\hat{F} = -2e^{0.5v}$. יחידות המידה mks, v מהירות הגוף. הניחו שכוח החיכוך הוא הכוח היחיד הפועל על הסירה.

א. כמה זמן יעבור עד לעצירת הסירה?

ב. מהי מהירות הגוף בחצי מהזמן הנ"ל?

תשובות סופיות:

$$v(t) = \left(-\mu g + \left(\mu g + \frac{\alpha}{m} v_0 \right) e^{-\frac{\alpha}{m} t} \right) \frac{m}{\alpha} . \quad \text{ב} \quad -\mu mg - \alpha v = ma . \text{ נ}$$

$$x(t) = \frac{m}{\alpha} \left((-\mu g)t + \left(\mu g + \frac{\alpha}{m} v_0 \right) \left(\frac{1}{-\frac{\alpha}{m}} \right) e^{-\frac{\alpha}{m} t} \right) + C , \quad C = x_0 + \left(\frac{m}{\alpha} \right)^2 \left(\mu g + \frac{\alpha}{m} v_0 \right) . \quad \lambda$$

$$x(t) \approx 6.1 \text{ km} \quad \text{(1)}$$

$$a = \frac{3}{4}g . \lambda \quad a = \frac{5}{4}g . \quad \text{ב} \quad v = \sqrt{\frac{mg}{k}} . \text{ נ} \quad \text{(2)}$$

$$x(t) = \frac{m}{k} \sqrt{\frac{2k}{m} t + \frac{1}{v_0^2}} - \frac{m}{kv_0} . \quad \text{ב} \quad v(t) = \frac{1}{\sqrt{\frac{2k}{m} t - \frac{1}{v_0^2}}} . \text{ נ} \quad \text{(3)}$$

$$v(t) = \frac{1}{\frac{kH}{m} + \frac{1}{v_0}} = v_2 . \quad \text{ט} \quad v(t) \approx \frac{1}{\sqrt{2kt}} . \quad \lambda$$

$$\Delta x = 1.39 \cdot 10^3 \text{ m} . \quad \lambda = 20 \frac{\text{kg}}{\text{m}} . \quad \text{ב} \quad v(t) = \frac{1}{0.1 + 10^{-3}t} . \text{ נ} \quad \text{(4)}$$

$$v\left(t = \frac{45.9}{2}\right) \approx 1.23 \frac{\text{m}}{\text{sec}} . \quad \text{ב} \quad t = 45.9 \text{ sec} . \text{ נ} \quad \text{(5)}$$

פיזיקה 1 מכניתה

פרק 7 - תנועה מעגלית -

תוכן העניינים

95	1. נוסחאות בסיסיות בתנועה מעגלית.....
101	2. הכוח המרכזי 103
106	3. וקטורים בתנועה מעגלית..... 110
	4. תרגילים מסכמים..... 5. תרגילים מסכימים למתקדמים.....

נוסחאות בסיסיות בתנועה מעגלית

רקע

- תנועה מעגלית היא תנועה על מעגל עם רדיוס קבוע.

יש להציב את הزاوية ברכינאים כיוון המהירות תמיד משיק למעגל	$S = \Delta\theta \cdot R$	הדרך בתנועה מעגלית
כיוון המהירות תמיד משיק למעגל	$v(t) = \frac{dS}{dt}$	גודל מהירות הקווית (speed) הרגעתית
f - הדרירות T - זמן המחזור הדרירות וזמן המחזור מוגדרים רק בתנועה מעגלית קצובה	$\omega = \frac{d\theta}{dt} = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$	מהירות זוויתית
קשר ישיר בין הגדלים	$v = \omega R$	קשר בין המהירות הקווית לזרויתית
$a_r = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$	$a_r = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$	תאוצה רדיאלית לכיוון מרכז המעגל
$\Sigma F_z = m \frac{v^2}{R} = m\omega^2 R$ <small>למרכז המעגל</small>	$\Sigma F_z = m \frac{v^2}{R} = m\omega^2 R$ <small>למרכז המעגל</small>	הכוח
$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$	$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$	תאוצה זוויתית
$a_\theta = \frac{d \vec{v} }{dt} = \alpha R$	$a_\theta = \frac{d \vec{v} }{dt} = \alpha R$	תאוצה משיקית
כאשר h ו- θ נמדדים מתחתיות המעגל	$h = R(1 - \cos\theta)$	הגובה במעגל אנכי

שאלות

1) דוגמה- נהג מרוצים

נהג מרוצים נוסע במסלול מעגלי שרדיוסו 50 מטר.

$$\text{מהירותו של הנהג כתלות בזמן היא: } v = \omega t .$$

א. מצא את המהירות הזוויתית של הנהג כתלות בזמן ומצא את הזווית של הנהג לאחר 5 שניות? (בנחתה כי התחילה מזווית אפס).

ב. متى ישלים הנהג את הסיבוב הראשון?




2) דוגמה- חישוב מהירות זוויתית של מוחוי שעון

חשב את המהירות הזוויתית של מוחוי השניות, מוחוי הדקות
ומוחוי השעות בשעון מוחגים.

3) חישוב מהירות זוויתית של כדור הארץ

א. חשב את המהירות הזוויתית של סיבוב כדור הארץ סביב עצמו.



ב. מהי המהירות הקווית של אדם הנמצא בקו המשווה

אם רדיוס כדור הארץ הוא בערך 6400 ק"מ?

ג. מהי המהירות הקווית של אדם הנמצא בקו רוחב 30° ?

4) דוגמה- יובל מסובבת אבן


יובל קשורת אבן שمسתה 200 גרם לחוט באורך 0.7 מטר.

יובל מסובבת את האבן באמצעות החוט במעגל אופקי מעלה ראשונה

(כמו שמסובבים קלע). המהירות הזוויתית של האבן היא: $\omega = 12 \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$

מהי התאוצה הרדיאלית של האבן ומהי המתיichות בחוט?

הנח שכוח הכביד זניח.




5) מסה קשורה לעמוד מסתובב

במערכת הבאה מסה m קשורה דרך שני חוטים למוט המסובב
במהירות זוויתית ω_0 . אורך החוטים זהה ושווה ל-1.

המהירות של החוטים עם המוט היא 30 מעלות.

מהי המתיichות בכל חוט? בשאלת זו כוח הכביד אינו זניח.

נתונים: m , l , ω_0 .



- 6) כדור בקערה כדורית.**
 כדור קטן מונח בתחום קערה כדורית בעל רדיוס R .
 מניחים את הכדור בזווית של 30 מעלות ביחס לאופק.
 ונותנים לו מהירות התחלה לתוך הדף.
 מהו גודל המהירות התחלה הדרוש כך שהכדור
 יישאר בתנועה מעגלית בגובה קבוע?


- 7) דוגמה-תאוצה זוויתית נהג המרוצים**
 מצא את התאוצה הזוויתית בדוגמה-נהג מרוצים (שאלה 1).

- 8) זווית משתנה בזמן**
 המיקום הזוויתי של נקודה על גבי שפת גלגל מסטובב נתונה
 ע"י: $\phi = 5t + 3t^2 - 2t^3$.
 א. מהי מהירות הזוויתית ב- $t = 2\text{ sec}$ ו- $t = 4\text{ sec}$?
 ב. מהי התאוצה הזוויתית המומוצעת בין זמנים אלו?
 ג. מהי התאוצה הזוויתית הרגעית בזמנים אלו?

- 9) תאוצה משיקית קבועה**
 גוף נע במעגל בעל רדיוס R בתאוצה משיקית קבועה a_t
 ולא מהירות התחלה.
 מצאו את גודל התאוצה הרדיאלית:
 א. כפונקציה של הזמן.
 ב. כפונקציה של זווית הסיבוב.

- 10) תאוצה משיקית רדיאלית וכוללת**
 גוף נע במעגל שרדיוסו 3 מטר.
 הדרך שעובר הגוף נתונה ע"י: $s = 6t^2 + 3t$.
 חשב את התאוצה המשיקית, הרדיאלית והכוללת (כתלות בזמן).

- 11) דוגמה-כוח על נהג המרוצים**
 בדוגמה של נהג המרוצים (שאלה 1), מצא מה הכוח הפועל על המכונית
 אם מסת המכונית (כולל הנהג) היא טון אחד.
 מי מפעיל כוח זה?

12) דוגמה-כדור בלוֹפּ

כדור קטן מאד מתחילה להתגלגל ממנוחה מגובה $h = 6\text{m}$ ונכנס לתוכו מעגל אנכי.


נתון שהכדור ממשים סיבוב ואין חיכוך בין הריצפה.
רדיוס המעלג הוא : $R = 2\text{m}$.

א. מצא את מהירות הכדור בכל הנקודות באוויר.
(רמז : שימור אנרגיה).

ב. מצא את התאוצה הרדיאלית של הכדור באותה נקודות.

ג. מצא את התאוצה בכיוון המשיק באותה נקודות.

ד. מצא את גודל התאוצה הכוללת באותה נקודות.

**13) כוחות במטוטלת**

מטוטלת משוחררת ממנוחה מזויה של 45 מעלות.
אורך החוט הוא l והמסה היא m .

א. מהירות המשקה בתחלת המסלול?

ב. מהי המתייחות בחוט ברגע זה?

ג. מהי מהירות המשקה בנקודה B הנמצאת
בזווית 30 מעלות? ומהי המתייחות בחוט באותה נקודה?


ד. מהי המתייחות בחוט בשיא הגובה וברגע השחרור?

14) רוכב אופנוּע במעגל אנכי

רוכב אופנוּע מתחילה תנועתו מנקודת ההתחלת שבציר.
מהי המהירות התחלתית המינימלית הנדרשת עבור


הרוכב כך שיוכל להשלים את הסיבוב האנכי.
הנח שהרוכב אינו משתמש במנוע לאחר
נקודת ההתחלת.

נתון : h , R .

**15) קופסה מחיליקה על גבעה מעגלית**

קופסה במשקל m מונחת על ראש גבעה בצורת
חצי מעגל ברדיוס R .

ה קופסה מתחילה להחליק לאחד הצדדים
מןוחה כאשר אין חיכוך בין להגבעה.
מצא באיזה זווית הקופסה מתנתק מהגבעה.



תשובות סופיות

$$12.5 \text{ sec} \quad \text{ב.} \quad \omega = \frac{2t}{25}, \theta \approx 57.3^\circ \text{ נ.} \quad (1)$$

$$1.75 \cdot 10^{-3} \frac{\text{rad}}{\text{sec}} \quad \text{מחוג דקotas:} \quad 0.105 \frac{\text{rad}}{\text{sec}} : \text{ מחוג שניות:} \quad (2)$$

$$1.45 \cdot 10^{-4} \frac{\text{rad}}{\text{sec}} : \text{ מחוג שעות:} \quad (3)$$

$$400 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \text{ ג.} \quad 465 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \text{ ב.} \quad 7.27 \cdot 10^{-5} \frac{\text{rad}}{\text{sec}} \text{ א.} \quad (4)$$

$$T_1 = \frac{mg}{\sqrt{3}} + \frac{m\omega_0^2 l}{2}, T_2 = \frac{-mg}{\sqrt{3}} + \frac{m\omega_0^2 l}{2} \quad (5)$$

$$v = \sqrt{\frac{3gR}{2}} \quad (6)$$

$$\alpha = \frac{2}{25} \frac{\text{rad}}{\text{sec}^2} \quad (7)$$

$$\bar{\alpha} = -30 \frac{\text{rad}}{\text{sec}^2} \text{ ב.} \quad \omega(t=2) = -7 \frac{\text{rad}}{\text{sec}}, \omega(t=4) = -67 \frac{\text{rad}}{\text{sec}} \text{ נ.} \quad (8)$$

$$\alpha(t=2) = 18 \frac{\text{rad}}{\text{sec}^2}, \alpha(t=4) = -42 \frac{\text{rad}}{\text{sec}^2} \text{ ג.}$$

$$a_r = 2a_t\theta \text{ ב.} \quad a_r = \frac{(a_t \cdot t)^2}{R} \text{ נ.} \quad (9)$$

$$a_\theta = 12 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}, a_r = (4t+1)^2 \cdot 3 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}, a = \sqrt{12^2 + 9(4t+1)^4} \quad (10)$$

$$\text{הכbesch מפעיל כוח זה.} \quad |F| = \sqrt{(80t)^2 + 4000^2} \quad (11)$$

$$|F| = \sqrt{(80t)^2 + 4000^2} : \text{ החיכוך מהכbesch} \quad (12)$$

$$v_A \approx 10.95 \frac{\text{m}}{\text{sec}}, v_C \approx 8.94 \frac{\text{m}}{\text{sec}}, v_D \approx 7.975 \frac{\text{m}}{\text{sec}}, v_E \approx 6.32 \frac{\text{m}}{\text{sec}}, v_F \approx 6.73 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \text{ א.} \quad (13)$$

$$\cdot a_r = \frac{v^2}{R} \text{ וכיו', לפי הנוסחה} \quad a_{r_A} = 60 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}, a_{r_B} = 40 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} \text{ ב.}$$

$$a_{\theta_A} = 0, a_{\theta_C} = -g, a_{\theta_D} = -10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}, a_{\theta_E} = 0, a_{\theta_F} = 5 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} \text{ ג.}$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{a_r^2 + a_\theta^2} \text{ ד.}$$

$$T = 1.58mg \quad \text{ב.} \quad v = \sqrt{0.58gl} \quad \text{א.} \quad (14)$$

ג. מהירות : $T = mg(1.19)$, $v_B = \sqrt{0.32gl}$

ד. בשנייהם : $T = mg \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$\theta = 41.8^\circ \quad (15)$$

הכוח המרכזי-

רקע

$$F_r = m\omega^2 R$$

בכיוון החוצה מהמעגל


שימוש לב שהכוח המרכזי- הינו כוח מודומה והוא מגיע מדרך הסתכלות שונה על תנועה מעגלית של צופה המסתובב עם המערכת. בצורת ההסתכלות זו אין לגוף תאוצה רדיאלית.

שאלות

1) מסה על שולחן מסתובב

מסה m מונחת על דיסק המסתובב על שולחן במהירות זוויתית קבועה ω .
המסה מחוברת לחוט העובר דרך מרכז השולחן ומחובר למסה m_s .
בין המסות m לדיסק יש חיכוך ומקדם החיכוך הסטטי הוא μ_s .
נתון: μ_s , m , m_s , ω .

מהו הרדיוס המינימלי והרדיוס המקסימלי שבו ניתן להניח את המסה כך
שלא תזוז בכיוון הרדיאלי?



תשובות סופיות

$$r_{\max} = \frac{Mg \pm \mu_s mg}{m\omega^2} \quad (1)$$

וקטורים בתנועה מעגלית

רקע

וקטור המיקום: $\vec{r} = R \cos \theta \hat{x} + R \sin \theta \hat{y}$


הקשר הכללי בין מהירות הקווית לזוויותית: $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$

הקשר הכללי בין התאוצה המשיקית לתאוצה הזוויותית: $\vec{a}_\theta = \vec{\alpha} \times \vec{r}$

שאלות


1) מציאת הכוון של אומגה

במקרים הבאים נתנו כיוונה של מהירות הקווית של גוף הנע במעגל. מצא את הכוון של מהירות הזוויותית בכל מקרה:



2) תרגיל לנוסחה $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$

מצא את כיוון מהירות הקווית של הגוף במקרים הבאים בהנחה כי הגוף נע בתנועה מעגלית.



3) תאוצה זוויתית קבועה כוקטור

גוף נע במעגל בעל רדיוס קבוע שאינו ידוע.

התאוצה הזוויתית של הגוף קבועה ונوتנה לפי: $\vec{\alpha} = 2\hat{x} + 3\hat{y} + 1\hat{z}$ ביחידות של רדיאן לשניה בריבוע. התאוצה הזוויתית של הגוף קבועה ונוטנה לפי:

המיקום ההתחלתי ומהירות הזוויתית ההתחלתי הם: $\vec{r}_0 = 5\hat{x} + 3\hat{y} - 2\hat{z}$ ו- $\vec{\omega}_0 = -2\hat{x} + 3\hat{y} - 4\hat{z}$ בradian לשניה. מצא את גודל מהירות הקווית של הגוף ב- $t = 2\text{ sec}$.

4) דוגמה-וקטור המיקום של נаг המרוצים

מצאו את וקטור המיקום כתלות בזמן בדוגמה עם נаг המרוצים :
 נаг מרוצים נוסע במסלול מעגלי שרדיוס 50 מטר. מהירותו של הנаг כתלות בזמן היא $v(t) = 4t$.

א. מצאו את מהירות הזוויתית של הנаг כתלות בזמן, ומיצו את הזווית של הנаг לאחר 5 שניות (בנחיה כי התחילה מזווית אפס).

ב. متى يصلים הנаг את הסיבוב הראשון?


5) תנועה מעגלית שאינה סביב הראשית

גוף נע על מעגל ברדיוס 3m.

הגוף חולף דרך הנקודה (5,4) ביחס לראשית הצירים O.

נתון כימרכז המעגל נמצא ב- (5,7) ומהירות הזוויתית היא : $\omega = \frac{2\pi}{20} \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$.

- א. מצאו את וקטור המיקום של הגוף כפונקציה של הזמן.
- ב. מצאו את וקטור מהירותו של הגוף כפונקציה של הזמן.
- ג. מצאו את וקטור התאוצה של הגוף כפונקציה של הזמן.
- ד. מצאו את מהירות הממוצעת בין $t = 5 \text{ sec}$ ל- $t = 10 \text{ sec}$.
- ה. מצאו את תחום הזווית ביחס לראשית בו נע וקטור המיקום.
- ו. מצאו את תחומי הגודלים של וקטור המיקום.



תשובות סופיות

ג.

ב.

⊗ א. **(1)** $-\hat{z}$.ב. \hat{y} . א. **(2)**

$$63.63 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \quad \mathbf{(3)}$$

$$\vec{r} = 50 \cos\left(\frac{t^2}{25}\right) \hat{x} + 50 \sin\left(\frac{t^2}{25}\right) \hat{y} \quad \mathbf{(4)}$$

$$\vec{r} = \left(5 + 3 \cos\left(\frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{10}t\right), 7 + 3 \sin\left(\frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{10}t\right) \right) . \text{א.} \quad \mathbf{(5)}$$

$$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \left(-3 \sin\left(\frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{10}t\right) \frac{\pi}{10}, 3 \cos\left(\frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{10}t\right) \frac{\pi}{10} \right) . \text{ב.}$$


$$\vec{a} = \ddot{\vec{r}} = \left(\frac{-3}{5}, \frac{3}{5} \right) . \text{ט} \quad \vec{a} = \dot{\vec{v}} = -\omega^2 \vec{r} . \text{ג.}$$

$$r_{\max} = 8.6 + 3, r_{\min} = 8.6 - 3 . \text{ט}$$


$$\theta_{\min} = 34.5^\circ, \theta_{\max} = 74.9^\circ . \text{ט.}$$

תרגילים מסכימים:


שאלות:



- (1) מטוטלת מסתובבת אופקית
מטוטלת בעלת אורך l מסתובבת סביב ציר האנכ לתקרה בזווית מפתח קבועה θ . נתון: l , θ .
מצא את התדרות וזמן המחזור של הסיבוב.




- (2) מכונית במחלף
מכונית נוסעת על מחלף משופע.
זווית השיפוע של המחלף היא 15 מעלות.
רדיווס הסיבוב של המחלף הוא 15 מטרים.
אם נניח שלמכונית אין חיכוך עם הכביש,
מה מהירותה בה צריכה לנסוע המכונית על מנת לא להחליק?



- (3) הילוכי אופניים
הילוכים של אופניים מורכבים משני גלגלי שניינים ברדיוסים שונים ושרשרת המקיפה את שני הגלגלים. כאשר השרשרת מתוחה האורך שלה קבוע. מצאו את הקשר בין מהירות הסיבוב של גלגלי השניים אם הרדיוסים שביהם מקיפה השרשרת כל אחד מהגלגלים ידועים.

- (4) שני גופים על מסילה מעגלית אנכית (כולל עבודה ואנרגיה)
מסילה מעגלית חלקה, דקה ובעלת רדיוס R מוצבת במישור אנכי.
מישור משופע וחולק משיק למסילה ומשתלב בה כמתואר בתרשימים.
מציבים את בול A בגובה $2R$ ואת בול B על המישור המשופע בגובה זהה מהרצפה.
נותנים ל-A דחיפה קלה ועווזבים את B מ מצב מנוחה.
שני הגוף מחליקים, גוף A בצד החיצוני של המסילה ואילו גוף B משתלב ונכנס לתוך המסילה. בשלב מסוים כל אחד מהגוף מתנתק מהמסילה.
התיחסו לגופים כאלו גופים נקודתיים.
א. באיזו זווית θ עם ציר ה- y , יתנתק גוף A מהמסילה?
ב. באיזו זווית θ יתנתק גוף B מהמסילה?


- ג. אם שני הגוף מتنתקים מהמסילה בו זמן?
מה גודל המהירות היחסית ביניהם?
ד. מה יהיה המרחק בין הגוף לאחר הניתוק,
אחרי פרק זמן Δt (הניחו שהגוף עדין באוויר).



5) מציאת מיקום כפונקציה של הזמן

חלקיק מוגבל לנוע על מעגל ברדיוס R .

נתון שגודל המהירות של החלקיק: $V(t) = Ct^2$ כאשר C קבוע.
מצאו ופתרו את משוואת המיקום של החלקיק.

**6) מסובבים פיצה בתנועה מעגלית**

מסובבים פיצה בתנועה מעגלית כך שמתקיים: $\theta = 4t^2 + 5t$ אשר θ נמדד בראדיאנים ו- t בשניות.

- מצאו את המהירות הזוויותית של הבצק.
- מצאו את התאוצה הזוויותית של הבצק.

ג. לאחר שהוסיפו את הזויות מסובבים עוד פעם את הפיצה באותו אופן.

מצאו את הרדיוס בו נמצא זית הנע בתאוצה משיקית של $0.2 \frac{m}{sec^2}$.

ד. חזר על סעיף ג' אם ידוע שהתאוצה הקווית הכוללת ב- $t = 1sec$ היא: $0.2 \frac{m}{sec^2}$

7) תאוצה משיקית קבועה

נקודה נעה במסלול מעגלי שרדיוסו 30 ס"מ .

הנקודה נעה בתאוצה משיקית קבועה של 4 מטר לשנייה ברכיבו.

לאחר כמה זמן מתחילה התנועה הרדיאלית של הנקודה תהיה:

- גדולה פי 2 מהתאוצה המשיקית?
- שווה לתאוצה המשיקית?

8) זווית בין משיקית לכוללת

גוף נקודתי מתחילה לנוע ממנוחה במסלול מעגלי בעל רדיוס 2 מטר בתאוצה משיקית קבועה. ידוע כי לאחר שני סיבובים שלמים הגיע הגוף למהירות קבועה של 2 מטר לשנייה .

א. תוך כמה זמן הגיע הגוף את שני הסיבובים הראשונים?

ב. מה הייתה התאוצה המשיקית של הגוף?

ג. מה הייתה הזווית בין וקטור התאוצה המשיקית לווקטור התאוצה השקולה לאחר שני הסיבובים הראשונים?

ד. מתי, החל מעת תחילת התנועה, תהיה התאוצה המשיקית שווה בגודלה לתאוצה המרכזית של הגוף?


ה. איזה מרחק יעבור הגוף עד אז? (ראה סעיף ד').

9) חמישה סיבובים

נקודה שנמצאת במרחק 15 ס"מ ממרכז הגלגל, מתחילה להסתובב בתאוצה
משיקית קבועה. הנקודה מגיעה ל מהירות זוויתית של $\frac{\text{rad}}{\text{sec}} 20$ לאחר 5 סיבובים.

מצא את :

- התאוצה המרכזית של הנקודה מעבר 5 שניות.
- התאוצה המשיקית של הנקודה מעבר 5 שניות.
- התאוצה השקולת של הנקודה מעבר 5 שניות.

10) טנק יורה פגז מדיסקה מסתובבת

טנק נמצא בקצה של דיסקה ברדיוס R היכולת
להסתובב במקביל לקרקע. הדיסקה מתחילה
להסתובב ב- $t=0$ בתאוצה זוויתית $\ddot{\theta} = kt^2$.

עבור זמן t_0 הטנק נמצא במקום שבאיור ויראה פגז.
מהירות הלוע של הפג ז' v_0 .


התווחה מכיוון הרדיאלי לפני חוץ, ובזווית φ
על הקרקע (במאונך למשור שבו מסתובבת הדיסקה).

- באיזה מהירות ביחס לצופה נិיח יוצא הcador מלוע הטנק?
- באיזה מרחק מנקודת הירי יפגע הפג ז'?

11) חוט נקרע במעגל אנכי גבוה

cador קטן שמסתו m קשור לקצהו של חוט שאורכו 1.
הcador מסתובב במעגל אנכי שמרכזו בגובה 2l
על הרצפה.

כאשר החוט מתוח והcador נמצא אנכית מעל
ציר סיבוב מעניקים לו מהירות אופקית v_0 .



א. מה מהירות המינימלית v_0 הנדרשת
 כדי שהcador יבצע תנועה מעגלית שלמה?

ב. מעניקים לcador מהירות התחלתית : $v_0 = 1.5\sqrt{gl}$,
 אם החוט נקרע ברגע שמתיחותו עולה על $5.25mg$
 מצאו את הזווית θ שבה יקרע החוט.

- מה מהירות הcador ברגע שהחוט נקרע, אם נתון ש : $l = 2m$?
- תוק כמה זמן מרגע קריית החוט יפגע הcador ברצפה?

תשובות סופיות:

$$f = \frac{\omega}{2\pi} , T = \frac{2\pi}{\omega} \quad (1)$$

$$V \approx 6.34 \frac{m}{sec} \quad (2)$$

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2}{r_1} \quad (3)$$

$$d = \sqrt{\frac{8}{3} g R \Delta t} \quad . \quad |\vec{v}_{AB}| = \sqrt{\frac{8}{3} g R} \quad . \quad \theta_2 = \theta_1 = 48.2^\circ \quad . \quad \theta_1 = 48.2^\circ \quad . \quad (4)$$

$$x = R \cos \frac{C \cdot t^3}{3R} , y = R \sin \left(\frac{C \cdot t^3}{3R} \right) \quad (5)$$

$$R = 2.5 \text{ cm} \quad . \quad \alpha = \dot{\omega} = 8 \frac{\text{rad}}{\text{sec}^2} \quad . \quad \omega = \dot{\theta} = 8t + 5 \quad . \quad (6)$$

$$1.18 \cdot 10^{-3} \text{ m} \quad . \quad t \approx 0.27 \text{ sec} \quad . \quad t \approx 0.39 \text{ sec} \quad . \quad (7)$$

$$t_2 = 5 \text{ sec} \quad . \quad \alpha = 87.73^\circ \quad . \quad a_\theta \approx 0.08 \frac{m}{\text{sec}^2} \quad . \quad t_1 \approx 25.1 \text{ sec} \quad . \quad (8)$$

$$S = 1 \text{ m} \quad .$$

$$|a| \approx 150 \frac{m}{\text{sec}^2} \quad . \quad a_\theta \approx 0.95 \frac{m}{\text{sec}^2} \quad . \quad a_r \approx 150 \frac{m}{\text{sec}^2} \quad . \quad (9)$$

$$v_x = v_0 \cos \varphi , \quad v_y = \frac{k t_0^3 R}{3} , \quad v_z = v_0 \sin \varphi \quad . \quad (10)$$

$$d = \left((v_0 \cos \varphi)^2 + \left(\frac{k t_0^3 R}{3} \right)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(t_0 + \frac{2v_0 \sin \varphi}{g} \right) \quad .$$

$$t \approx 0.3 \text{ sec} \quad . \quad v \approx 10 \frac{m}{\text{sec}} \quad . \quad \theta \approx 110^\circ \quad . \quad v_{min} = \sqrt{gl^5} \quad . \quad (11)$$

תרגילים מסכימים למתכונים:

שאלות:

1) נקודה על גלגל

מייקומו של גוף כתלות הזמן נתון ע"י: $y(t) = R - R \cos(\omega t)$, $x(t) = R\omega t - R \sin(\omega t)$ כאשר R -ו- ω קבועים.

- .א. מצאו את וקטורי המהירות והתאוצה של הגוף.
- .ב. מצאו את גודל התאוצה המשיקית והנורמללית.
- .ג. ציירו את מסלול הגוף.

2) חבל עם מסה מסתובב*

נתון חבל אחד בעל מסה m ואורך l_1 . החבל קשור בקצת אחד ומסתובב במישור אופקי ב מהירות זוויתית ω . מצא את גודל המתיחות לאורך החבל (כתלות במרחק מהקצת החיבור). רמז: יש לחלק את החבל לחתיכות קטנות ולעשות משווהת תנועה על כל חתיכה.

3) מטוטלת כפולה מסתובבת אופקית*

גוף בעל מסה m_1 מחובר באמצעות חוט באורך l_1 לתקורה. גוף בעל מסה m_2 מחובר באמצעות חוט באורך l_2 לגוף הראשון. שני הגוף מסתובבים יחדיו בתדריות זוויתית קבועה ω סביב ציר האנך לתקורה. הזווית בין החוטים לאנכים הוא: β , α (ראה איור).

- .א. רשום את משווהת התנועה לכל גוף.

.ב. מצא מהי הזווית α עבור המקרה בו $m_2 = 0$ ו- $m_1 \neq 0$.

מהי תדריות הסיבוב המינימלית האפשרית?


.ג. דני ויוסי ניסו למצוא את ω במקרה הכללי. דני הציב את גודלי המתיחויות של החוטים במשווהת התנועה של גוף 2


$$\text{וקיבל: } \omega^2 = \frac{g \tan \beta}{l_1 \sin \alpha + l_2 \sin \beta}.$$

יוסי הציב את המתיחויות במשווהת התנועה

$$\text{של גוף 1 וקיים: } \omega^2 = \frac{\frac{m_1 + m_2}{m_1} \tan \alpha - \frac{m_2}{m_1} \tan \beta}{\sin \alpha}$$

ישב את הסתירה.






- 4) **מים בכלי מסתובב****
- תיבת באורך $2L$ ורוחב ω כך ש- $L < \omega$ מכילה מים.
גובה המים בתיבה הוא h .
מסובבים את התיבה במהירות זוויתית ω סביב ציר העובר במרכזו.
הנה כי המים לא נשפכים מהຕיבה.
- א. מצאו את הפונקציה המתארת את פני המים במרחב (רמז: חשבו את השיפוע של המשיק לפניו המים בנקודה כלשהיא, שיפוע זה הוא הנגזרת של הפונקציה).
- ב. מהו הפרש הגבהים בין המים במרכז התיבה למים במרקם אופקי d מהמרכז?
- ג. מה יהיה הפרש הגבהים אם נגדיל את מהירות הסיבוב פי 2?
- ד. מהו התנאי שתחתיות התיבה תתייבש בנקודה כלשהיא?

תשובות סופיות:

$$\text{א. } \vec{v} = (R\omega - R\cos(\omega t) \cdot \omega) \hat{x} + R\sin(\omega t) \cdot \omega \hat{y} \quad (1)$$

$$\vec{a} = R\omega^2 \sin(\omega t) \hat{x} + R\omega^2 \cos(\omega t) \hat{y}$$

$$\text{ב. } |\vec{a}_t| = \frac{R\omega^2 (\sin \omega t)}{\sqrt{2(1-\cos \omega t)}}, \quad |\vec{a}_n| = \frac{R\omega^2 (\cos(\omega t) - \cos(2\omega t))}{\sqrt{2(1-\cos(\omega t))}}$$



$$\text{ג. } T(x) = \frac{m\omega^2}{2l} (l^2 - x^2) \quad (2)$$

$$\sum F_x = m_1 \omega^2 l_1 \sin \alpha, \quad \sum F_y = 0 : 1 \quad (3)$$

$$\text{ג'ו' } \sum F_x = m_2 \omega^2 (l_1 \sin \alpha + l_2 \sin \beta), \quad \sum F_y = m_2 g : 2$$

$$\Delta y = \frac{2\omega^2 d^2}{g} \quad . \quad \text{ג.} \quad \Delta y = \frac{\omega^2 d^2}{2g} \quad . \quad \text{ב.} \quad y = \frac{\omega^2 x^2}{2g} + h - \frac{\omega^2 L^2}{6g} \quad . \quad \text{א.} \quad (4)$$

$$h = \frac{\omega^2 L^2}{6g} \quad . \quad \text{ד.}$$

פיזיקה 1 מכניתה

פרק 8 - תנועה תחת השפעה של שדה אלקטrico מגנטי

תוכן העניינים

1. תנועה תחת שדה חשמלי ומגנטי

112

תנועה תחת שדה חשמלי ומגנטי:

מבנה החומר :

רקע:

החומר מורכב מאטומים. אטומים מורכבים מגרעין ומעטפת, הגרעין מורכב מפרוטונים וניוטרונים והמעטפת מאלקטרונים.

$$m_p \approx m_n = 1.67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$m_e \approx 9.11 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \approx \frac{1}{2000} m_p$$

כוח חשמלי הוא כוח שפועל בין אלקטرونים ופרוטונים אך הנוייטרונים לא מרגישים אותו. בשבייל לתאר את הכוח משתמשים בתכונה של מטען חשמלי.

$$q_e = -1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C} = -e$$

$$q_p = +1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C} = e$$

גודל המטען e הוא גודל יסודי והמטען הכלול של כל גוף חייב להיות כפולה שלמה של e .

הכוח הפועל בין שני חלקיקים טעוניים נתון לפי חוק קולון.

$$\vec{F} = \frac{k q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$$

$$k = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2}$$

ר - המרחק בין הגוףים.

שאלות:**1) אלקטרוון ופרוטון**

אלקטרוון ופרוטון נמצאים במרחק של $3A$ אחד מהשני.
מהו הכוח הפועל על כל אחד מהם? (גודל וכיוון).

2) שני מטענים על ציר ה-X

שני גופים טעוניים במטענים: $q_1 = 0.2mc$, $q_2 = 0.3mc$.
מיקום הגוף הראשון הוא: $(0, \vec{r}_1)$ ומיקום הגוף השני הוא: $(3m, 0)$.
א. חשבו את הכוח החשמלי הפועל על כל גוף גודל וכיוון.
ב. מהי תאוצת כל גוף באותו רגע אם מסותיהם הם: $m_1 = 3kg$, $m_2 = 8kg$.

3) מהירות זוויתית באטום המימן

אטום המימן מורכב מפרוטון בגרעין ואלקטרון הסובב סביב הגרעין בתנועה מעגלית ברדיוס של 0.53 אנGSTROMS.
מצאו את המהירות הזוויתית של האלקטרון, אם ידוע כי מסת האלקטרון
היא: $q_e = -1.6 \cdot 10^{-19} C$ וטען האלקטרון והפרוטון הוא: $m_e = 9.1 \cdot 10^{-31} kg$.

תשובות סופיות:

$$(1) F = -2.56 \cdot 10^9 N, \text{ כוח המשיכה.}$$

$$(2) \text{ א. שניהם נעים בכיוונים הפוכים, ב- } F = 21.6 N.$$

$$(3) \omega = \sqrt{17} \cdot 10^{16} \frac{1}{\text{sec}}$$

השדה המגנטי, הכוח המגנטי ותנועת תחת שדה מגנטי קבוע:

רקע:

$$\vec{F}_B = q\vec{V} \times \vec{B}$$

הטען חייב להיות בתנועה בשבייל שיפעל כוח מגנטי.

הכוח תמיד מאונך לשדה המגנטי ולמהירות הגוף.

כל יד ימין נותן את כיוון הכוח על טען חיובי, הכוח על מטען שלילי יהיה בדיק בכיוון ההפוך לזרם של כל יד ימין.

בשדה מגנטי אחיד ולא שדה חסמי נוצרת תנועה במעגלית או בורגית ורדיסוס המעגל

$$R = \frac{mv_{\perp}}{qB}$$

שאלות:

1) חלקיק זו בשדה מגנטי

חלקיק הטוען במטען q נע במהירות \vec{v} באזורי בו שורר שדה

$$\text{מגנטי } \vec{B} = -2\hat{x} + 3\hat{y} \text{ טסלה.}$$

חשבו את הכוח המגנטי שייפעל על החלקיק אם נתון :

$$\text{א. } \vec{q} = 2\hat{x} + 3\hat{y} \text{ מטר לשניה ו-} C = 2 \text{ א.}$$

$$\text{ב. } \vec{q} = -2\hat{x} + \hat{z} \text{ מטר לשניה ו-} C = 1 \mu\text{א.}$$

2) פרוטון פוגע במסך

פרוטון מואץ בקובל הנמצא במתח של $10^5 V$.

לאחר מכון הפרוטון עובר בשדה מגנטי אחיד עד

לפגיעה במסך הנמצא במרחק $15c.m.$ מהקובל.


עוצמת השדה המגנטי היא $0.2 T$.

א. מצאו את המרחק האופקי שעבר הפרוטון

עד לפגתו במסך.

ב. מצאו את הזמן עד לפגעה במסך.

ג. מהו המתח המינימלי הדרוש על מנת שהפרוטון יפגע במסך?




3) מטען בשדה מגנטי וחשמלי

שדה חשמלי קיים בתחום $x < 0$ כך שמעל ציר ה- x ($y > 0$) השדה הוא: $\vec{E} = E_0 \hat{y}$ ו מתחת לציר ה- x ($y < 0$)

השדה הוא: $\vec{E} = E_0 \hat{y}$, ראה שרטוט. בכל המרחב קיים גם שדה מגנטי אחד, שכיוונו וגודלו אינם ידועים.

חלקיק בעל מסה m ומטען $|q|$ מגיע מ- $-\infty$ ועובר בקו ישר ובמהירות קבועה. גובה המסלול של החלקיק הוא $-y$.



כאשר החלקיק חוצה את ציר ה- y הוא מבצע רבע מעגל ברדיוס R (ראה ציור). נתון: $R, m, |q|$.

א. שרטטו את המשך מסלול המטען.

ב. מה סימן המטען?

ג. מצאו את המהירות של המטען, והשדה המגנטי.

ד. מצאו את המסה הדורשה על מנת לבצע אותו מסלול בשדה מגנטי גדול פי 3 מהשדה המקורי, כאשר שאר התנאים אינם משתנים.

4) תנועה בשדה מגנטי ושדה חשמלי

חלקיק בעל מסה m ומטען שלילי q נמצא באזורי בו קיימים שדה חשמלי E_0 ושדה מגנטי B_0 אחידים בכיוון ציר ה- x . מיקום החלקיק ב- $t=0$ הוא בנקודה: $(v_0 \sin \theta, 0, v_0 \cos \theta)$ ומהירותו באותו הזמן היא: $(v_0 \sin \theta, 0, v_0 \cos \theta)$.

א. מצאו את הכוח הפועל על החלקיק כתלות ב- t .

ב. מצאו את הכוח הפועל על החלקיק כתלות בזמן ורשום את משוואת התנועה.

ג. פתרו את משוואת התנועה ותאר את מסלול החלקיק.

תשובות סופיות:

$$\vec{F} = (6\hat{x} + 4\hat{y} + 3\hat{z}) \mu N \quad \text{ב. נ. } \vec{F} = 24N\hat{z} \quad \text{(1)}$$

$$V = 4.312 \cdot 10^4 V \quad \text{ג.} \quad t = 3.371 \text{ sec.} \quad \Delta x = 0.0315 \quad \text{א.} \quad \text{(2)}$$

$$V = \sqrt{\frac{qRE_0}{m}}, \quad \vec{B} = \sqrt{\frac{mE_0}{qR}}\hat{z} \quad \text{ג.} \quad \text{sign}(q) = -1 \quad \text{ב. א. ראו סרטון} \quad \text{(3)}$$


$$m_2 = qm_1 \cdot T$$

$$, \quad \vec{F}(t) = (-q)(v_z B_0 \hat{y} - v_y B_0 \hat{z}) + (-q) E_0 \hat{x} \quad \text{ב.} \quad \vec{F} = (-q) v_0 B_0 \cos \theta \hat{y} + (-q) E_0 \hat{x} \quad \text{א.} \quad \text{(4)}$$

$$\text{ג. ראו סרטון} \quad \ddot{v}_z = -\frac{q^2 B_0^2}{m^2} v_z, \quad \ddot{v}_y = -\frac{q^2 B_0^2}{m^2} v_z$$

סיכום ותרגילים נוספים:**שאלות:****1) בורר מהירות ומתח עצירה**

חלקיים בעלי מטען $q+$ וمسה m נפלטים ממוקור S ב מהירות שונות ונכנסים אל בין לוחות קבל.



בין לוחות הקבל פועלים שדה חשמלי אחד \vec{E} וכיונו ימינה ושדה מגנטי אחד \vec{B} והמכoonן אל תוך הדף, כמו זה בתרשימים.

השדה המגנטי פועל על החלקיים גם לאחר יציאתם מהקbel.

במקרה d מנקודת הייציאה של החלקיים מהקbel, נמצא נקב קטן דרכו נכנסים החלקיים אל תוך הקbel השני אשר בין לוחותיו לא פועל שדה מגנטי. על הקbel השני מופעל מתח עצירה V . ידוע כי המרחק בין לוחות הקbel השני הינו L . ניתן להזנich את כוח הכבוד הפועל על החלקיים.

נתונים: $L, q, m, \vec{E}, \vec{B}$.

א. באיזו מהירות v יוצאים החלקיים מהקbel הראשון?

ב. מהו המרחק d (ראה ציור)?


ג. תוך כמה זמן משלים החליקיק את חצי הסיבוב?

ד. מה צריך להיות ערכו המינימלי של מתח העוצר V המופעל על הקbel השני כדי שהחלקיים הנכנסים לתוכו יעברו לחולוטיו?

ה. מחברים את הקbel השני לסללה שמתבהה גדול פי שתיים ממה שהישבתם בסעיף ד'. תוך כמה זמן יעזור החליקיק מרגע כניסה אל בין לוחות הקbel השני כתעט?

2) מטען נכנס ויוצא משדה מגנטי בזווית

אלומות חלקיים בעלי מסה m וטען q נקלעות לאזור בו שורר שדה מגנטי אחד \vec{B} המאונך למישור הדף E_k ובמגמה פנימה. החלקיים אנרגיה קינטית E_k והם נכנסים לאזור המגנטי בזווית θ , כמתואר בציור.




א. חשבו את המרחק האנכי y אותו עברו החלקיים מנקודת כניסה כניסחים לאזור המגנטי ועד ליציאתם ממנה.

ב. חשבו את זווית היציאה φ (ראו איור).

3) עוד מטען נכנס ו יוצא משדה מגנטי בזווית

שדה מגנטי אחיד B נמצא בתחום מלבני בגודל $a \times b$. מהו זווית השדה והוא אפס. כיוון השדה החוצה מהד'



מטען q נכנס בתחום המלבני בדיק במרכז המלבן, ב מהירות שגודלה v וכיוונה מאונך לשפת המלבן (ראה איור).

ידוע שהמטען יוצא מהצלע העליון של המלבן.

א. מהו סימן המטען? ומהו גודל מהירותו ביציאה?

ב. מהו המרחק x מקצה המלבן בו יוצא המטען?

ג. מהי הזווית θ של קוטור מהירות ביציאה ביחס לצלע המלבן?

4) מטען בשדה מגנטי עם משוואות דיפרנציאליות

נתון שדה חשמלי: $\hat{x} = \alpha x$ ו $\hat{E} = B_0 \hat{z}$ ושדה מגנטי קבוע ואחד: $\vec{B} = B_0 \hat{z}$.

חלקיק בעל מסה m ומטען q נמצא בראשית זמן $t=0$.

מהירותו ההתחלתית היא: $\hat{x}_0 = v_0 \hat{x}$.

מהו מיקום החלקיק כתלות בזמן בכל אחד מהמקרים הבאים:

$$\alpha > \frac{q}{m} B_0^2, \quad \alpha < \frac{q}{m} B_0^2, \quad \alpha = \frac{q}{m} B_0^2$$

תשובות סופיות:

$$\frac{2BL}{E} \cdot \text{ה.} \quad \frac{mE^2}{2qB^2} \cdot \text{ט} \quad \frac{\pi m}{qB} \cdot \text{ג.} \quad \frac{2mE}{qB^2} \cdot \text{ב.} \quad \frac{E}{B} \cdot \text{א.} \quad (1)$$

$$\theta' = \theta \quad y = \frac{\sqrt{8mE_k} \sin \theta}{Bq} \quad (2)$$

- (3) א. אם כיוון הכוח הפוך לכיוון המכפלת $\vec{V} \times \vec{B}$ אז המטען שלילי.
 ב. תמיד מאונך ל- \vec{V} ול- \vec{B} לכן ה- \vec{F}_B אף פעם לא ישנה את גודל המהירות, רק את הכיוון (V כניסה = V יציאה).

$$\cos \theta = \frac{b}{2R} - 1 \quad g. \quad x = \sqrt{b \left(\frac{b}{4} - \frac{mV}{qB} \right)} \cdot b.$$

$$. x(t) = V_0 \cdot t, y = \frac{1}{2} \left(-\frac{qB_0 V_0}{m} \right) t^2 : \alpha = \frac{q}{m} B_0^2 \quad (4)$$

$$. x(t) = \frac{V_0}{\sqrt{\frac{q}{m} \left(\frac{qB_0^2}{m} - \alpha \right)}} \sin \left(\sqrt{\frac{q}{m} \left(\frac{qB_0^2}{m} - \alpha \right)} \cdot t \right) : \alpha < \frac{q}{m} B_0^2$$

$$. x(t) = \frac{V_0}{\sqrt{\frac{q}{m} \left(\alpha - \frac{qB_0^2}{m} \right)}} \sinh \left(\sqrt{\frac{q}{m} \left(\alpha - \frac{qB_0^2}{m} \right)} \cdot t \right) : \alpha > \frac{q}{m} B_0^2$$

פיזיקה 1 מכניתה

פרק 9 - קואורדינטות פולריות -

תוכן העניינים

1. הרצאות ותרגילים

120

הרצאות ותרגילים

רקע

$$\begin{aligned}x &= r \cos \theta \\y &= r \sin \theta\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}r &= \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan \theta &= \frac{y}{x}\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}\hat{r} &= \cos \theta \hat{x} + \sin \theta \hat{y} \\ \hat{\theta} &= -\sin \theta \hat{x} + \cos \theta \hat{y}\end{aligned}$$

$$\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} = r\hat{r}$$

$$\vec{v} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}$$

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{r} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\hat{\theta}$$

שאלות



1) מהו הקשר בין קבוע זוויתית ω במשורט האופקי לבין אורך הקפיץ l בזמן t ?
לפי: $l = l_0 + A \sin(\Omega t)$ כאשר $A < l_0$.
הם קבועים חיוביים ומתקיים $A < l_0$.

- א. מהי התאוצה של הגוף בקוואורדיינטות פולריות?
- ב. נניח ש- A , Ω ו- ω ידועים, מהו התנאי על l כך שבנקודות זמן מסוימות כיוון התאוצה יהיה רק בכיוון $\hat{\theta}$?
- ג. מהי התשובה המספרית לסעיף ב' אם: $\omega = 1 \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$, $A = 0.2 \text{m}$, $\Omega = 3 \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$:

2) דני מסתובב במעגלים

דני בן השלוש מתחילה לrox במעגלים ממונחה.

דני מתרחק מהנקודה בה התחיל לrox לפי: $t^2 = r$ והוא מסתובב במהירות

$$\text{זוויתית הולכת וגדלה: } \omega = Bt = 1 \frac{\text{rad}}{\text{sec}^2}, \quad A = 0.4167 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}.$$

א. מצא את המהירות של דני כתלות בזמן בקוואורדינטות פולריות.

ב. מצא את התאוצה של דני כתלות בזמן בקוואורדינטות פולריות.

ג. כאשר דני מגיע לתאוצה השווה ל- g הוא מקבל סחרחות ונופל

(על הטוסיק כמובן), متى ייפול דני?

3) כוח מסתורי בциינור

ציינור מסתובב במהירות זוויתית קבועה ω סביב מרכזו.

צדור קטן בעל מסה m נמצא ב- $t=0$ במרכז הצינור.

לצדור מהירות הincipital v_0 בכיוון הרדיאלי.


כוח מסתורי F (לא בהכרח קבוע) פועל על הצדור

ושומר על מהירות הצדור ביחס לצינור להיות קבועה

ושווה ל- v_0 . בין הציינור לצדור אין חיכוך.

א. מה מיקום הצדור כתלות בזמן?

ב. מהו הכוח F כתלות בזמן הפועל על הצדור?

**4) מנוע מושך הצדור בתוך דיסקה מסתובבת**

דיסקה ברדיוס R מונחת על שולחן ומקובעת במרכזה

אך מסתובבת סביב מרכזה במהירות זוויתית קבועה ω .


בתוך הדיסקה ישנה תעלת, הצדור בעל מסה m מונת

בקצה של התעלה ויכול לזרז רק בתוך התעלה.

במרכז הדיסקה נמצא מנוע המחבר בחוטו לצדור.

המנוע מושך את הצדור למרכז הדיסקה כך שתאותצת

הצדור ביחס לדיסקה היא a_0 .




א. מצא את מיקום המסה כתלות בזמן ביחס לדיסקה וביחס למעבה, בקוואורדינטות פולריות.

ב. מה הכוח שפעיל המושך על הצדור כתלות בזמן?

ג. מה הכוח שפעילים הקירות על הצדור?

5) מכ"ם מזזהה טיל

מכ"ם מזזהה טיל הנמצא מעט מעל האטמוספירה עם מנוע קבוע.
הבעיה דו מימדית.



$$\text{נתון כי: } r = 70\text{km}, \theta = 30^\circ, \dot{\theta} = 1.5 \cdot 10^{-2} \frac{\text{rad}}{\text{sec}}, \ddot{\theta} = 1100 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$$

החיכוך עם האויר זניח בגובה רב והתאוצה היחידה היא תאוצת הכביד השווה ל- $\frac{9.6}{\text{sec}^2}$ (התאוצה קטנה מעט בגל המרחק ממרכז כדור הארץ).

- מהו גודלה של מהירות הטיל?
- מצאו את הערך של $\ddot{\theta}$ ושל \ddot{r} .

6) כדור חופשי בתוך צינור מסתובב

צינור מסתובב ב מהירות זוויתית קבועה ω סביב מרכזו.


כדור קטן בעל מסה m נמצא בתוך הצינור.

ב- $t = 0$ הכדור נמצא במנוחה ביחס לצינור ובמרחק d ממרכז הצינור. בין הצינור לכדור אין חיכוך.

- רשום את הכוחות הפועלים על הכדור בצירים פולריים.
- רשום את משוואת התנועה בכיוון הרדייאלי.

ג. בדוק כי הפתרון: $r(t) = Ae^{\omega t} + Be^{-\omega t}$ ממתאים למשוואת שמ冤ת ומצא את הקבועים A , B .

- מהו החומר הנורמלי הפועל מהצינור על כדור?

**7) משוואות לתנועת חלקיק**

תנועה חלקיק מתוארת ע"י המשוואות: $\dot{\theta} = \omega = \text{const}$ ו- $r = A \cdot t^\alpha$ כאשר α , A קבועים.

- הביעו את r כתלות ב- θ .
- שרטטו את התנועה עבור: $\alpha = 0$, $\alpha < 0$, $\alpha > 0$.
- הניחו כי הגוף מתחילה מהראשית וכי: $\omega = 2 \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$, $A = 4 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$, $\alpha = 1$.
כמה סיבובים יעבור הגוף עד שהרדיויס יהיה 30_m ?

8) חללית במסלול ספריאלי

חללית 1 נעה במסלול ספריאלי (בדו מימד) כך ש- $\dot{r} = A t^\alpha$, כאשר A ו- α הם קבועים חיוביים נתוניים.

$$\text{נתון גם כי: } \ddot{r} = A\alpha^2 t^{\alpha-2} - AC^2 t^{\alpha-2} e^{2Ct}.$$

החללית נעה נגד כיוון השעון ו- C הוא גם קבוע חיובי נתון.
בזמן $t=0$ החללית חוצה את ציר ה- x השמאלי.
א. מצאו את מיקום החללית בקוודינטות קרטזיות.

ב. חללית 2 נעה על מסלול ספריאלי כך ש- $\dot{r}_2 = \frac{1}{2} t^2$ ובאותה זווית כמו חללית 1.

- מצאו את המיקום, מהירות והतאוצה של חללית 1 ביחס לחללית 2.
ג. תארו באופן מילולי את תנועתה של חללית 1 ביחס לחללית 2 אם $\alpha = 2$.

9) עכbesch הולך על דיסקה מסתובבת

עכbesch נמצא במרכזה של דיסקה המסתובבת במהירות זוויתית $0.2 \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$.

העכbesch מתחילה לנוע במהירות קבועה ובקו ישר ביחס לדיסקה עד לקצת הדיסקה ברדיוס $2m$. הזמן שלוקח לעכbesch להגיע לנקודה 4 שניות.

- א. מצאו את וקטורי מהירותו ותאוצתו של העכbesch (ביחס למעבده).
ב. הסבירו מדוע יש לעכbesch תאוצה אם הוא הולך במהירות קבועה ביחס ל夸ריסלה.
ג. הסבירו באופן אינטוטי את כל אחד מהרכיבים של תאוצת העכbesch.

10) מהירות מינימאלית ללוין

לוין שעובר בסמוך לפני כדה"א מרגיש תאוצה $\hat{a} = -g$ (בזהונחת התנודות האויר).
מצאו מה צריכה להיות המהירות המינימלית של הלוין כך שלא יתנגש לפני כדה"א
וישלים סיבוב.

11) משחק טופסת*

ארבעה ילדים משחקים טופסת, הם מתחילהים לרווח מאربع פינות של ריבוע בגודל $d \times d$. כל ילד רץ ב מהירות קבועה v לעבר הילד שמשמאלו (הכוון הוא תמיד לכיוון הילד שמשמאלו).


א. תאר את תנועת הילדים וקבע היכן ייפגשו.

ב. כעבור כמה זמן ייפגשו?


ג. כמה סיבובים עשה כל ילד עד למחצית הזמן שפגשו?

ד. מצא את וקטור המיקום של הילד המתחלף ברבע הראשו כפונקציה של הזמן בקוואורדייניות קרטזיות.

رمזים: מהי הסימטריה בעיה? איזה צורה יוצרים הילדים בכל רגע? רשום את המהירות של כל ילד בקוואורדייניות פולריות.

**12) שתי מסות מחוברות בחוט בתוך דסקה מסתובבת***

על דסקה המסתובבת ב מהירות קבועה ω ישנה מסילה העוברת דרך מרכזו הדסקה. במסילה ישן שתי מסות m_2 , m_1 המוחוברות בחוט באורך l . המערכת מונחת על שולחן אופקי (ז"א כיון כוח הכבידת לתוכה הדף).



א. מצא את היחס בין המסות על מנת שרדיויס כל מסה יישאר קבוע במהלך התנועה.

נסמן את הזמן שבו חוטים את החוט $t = 0$.

ב. רשום משווה דיפרנציאלית שפתרונה ייתן את $r_1(t)$.

ג. פטור את המשווה ומצא את $r_1(t)$.

הנח כי r_1 הוא מיקום המסה ברגע השחרור.

13) רוכב אופנוו*

רוכב אופנוו מתחילה את תנועתו ממנוחה.

מרחקו מנקודת ההתחלה משתנה לפי $r = Ct$, כאשר C קבוע.

בנוסף הרוכב מסתובב ב מהירות קבועה ω .


מצא את המרחק המקסימלי אליו הגיע הרוכב אם נתנו מקדם החיכוך הסטטי μ_s .

14) סטודנט ומרצה על גלגל ענק*

סטודנט נmrץ פוגש מרצה בעת ביקורו בפארק שעשועים. הסטודנט נחוש בדעתו להראות שהוא יודע מכניקה וMSCNU את המרצה לטפס למרכז גלגל ענק. הסטודנט עולה על الكرון של הגלגל. הגלגל מסתובב במהירות קבועה ω עם כיוון השעון ורדיווט R . כשהסטודנט מגיע לשיא הגובה המרצה זורק כרית מהירותית v_0 ובזווית α ביחס לאופק. בזמן מסוים לאחר זריקת הכרית הסטודנט קופץ מהקרון כך שמהירותו היא המהירות המשיקית של הקרון ביחס למרצה. הסיכון היחיד של הסטודנט לא להיפגע בעת הפגיעה בקרקע הוא אך ורק אם ינחת על הכרית. הנח שתנועת הכרית היא כתנועת אבן. לפני הזינוק של הסטודנט:

- רשמו את וקטורי המיקום של הכרית בקוואורדייניות קרטזיות ביחס למרצה.
- רשמו את וקטורי המיקום של הכרית בקוואורדייניות פולריות ביחס למרצה.
- רשמו את וקטורי המיקום של הסטודנט בקוואורדייניות קרטזיות ביחס למרצה.
- רשמו את וקטורי המיקום של הסטודנט בקוואורדייניות פולריות ביחס למרצה.
- רשמו את וקטורי המיקום של הכרית בקוואורדייניות קרטזיות ביחס לסטודנט.
- מה צריכה להיות גודלה של המהירות ההתחלתית v_0 והזווית α כדי שהכרית תעבור ליד הסטודנט לאחר זמן t_0 .

סטודנט מחליט קופז כהכרית עוברת לידו (אסור לו לתפוס אותה כשהיא לידו).
 ז. הכרית יכולה לעבור ליד הסטודנט כשהיא לפני שיא הגובה, בשיא הגובה או אחריו. באיזה משלוחת המקטים על הסטודנט קופז על מנת לחסוך את הוצאות החיבור של האמבולנס? (נמקו את תשובהכם).
 ח. על פי הסעיף בהינתן שהסטודנט והכרית בקרקע באותו הזמן. מה הוא הקשר בין וקטורי המהירות של הסטודנט והכרית בעת הקפיצה כך שהסטודנט לא יפגע?
 ט. חשבו את הגובה בו תתרחש הקפיצה.
 בטאו את הגובה הניל' בעזרת קבועי הביעיה בלבד
 (t_0) הוא לא קבוע בעיה עבר שאלת זו.



15) קROLSלה**

חיפושית נעה על קROLSלה המסתובבת במהירות זוויתית קבועה ω_0 .

רדיוס הקROLSלה R. החיפושית נעה מקצת הקROLSלה למרכזה ב מהירות קבועה v_0 ביחס לקרים.

א. מצא את מיקום החיפושית בקורדיינטות קרטזיות ובקורדיינטות פולריות ביחס לצופים הבאים:

- i. צופה A - הנמצא על הקROLSלה בנקודת התחלה של החיפושית.
- ii. צופה B - הנמצא על הקROLSלה במרכזה.
- iii. צופה C - הנמצא במרכז הקROLSלה אך אינו מסתובב אליה.
- iv. צופה D - הנמצא בקצת הקROLSלה ואינו מסתובב עם הקROLSלה.

ב. מצא את המהירות והתאוצה ביחס לאותם צופים.

תשובות סופיות

$$\overset{\text{ר}}{a} = -\left(\left(\Omega^2 + \omega^2\right)A \sin \Omega t + \omega^2 l_0\right)\hat{r} + \left(2\Omega A \cos \Omega t\right)\hat{\theta} . \text{ נ } \quad (1)$$

$$\theta < l_0 \leq 2m . \text{ ג} \quad \theta < l_0 \leq \frac{\Omega^2 + \omega^2}{\omega^2} \cdot A . \text{ ב}$$

$$\overset{\text{ר}}{a} = \left(2A - B^2 A t^4\right)\hat{r} + \left(5ABt^2\right)\hat{\theta} . \text{ ב} \quad \overset{\text{ר}}{r} = 2At\hat{r} + At^2 \cdot Bt\hat{\theta} . \text{ א} \quad (2)$$

$$t = 2 \text{ sec} . \text{ ג}$$

$$F_r = m\left(0 - \omega^2 v_0 t\right) . \text{ ב} \quad r = v_0 \cdot t , \theta(t) = \omega \cdot t . \text{ נ} \quad (3)$$

$$, r'(t) = R - \frac{1}{2}a_0 t^2 , \theta'(t) = 0 . \text{ א. ביחס לדיסקה :} \quad (4)$$

$$T = m \left(a_0 + \omega^2 \left(R - \frac{1}{2}a_0 t^2 \right) \right) . \text{ ב} \quad r(t) = R - \frac{1}{2}a_0 t^2 , \theta(t) = \omega t . \text{ ביחס למעבה :}$$



$$N_z = mg . \text{ ג}$$

$$\alpha \approx 7.44 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} , \beta \approx -4.03 \cdot 10^{-4} \frac{\text{rad}}{\text{sec}^2} . \text{ ב} \quad |\overset{\text{ר}}{v}| \approx 1521 \frac{\text{m}}{\text{sec}} . \text{ נ} \quad (5)$$


$$\alpha \theta r = 0 . \text{ ב} \quad \sum F_r = 0 , \sum F_\theta = N_\theta , \sum F_z = N_z - mg . \text{ נ} \quad (6)$$

$$N_\theta = m\omega^2 d \left(e^{\omega t} - e^{-\omega t} \right) , N_z = mg . \text{ ת} \quad \alpha = \omega A e^{\omega t} - \omega B e^{-\omega t} , A = B = \frac{d}{2} . \text{ ג}$$

$$: \alpha < 0 \quad : \alpha > 0 . \text{ ב} \quad r = A \left(\frac{\theta}{\omega} \right)^\alpha . \text{ נ} \quad (7)$$



$$N \approx 2.39 . \text{ ג}$$



$$\overset{\text{ר}}{r}(t) = At^\alpha \left(-\cos(e^{ct} - 1)\hat{x} - \sin(e^{ct} - 1)\hat{y} \right) . \text{ נ} \quad (8)$$

$$x(t) = -\frac{1}{2}At^\alpha , y(t) = 0 . \text{ ב}$$

$$v_x(t) = -\frac{1}{2}A\alpha t^{\alpha-1} , a_x(t) = -\frac{1}{2}A\alpha(\alpha-1)t^{\alpha-2}$$

ג. תנועה בתאוצה קבועה בקו ישר.

$$\frac{r}{v} = 0.5\hat{r} + 0.1t\hat{\theta}, \quad \frac{r}{a} = -0.02 \cdot t\hat{r} + 0.2\hat{\theta} \quad \text{א. (9)}$$

ב. כי הוא לא זו ב מהירות קבועה ביחס למעבده.

ג. רכיב רציאלי: תאוצה רציאלית מהתנועה.

רכיב θ : $v_\theta = \omega r$ בגלל ש- r משתנה צריך תאוצה בכיוון θ שתגדיל את

המהירות בכיוון θ אפילו ש- ω קבוע.

$$\sqrt{gR_E} \quad \text{ב. (10)}$$

א. התנועה היא של היפיניות של ריבוע הקטן ומסתווב. המפגש יהיה במרכזו.

$$\frac{\ln 2}{2\pi} \cdot g. \quad \frac{d}{v} \cdot \text{ב.}$$

$$\frac{r}{t}(t) = \left(-\frac{vt}{\sqrt{2}} + \frac{d}{\sqrt{2}} \right) \left[\cos \left(\ln \left(\frac{d}{d-vt} \right) + \frac{\pi}{4} \right) \hat{x} + \sin \left(\ln \left(\frac{d}{d-vt} \right) + \frac{\pi}{4} \right) \hat{y} \right]. \quad \text{כ.}$$

$$r_1(t) = \frac{r_1}{2} (e^{\omega t} + e^{-\omega t}). \quad \text{ג.} \quad \omega = \omega^2 r_1. \quad \frac{m_1}{m_2} = \frac{r_2}{r_1}. \quad \text{א. (12)}$$

$$r_{\max} = \sqrt{(\mu_s g)^2 - (2C\omega_0)^2} \left(\frac{1}{\omega_0} \right) \quad \text{ב. (13)}$$

$$x_1 = v_0 \cos \alpha \cdot t, \quad y_1 = v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} gt^2. \quad \text{א. (14)}$$

$$r = \sqrt{(v_0 \cos \alpha \cdot t)^2 + \left(v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} gt^2 \right)^2}, \quad \tan \theta = \frac{v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} gt^2}{v_0 \cos \alpha \cdot t}. \quad \text{ב.}$$

$$r = R, \quad \theta = \frac{\pi}{2} - |\omega| \cdot t. \quad \text{כ.} \quad x_2 = R \cos \left(\frac{\pi}{2} - |\omega| t \right), \quad y_2 = R \sin \left(\frac{\pi}{2} - |\omega| t \right). \quad \text{ג.}$$

$$x_{1,2} = v_0 \cos \alpha t - R \cos \left(\frac{\pi}{2} - |\omega| t \right), \quad y_{1,2} = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2} gt - R \sin \left(\frac{\pi}{2} - |\omega| t \right). \quad \text{ה.}$$

$$\tan \alpha = \frac{\frac{1}{2} gt^2 + R \sin \left(\frac{\pi}{2} - |\omega| t_0 \right)}{R \cos \left(\frac{\pi}{2} - |\omega| t_0 \right)}. \quad \text{ו.}$$

$$v_0^2 t_0^2 = \left(\frac{1}{2} gt_0^2 + R \sin \left(\frac{\pi}{2} - |\omega| t_0 \right) \right)^2 + R^2 \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} - |\omega| t_0 \right)$$

ח. וקטורי המהירות חייבים להיות שוויים בגודל ובכיוון.

$$y = \frac{v_0 \cos \alpha}{|\omega|} \cdot t. \quad \text{ט.}$$

ב. ראו סרטוון. (15)

פיזיקה 1 מכניתה

פרק 10 - כוחות מודומים (עקרון דלאמבר) -

תוכן העניינים

1. הסבר על כוחות מודומים ומערכת הנעה בקו ישר	129
2. כוחות מודומים במערכת מסתובבת - הцентрופוגלי והקוריאוליס	132
3. תרגילים עם הקוריאוליס והцентрיפוגלי	133
4. צופה מסתובב שאינו בראשית ותנועת משולבת	(ללא ספר)
5. כוח אוילר	(ללא ספר)

הסבר על כוחות מדומים ומערכת הנעה בקו ישר

רקע


כוחות מדומים הם תיקון לחוק השני של ניוטון, כאשר הצופה / מערכת המדידה נמצאת בתאוצה.

הערה: אם הצופה נמצא במנוחה או נע במהירות קבועה לא יהיה כוחות מדומים – לא משנה מה תנועת הגוף.

הנוסחה לכוח המדומה הנוצר כאשר הצופה נע בתאוצה בקו ישר היא:
 $F = -ma_0$, כאשר m היא מסת הגוף הנמדד ו- a_0 היא תאוצת הצופה.

שאלות

1) דוגמה-משקל במעלית



אדם עומד על משקל בתחום מעלית. מסת האדם היא 70 ק"ג.
 המעלית עולה מקומת הקרקע לקומת 15.

בתחילת התנועה המעלית מאייצה בקצב קבוע של $3 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$.

החל מקומת 2 המעלית נעה במהירות קבועה עד לקומת 12.

החל מקומת 12 המעלית מאיטה בקצב קבוע של $4 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$


עד לעצירה בקומת 15.

מצא מה מורה המשקל בכל רגע במהלך תנועת המעלית.

פתרונות פעם אחת מנקודות מבט של צופה מהקרקע

ופעם נוספת מנקודה מבט שצופה הנמצא בתחום המעלית.

2) מכשיר למדידת תאוצה



מטרולט קשורה לתקרת המכונית.

המטרולט נמצא בזווית קבועה ונתונה α ,

ביחס לאנך מתקרת המכונית.

מצא מהי תאוצת המכונית (גודלה וכיוונו).

פתרונות פעם אחת מנקודות מבט של צופה מהקרקע


ופעם שנייה מנקודה מבטו של צופה בתחום המכונית.

3) מכונת אטוד במעלית

שתי מסות : $m_1 = 5\text{kg}$ ו- $m_2 = 3\text{kg}$ מחוברות באמצעות חוט דרך גלגלת אידיאלית הקשורה לתקرت מעלייה.

היא : $a_0 = 2 \frac{m}{sec^2}$ כלפי מעלה.

הגובה של m מעל רצפת המעלית הוא : $h = 5m$
 כמה זמן ייקח ל- m להגיע אל רצפת המעלית?



4) גלגולות נעות במעלית*

מערכת הגלגלות המתואמת באיזור תלולה מתקרת מעלייה העולה בתאוצה קבועה α . כל הגלגלות הינן חסרות מסה.


- ב.** ידוע כי $m_1 > 2m_2$. מצאו את תאוצת המשות.

מעוזבים את המערכת מנוחה כאשר המס' m נמצא מטר מעל לרצפת המעלית.

תוק כמה זמן תפגע המסה m ברכפת המעלית?

5) תרגיל חי משנקר - מושלש עם שתי מסות*

באיור מתוארת עגלת שמסתה M המורכבת משני מישוריים משופעים חלקים. שתי מסות נקודתיות m_1 ו- m_2 מחוברות ביניהן בחוט העובר בגלגול אידיאלית. המישוריים המשופעים והמיישור האופקי עליו נעה העגלת חלקים.




נתונים : $M = 35\text{kg}$, $m_1 = 10\text{kg}$, $m_2 = 5\text{kg}$, $\theta_1 = 45^\circ$, $\theta_2 = 30^\circ$.
משחררים את המסות הנקודות מ מצב מנוחה והן מחליקות על המישורים המשופעים.
חשב את תאוצת העגלה ביחס לקרקע (גודלו וכיוונו).

6) מכוניות משולשת**

בציבור מתוארת מכונית משולשת עם זווית ראש θ .

על המכונית ישנה מסה M ובין המכונית למסה קיימים חיכוך.

$$\text{נתון כי: } \mu_s = 0.2, \mu_k = 0.6, \sin \theta = ?$$



א. מהו התנאי שהתאוצה a צריכה לקיים על

מנת שחמשה לא תחליק מטה?

$$\text{ב.icut, נתון כי } a = 0.2g$$

חשב את תאוצת הגוף במערכת העגלת.

$$\text{ג. חשב את תאוצת הגוף במערכת המעבדה } (a = 0.2g)$$

ד.icut נתון כי העגלת נעה שמאלה.

מה צריכה להיות התאוצה הקרטית שמאלה של העגלת כדי שהמסkolות תינתק מהמיישור המשופע?

תשובות סופיות

$$(1) \text{ קומות 0-2 : } 42\text{kg}, \text{ קומות 2-15 : } 70\text{kg}, \text{ קומות 15-20 : } 91\text{kg}$$

$$(2) \text{ ימינה. } a_x = g \tan \alpha$$

$$(3) t = 1.83\text{sec}$$

$$(4) a_2 = -2(a_0 + g) \frac{2m_2 - m_1}{2m_2 + m_1}, a_1 = \frac{2m_2 - m_1}{4m_2 + m_1}(a_0 + g) \text{ א.}$$

$$\text{ב. } t = \sqrt{\frac{(4m_2 + m_1) \cdot 2}{(m_1 - 2m_2)(a_0 + g)}}$$

$$(5) a_M = 1.16 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$$

$$(6) a = 1.33g \text{ .ג. } a_x = 0.4g, a_y = 0.15g \text{ .ג. } a_x' = 0.256g \text{ .ב. } a \geq 0.48g \text{ .א.}$$

כוחות מדומים במערכת מסתובבת - הцентрיפוגלי והקוריאוליס

רקע

הכוחות מדומים הנוספים במקורה של צופה מסתובב ב מהירות זוויתית קבועה :

הכוח הцентрיפוגלי

$$\vec{F} = m\omega^2 r \hat{r}$$


$$\vec{F} = -m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$$

כוח קוריאוליס

$$\vec{F}_c = -2m\omega \times \vec{v}$$


תרגילים עם הקוריואוליס והцентрיפוגלי:

שאלות:




- 1) **מכונית בסיבוב עם קובייה תלולה**
נהג מסתובב עם מכוניתו סביב כיכר שדריווה $R = 50\text{m}$, ב מהירות $v = 20 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$. על מראת המכונית תלואה קובייה ש מסטה $m = 0.1\text{kg}$.

- א. ב מערכת הייחוס של הנהג, מהו הכוח המדומם (הכוח המרכזי-פוגלי) הפועל על הקובייה?
ב. מצאו, פעם ב מערכת הייחוס של צופה מן הצד ופעם ב מערכת הייחוס של הנהג, את הזווית בה תלואה הקובייה ביחס לאנך בשוויי-משקל.




- 2) **циינור גלילי מסתובב**
циינור גלילי באורך L מסתובב ב מהירות זוויתית ω סביב ציר אנכי הניצב לצינור ועובר במרכזו. גופו בעל מסה m נעל ללא חיכוך בתוך הצינור. נתון כי הגוף מתחילה מנוחה ובמרחק a ממרכז הצינור. (לצורך השאלה יש להתעלם מכוח הכבידה).

- א. מצא את הכוחות הפועלים על החלקיק ב מערכת הצינור המסתובב.
ב. חשב את המהירותים כפונקציה של הזמן וכפונקציה של המרחק מהציר.
(פתרור המשווה הדיפרנציאלי בעזרת הכפלת ב- $-z$).
ג. מצא את הזמן בו הגוף י יצא מהצינור.
ד. רשם את משוואת התנועה של הגוף בצינור במידה וקיים כוח חיכוך ומוקדם החיכוך הקינטי נתון μ .




- 3) **סירה יורה פגז**
סירה נמצאת בקו רוחב λ יורה פגז ב מהירות v לעבר סירה אחרת הנמצאת ב מרחק d ממנה לכיוון דרום. נתון מהירות כדור הארץ היא ω .
מצאו את הסטייה במיקום הפגז בעקבות כוח קוריואוליס. הזנה את ההשפעה של הכוח על רכיבי המהירות בכיוון מזרח מערב ובכיוון אנך לכדור הארץ.
הנה כי הפגז נעה בקו ישר והתעלם מהתנועה הבליסטיות.

4) מוטולת בתוך תיבה מסתובבת


תיבת קשורה בחבל שאורכו R למומט המסתובב ב מהירות זוויתית ω .
תולים מוטולת שאורכה L ומסתה M מהקיר של התיבה.

הمسה שבקצתה המוטולת היא גוף בעל מטען חשמלי Q הנמצא בשדה חשמלי E כלפי מעלה (גוף טוען הנמצא בשדה חשמלי מרגייש כוח שגודלו QE וכיוונו בכיוון השדה החשמלי).
חשבו את הזווית של המוטולת עם הקיר במצב שיווי משקל.
הניחו ש- $\alpha \ll L \sin \alpha \ll R$.



5) זיגי הולך על השפה של דיסקה מסתובבת
זיגי הכלב רץ ב מהירות קבועה v לאורך היקפה של דיסקה המסתובבת ב מהירות זוויתית ω .
ה מהירות v נתונה ביחס לדיסקה.


משקלם של זיגי הוא m ורדיויס הדיסקה הוא R .
מהו כוח החיכוך הפועל על זיגי מהדיסקה (גודל וכיום)?



6) יוסי ודני מתמסרים על דיסקה מסתובבת
יוסי ודני עומדים זה מול זה על גבי דיסקה בעלת רדיוס R המסתובבת ב מהירות זוויתית ω סביב צירה. האנשים קבועים במקומות על שפת הדיסקה כאשר מרכז הדיסקה נמצא בדיקוק ביניהם.

יוסי מגלגל כדור קטן על הדיסקה ש מגיע לדני בעבר זמן T .
א. מצא את מהירות הזריקה (גודל וכיום) יחסית לדיסקה.
בעצם החישוב במערכת המעבדה.

ב. מצא את משוואת התנועה של המסה במערכת הדיסקה בעזרת מערכות קוואורדינטות פולריות היחסית למערכת ומרכז הדיסקה.



7) **חלקיק במנהרה**
 חלקיק נקודתי בעל מסה m נע בתוך מנהרה ישרה העוברת
 במרכז כדור הארץ (הנה כי מסת כדור הארץ ורדיוסו
 ידועים וצפיפותו אחידה).
 נתון גם כי כדור הארץ מסתובב ב מהירות זוויתית ω .
 על החלקיק פועל כוח חיכוך השווה ל- N כאשר N הוא
 הכוח הנורמלי הפועל מזרוף המנהרה.

א. מהו גודל כוח הכבוד בתוך הכדור כתלות במרחק ממרכזו?


$$\text{התיאיחס לנוסחה המלאה של כוח הכבוד: } \vec{F} = -\frac{GMm}{r^2} \hat{r}$$

(כאשר G הוא קבוע נתון, r הוא המרחק ממרכזו הcéדור).


ב. מהם הכוחות המרכזייפוגלי וקוריאוליס הפועלים על החלקיק כתלות
 במקומות ובמהירות?

ג. מהו כוח החיכוך הפועל על החלקיק?

ד. רשמו משוואות התנועה עבור רכיב המיקום לאורך ציר ה- x במערכת מסתובבת.



8) **עכבייש מטפס על עץ**
 עץ דקל נמצא בקו רוחב λ וכיומו מקביל לרדיויס כדה"א
 (הנה שגובהו זנich ביחס לרדיויס כדה"א).
 עכבייש מטפס במהירות קבועה במעלה חוט שטווה
 המחבר לעץ.
 מצא את הזווית שיווצר החוט עם העץ.
 הנה כי תאוצת הכבוד g כבר כוללת את התיקון
 המרכזייפוגלי וכי הזווית עם העץ קטנה ולכן ניתן להזניח
 את רכיבי המהירות בציריהם y , R_E , ω_E , v (התיאיחס ל- x בנתונים).




9) **פג' עם כנפיים**

$$\text{פג' עם כנפיים נורה במהירות } v = 4 \frac{\text{Km}}{\text{sec}}$$


בגלל הכנפיים, הפג' עף בגובה קבוע מעלה פני כדה"א.
 הפג' יוצא מנקודה A הנמצאת בזווית 5° מ- x מציג
 הסיבוב של כדה"א ומגיע לנקודה B הנמצאת
 במרחק $d = 5 \text{ Km}$ צפונית לנקודה A.

ניתן להניח כי $R_E < d$ ומכאן שקו הרוחב של B זהה לזה של A.
 חשב את הזווית בה צריך לירות את הפג' ביחס לקו האורך המחבר בין A ל-B.
 כך שיגיע בבדיקה לנקודה B.
 רמז: מומלץ לשים לבגדלים בשאלת ולבנות הונחות בהתאם.

**10) כדור משוחרר מגג בניין**

כדור משוחרר ממנוחה מגג בניין בגובה h הנמצא בקוטר רוחב λ .

חשב את הסטייה של הכדור הנובעת מכוח קוריוליס.
הזנה את כל ההשפעות של הכוח המרכזי.

**11) הפרש גבהים בגדות נהר**

נהר זורם במהירות v מצפון לדרום.

מיקום הנהר הוא בזווית θ ביחס לציר הסיבוב של כדור הארץ.

נתון רדיוס כדור הארץ ורוחב הנהר D .

המהירות הזוויתית של כדור הארץ היא ω
מצאו את הפרש הגבהים בין גdots הנהר.

12) חבילת סיוע לכפר

כפר הנמצא בקוטר רוחב λ בחצי היקטור הצפוני נדרש לסייע הומניטרי.


מטוס סיוע טס בגובה H מעל הכפר במהירות אופקית v_0 ובכיוון צפון.

המטוס משחרר חבילת סיוע לכפר.

א. חשבו את כוח קוריוליס, בצעו הזרחות מתאימות.

ב. האם הסטייה בנקודת הנפילה של החבילה היא מזרחית או מערבית?

ג. חשב את הסטייה מהכפר כתוצאה מכוח קוריוליס
(הניחו שאין סטייה צפונה או דרומה).

**13) זריקה אופקית עם קווריאוליס ללא הזנחות**מסה m נזרקת אופקית ממגדל בגובה H .המגדל נמצא בקו רוחב λ .

נתון :

- רדיוס כדור הארץ.

- מהירות התחלתית של המסה.


g - תאוצה הכלוב בקטבים.

ω - מהירות זוויתית של כדור הארץ.

הנה כי $R \ll h$ וכי ניתן להזניח את השינוי בכוח המרכזייפוגי ואת השינוי בקו הרוחב במהלך התנועה.

א. חשב את משוואות התנועה במערכת ייחוס של המגדל.

ב. פטור את משוואות התנועה.

ג. בדוק מה קורה בגבול $sh^2 R \omega^2 = 1$? פתח עד סדר שני ב- ωt .**14) דיסקה מסתובבת וגוף בתעלת שאינה במרכז**בדיסקה ברדיוס R ישנה תעלת ישרה למרחק $\frac{R}{2}$ ממרכז הדיסקה.הדיסקה מסתובבת במהירות זוויתית ω .כוח מושך גוף בעל מסה m לאורך התעלת כך שמהירות הגוף היא: $v = \omega R$ יחסית לדיסקה.

א. מה גודלו של הכוח המשיע את המסה אם נתון שאין חיכוך בין המסה לתעלה?

ב. מהו גודלו וכיוונו של הכוח הנורמלי הפועל מדפנות התעלה? (התעלם מכוח הכלוב).

ג. במידה והכוון המושך את המסה לא היה פועל, והגוף היה מתחילה לנעה מקצת התעלה במהירות התחלתית $R\omega = v$ כלפי פנים, מה הייתה מהירות הגוף במרכז התעלה?

תשובות סופיות:

$$\tan \theta = \frac{v^2}{gR} . \text{ב} \quad v' = 0 . \text{א} \quad (1)$$

$$\vec{F} = m\omega^2 r \hat{r}, \vec{F} = 2m\dot{r}\omega(-\hat{\theta}) . \text{א} \quad (2)$$

$$r(t) = a \cosh(t), v(t) = \dot{r} = \omega a \sinh(t) . \text{ב}$$

$$-\mu 2m\omega \dot{r} + m\omega^2 r = m\ddot{r} . \text{ט} \quad t_{end} = \frac{1}{\omega} \ln \left(\frac{L + \sqrt{L^2 - a^2}}{a} \right) . \lambda$$

$$z = \frac{\omega d^2}{v} \sin \lambda \quad (3)$$

$$\cos \alpha = \frac{mg - QE}{m\omega^2 L} \quad (4)$$

$$\vec{f} = -m \left(\omega^2 R + 2\omega v + \frac{v^2}{R} \right) \hat{r} \quad (5)$$

$$\left| v_{ball,disk} \right|^2 = \left(\frac{R}{T} (\cos \omega T + 1) \right)^2 + \left(\frac{R}{T} \sin \omega T + \omega R \right)^2, \tan \theta_{ball,disk} = \frac{\cos \omega T + 1}{\sin \omega T + \omega T} . \text{א} \quad (6)$$

$$\tilde{\omega}^2 r = \ddot{r}, -2\tilde{\omega} \dot{r} = r \ddot{\omega} . \text{ב}$$

$$N = -2m\omega \dot{x} \hat{z} . \text{ז} \quad \vec{F} = m2\omega \dot{x} \hat{z} . \text{ב} \quad F(r) = -\frac{GMm}{R^3} x \hat{x} . \text{א} \quad (7)$$

$$-\frac{GM}{R^3} + \omega^2 x - 2\mu\omega \dot{x} = \ddot{x} . \text{ט}$$

$$\cos \theta = \frac{g}{\sqrt{\omega_E^4 R_E^2 \cos^2(\lambda) \sin^2(\lambda) + 4\omega_E^2 v^2 + g^2}} \quad (8)$$

$$\alpha = 5.185 \cdot 10^{-3} \quad (9)$$

$$y = -\omega \cos(\lambda) g \frac{1}{3} \left(\frac{2h}{g} \right)^{\frac{3}{2}} \quad (10)$$

$$\tan(\varphi) = \frac{2mv\omega \cos \theta}{-mg + m\omega^2 R_E \sin^2 \theta} \quad (11)$$

$$\text{ב. מזרחה.} \quad 2m(gt\omega \cos \lambda + v_0\omega \sin \lambda) \hat{z} . \text{א} \quad (12)$$

$$\frac{g}{3} \left(\frac{2H}{g} \right)^{\frac{3}{2}} \omega \cos \lambda + v_0 \omega \sin \lambda \frac{H}{g} . \text{ז}$$

(13) ראה סרטון.

$$v(x=0) = \frac{1}{2} \omega R . \text{ז} \quad N = \frac{3}{2} m\omega^2 R . \text{ב} \quad F = -m\omega^2 x . \text{א} \quad (14)$$

פיזיקה 1 מכניתה

פרק 11 - עבודה ואנרגיה -

תוכן העניינים

1. שימור אנרגיה ומשפט עבודה ואנרגיה	139
2. חישוב עבודה לכוח לא קבוע	143
3. חישוב כוח משמר מאנרגיה פוטנציאלית	145
4. איך בודקים האם כוח הוא משמר	146
5. נקודת שיווי משקל	147
6. ניתוח באמצעות גרפים של אנרגיות	149
7. חישוב אנרגיה פוטנציאלית מכוח משמר	151
8. הספק ונצילות	152
9. תרגילים מסכמים	155
10. תרגילים מסכמים כולל תנועה מעגלית	159

שמור אנרגיה ומשפט עבודה ואנרגיה

רקע

עבודה של כוח קבוע :

$$W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r} = |\vec{F}| \cdot |\Delta \vec{r}| \cdot \cos \alpha = F_x \Delta x + F_y \Delta y + F_z \Delta z$$

כאשר α היא הזווית בין הכוח להעתק

הערות :

1. העבודה של כוח שמאונך להעתק (לתנועת) מתאפשרת.
2. אם הגוף לא זו או אין עבודה (לכן העבודה של החיכוך הסטטי היא תמיד אפס).

הקשר בין עבודה כוללת לאנרגיה קינטית :

$$W_{\Sigma F} = \Delta E_k$$

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 \text{ אנרגיה קינטית}$$

כוח משמר :

1. **העבודה שמבצע הכוח אינה תלוי במסלול.** היא תלויות רק בנקודת בה התחיל הגוף ובנקודת בה סיים הגוף את התנועה.
2. **העבודה במסלול סגור מתאפשרת.**

$$W_c = -\Delta U$$

$$\text{האנרגיה הפוטנציאלית הכבידית } U_g = mgh$$

$$\text{האנרגיה הפוטנציאלית האלסטית } U_{el} = \frac{1}{2}kx^2$$

כאשר x הוא ההतארכות של הקפיץ ממצב רפיוי ו- k הוא קבוע הקפיץ

$$E = E_k + U \quad \text{אנרגייה (מכנית) כללית :}$$

U היא סכום כל האנרגיות הפוטנציאליות שקיימות בבעיה.

$$E_i + W_{NC} = E_F \quad \text{משפט עבודה אנרגיה:}$$

W_{NC} העבודה של הכוחות שאינם לשמורים

חוק שימור האנרגיה:

אם כל הכוחות לשמורים (או העבודה של הכוחות שאינם לשמורים שווה לאפס) אז האנרגיה הכללית נשמרת


שאלות

(1) אדם מושך ארגז

אדם מושך ארגז שמסתו $M = 5\text{ kg}$ באמצעות חבל ובזווית 30° מעלה ביחס לקרקע.

מקדם החיכוך הקינטי בין הארגז לקרקע הוא: $\mu_k = 0.2$.

האדם מושך את הארגז לאורך שני מטרים. הכוח שפעיל האדם הוא $N = 80$.



א. מהי העבודה שביצע האדם?

ב. מהי העבודה שביצע כוח החיכוך?

ג. מהן העבודות שביצעו כוח הגוף
והנורמל מהמשטח?

ד. מהי העבודה הכוללת שנעשתה על הארגז?

(2) מהירות הארגז

בדוגמה הקודמת, אדם מושך ארגז, חשב את מהירות הארגז לאחר שהאדם משך אותו 2 מטרים אם ידוע שהוא התחלил ממנוחה.

(3) חישוב עבודה של כוח הגוף

אבן בעל מסה 2 kg נופלת מגג בניין בגובה 10 מטרים.

חשבו את העבודה שביצע כוח הגוף על האבן עד הפגיעה לקרקע.

חשבו פעמי אחד באופן מפורש דרך המכפלה הסקלרית ופעם נוספת דרך האנרגיה הפוטנציאלית.


(4) עגלת במדרון


עגלת נעה על משטח ללא חיכוך.

העגלת מתחילה במעלה המדרון בגובה H
עם מהירות ההתחלתית v_0 .

מצא את מהירות העגלת בתחתית המדרון.

נתונים: H , v_0 .



5) קופסה במדרון עם חיכוך

קופסה יורדת במדרון משופע בעל זווית θ .


הנח כי מהירות הקופסה במעלה המדרון היא v_0

גובהה ההתחלתי הוא H .

מצא את מהירות העגלת בתחתית המדרון.

הנח שהחיכוך הוא רק על החלק המשופע של התנועה.

נתונים: H , $\theta\mu_k$.

6) מסה נופלת על קופץ

קופץ חסר מסה, בעל קבוע קופץ של $50 \frac{N}{m}$, מחובר לרצפה.

משחררים ממנוחה מסה של $m = 2kg$ הנמצאת

גובהה 3 מטר מעל הקופץ.

א. מצא את הcyoz המקסימלי של הקופץ.

ב. מה הגובה המקסימלי אליו תגיע המסה
לאחר הפגיעה בקופץ.

7) שתי מסות מחוברות, מדרון וקופץ

מסה m_1 נמצאת על מדרון משופע בזווית θ .

המסה מונחת על קופץ בעל קבוע קופץ k המכובץ ב- $d = \Delta x$.

אל המסה קשור חוט העובר דרך גלגלת אידיאלית ומחובר

למסה m_2 הנמצאת בגובה H מעל הרצפה.

המערכת משוחררת ממנוחה.


מצא את מהירות הפגיעה בקרקע של m_2 .

נתון:

$$m_1 = 1kg, m_2 = 2kg$$

$$H = 3m, k = 100 \frac{N}{m}$$

$$\theta = 30^\circ, d = 30cm$$



תשובות סופיות

$$W_T = 135J \text{ .ג} \quad W_N = W_g = 0 \text{ .ג} \quad W_{fk} = -4J \text{ .ב.} \quad W = 139J \text{ .נ} \quad (1)$$

$$V_F \approx 7.35 \frac{m}{sec} \quad (2)$$

$$W_C = |\vec{F}| \cdot |\Delta \vec{r}| \cos \alpha = 200J , \quad W_C = -\Delta U = -(U_F - U_i) = 200J \quad (3)$$

$$V_F = \sqrt{v_0^2 + 2gH} \quad (4)$$

$$V_F = \sqrt{v_0^2 + 2gH(1 - \mu_k \cot(\theta))} \quad (5)$$

$$mgH = mgh \text{ .ב} \quad \Delta x = 2m \text{ .נ} \quad (6)$$

$$V = 5.745 \frac{m}{sec} \quad (7)$$

чисוב עבודה לכוח לא קבוע

רקע

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int (F_x dx + F_y dy + F_z dz)$$

צריך גם משווהה של המסלול

שאלות

1) חישוב עבודה במסלולים שונים

- חשבו את העבודה שמבצע הכוח: $\vec{F} = xy\hat{i} + xx\hat{j}$ בין הנקודה $A(0,0)$ לנקודה $B(2,4)$:
- דרך המסלול של הקו הישר המחבר בין הנקודות.
 - דרך מסלול המקביל לציר ה- x עד לנקודה $C(2,0)$ ולאחר מכן דרך המסלול המקביל לציר ה- y עד לנקודה B .
 - דרך המסלול $y = x^2$.
 - דרך המסלול $y(t) = 4t^2$, $x(t) = 2t$.

2) כוח בשלושה מימדים

נתון הכוח: $\vec{F} = z\hat{x} + xz\hat{y} + 2y\hat{z}$.

- חשבו את העבודה של הכוח דרך המסלול היוצא מהנקודה $A(1,2,3)$ עד לנקודה $B(2,3,5)$ כאשר המסלול יוצא מ- A במקביל לציר ה- Y עד לנקודה $C(1,3,3)$ ולאחר מכן מ- C במקביל לציר ה- Z ועד לנקודה $D(1,3,5)$ ולאחר מכן מהנקודה D במקביל לציר ה- X עד לנקודה B .
- חשבו את העבודה של הכוח מהנקודה $A(0,0,-1)$ עד הנקודה $B(4,4,5)$.
לאורך המסלול הנתון לפי המשוואות: $x(t) = 2t$; $y(t) = t^2$; $z(t) = 3t - 1$.

(3) חישוב עבודה של כוח במסלול מעגלי ואלפטי

$$\vec{F} = a(2x+4y)\hat{x} + b(4x-2y)\hat{y}$$

א. מצא תנאי על a ו- b כך שהכוח יהיה משמר.

ב. מצא את העבודה שעושה הכוח על גוף הנע במסלול סגור לאורך מעגל המתוואר ע"י: $\vec{r} = R \cos \theta \hat{x} + R \sin \theta \hat{y}$ כאשר הגוף מתחילה את תנועתו מהנקודה $(R, 0)$.

ג. מצא את העבודה שעושה הכוח על גוף הנע במסלול סגור לאורך אליפסה המתווארת ע"י: $\vec{r} = d \cos \theta \hat{x} + k \sin \theta \hat{y}$ כאשר הגוף מתחילה את תנועתו מהנקודה $(d, 0)$.

תשובות סופיות

$$W_{A \rightarrow B} = 2 + \frac{64}{5} \text{ נ.} \quad W_{A \rightarrow B} = 18 \text{ נ.} \quad W_{A \rightarrow B} = \frac{4}{2} + \frac{4 \cdot 8}{3} \text{ נ.} \quad (1)$$

$$W_{A \rightarrow B} = 2 + \frac{64}{5} \text{ נ.}$$

$$128 \text{ J} \quad 26.67 \text{ J} \quad (2)$$

$$W = k \cdot d (0 - 4a\pi + 4b\pi) \text{ נ.} \quad W = R^2 (0 - 4a\pi + 4b\pi) \text{ נ.} \quad \vec{\nabla} \times \vec{F} = 0 \Rightarrow a = b \text{ נ.} \quad (3)$$

чисוב כוח משמר מאנרגיה פוטנציאלית

רקע

$$\vec{F} = -\vec{\nabla} \cdot U$$

שאלות

1) חישוב עבודה מתוך אנרגיה פוטנציאלית

על גוף מסוים פועל כוח משמר המתאים לאנרגיה הפוטנציאלית
הבאה : $U(x, y) = 2x^2 - 6y^3$.

מצא את העבודה אותה צריך לבצע על מנת להביא את הגוף מהנקודה $(1, 0)$ אל הנקודה $(2, 3)$.

תשובות סופיות

$$W_{ext} = 156J \quad (1)$$

איך בודקים האם כוח הוא משמר

רקע

אם ורק אם $\vec{F} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$, אז הכוח משמר.

הערה: צריך שכל רכיב יתאפס בנפרד

שאלות

1) דוגמה

נתון הכוח F : $\vec{F} = -2xyx + (x^2 - z)y + y\hat{z}$.
בדקו האם הכוח F משמר.

תשובות סופיות

1) משמר.

נקודות שיווי משקל:

שאלות:




1) שעון תלוי

- שעון קיר תלוי באמצעות מסמר הנמצא בקצתו העליון. ניתן לסובב את כל השעון (לא את המחוגים) סביב המסמר.
- מצא באילו מצבים השעון יהיה בשווי משקל וקבע עבור כל מצב איזה סוג שווי משקל הוא.
 - חזור על סעיף א' אם המסמר תקוע במרכז השעון (השעון עדין יכול להסתובב סביב המסמר).

2) אנרגיה פוטנציאלית בשווי משקל

- האנרגיה הפוטנציאלית של הגוף נתונה לפי הfonקציה הבאה: $U = (x-4)^2 + x^3$.
מצא את נקודת שווי המשקל ומניין אותה לסוגים הרלוונטיים.



3) קפיץ וחרוזים על תיל קשיח מכופף

תיל קשיח מכופף בצורה פרבולה המתאימה לפונקציה: $y = -Ax^2$ כאשר A קבוע נתון.

- על התיל מושחלים שני חרוזים זהים בעלי מסה m , אחד בכל צד.
קפיץ אופקי בעל קבוע k ואורך רפי l מחבר בין החרוזים (ראה איור).
חשב את המרחק האופקי x_0 של כל חרוז מציר ה- y במצב של שווי משקל.

ניחס כי הקפיץ והחרוזים נמצאים תמיד באותוגובה.

הדרך: כתוב ביטוי לאנרגיה הפוטנציאלית כfonקציה של x בלבד.

תשובות סופיות:

- 1) א. כשהשעון למטה שיווי משקל יציב וכשהשעון הפוך ב- 180° שיווי משקל רופף.
 ב. השעון בשיווי משקל אדיש.

$$x_1, U''(x_1) = 6 \cdot \frac{4}{3} + 2 > 0 \quad (2)$$

$x_2, U''(x_2) = -2 \cdot 6 + 2 < 0$ ש.מ. רופף.

$$x_0 = \frac{kl}{2k - 2mgA} \quad (3)$$

ניתוח באמצעות גרפים של אנרגיות:

שאלות:

1) נקודת הביימניטה

גוף שמסתו 6 ק"ג נע לאורך ציר x בהשפעת כוח יחיד הנגור מהאנרגיה הפוטנציאלית: $U(x) = 2x^4 - 36x^2$.

נתון שכאשר הגוף מגיע לנקודת בה $m = 1.5$ מטר מהירותו שווה ל- $v = 3 \frac{m}{sec}$.

א. מהי הנקודה הימנית ביותר במסלול של הגוף?

ב. חזר על סעיף א', אם ערך המהירות היה: $v = 3 \frac{m}{sec}$.


2) גמל דו דבשתי

כוח משמר פועל על כדור בעל מסה 625gr. הגרף הבא מתאר את האנרגיה הפוטנציאלית של הcador כתלות במקומו:

א. שרטטו באופן איקוטי את הגרף של הכוח כתלות במקום.

ב. תארו באופן מילולי את תנועת הcador אם הוא משוחרר מ- $7m = x$ ממנוחה.

ג. מהי המהירות המינימלית שצרכי לתות כדור במצב של סעיף ב' על מנת שהcador יגיע לאינסוף?



מיינו אותן לפיה יציבותן וציין מה המשמעות של כל סוג של שיווי משקל.

3) שני גופים בפוטנציאלי אקספונצייאלי ריבועי

שני גופים נמצאים על ציר ה- x ונתונים להשפעת הפוטנציאלי: $U(x) = Axe^{-Bx^2}$ כאשר A, B הם קבועים חיוביים. נתון כי ברגע מסויםגוף אחד נמצא ב- $x = 0$ והאנרגיה שלו היא אפס, והגוף השני נמצא ב- $x = -\sqrt{\frac{1}{B}}$ והאנרגיה שלו

היא: $E = -\frac{A}{e} \sqrt{\frac{1}{B}}$. איך ייפגשו הגוף? (בחר את התשובה הנכונה):

ב. הגוף לא ייפגש אף פעם

א. בתחום $0 \leq x \leq -\sqrt{\frac{1}{B}}$


ד. $x = 0$.

ג. בנזודה $x = -\sqrt{\frac{1}{B}}$.

תשובות סופיות:

ב. $x = 6.81\text{m}$ א. $x = -1.202\text{m}$ (1)

ג. $x = 11\text{m}$ א. $x = -1.202\text{m}$ (2)



- ב. מתחילה בתאוצה בכיוון החיובי עד $x = 9\text{m}$ ואז מתחילה להאט עד $x = 11\text{m}$ שם עוצר רגעים ומסתובב חזרה. כך חוזר עד אינסוף.
- ג. 2 מטר לשנייה.
- ד. לא יציבה, $x = 9\text{m}$ יציבה, $x = 12\text{m}$ לא יציבה.
- א. (3)

чисוב אנרגיה פוטנציאלית מכוח משמר:

שאלות:

1) דוגמה

מצא את האנרגיה הפוטנציאלית של הכוח : y

$$\vec{F} = -2xyx + (2-x^2)y$$

אם נתון ש : $U(0,0) = 0$.

תשובות סופיות:

$$U = x^2y - 2y \quad (1)$$

הספק ונצלות

רkJ

$$P_{avg} = \frac{W}{\Delta t} \quad \text{הספק ממוצע :}$$

$$P = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

הספק רגעי : $-F$ – הכוח ו- v היא מהירות הגוף

שאלות

1) כמה עולה להפעיל מזגון

כמה עולה להפעיל מזגן שההספק שלו 1 כוח סוס למשך שעה אחת? יש לבדוק את תעריף חברות החשמל.

2) מבונית מאיצה מ-0 ל-100

מכונית מתחילה לנסוע מנוחה ומגיעה למהירות של 100 קמ"ש ב-10 שניות. מסת המכונית היא 1 טון. הניחו כי אין חיכוך עם האוויר.

א. מהי העבודה שהתבצעה על המכונית?

ב). מהו ההספק של המנווע בהנחה שהוא קבוע ומונצל במלואו (הנחה לא נכון)?

3) אונגווע נושא ב מהירות קבועה בגדי התנדבות אוויר

אופנוג נושא במחירות קבועה של 100 קמ"ש.

כגדו פועל כוח החתוגות מהאוויר של 300 ניוטון.

מהו היחס של המנווע אם נניח שהחיספָק מונוצל במלואו?

4) נצילות של 40 אחוז בדוגמה של המכונית המאיצה

בדוגמה "מכונית מאיצה מ-0 ל-100" מה ההספק של המנוע אם הנזילות שלו היא 40%?

5) הספק ממוצע לשנות מהירות

איזה כוח קבוע יש להפעיל על מכוניות בעלת מסה של 2 טון,

$$\text{כדי לשנות את מהירותה מ-} 9 \frac{\text{km}}{\text{hr}} \text{ ל-} 27 \frac{\text{km}}{\text{hr}} \text{ בתוך } 4 \text{ sec ?}$$

מהו ההספק הממוצע של כוח זה?

6) רכבת צעכו לחשמלית

רכבת צעכו לחשמלית מורכבת מ-10 קרונות.

הקרון הראשון והשני מכילים מנוע חשמלי ושוקלים 2 ק"ג כל אחד.

שאר הקרונות עמוסים בצעכוים ושוקלים 3 ק"ג כל אחד.

כל אחד מן המנועים מייצר הספק קבוע של 0.2KW.

- א. כמה זמן ייקח לרכבת להגיע למהירות של 10 מטר לשנייה אם התחילה לנוע ממנוחה?

ב. מהי האנרגיה הקינטית של הקרון הראשון ומהי האנרגיה הקינטית של הקרון השני, כאשר הרכבת נעה במהירות שחישבת בסעיף א'?

ג. חשב את העבודה שביצע הכוח שפועל בחיבור בין הקרון הראשון לשני על الكرון השני בזמן ההאצה.

ד. חשב את העבודה שביצע הכוח שפועל בחיבור בין הקרון השני לשישי על الكرון השלישי בזמן ההאצה.

ה. הרכבת מגיעה לעלייה עם שיפוע של 2 מעלות, מה צריך להיות הספק המנועים (בהתהה שהם שווים) על מנת שהרכבת תישאר במהירות קבועה של 10 מטר לשנייה?

**7) הספק כאשר נתון מיקום כתלות בזמן**

כוח ייחיד הפועל על גוף שמסתו 4kg, הכוח פועל בכיוון התנועה

ומיקום כתלות בזמן של הגוף הוא: $x = 2 + 3t + t^2$ ביחידות m.k.s.

- א. מהי העבודה שմבצע הכוח במשך 3 השניות הראשונות של התנועה?

ב. מהו ההספק של הכוח ב- $t = 2 \text{ sec}$?

תשובות סופיות

$$\text{א} 45 \text{ אגורות.} \quad (1)$$

$$p = 51.7 \text{ HP} \quad \text{ב.} \quad \Delta E_k \approx 385,800 \text{ J} = W_{\sum \vec{F}} \quad \text{א.} \quad (2)$$

$$p = 11.18 \text{ HP} \quad (3)$$

$$\text{כ"ס.} 135 \quad (4)$$

$$F = 2500 \text{ N}, \quad \bar{p} = 16.76 \text{ HP} \quad (5)$$

$$W_{1 \rightarrow 2} = 600 \text{ J.} \quad \text{ג.} \quad E_{k_1=100 \text{ J}} = E_{k_2}. \quad \text{ד.} \quad \Delta t = 3.5 \text{ sec.} \quad \text{א.} \quad (6)$$

$$p = 97.7 \text{ W.} \quad \text{ה.} \quad W_{3 \rightarrow 2} = 1200 \text{ J.} \quad \text{ט.}$$


$$p(t=2) = 56 \text{ W.} \quad \text{ו.} \quad W = 144 \text{ J.} \quad \text{א.} \quad (7)$$

תרגילים מסכימים:

שאלות:

1) קפץ יורה כדור

הלווע של רובה צעצוע מורכב מקפץ בעל קבוע k ובוכנה בעלת מסה m_1 .
בטעינה דוחפים כדור בעל מסה m_2 ודורכים את הקפץ.



הכיווץ של הקפץ הוא \hat{x} .

ברגע הירוי הקפץ משוחרר ממנוחה.

א. באיזה רגע הcador מנטק מגע מהבוכנה?

ב. מהי מהירות הcador ברגע זה?

2) כוח כפונקציית של מיקום, קפוץ וחיכוך*

מסה m נמצאת על מישור אופקי לא חלק ומתחוברת לקפוץ בעל קבוע k .
החל מ- $x=0$ פועל על המסה כוח התלוי במיקום: $\vec{F}(x) = (30x^2 - 4x)\hat{x}$.
כל היחידות בשאלת הונצחים סטנדרטיות.

ב- $x=0$ המסה נמצאת בראשית עם מהירות התחלתית v_0 והקפוץ רופיע.

נתונים: $v_0 = 5 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$, $\mu_k = 0.3$, $k = 10 \frac{\text{N}}{\text{m}}$, $m = 2\text{kg}$


א. רשמו ביטוי לתאוצה המסה כתלות במיקום (x) , הנח כי התנועה תמיד

בכיוון החיצוני.

ב. מצאו את המיקום בו התאיצה של המסה מתאפסת.

ג. מהי העבודה שביצע הכוח מתחילה התנועה ועד אשר $x = 0.5\text{m}$?

ד. מהי המהירות של המסה כאשר מיקומה $x = 0.5\text{m}$?



(3) כוח כפונקציה של זמן במישור משופע*

מסה $m = 5\text{kg}$ נמצאת על מישור משופע לא חלק.
על המישת פועל כוח התליוי בזמן (t) F שדוחף אותה במעלה המישור.


$$\text{מהירות המשא ידועה והיא נתונה לפי הפונקציה: } v(t) = 3t^2 + 2t \text{ .}$$

$$\text{מקדם החיכוך הוא: } \mu_k = 0.2 \text{ ונתון כי: } x(t=0) = 0 \text{ .}$$

כל הידידות הן ייחidot סטנדרטיות.
זווית המישור היא 30 מעלות.

א. (1) היכן נמצא הגוף ב- $t = 2\text{sec}$?

(2) מהו גודל הכוח F ברגע זה?



ב. מהו מיקום הגוף כאשר תאוצתו היא: $? \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$

ג. מהי האנרגיה הקינטית של הגוף ברגע של סעיף ב'?


ד. מהי העבודה הכוח F מרגע $t = 0\text{sec}$ ועד $t = 3\text{sec}$?

(4) קופסה מחליקה על מקטעים ישרים*

קופסה משוחררת ממנוחה ומתחליה להחליק לאורך מסלול שאינו ידוע, אך מורכב מקטעים ישרים בלבד.

בין הקופסה למשטח עליו היא מחליקה קיימים חיכוך והקופסה נעזרת בנקודה המרוחקת 900m אופקית ו- -90m מתחת נקודת בה התחליה.


חשבו את מקדם החיכוך, לא חסרים נתונים.

**(5) שרשרת על גלגלת**

שרשרת בעלת מסה M ואורך L מונחת על גלגלת אידאלית התלויה מהתקרלה.

השרשרת מונחת כך שרבע מהשרשרת מצד אחד של הגלגלת ושאר השרשרת מצד השני.
הנח שהחלק על הגלגלת עצמה זניח.
המערכת משוחררת ממנוחה.

מצאו את מהירות השרשרת ברגע שהקצה האחרון שלה עבר את הגלגלת.



6) חבל מחליק משולחן אנרגיה ומשוואת תנועה*



חבל באורך L ומסה M מונח על שולחן חסר חיכוך כך שהקצתו של החבל באורך d נשעט מחוץ לשולחן. החבל מוחזק ומשוחרר ממנוחה.

- רשמו את האנרגיה הקינטית והאנרגיה הפוטנציאלית במהלך החלקת החבל.

ב. השתמשו בשימור אנרגיה ומצאו את משוואת התנועה של החבל.

ג. השתמשו במשוואת התנועה ומצאו את מהירות החלקת כל החבל מהשולחן למיטה.



7) חוט מושך שתי מסות מחוברות בחוט**

חותן חסר מסה באורך L מחבר שתי מסות הנעות במישור אופקי ללא חיכוך.

כוח אופקי קבוע ונットו מושך את החוט במרכזו, בכיוון מאונך לחוט.

הניח שהמסות מתנגשות ונדקוקות בהתקنشות.

כמה אנרגיה הילכה לאיבוד בהתקنشות?

תשובות סופיות:

$$V = \sqrt{\frac{kd^2}{m_1 + m_2}} . \quad \text{ב.} \quad \text{א. בנקודת הרפיוון של הקפיץ.} \quad \text{(1)}$$

$$W = 0.75J . \quad \text{ג.} \quad x = 0.738m . \quad \text{ב.} \quad a_{(x)} = 15x^2 - 7x - 3 . \quad \text{א.} \quad \text{(2)}$$

$$V = 4.64 \frac{m}{s} . \quad \text{ט}$$

$$E_k = 62.5J . \quad \text{ג.} \quad x = 2m . \quad \text{ב.} \quad F = 103.7N \quad \text{(2)} \quad x = 12 \quad \text{(1). א.} \quad \text{(3)}$$

$$W = 3935J . \quad \text{ט}$$

$$0.1 \quad \text{(4)}$$

$$V = \sqrt{\frac{3gL}{8}} \quad \text{(5)}$$

$$\ddot{y} = \frac{gy}{L} . \quad \text{ב.} \quad E = \frac{1}{2} MV^2 - \frac{M}{2} g \frac{y^2}{2} . \quad \text{א.} \quad \text{(6)}$$


$$V(y=L) = \sqrt{\frac{g}{L} (L^2 - d^2)} . \quad \text{ג.}$$

$$\Delta E = F \cdot l \quad \text{(7)}$$


תרגילים מסכימים כולל תנועה מעגלית:

שאלות:


- 1) **תנאי להשלים סיבוב עם החיכוך במישור משופע**
גוף בעל מסה m מחליק על גבי מסילה המתוירת באורך.
מקדם החיכוך בין הגוף למישור המשופע הוא μ_k .
זווית המישור היא θ .
החלק המעגלי חסר חיכוך.
מצא את h הנמוך ביותר עבورو הגוף ישלים סיבוב בחלק העגול.



- 2) **שני חרוזים על טבעת מתווממת***
טבעת בעלת רדיוס R ומסה M תלואה מהתקarra
באמצעות חוט. מניחים בקצת העליון של הטבעת שני
חרוזים בעלי מסה זהה m .
החרוזים מתחילהים ליפול ממנוחה לשני צדי הטבעת.
מצא את היחס בין המסות הדרושים על מנת שהטבעת
תתרוםם במהלך נפילת הבדורים.



- 3) **מסה מסתובבת על שולחן ונמשכת למרכז***
מסה m נעה על שולחן חסר חיכוך בתנועה מעגלית ברדיוס R ובמהירות v_0 .
חוט קשור אל המסה הולך למרכז השולחן ועובד דרך גלגלת אידיאלית וחור בשולחן.
מושכים את החוט כך שהמסה מתקרבת למרכז.
א. מהי המהירות הזוויתית כתלות ב- r (המרחק ממרכז הסיבוב).
השתמשו בשיקולי כוחות בלבד. רמז: אין כוחות בכיוון $\hat{\theta}$.
ב. הוכיחו שהעבודה שהושקעה במשיכת החוט עד לרדיוס R כלשהו הקטן
מ- R זהה לשינוי באנרגיה הקינטית של המסה.
בסעיף זה ניתן להניח שהמהירות הרדיאלית קבועה.



תשובות סופיות:

$$h_{\min} = \frac{2.5R}{1 - \frac{\mu_k}{\tan \theta}} \quad (1)$$

$$\frac{m}{M} \geq \frac{3}{2} \quad (2)$$

$$\omega(r) = \frac{v_0 R}{r^2} \quad (3)$$

ב. הוכחה.

פיזיקה 1 מכניתה


פרק 12 - מתקף ותנע -

תוכן העניינים

1. מהו תנע והחוק השני של ניוטון	(ללא ספר)
2. מתקף	161
3. חוק שימור תנע וכוחות חיצוניים	162
4. סוגי התנגשויות	163
5. שימור תנע בה Tangshioot_Kzrotot	164
6. תנע, סיכום	165
7. התנגשויות קצורות ללא שימור תנע	166
8. תרגילים מסכמים	167

מתוך:**שאלות:**

- 1) דוגמה לחישוב מתוך**
שחקן בועט בכדור בעל מסה 2 ק"ג בכוח קבוע של 50 ניוטון. זמן המגע בין הכדור לשחקן הוא 0.2 שניות. מהי מהירות הכדור לאחר הביעת?



- 2) דוגמה 2- שני כוחות על גוף**
נתון גוף בעל מסה של 3 קילוגרם. על הגוף פועלם הכוחות כמו תואר בציור במשך זמן של 0.5 שניות.
א. מצא את המתוך שפועל כל כוח.
ב. מצא את המתוך השקול הפועל על הגוף.
ג. מצא את מהירות הגוף לאחר פועל הכוחות אם התחיל ממנוחה.

- 3) מתוך של כוח ממוצע דוגמה**
כדור בעל מסה של 1 ק"ג נזרק לעבר קיר במהירות של 2 מטר לשנייה. הכדור פוגע בקיר וחוזר באותה מהירות.
א. חשב את המתוך שפועל על הכדור.
ב. מי מפעיל את המתוך הנ"ל?
ג. חשב את הכוח הנורמלי הממוצע שפעיל הקיר אם זמן הפגיעה הוא 0.2 שניות.

תשובות סופיות:

$$V_f = \frac{5\text{m}}{\text{sec}} \quad (1)$$

$$|J| = 12.1\text{N}\cdot\text{sec} \quad \text{ב.} \quad \vec{J}_1 = 5\text{N}\cdot\text{sec} \hat{x}, \quad \vec{J}_2 = 7.5\text{N}\cdot\text{sec} \quad \text{א.} \quad (2)$$

$$V_x = \frac{11.5}{3} \frac{\text{m}}{\text{sec}}, \quad V_y = \frac{3.75}{3} \frac{\text{m}}{\text{sec}} \quad \text{ג.}$$

$$\bar{N} = -20\text{N} \hat{x} \quad \text{ב. הכוח הנורמלי.} \quad \text{ג.} \quad \vec{J} = \Delta \vec{P} = -4\text{N}\cdot\text{sec} \hat{x} \quad \text{א.} \quad (3)$$

חוק שימור תנע וכוחות חיצוניים:


שאלות:

1) דוגמה לשימור תנע

כדור בעל מסה m_1 ומהירות v_0 , פוגע בכדור שני בעל מסה m_2 . לאחר ההתנגשות, כדור 2 עף בזווית של 30 מעלות עם ציר ה- x וכדור 1 עף בזווית של 45 מעלות מתחתי לציר ה- x .

$$\text{נתון: } m_1 = 3\text{kg}, m_2 = 2\text{kg}, V_0 = 3 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$$

- א. מצא את גודל מהירות הגוף לאחר ההתנגשות.
- ב. מצא את המתќף שפועל על כל גוף.



תשובות סופיות:

$$V_1 = 1.55 \frac{\text{m}}{\text{sec}}, V_2 = 3.29 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \text{ א.} \quad (1)$$

$$\vec{J}_1 = -5.71\text{N}\cdot\text{sec} \hat{x} - 3.29\text{N}\cdot\text{sec} \hat{y}, \vec{J}_2 = -\vec{J}_1 \text{ ב.}$$

סוגי התנגשויות:

שאלות:

1) פיזור

כדור מס' 1 בעל מסה m ומהירות v_0 מתרגש אלסטית בכדור מס' 2 בעל מסה $3m$ הנמצא במנוחה. הזרות של כדור מס' 2 עם ציר ה- x היא 45° . מצא את הזרות של כדור מס' 1 לאחר ההתנגשות.



תשובות סופיות:

$$\theta = 71.56^\circ \quad (1)$$

שימור תנוע בה Tangential קצירות:

שאלות:

1) זיקוק מתפוצץ

זיקוק נורה לאוויר בכיוון אנכי לקרקע.
ברגע שהזיקוק מגיע לשיא הגובה הוא מתפוצץ לשלווה חלקים שווים בגודלם.
משך זמן הפיצוץ הוא : 0.5sec

מהירות החלק הראשון לאחר הפיצוץ היא : $50 \frac{m}{sec^2}$ ומהירות החלק השני

היא : $20 \frac{m}{sec} \hat{x} - 10 \frac{m}{sec} \hat{y} + 50 \frac{m}{sec} \hat{z}$

מהי מהירות החלק השלישי?

תשובות סופיות:

$$\vec{u}_3 = 70\hat{x} - 25\hat{y} + 50\hat{z} \quad (1)$$

תנע, סיכום:

שאלות:


- 1) דוגמה עם מקדם תקומה
 גוף בעל מסה m נע ב מהירות v על משטח אופקי חלק ומתנשא
 בגוף בעל מסה $3m$ הנמצא במנוחה.
 נתון כי ההתנשאות חד ממדיות ומקדם התקומה הוא 0.8.
 מצא את מהירות הגוף לאחר ההתנשאות.

תשובות סופיות:

$$u_2 = 0.45V, u_1 = -0.35V \quad (1)$$

התנשויות קצרות ללא שימור תנוע:

שאלות:



- 1) **התנשויות קצרה במדרון**
 כדור בעל מסה m נפל אל מדרון לפי המתוואר בשרטוט.
 נתון כי הכדור אינו מתרומם חזרה מעל המדرون לאחר הפגיעה.
 מצא את מהירות הכדור רגע לאחר הפגיעה.



- 2) **טנק וחיכוך קינטי**
 טנק בעל מסה M יורה פגז בעל מסה m בזווית α מעלה האופק במהירות V .
 הטנק מוצב על מישור בעל מקדם חיכוך קינטי נתון.
 מה תהיה מהירותו של הטנק רגע לאחר הירייה?


תשובות סופיות:

$$u_p = \frac{m\sqrt{2gh} \sin \theta - \mu m\sqrt{2gh} \cos \theta}{m} \quad (1)$$


$$u = \frac{mv \cos \alpha - \mu mv \sin \alpha}{M} \quad (2)$$

תרגילים מסכימים:


שאלות:



- (1) **גוף יורץ במדרון מתנגן ועולה חזרה**
 גוף בעל מסה $m_1 = 2\text{kg}$ משוחרר ממנוחה על מדרון משופע בגובה $h = 1\text{m}$.
 בתחתית המדרון מונחגוף בעל מסה $m_2 = 5\text{kg}$.
 הגוף הראשון פוגע בגוף השני בהגיעה למשור האופקי והגוףים מתנגשים התרגשות אלסטית, עד לאיזה גובה יגיע הגוף הראשון בחזרה במעלה המדרון? אין חיכוך בין הגוףים למשטחים.



- (2) **קליע חודר מטוטלת בליתסיטי**
 בול עץ בעל מסה 2kg קשור לחוט ותלויה אנטית במנוחה.
 קליע בעל מסה 5gr נע במהירות $v_1 = 450 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ פוגע בבול העץ, חודר אותו, וyonza מצידו השני במהירות $v_2 = 150 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$.
 לאיזה גובה מקסימלי יגיע בול העץ?




- (3) **פיצעה**
 פיצעה בעלת מסה $M = 13\text{kg}$ נעה באוויר במהירות קבועה $v_0 = 100 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$. ברגע מסוים, הפיצעה מתפוצצת לשולש חלקים קטנים יותר. מסת החלק הראשון היא: $m_1 = 4\text{kg}$ והוא נע במהירות $v_1 = 80 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ בזווית של 40° ביחס לכיוון המקורי.

- מסת החלק השני היא: $m_2 = 2\text{kg}$ והוא נע במהירות $v_2 = 10 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ בזווית של 120° ביחס לכיוון המקורי.
 מסת החלק השלישי היא: $m_3 = 7\text{kg}$.
 מצא את מהירות החלק השלישי.

4) איבוד אנרגיה

- כדור בעל מסה $m_1 = 2\text{kg}$ ו מהירות $v_1 = 10 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$ מתרחש בכדור בעל מסה $m_2 = 3\text{kg}$ הנמצא במנוחה. לאחר ההתנגשות הכדור הראשון נעה בכוון 30° מתחת לכיוון הפגיעה (ראה איור).
 א. מצא את מהירות הגוף לאחר ההתנגשות.
 ב. האם ההתנגשות אלסטית? אם לא - כמה אנרגיה נאבדה בהתנגשות?

**5) קליע חודר בול עץ וגורם לסיבוב אנכי (כולל תנועה מעגלית)**

- בול עץ בעל מסה M תלוי אנכית באמצעות מוט קשיח חסר מסה באורך L . המוט ביחד עם בול העץ יכולים להסתובב במעגל אנכי (ראה איור).
 יורים קליע בעל מסה m ב מהירות אופקית v לעבר בול העץ. הקליע חודר את הבול ויוצא מצדיו השני ב מהירות v_f . יחד עם הקליע יוצאה גם חתיכה מהעץ (ב מהירות הקליע) וב מסה של 5 אחוז ממשת בול העץ.
 מהי מהירות המינימלית של הכדור עבורה בול העץ יוכל להשלים סיבוב אנכי (שמעו לב שהמוט קשה)?

**6) אדם יורץ מכדור פורח**

- אדם נמצא בכדור פורח בגובה קבוע באויר. משקלו של האדם הוא 70 ק"ג ו מסתו של הכדור פורח (לא האדם) היא 280 גרם (כולל הסל וכל אביזר אחר בכדור).
 האדם משלשל חבל מהסל של הכדור פורח ומתחיל לרדת באמצעות החבל כלפי מטה.
 א. אם מהירותו של האדם בזמן הירידה בחבל היא 3 מטר לשנייה כלפי מטה וביחס לקרקע, מהי מהירות של הכדור פורח (גודלו וכיוונו)?
 ב. מהי מהירות הכדור פורח אם האדם נעצר לפטע באמצעות (לפני שהוא מגיעה לקרקע)?

7) מסה על קרונית ואיובוד אנרגיה

נתון כוח F קבוע המושך עגלת בעלת מסה m_1 ללא חיכוך.

על העגלה נמצא מסה m_2 ובין המסות יש חיכוך.

נתון: m_2 , m_1 , F , μ_k , μ_s .

א. מה הכוח F המקסימלי עبورו המסה העליונה
תחליק ביחס לתחנותה?

נניח כי הכוח F גדול מזה שחייבת בסעיף א'.


נניח גם כי הכוח הפועל במשך זמן T נתון והמסה העליונה אינה נופלת מתחנותה.

ב. מה הכוח F המקסימלי?

ג. מהי תאוצת הגוף, מהירותם ומיקומם כפונקציה של הזמן עד לזמן T ?

ד. כמה אנרגיה הולכת לאיבוד בזמן זה?

ה. מצא את מהירותם הסופית של הגוף ($v-T > t$) בהנחה שהמסה העליונה
עדין לא נופلت.



8) מסה על שני קرونות

נתונים שני קرونות על משטח חלק.

הקרון ימני במנוחה והקרון השמאלי נעה לעברו במהירות v .

על הקרון השמאלי מונחת מסה הנעה יחד עם הקרון.

מקדם החיכוך בין המסה לקרון ימני נתונה.

בין המסה לקרון השמאלי אין חיכוך.

בזמן $t=0$ הקרון השמאלי פוגע בקרון ימני

ונצמד אליו (אך הוא יכול להיפרד ממנו לאחר מכן).

א. متى תעבור המסה לקרון ימני?

ב. מה תהיה מהירותו הסופית של הקרון ימני?

ג. מהי תאוצת הקרון ימני? כמה זמן תאוצה זו נשכחה?

ד. האם סעיף ב' ווי' תואמים בתשובותיהם?

**9) מסות שומרות תנע ונבדקות לקיר**


המסה m מונחת על גבי الكرונית M (אך אינה מחוברת אליה).

שתי המסות נעות יחד ב מהירות v על גבי משטח

חלק לעבר קיר. התങשות בקיר אלסטית.

מקדם החיכוך בין המסות הוא μ .

א. מה תהיה מהירות המסה M לאחר זמן רב בהנחה שהיא גדולה מהמסה m .




ב. ענה על סעיף א' בהנחה שהמסה M קטנה מהמסה m .

10) כדור בקרונית

כדור בעל מסה m ומהירות v_0 נעה בתזוז קרונית בעלת מסה $M = \alpha m$ ואורך L . הכדור מתגש בדופן הימנית של הקרונית התנשאות אלסטית.

(אין חיכוך בין הקרונית לרצפה).



א. מהי מהירות הגוף לאחר ההתנגשות?

בדוק עבור: $\infty, 1, 0 = \alpha$.

ב. כמה זמן יעבור מהפגיעה הראשונה בדופן לפגיעה השנייה בדופן השמאלית?


11) שתי מסות על גלגלת וחוט רפי

שתי מסות m_1 , m_2 תלויות על גלגלת אידיאלית חסרת חיכוך.

המסה m_1 נמצאת על הקרקע במנוחה בעוד שהמסה m_2 תלואה באוויר.

מריימים את מסה m_2 לגובה H נוספת כך שהחוט מתרופף ומשחררים אותה ממנוחה.

א. מצא את מהירות המסאה m_2 לפני שהיא מגיעה לנקודת בה החוט נמתך.



ב. כתע החוט נמתך. הנח שהחוט אינו אלסטי,

כלומר, האורך שלו קבוע ללא תלות בגודל המתייחות שלו כל עוד קיימת בו מתיחות כלשהי (והוא אינו רפי כמו בסעיף א').

מצא את השינוי הכלול בתנוע של שתי המשקלות (בין הקטע מיד לפני שהחוט נמתך לבין הקטע מיד אחרי שהחוט מתוח ושתי המסות זזות).

ג. מצא את המתקף שפעולת התקarra על הגלגלת בזמן מתיחות החוט.

ד. לאיזה גובה תעלה m_1 בהנחה ש- $m_1 > m_2$ ו- m_1 אין פוגעת ברצפה.

ה. מהו המתקף שפעולת התקarra על הגלגלת מהרגע $t=0$

עד לרגע בו m_1 הגיעו לשיא הגובה?

12) מסה מתנגשת במשאית ונופלת

מסה m מונחת על עגלה חסרת חיכוך בעלת אורך L

ומסה $5m$. המסאה נועשת במהירות v לכיוון שמאל

והעגלה נייחת.


נתון כי ההתנגשות בין המסאה לבין העגלה היא התנשאות אלסטית.

לאחר כמה זמן מרגע ההתנגשות תיפול המסאה מהעגלה?



13) רתע בתוך עגלת

בתוך עגלת ללא חיכוך עומדים שני חברים המקובעים לרצפת ה الكرון. מסת האנשים וה الكرון M ואורך ה الكرון T.



האדם זורק כדור בעל מסה m ב מהירות v אל עבר חברו.

- מה תהיה מהירות העגלת והאנשים שעלייה לאחר זריקת ה כדור?

- מה תהיה מהירות העגלת לאחר שהחבר יתפос את ה כדור?

- כמה זמן ה כדור ישחה באוויר?

- מהו המרחק אותו עברה העגלת במהלך זמן זה?

- תאר מה יקרה אם החבר ימסור חורה את ה כדור לחברו.

14) אדם הולך על עגלת (מכיל תנועה יחסית)

אדם בעל מסה M עומד על עגלת בעלת מסה m.

האדם מתחילה ללכט ב מהירות v ביחס לעגלת.


מצא את מהירות האדם והעגלת ביחס לקרקע אם אין חיכוך בין העגלת לרצפה.

15) אדם על רמפה (מכיל תנועה יחסית)*

אדם שמסתו m רץ במעלה רמפה משופעת בזווית θ .

מסת הרמפה היא M, והוא מונחת על מישור חלק.

האדם מתחילה מנוחה והזמן הדרוש לו ב כדי לעבור דרך שאורכה L על פני הרמפה הוא T.



- מהי תאוצת האדם ביחס לرمפה?

- עקב הריצה נ הדפת הרמפה ימינה, בתאוצה לא ידועה A יחסית לקרקע.

בטאו את רכיבי התאוצה של האדם יחסית לקרקע בעזרת התאוצה A.

- כמה זהה הרמפה ימינה בזמן T?

16) כדור עולה על מדרון משולש

מדרון משולש בעל גובה $h = 3m$ חופשי לנوع


על משטח אופקי חלק (ללא חיכוך).

מסת המדרון היא: $M = 15kg$.

מגללים כדור בעל מסה $m = 5kg$

על המשטח לכיוון המדרון.

התיחס לכדור כל גוף נקודתי.



- מה צריכה להיות מהירותם שבה מגללים את ה כדור כך שהוא יעזור (ביחס למדרון) לבדוק לפני שהוא עבר את שיא הגובה של המדרון?

- מהי מהירות המדרון ברגע שהכדור מגיעה לשיא הגובה?

- מהי מהירות הסופית של המדרון וה כדור?


17) מסה מחליקה בין שני טרייזים

גוף בעל מסה m מחליק על שני טרייזים זהים בעלי מסה M כל אחד.



המעבר מהטרייז למשטח האופקי הוא חלק, המשטחים חסרי חיכוך וחופשיים לנעו על השולחן (ראו סרטווט).

לאיזה גובה מקסימלי יטפס הגוף על הטרייז השני אם גובהו ההתחלתי הוא h ?

**18) כדור גולף על כדורסל**

כדור גולף וכדור כדורסל מוחזקים במנוחה אחד מעל השני בגובה $m = H = 1.5m$.

משחררים אותם ליפול ממנוחה. מה יהיה הגובה המרבי אליו הגיעו כדור הגולף אם נניח שככל ההתגשויות אלסטיות ומצחירות. מסת כדור הגולף היא: $m = 46\text{gr}$ ומסת הכדורסל היא: $M = 624\text{gr}$.

19) התנגשות אלסטית זהה בכל המערכת


במערכת אינרציאלית מסוימת האנרגיה הקינטית של שני גופים ${}_1m$ ו- ${}_2m$ היא E_k .

מצאו את האנרגיה הקינטית של הגוף במערכת אינרציאלית אחרת הנעה ב מהירות v_0 ביחס למערכת המקורית.

השתמשו בתוצאה שקיבלו והראו כי אם במערכת מסוימת התנגשות היא אלסטית אז היא חייבת להיות אלסטית גם בכל מערכות הייחוס האינרציאליות האחרות.


20) דיסקה מתנגשת בשתי דיסקות זהות

על מישור חלק נמצאות 3 דיסקות זהות בעלות מסה M ורדיוס R כל אחת.



הדיסקה השמאלית באוויר נעה ב מהירות v_0 ומתנגשת בתנגשות אלסטית בו זמנית עם שתי הדיסקות האחרות כפי שמתואר באירור. המרחק בין הדיסקות שנמצאות במנוחה לפני ההתנגשות מתואר על ידי $2Rk$ כאשר $2 \leq k \leq 1$.

- מיהי גודלה של מהירות הדיסקה הפוגעת לאחר ההתנגשות כתלות בזווית α שבאיור?
- עבור אילו ערכים של k הדיסקה תחזור אחורה/תיעצר במקום/תמשיך קדימה?

**(21) סיירה יורה פגז על מטרה בקצתה השני**


סיירה באורך l נמצאת על מים שקטים, בקצתה השמאלי של הסיירה נמצא תותח צעצוע ובקצתה הימני נמצא מטרה. התותח יורה פגז צעצוע בזווית θ ובמהירות v ביחס לקרקע.

מסת הפגז היא m ומסת הסיירה היא M .


מצא את המהירות v הדורשה בשבייל לפגוע במטרה (הזנח את גובה התותח וגובהה המטרה והנח כי התותח מחובר לסיירה).

(22) שרשרת מחליקה משולחן

שרשרת בעלת אורך l ומסה m מחליקה ממנוחה משולחן כאשר חצייה עדין מונח על השולחן.



- מה תהיה מהירותה השרשרת ברגע הניתוק מהשולחן, בהנחה שאין חיכוך?
- ענה על סעיף א' בהנחה שמקדם חיכוך μ קיים בין השרשרת לשולחן.

(23) שתי מסות ושני קופיצים

מסות מתחילה ממנוחה כבשרטוט. המסה הימנית נמתחת מרחק D ימינה ומשוחררת. כשהיא פוגעת במסה השנייה היא נדבקת אליה ושתיהן ממשיכות יחד.


- מהו הכיווץ המקסימלי של הקפיז השמאלי?
- מהו הכיווץ המקסימלי של הקפיז הימני כאשר שתי המסות חוזרות ימינה?

(24) טנק יורה פגזים ועולה במדרון**

טנק שמסתו 800 ק"ג (טנק קל מאוד) נמצא ברגע מסויים במנוחה על מדרון משופע בזווית של 15° מעלות. הטנק יורה שני פגזים במרוחת של 2 שניות בין הירי הראשון לשני.

מסת כל פגז היא 20 ק"ג והוא נורה במהירות קבועה של 400 מטר לשנייה במקביל ובמוריד למדרון. הניחו שלטנק גלגלים וחיכוך ביןו למדרון זניח.

מה העתק המקסימלי שיעשה הטנק במעלה המדרון?



תשובות סופיות:

0.18m **(1)**

0.028m **(2)**

$u = 155 \frac{m}{sec}$ **(3)**

ב. לא אלסטית, $J = 8.27$

$u_1 = 8.66 \frac{m}{sec}, u_2 = 3.34 \frac{m}{sec}$. **(4)**

$v_{min} = \left[(m + 0.05M)v_f + 0.95M \cdot 2\sqrt{gL} \right] \cdot \frac{1}{m}$ **(5)**

ב. 0 א. $0.75 \frac{m}{sec}$ כלפי מעלה. **(6)**

, $a_1 = \frac{F}{m_1} - \frac{m_2}{m_1} \mu_k g, a_2 = \mu_k g$: ב. תאוצה: $F \leq \mu_s g(m_1 + m_2)$. **(7)**

מהירות: $x_1(t) = \frac{1}{2}a_1 t^2, x_2(t) = \frac{1}{2}a_2 t^2$: מיקום, $v_1(t) = a_1 t, v_2(t) = a_2 t$:

$u_f = \frac{F \cdot T}{m_1 + m_2}$.**7** $E = F \cdot \frac{1}{2}a_1 T^2 - \left(\frac{1}{2}m_2 v_2^2(T) + \frac{1}{2}m_1 v_1^2(T) \right)$.**8**

$\tilde{u} = \frac{v \left(m + \frac{M}{2} \right)}{M + m}$.**7** $t = \frac{2l}{v}$.**8**

. מ. $M \cdot v \cdot \left(m + \frac{M}{2} \right) = (m + M) \cdot M \cdot \frac{v}{2} + (m + M) \cdot mg\mu \cdot \tilde{t}, a = \frac{mg\mu}{M}$.**9**

ב. $\tilde{u} = \frac{v(M-m)}{M+m}$.**7** חיובי. $\tilde{u} = \frac{v(M-m)}{M+m}$.**8** **(9)**

$u_1 = -v_0, u_2 = 0$: $\alpha = \infty$, $u_1 = 0, u_2 = v_0$: $\alpha = 1$, $u_1 = v_0, u_2 = 2v_0$: $\alpha = 0$. **(10)**

$t = \frac{L}{u_2 - u_1}$.**7**

$J_{ceiling} = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} \sqrt{2gH}$.**7** $\Delta P_{Total} = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} \sqrt{2gH}$.**7** $v_2 = \sqrt{2gH}$.**8** **(11)**

$J_{Totalceiling} = 0 + \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} \sqrt{2gH} + \frac{m_1(m_1 + m_2)}{m_1 - m_2} \sqrt{32gH}$.**7** $h = \frac{m_2}{m_1 - m_2} \sqrt{\frac{H}{2g}}$.**7**

$t = \frac{L}{v}$ **(12)**

$L = t \cdot (v - u)$.**7** $mv + Mu = (m + M) \cdot 0$.**7** $0 = mv + Mu$.**8** **(13)**

ה. ראה סרטון. $x = u \cdot t$.**7**

$u_2 = \frac{mv_R}{m+M}, u_1 = \frac{-Mv_R}{m+M}$ **(14)**

$$x_{ramp}(T) = \frac{m}{m+M} L \cos \theta \quad \text{ג.} \quad a_{P_x} = \frac{2L}{T^2} \cos \theta - A \quad \text{ב.} \quad a'_{P_x} = \frac{2L}{T^2} \quad \text{ג. (15)}$$

$$u_1' = 2\sqrt{5} \frac{m}{sec}, u_2' = -2\sqrt{5} \frac{m}{sec} \quad \text{ג.} \quad u = \sqrt{5} \frac{m}{sec} \quad \text{ב.} \quad v_0 = 8.94 \frac{m}{sec} \quad \text{ג. (16)}$$

$$h'_{max} = \frac{M^2 h}{(M+m)^2} \quad \text{(17)}$$

$$h \approx 12.3m \quad \text{(18)}$$

$$E_k' = E_R - (m_1 v_1 + m_2 v_2) v_0 + \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_0^2 \quad \text{(19)}$$

$$u_1 = v \frac{1 - 2 \cos^2 \alpha}{1 + 2 \cos^2 \alpha} \quad \text{ג. (20)}$$

ב. קדימה : $1 \leq k < \sqrt{2}$, $k = \sqrt{2}$: ב مكانם , $\sqrt{2} < k \leq 2$: לאחריה

$$v = \sqrt{\frac{gL}{\left(1 + \frac{m}{M} \sin 2\theta\right)}} \quad \text{(21)}$$

$$v = gl \left(\frac{3 - \mu}{4} \right) \quad \text{ב.} \quad v = \sqrt{\frac{3}{4} gl} \quad \text{ג. (22)}$$

(23) ראה סרטון.

$$x(t=5.82) \approx 60m \quad \text{(24)}$$

פיזיקה 1 מכניתה

פרק 13 - בעיות שני הגוף (מסות מצומדות) חלק א

תוכן העניינים

1. הסבר ותרגילים.....
176


הסבר ותרגילים:

שאלות:

1) שני גופים עם כוח חשמלי דוחה

שני גופים בעלי מסות m ו- $2m$ מאולצים להיות רק על ציר ה- x .

לכל אחד מהגוף יש מטען חשמלי q .
כתוצאה מהטען החשמלי פועל בין הגוף
כוח חשמלי משמר (במקרה זה כוח דחיה).



$$\text{האנרגייה הפוטנציאלית של הכוח היא: } U(x_1, x_2) = \frac{q^2}{|x_2 - x_1|}$$

ברגע $t=0$ המתוואר בשרטוט, הגוף השמאלי נמצא ב- $-d=x$ והגוף הימני
בראשית הציר.

ברגע זה הגוף השמאלי מתחילה לנוע במהירות v לעבר הגוף הימני הנמצא במנוחה.
א. מהו מיקום מרכזו המסה של שני הגוףים ב- $t=0$?

$$\text{ב. מה מיקום מרכזו המסה ברגע } t_1 = \frac{d}{2v} ?$$

ג. מצא את המרחק המינימלי בין הגוףים.

ד. מהי מהירותו של הגוף השמאלי ביחס למעבده ברגע בו המרחק מינימלי?

2) שני גופים זהים מתנגשים

שני גופים בעלי מסה זהה $600\text{ gr} = m$ מתנגשים חזיתית.

האנרגייה הקינטית של שני הגוףים ביחד לפני ההתנגשות שווה ל-30 גיאול.

$$\text{גודל המהירות היחסית לפני ואחרי ההתנגשות הוא } \frac{m}{4\text{ sec}}$$

א. האם לאחר ההתנגשות הגוף מתקרבים זה לזה, מתרחקים זה מזה,
נמצאים שניהם במנוחה או שלא ניתן לקבוע מהנתונים?

ב. מהי האnergיה הקינטית לאחר ההתנגשות?

ג. מהו התנוע הכללי של המערכת לפני ואחרי ההתנגשות?

ד. נניח כי המהירות היחסית לאחר ההתנגשות הייתה אפס ושאר הנתונים
נותרים ללא שינוי. בכמה היה משתנה התנוע הכללי של המערכת לאחר
התנגשות ביחס לחישוב בסעיף ג'?

ה. מהי האnergיה הקינטית לאחר ההתנגשות בתנאי של סעיף ד'?

ו. האם ההתנגשות בתנאי של סעיף ד' היא: אלסטית, פלסטית, לא אלסטית
ולא פלסטית או שלא ניתן לקבוע מהנתונים?

תשובות סופיות:

$$x_{\text{rel min}} = \frac{q^2}{\frac{1}{3}mv^2 + \frac{q^2}{d}} \quad \text{ג.} \quad x_{\text{c.m.}} = -\frac{d}{3} \quad \text{ב.} \quad x_{\text{c.m.}} = -\frac{2}{3}d \quad \text{א.} \quad \mathbf{(1)}$$

$$v = v_{\text{c.m.}} = \frac{2}{3}v \quad \text{ד.}$$

- 2) א. מתרחקים זה מהה. ב. 30 ג. 27.6 ה. לא משתנה.
- ג. $8.14kg \cdot \frac{m}{s}$. ה. פלסטית.

פיזיקה 1 מכניתה


פרק 14 - מרכז מסה -

תוכן העניינים

1. הסבר בסיסי על מרכז מסה.....	178
2. דוגמה מרכז מסה של דיסקה עם חור	179
3. תנועה לפי הכוחות החיצוניים	(לא ספר)
4. שני תרגילים.....	180
5. חישוב מרכז מסה של גופים גדולים בעזרת אינטגרל	(לא ספר)
6. דוגמאות לחישוב מרכז מסה בעזרת אינטגרלים	181
7. מערכת מרכז המסה.....	183
8. תרגילים מסכמים.....	186


הסבר בסיסי על מרכז מסה:

שאלות:



1) דוגמה - מרכז מסה של שני מוטות בזווית
המערכת המתוארת באוויר מורכבת משני מוטות בעלי צפיפות אחידה.

מוט ראשון באורך 3c.m נמצא לאורך ציר ה-*x* ומסתו 2kg, מוט שני נמצא בזווית 60° עם ציר ה-*x* החיוובי אורכו 5c.m ומסתו 3kg.
מצאו את מרכז המסה של המערכת (bihcs בראשית).



2) דוגמה - מרכז מסה של האות נ
המערכת המתוארת באוויר מורכבת ממוט בעל צפיפות מסה אחידה המכופף בצורת האות "נ" בתמונה מראה.
מצאו את מיקום מרכז המסה של המערכת ביחס לפינה השמאלית התחתונה.

3) דוגמה - מרכז מסה של F
רכיבים את האות F מלוחות בעלי צפיפות מסה אחידה ליחידת שטח.
המידדים של כל הלוחות נתונים באוויר.
א. מצאו את מרכז המסה של המערכת ביחס לפינה השמאלית התחתונה של האות.
ב. מהו מרכז המסה של המערכת ביחס לפינה הימנית התחתונה של האות?

תשובות סופיות:

$$x_{\text{c.m}} = 1.35 \text{ c.m} , y_{\text{c.m}} = 1.3 \text{ c.m} \quad (1)$$


$$x_{\text{c.m}} = 1.2 \text{ c.m} , y_{\text{c.m}} = 1.875 \text{ c.m} \quad (2)$$

$$\text{ב. } x_{\text{c.m}} = 14 \text{ mm} , y_{\text{c.m}} = 62 \text{ mm} \quad \text{ג. } x_{\text{c.m}} = 31 \text{ mm} , y_{\text{c.m}} = 62 \text{ mm} \quad (3)$$

דוגמיה מרכז מסה של דיסקה עם חור:

שאלות:

- 1) דוגמיה מרכז מסה של דיסקה עם חור
 בדיסקה בעל רדיוס R ומסה M קדחו חור עגול בעל רדיוס a במרחק r ממרכז הדיסקה. הנח כי צפיפות המסה אחידה בכל הדיסקה.
 מצא את מרכז המסה של הדיסקה עם החור.




תשובות סופיות:

$$x_{c.m.} = \frac{-a(\rho\pi r^2)}{M - (\rho\pi r^2)} \quad (1)$$


שני תרגילים:

שאלות:



1) נער על סירה

אדם עומד בקצת סירה באורך 3 מטר. מסת האדם היא 70 קילוגרים ומסת הסירה 100 קילוגרים. האדם התקדם 2 מטרים לאורך הסירה. כמה זהה הסירה? (הזניח את החיכוך בין המים לסירה).
נתון : $m_1 = 70\text{kg}$, $m_2 = 100\text{kg}$



2) כדור על קרונית

כדור מונח על קרונית משופעת הנמצאת במנוחה. הכדור מונח בגובה $H = 1\text{m}$ ובמרחק של 5m מטר מקצה הקרונית.
מסת הקרונית : $m_1 = 10\text{kg}$, מסת הכדור : $m_2 = 2\text{kg}$
א. מצא את העתק הקרונית כאשר הכדור מגיע לקצתה.
ב. מצא את מהירות הגוף אם נתון שמהירות הכדור בקצת הקרונית היא רק בכיוון ציר ה- x .

תשובות סופיות:

$$x = \frac{14}{17} \text{m} \quad (1)$$


$$u_2 \approx 4.08 \frac{\text{m}}{\text{sec}} , u_1 \approx -0.82 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \quad \text{ב.} \quad \Delta x_1 = -\frac{10}{12} \text{m} \quad \text{א.} \quad (2)$$

דוגמאות לחישוב מרכז מסה בעזרת אינטגרלים:

שאלות:

1) מרכז מסה של מוט עם צפיפות לא משתנה

חשב את מרכז המסה של מוט בעל אורך L וצפיפות מסה $\lambda(x) = \lambda_0 \frac{x}{L}$.



2) מרכז מסה של משולש


מצא את מרכז המסה של המשולש שבתמונה.



3) מרכז מסה של שער


שער חשמלי בעל מסה m ואורך l מונח על ציר שמרחקו d מסומו.

הסביר מדוע מחוברים לקצה השער משקלות כבדה
ומצא את מסטה אם נתון כי אורכה L .



4) מרכז מסה של גזרה וחצי דיסקה


חשב את מרכז המסה של גזרה עם צפיפות אחידה וזווית θ .



5) חישוב שטח גזרה


נתון מעגל שרדיוסו R .

חשב שטח של גזרה עם זווית θ .



6) מרכז מסה של חצי כדור מלא

חשב את מרכז המסה של חצי כדור מלא בעל צפיפות אחידה.




7) מרכז מסה של חרוט מלא

חשב את מרכז המסה של חרוט מלא בעל צפיפות אחידה.

8) דיסקה עם חור

חשב את מרכז המסה של חרוט מלא בעל צפיפות אחידה.

9) חצי חישוק ושתי מסותמצאו את מרכזו המסה של חצי חישוק בעל מסה M ורדיוס R אשר בקצתו חוברו שניכדורים קטנים בעלי מסה m .**תשובות סופיות:**

$$x_{c.m.} = \frac{2}{3}L \quad (1)$$

$$\mathbf{r}_{c.m.} = \left(\frac{1}{3}b, \frac{1}{3}a \right) \quad (2)$$

$$\frac{\left(\frac{L}{2}-d\right)m + \left(d+\frac{1}{2}R\right)M}{m+M} = 0 \quad (3)$$

$$x_{c.m.} = \frac{4R \sin \frac{\theta_0}{2}}{3\theta_0} \quad (4)$$

$$S = \frac{\theta R^2}{2} \quad (5)$$

$$z_{c.m.} = \frac{3R}{8} \quad (6)$$


$$z_{c.m.} = \frac{H}{4} \quad (7)$$

$$z_{c.m.} = -\frac{1}{30}R \quad (8)$$

$$y_{c.m.} = \frac{2RM}{\pi(M+2m)} \quad (9)$$

מערכת מרכז המסה:

שאלות:



1) שני גופים מחוברים בקפיץ ונעים

שני גופים עם מסות $m_1 = m$, $m_2 = 2m$, קשורים בקפיץ בעל קבוע k ומונחים על משטח חסר חיכוך.

ברגע מסוים מעניקים לגוף m_1 מהירות v_0 כך שהוא מתרחק מהמסה m_2 .

א. מה מהירות מרכז המסה $v_{c.m.}$?

ב. מה מהירותו של הגוף השני במערכת מרכז המסה מיד עם תחילת התנועה?

ג. מה האנרגיה הקינטית הכוללת מיד עם תחילת התנועה במערכת המعبدת ובמערכת מרכז המסה?

ד. מהי ההתאגדות המקסימלית של הקפיז? מה מהירותו של הגוף השני במצב זה (גם במערכת מרכז המסה וגם במערכת המعبدת)?

ה. מה מהירותו של הגוף השני (בשתי מערכות הייחוס) בפעם הראשונה בה הקפיז חוזר לאורכו המקורי?

2) התנגשות לא חזיתית


שתי דיסקות ברדיוס זהה R נמצאות על משטח ללא חיכוך.

הדיסקה $m_1 = m$ נמצאת במנוחה

והדיסקה $m_2 = 3m$ נעה במהירות v כלפימה.

המרחק בין מרכז דיסקה 1, למסלול של מרכז דיסקה 2 הוא $\sqrt{2}R$ כמתואר באיור.

אין חיכוך בין שפונות הדיסקות במהלך ההתנגשות וההתנגשות האלסטיתית.




א. תארו את תנועתן במערכת מרכז המסה לפני ההתנגשות.

ב. באיזו נקודת על פני כל דיסקה תהיה ההתנגשות ביןיה? מה כיוון הכוח ביניהן בעת ההתנגשות?

ג. מה היו וקטורי המהירות אחרים בהתנגשות במערכת מרכז המסה?

ד. מה יהיו המהירות, גודלו וכיוונו אחרים בהתנגשות במערכת המعبدת?

ה. מה המתפרק שהפעיל כدور 2 על כדור 1? חשבו בשתי המערכות.

**(3) גוף מתנגש בדפנות עגלה**

גוף שמסתו m מונח בתוך עגלה שמסתה M .
 העגלה נמצאת במנוחה על משטח אופקי ואין
 חיכוך ביןיה לבין המשטח.
 מקנים לגוף מהירות תחילה v_0 והוא נע
 הלא ושוב בין דפנות העגלה ללא חיכוך.
 ההתנשות של הגוף עם הדפנות היא התנשות אי-אלסטית.
 מה תהיה מהירות הגוף ביחס לקרקע לאחר זמן רב?

(4) זווית פיזור אפשרית באיבוד אנרגיה**

- חלקיק בעל מסה M נע במהירות קבועה לאורך ציר $h-x$.
 כאשר האנרגיה הקינטית שלו היא K .
 החלקיק פוגע בחלקיק אחר, בעל מסה זהה הנמצא במנוחה.
 האנרגיה של כל המערכת לאחר ההתנשות היא K' כאשר α
 קבוע חיובי נתון, הקטן מ-1.
- א. מהי מהירות מרכז המסה לפני ואחרי ההתנשות?
 ב. האם ניתן לדעת את כיוון המהירות של החלקיק הפוגע, במערכת מרכז
 המסה, לפני ואחרי ההתנשות?
 ג. אם $\alpha = 0.6$, מה תחום זווית הפיזור האפשריות?
 מומלץ לצפות בסרטון ההוראה שהזווית בין שני גופים בעלי מסות זהות
 המתנשימים התנשות אלסטית היא 90 מעלות.

תשובות סופיות:

$$v_{l_{c.m.}} = \frac{2v_0}{3}, v_{2_{c.m.}} = -\frac{v_0}{3} \text{ ב. } v_{c.m.} = \frac{v_0}{3} \text{ א. (1)}$$

ג. מעבדה: $E_k = \frac{1}{2}mv_0^2$, מרכז המסה: $E_k = \frac{1}{2}mv_0^2$

ד. מעבדה: $0, \Delta u_{c.m.} = 0$, מרכז המסה: $\frac{v_0}{3}$, $\Delta x_{\max} = \sqrt{\frac{2mv_0^2}{3k}}$

ה. מעבדה: $u_{2_{c.m.}} = \frac{v_0}{3}, u_{1_{c.m.}} = -\frac{2v_0}{3}$, מרכז המסה: $u_2 = \frac{2v_0}{3}, u_1 = -\frac{1}{3}v_0$

ו. $|\vec{v}_{l_{c.m.}}| = \frac{3}{4}v$, ג. בכיוון ציר y השמאלי - ב. $\alpha = 45^\circ$, $v_{l_{c.m.}} = -\frac{3}{4}v, v_{2_{c.m.}} = \frac{1}{4}v$ א. (2)

בכיוון ציר y החיובי - ד. $u_1 = \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot 3v, \alpha_1 = -45^\circ$, $|u_{2_{c.m.}}| = \frac{1}{4}v$

ה. במעבדה: $\vec{J}_{2 \rightarrow 1} = \Delta \vec{P}_1 = mv \cdot \frac{3}{4}(1, -1)$, $u_2 = \frac{\sqrt{10}}{4}v, \alpha_2 = 18.4^\circ$

במרכז המסה: $\vec{J} = \int N dt = m \frac{3}{4}v(1, -1)$

$$u = \frac{mv_0}{m+M} \quad (3)$$

ג. לא ניתן. ב. לפני: באותו כיוון, אחרי: לא ניתן. נ. $-48.2^\circ \leq \theta \leq 48.2^\circ$, א. $v_{c.m.} = \frac{v}{2}$ (4)

תרגילים מסכימים:


שאלות:

1) שני גופים מחוברים בקפיץ נלחצים לקיר

שני גופים מחוברים בקפיץ בעל קבוע k ומצאים על משטח אופקי חסר חיכוך. מסת הגוף הימני היא m_1 , מסת הגוף השמאלי היא m_2 והוא צמוד לקיר. האורך הרפוי של הקפיץ הוא l_0 .

ולוחצים את הגוף הימני עד שהקפיץ מתכווץ לאורך $\frac{l_0}{3}$ ומשחררים ממנוחה.

- א. متى תתנתק המסה השמאלית מהקיר?
- ב. מהו מיקום מרכז המסה כתלות בזמן?



2) מנוע מושך מסה בסירה

על סירה (ללא חיכוך עם המים) מונחת מסה. המסה מחוברת בחוט למנוע המחבר לסירה.

כוח המשיכה של המנוע משתנה בזמן, מוקדם החיכוך הסטטי ומוקדם החיכוך הקינטי נתוניים.

א. متى תתחליל לנוע המסה?

ב. מה תהיה תאוצת מרכז המסה? תאוצת הסירה? תאוצת המסה?

ג. לאחר שהמסה נעה החוט ניתק. ענהשוב על סעיף ב'.


ד. האם המסה והסירה ייעצרו בו זמינות?

3) חרוץ מסתובב על חישוק שחוופשי לנוע

חישוק בעל רדיוס R ומסה m מונח על שולחן אופקי חלק.

על החישוק ישנו חרוץ המתחילה לנוע מהנקודה A ומסתו m גם כן.


ב- $t=0$ החישוק נמצא במנוחה ומהירותו ההתחלתית של החרוץ היא v_0 ימינה.



א. מצא את מיקום מרכז המסה של המערכת בתחילת התנועה.

ב. מצא את מהירות מרכז המסה כפונקציה של הזמן ונת מסלולה.

ג. מהן מהירותו של החרוץ והזמן כאשר החרוץ נמצא בנקודות D, C, B ושוב ב-A ביחס לחישוק?

**4) שני גופים על מדרון שנו**

שני גופים בעלי מסות m ו- $3m$ נמצאים על מדרון דו-צדדי בעל זווית נתונה α משני צדדיו. שני הגוף קשורים זה לזה בחוט אידיאלי דרך גלגלת אידיאלית המחברת למדרון. למדרון מסה 12m והוא יכול לנוע על הרצפה. אין חיכוך בין הגוף למדרון ובין המדרון לרצפה. משחררים את המערכת ממנוחה.

- חשב את העתק המדרון, לאחר שהגוף הכבד עבר מרחק L במורוד המדרון.
- מהי העבודה שביצע משקל הגוף הכבד ומשקל הגוף הקל במהלך התנועה?
- חשב את מהירות המדרון ביחס לרצפה ברגע זה.

5) מסה מתנוגשת במסה עם קפיז

גוף שמסתו $2m$ נע במהירות v על משטח חסר חיכוך לעבר גופו נוסף שמסתו m הנמצא במנוחה. בצדו השמאלי של הגוף במנוחה ישנו קפיז רופיע בעל קבוע k . הבעה חד מימדית.



- מהי מהירות מרכז המסה של הגוף?
- מהי ההתקומות המקסימאלית של הקפיז?

תשובות סופיות:

$$\text{1) א. כאשר הקפיץ מגיע לנקודת רפינו או ב-} t = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{m_1}{k}}$$

$$x_{\text{c.m.}}(d) = \frac{m_1 l_0}{m_1 + m_2} \left(1 + \frac{2}{3} \sqrt{m_1 k t} \right) \text{ ב.}$$

$$a = \mu \cdot g \frac{m}{M}, \quad -a = \mu \cdot g \quad \text{ג.} \quad a = \frac{t}{m}, \quad -a = \frac{t}{M} \quad \text{ב.} \quad \mu \cdot mg = t \quad \text{א.} \quad \text{ד. כן.}$$

$$\vec{v}_{\text{c.m.}}(t) = \frac{1}{2} v_0 \hat{x} \quad \text{ב.} \quad y_{\text{c.m.}}(t=0) = \frac{R}{2} \quad \text{א.} \quad \text{3}$$

$$\text{ג. בנקודת B: } u_{1_x} = \frac{1}{2} v_0 = u_{2_x}, \quad u_{1_y} = \frac{-v_0}{2} = -u_{2_y}$$

$$\text{בנקודת C: } u_{1_y} = 0 = u_{2_y}, \quad u_{2_x} = v_0, \quad u_{1_x} = 0$$

$$\text{בנקודת D: } u_{1_x} = u_{2_x} = \frac{1}{2} v_0, \quad u_{1_y} = \frac{v_0}{2} = -u_{2_y}$$

$$W = mg(-L \sin \alpha) \quad \text{ב. הכוח:} \quad W = 3mgL \sin \alpha \quad x_2 = -\frac{L \cos \alpha}{4} \quad \text{א.} \quad \text{4}$$

$$v_{2_x} = \sqrt{\frac{gL \sin \alpha}{4(4 \tan^2 \alpha + 3)}} \quad \text{ג.}$$

$$\Delta x_{\text{max}} = \sqrt{\frac{10m}{3k}} \cdot v \quad \text{ב.} \quad v_{\text{c.m.}} = \frac{2}{3} v \quad \text{א.} \quad \text{5}$$

פיזיקה 1 מכניתה

פרק 15 - מסה משתנה -

תוכן העניינים

1. הקדמה ופיתוח הנוסחה	(לא ספר)
189	
2. שימוש בנוסחה	
3. סיכום מסה משתנה	(לא ספר)
190	
4. תרגילים נוספים	

שימוש בנוסחה:

שאלות:

1) חיכוך במסה משתנה

עגלה בעלת מסה ההתחלתית M_0 נעה על משטח עם חיכוך.


לעגלה מחובר בקצת האחורי צינור המשפרץ מים בקצב α ומהירות u_0 .

הצינור נמצא בזווית θ ביחס לציר ה- x .

נתון: M_0 , θ , α , u_0 .

א. כתוב את משוואת התנועה.

ב. מצא את מהירות כפונקציה של הזמן.



תשובות סופיות:

$$-\mu_k(M(t)g - u_0 \sin \theta \alpha) = M(t) \frac{dv_x}{dt} - \alpha u_0 \cos \theta \quad \text{א.}$$

$$v(t) = -\mu_k g t + \left(\frac{C}{\alpha} \ln \frac{M_0 - \alpha t}{M_0} \right) + v_0 \quad \text{ב.}$$

תרגילים נוספים:

שאלות:

1) עגלת עם מטף קצר

מתקינים על עגלת מטף קצר.

המטף פולט קצר אחורנית (ואופקית) מהעגלת

$$\text{במהירות } u \text{ ביחס לעגלת ובקצב } \frac{dm}{dt} = a - bt$$



פליטת הקצר גורמת לעגלת לנוע בקו ישר.

מסת העגלת (כולל המטף) בתחילת התנועה

היא M_0 ואינו חיכוך בין העגלת לקרקע.

א. מהו הייחודה של a ו- b ? הנח שכל הגודלים האחרים ב- s.m.k.s.

ב. מצאו את תאוצת העגלת כתלות בזמן כל עוד $t > 0$.

ג. מהי מהירות העגלת כתלות בזמן?

2) חללית מתנקת מיכליים

חללית יכולה לנתק את מכלי הדלק הריקים שלה.

מכל שהתרוקן מתנקת ונופל לים וכל משקלו של המיכל הריק אינו מעmis עוד על החללית.



נתונה חללית בעלת מסה התחלתית- M_0 , קצב פליטת גזים- α ו מהירות הגז ביחס לחללית- u .

כאשר החללית מאבדת ממשקלה מסה m (מסת הדלק שהיא במיכל) היא מתנקת את המיכל שמסתו k וממשיכה במעופה הרגיל. כאשר החללית מאבדת ממשקלה m נוספת, נגמר הדלק במכליה והיא מכבה מנועים וממשיכה ב מהירות הסופית.

הנח שהחללית מתחילה מנוחה ושהיא משוגרת מתוך חלל, כלומר אין השפעת כבידה על החללית.

א. מהי מהירות החללית רגע לפני ניתוק המיכל הראשון?


ב. מהי מהירות החללית לאחר ניתוק המיכל?

ג. מהי מהירותה הסופית של החללית?

(הנח שהיא שומרת על מהירותה לאחר כיבוי המנועים).

ד. בכמה שיפרה החללית את מהירותה הסופית על ידי ניתוק המיכליים?

3) משפט חול על מסוע



משפך חול מפיל חול על מסוע בקצב

כasher A קבוע. אין חיכוך בין המסוע לרצפה.

- א. מה הכוח F הדורש על מנת למשוך את המסוע
במהירות קבועה (ונתונה) ?
ב. מהו החשוף (אנרגגיה יחידת זטן) שמשקיע הכב

4) בלונו

בלון בעל מסה M מלא בגז. נתון כי $\frac{3}{4}$ ממשת הבלון היא מסת הגז.


משחררים את הבלון ממנוחה והגז יוצא במהירות v_0 ביחס לבלון.

נתון כי הבלון מאייך בקו ישר כלפי מעלה בתאוצה של $0.5g$.

א. מצא את קצב פליית הגז מהבלון.

ב. מצא את הגובה המקסימלי אליו יגיע הבלון.

5) משפט על משקל



משפק חול נמצא מעל משקל, החול יותר ממהמשפּך
במהירות V_0 . שטח החתך של פתח המשפך הוא A
ונתנו כי המשפך נמצא בגובה H מעל המשקל.

נתונה צפיפות המסה של החול ρ .

הזנח את גובה החול המצטבר על המשקל.

-  משקל

 - א. מהי כמות החול היוצאת מהמשפך ביחידת זמן?
 - ב. מה מהירות החול בהגיעו לפני פגיעתו במשקל?
 - ג. במליך המילוי כאשר המשקל מראה W מה היחס בין המשקל האמתי של החול לערך שמראה המשקל?
 - ד. נניח כי כאשר המשקל מראה את המשקל מסעיף ג' סוגרים את המשפך. מה יראה המשקל לאחר זמן רב?
 - ה. לאחר האמור בסעיף ד' מאייצים את המשקל בתאוצה של 5 מטר לשנייה בריבוע כלפי מעלה. מה יראה המשקל?


6) טיפת גשם

טיפת גשם נופלת דרך ענן וסופחת מים יחסית לשטח הפנים שלה.

קצב שינוי המסה של הטיפה נתון לפי $\frac{dm}{dt} = 4\pi r^2 b$, כאשר b קבוע ו- r הוא רדיוס הטיפה. נתונה גם צפיפות המים ρ . הזנה את התנודות האוויר. הנח כי הטיפה מתחילה ליפול ממנוחה ורדיוסה ההתחלתי הוא r_0 .

- מצא את רדיוס הטיפה כפונקציה של הזמן.
- חשב את מהירות הטיפה כפונקציה של הזמן.
- מצא את התאוצה של הטיפה זמן קצר לאחר תחילת תנועתה.
- מצא את תאוצת הטיפה לאחר זמן רב.

$$\text{פתרון}: v(r) = (Cr)^A + \frac{B}{1-A} \quad \text{הו} \quad \frac{dv}{dr} = A \frac{v}{r} + B$$

**7) עגלה עם גשם, משאבה וחיכוך**

עגלה בעלת מסה M_0 נועשת על משטח עם חיכוך.


על העגלה יורדת גשם בקצב a ובמהירות v_0 בציר האנכי בלבד. בנוסף, לעגלה מחוברת משאבה בקצב האחורי, המוציאיה מים מן העגלה החוצה ב מהירות v_0 ובקצב זהה a . המשאבה מוציאיה את המים בזווית θ מתחת לציר ה- x (ראה ציור). לעגלה מהירות התחלתית V_0 . מקדם החיכוך הקינטי μ וכל הגדים הרשומים בשאלת נתונים.

- מצא את משוואת התנועה של העגלה.
- מצא את המהירות הסופית של העגלה.
- מצא את מהירות העגלה כפונקציה של הזמן.

8) חול נשוף מקרונית

קרונית עמוסה בחול נעה על פסים ללא חיכוך ב מהירות v .


ברגע מסוים נפתח חלון בתחום הקרונית וחול מתחילה להישפך בקצב קבוע α . מהי מהירות הקרונית כתלות בזמן?

**9) דלי מוחזק באוויר**


דלי בעל מסה M מוחזק הפוך באוויר באמצעות זרם מים.

המים יוצאים מצינור באדמה ב מהירות v_0 כלפי מעלה ובקצב α . מהו הגובה בו הדלי נמצא באוויר?


הנח שהמים לא ניתזים חזרה לאחר הפגיעה בDALI.

10) חבל מחליק משולחן


חבל באורך L ומסה M מונח על שולחן חסר חיכוך כך שהקצתו של החבל באורך d נשמט מחוץ לשולחן. החבל מוחזק ומשוחרר ממנוחה. מה תהיה מהירות החבל כאשר כל אורך החבל ייפול מהשולחן. פטור משיקולי תנוע בלבד! הנח שהחבל אינו פוגע ברצפה.

11) מרימים חבל ממנוחה

חבל אחד, בעל מסה M ואורך L מונח על שולחן. מרימים קצה אחד של החבל במתירות קבועה v .
 א. מהי המתייחסות בקצתה העליון של החבל כתלות בפרמטרים של השאלה ובגובה הקצה y ?
 ב. מהי העבודה שעושה היד ביחידת זמן?
 ג. מהו קצב שינוי האנרגיה ה.colliderת של החבל?


12) שרשרת מחוברת לקורה נופלת

שרשרת באורך L וצפיפות אחידה ρ מחוברת לקורה התלויה באוויר. מרימים את השרשרת אנכית מעל הקורה ומשחררים ממנוחה. הנח שה חלק שמחובר לקורה בהתחלה זניח, כלומר גובה הקצה העליון של השרשרת הוא L מעל החיבור עם הקורה. הנח שהשרשרת לא פוגעת בקרקע במהלך הנפילה.
 א. מהי מהירות החלק שנופל כתלות בזמן?
 ב. מהו התנע של כל השרשרת כתלות בזמן?
 ג. מה הכוח שפעילה הקורה על השרשרת כתלות בזמן?
 ד. מה גודל הכוח שפעילה הקורה ברגע הנפילה האחרון של השרשרת אם מסת השרשרת היא 2 kg ?


13) צינור משפריז על אדם*

צינור משפריז מים על אדם.
 לצינור שטח חתך A וצפיפות המים נתונה ρ .
 נתונה גם מהירות יציאת המים מהצינור v_0 .

- א. מצא את הכוח שפועל על אדם הנמצא במנוחה, בהנחה שהמים אינם ניתזים חזקה.
 ב. מצא את הכוח הפועל על אדם הבורח במתירות $v < v_0$.

**14) צינור משפרץ מים על עגלת***

צינור משפרץ מים על עגלת בעלת מסה M .
 המים יוצאים מהצינור ב מהירות v_0 ובקצב \dot{m} נתון (הנח כי מהירות המים קבועה עד לפגיעה בעגלת). המים מתנגדים התנגדות אלסטית ביחס לעגלת.
 מצא את מהירות העגלת כפונקציה של הזמן.

**15) שרשרת נופלת על מז משקל***

שרשרת בעלת אורך L ומסה M מוחזקת בצוואר אנכית מעל מז משקל כך שהקצה התחתון שלה בדיק נוגע במשקל.
 השרשרת משוחררת ממנוחה.
 מצא מה מראה המשקל כפונקציה של x (הمرחק אותו עבר הקצה העליון).

תשובות סופיות:

$$\frac{dv}{dt} = \frac{u(a-bt)}{M_0 - at + \frac{1}{2}bt^2} . \text{ב.} \quad [a] = \frac{\text{kg}}{\text{sec}} , \quad [b] = \frac{\text{kg}}{\text{sec}^2} . \text{א.} \quad (1)$$

$$v(t) = u \ln \left[\frac{M_0}{M_0 - at + \frac{1}{2}bt^2} \right] . \text{ב. לא משתנה.} \quad u \ln \frac{M_0}{M_0 - m} . \text{א.} \quad (2)$$

$$u \ln \left(\frac{M_0 - m - k}{M_0 - 2m - k} \right) . \text{ט} \quad u \ln \frac{M_0(M_0 - 2m - k)}{(M_0 - m)(M_0 - m - k)} . \text{ז.} \quad (3)$$

$$y_{\max} = \frac{g}{4} \left(\frac{2u_0}{3g} \ln 4 \right)^2 + \frac{1}{2g} \left(\frac{u_0}{3} \ln 4 \right)^2 . \text{ב.} \quad -\frac{3g}{2u_0} M e^{-\frac{3g}{2u_0} t} . \text{א.} \quad (4)$$

$$\frac{W}{W'} = 1 - \frac{V_F \rho A V_0}{W'} . \text{ג.} \quad V_F = \sqrt{V_0^2 + 2gh} . \text{ב.} \quad \frac{dm}{dt} = \rho A V_0 . \text{א.} \quad (5)$$

$$W = W + \frac{W}{g} a_0 . \text{ה} \quad W = W + \rho Ahg . \text{ט}$$

$$v(r) = -\frac{\rho g}{4b} r_0 \left(\frac{r}{r_0} \right)^{-3} + \frac{\rho g}{4b} r . \text{ב.} \quad r = \frac{b}{\rho} t + r_0 . \text{א.} \quad (6)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} a(t) = \lim_{r \rightarrow \infty} a(r) = \frac{g}{4} . \text{ט} \quad a(t=0) = g . \text{ז.}$$

$$V(t) = (u_0 \alpha \cos \theta - \mu_k N) \frac{1}{\alpha} . \text{ב.} \quad -\mu_k N = M_0 \frac{dv}{dt} + \alpha V(t) - u_0 \alpha \cos \theta . \text{א.} \quad (7)$$

$$V(t) = \frac{1}{\alpha} \left(C - (C - \alpha V_0) e^{-\frac{\alpha}{M_0} t} \right) . \text{ז.}$$

$$v = \text{const} \quad (8)$$

$$h = \frac{\alpha v_0^2 - Mg}{2g\alpha} \quad (9)$$

$$V_F^2 = \frac{g}{2} (L^2 - d^2) \quad (10)$$

$$\frac{dE}{dt} = \frac{M}{L} gyv + \frac{M}{L} v^3 . \text{ג.} \quad \rho = \frac{M}{L} gyv + \frac{M}{L} v^3 . \text{ב.} \quad F = \frac{M}{L} gy + \frac{M}{L} v^2 . \text{א.} \quad (11)$$

$$60_{\text{נ}} \cdot \tau = \frac{3}{4} \lambda g^2 t^2 \cdot \lambda \quad \rho_T = \lambda \left(L - \frac{1}{4} g t^2 \right) g t \cdot \tau \quad v = g t \cdot \lambda \quad (12)$$

$$\sum F = \rho A (v_0 - v)^2 \cdot \tau \quad \sum F = - \sum F = \rho A v_0^2 \cdot \lambda \quad (13)$$

$$v(t) = v_0 \left(1 - \frac{1}{2m} M t + 1 \right) \quad (14)$$

$$N(x=L) = 3Mg \quad (15)$$

פיזיקה 1 מכניתה


פרק 16 - מומנט כוח -

תוכן העניינים


1. מומנט כוח - הסבר	197
2. מכפלה וקטוריית	(לא ספר)
3. תרגיל - מומנטים על משולש	198
4. פיתוח, מדוע מתייחסים לכוח הכביד כאילו פועל במרכז המסה	(לא ספר)
5. משוואת מומנטים	(לא ספר)
6. תרגיל - שני פועלים מחזירים מנשא	199
7. תרגילים מסכמים	200

מומנט כוח - הסביר:

שאלות:



- 1) דוגמה לחישוב מומנט (מוט)
נתון מוט אשר מקובע בקצתו ומסתובב נגד כיוון השעון.
מופעל כוח F .
חשב את מומנט הכוח.



- 2) מרחק אפקטיבי דוגמה
אדם דוחף ארגו בגובה 0.5m ומפעיל כוח F
(ראה תמונה).
לאrugז אין חיכוך עם המשטח.
האדם דוחף את הארגז ללא כל בעיה עד
שנתקע באבן והארגו מתחוף
(מייקום האבן הופך לציר הסיבוב).
חשב את מומנט הכוח.

תשובות סופיות:

$$\vec{\tau} = \mathbf{F}_0 \times \hat{z} \quad (1)$$

$$|\vec{\tau}| = 10 \cdot 0.5 \text{m} \quad (2)$$

תרגיל - מומנטים על משולש:

שאלות:

1) מומנטים על משולש

המשולש בתמונה הוא משולש שווה צלעות עם אורך צלע נתונה a .


- א. חשב את המומנטים של הכוחות בתמונה סביב הפינה השמאלית של המשולש.

- ב. נתונה מסה של המשולש M ונמצא גם כי מרכז המסה של המשולש

$$\text{נמצא בנק': } \left(\frac{1}{2}a, \frac{1}{2\sqrt{3}}a \right)$$

חשב את מומנט הכוח של כוח הקובד.

- ג. חשב שוב את המומנטים סביב ציר העובר במרכז המסה של המשולש, הנח כי הזווית בין F_1 לדופן המשולש היא 60° מעלות.



תשובות סופיות:

$$\tau_g = -Mg \frac{1}{2}a \quad \text{ב.} \quad \tau_1 = 0! , \vec{\tau}_2 = -5 \cdot \sqrt{3}a , \vec{\tau}_3 = 0! , \tau_4 = 10a \quad \text{א.} \quad (1)$$


$$\tau_1 = \frac{-10a}{\sqrt{3}} , \tau_2 = -10 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}a , \tau_3 = -\frac{1}{\sqrt{3}}a \cdot 10 \cdot \sin 30^\circ , \tau_4 = 10 \cdot \frac{1}{2}a , \tau_g = 0 \quad \text{ג.}$$

תרגיל - שני פועלים מחזיקים מנשא:

שאלות:

1) **שני פועלים מחזיקים מנשא**

שני פועלים מחזיקים מנשא מעץ שמשקלו 12kg ואורכו 1.5m. על המنشא, במרחק של 0.5m מהפועל הימני, מונח ארגז בעל מסה של 8kg. בהנחה כי המערכת במנוחה, מצאו את הכוח שפעיל כל פועל (ראה איור).



תשובות סופיות:

$$F_2 = 113.333N, F_1 = 86.666N \quad (1)$$

תרגילים מסכימים:

שאלות:

1) מוט עומד מחובר לחוט ומשקלת

מוט אחד מונח על משטח אופקי לא חלק, כמו זה בתמונה.


המוט מחובר במרכזו לחוט אידיאלי שקצהו

השני קשור למשטח ויוצר עימיו זווית של 37° .

הקצה העליון של המוט מחובר באמצעות חוט

אופקי אידיאלי וגלגת אל משקלת שמשקלת $m = 7\text{kg}$.

המערכת נמצאת במנוחה.



א. מהי המתיחות בחוט המחבר אל המשטח?

ב. מהו כוח החיכוך שפעיל המשטח האופקי על המוט?

2) כורה על קיר אנכי


באյור לשאלת זו מתוארת כורה אחת

שאורך הכלול הוא 23.5m .

משקל הكورה היא 140kg .

הקורה נשענת בנקודת A על קיר אנכי חלק

שגובהו 8m .



קצת הקורה מונח על הרצפה בנקודת B במרחק 18m מהקיר

ובקצת זהה פועל כוח אופקי F , כמפורט באյור.

מקדם החיכוך הסטטי שבין הקורה הרצפה הוא $\mu_s = 0.3$.

מהו F המקסימלי הנתון להפעיל כך שהקורה תישאר במנוחה?

3) מוט נשען על כדור

נתון מוט דק שאורכו $L = 3.5\text{m}$ ומשקלתו $m = 7\text{kg}$

הנשען על כדור חסר חיכוך המודבק לרצפה כמתואר בשרטוט.


נקודת המגע של המוט בכדור היא הנקודה K.

בקצתו השמאלי נוגע המוט בקיר בעל חיכוך

בנקודת P, הזווית שיווצר המוט יחסית לקיר

היא 48° . מקדם החיכוך הסטטי שבין הקיר למוט


הוא $\mu_s = 0.15$.



א. מהו הכוח שפעיל הכדור על המוט אם


נתון שקצתו הימני של המוט נמצא על סף תנועה כלפי מטה?

ב. מהו המרחק בין הנקודות P ו-K במצב זה?

**טבלה מעץ 4)**

טבלה העשויה עץ בעלת עובי אחיד שמסתו 400 גרם וצורתה כמתואר בתרשימים, תלואה בשני חוטים בנקודות K ו-P.

- חשב את מרכז הכוח של הטבלה ביחס למערכת צירים שראשיתה ממוקמת בנקודה P.
- מצא את המתייחות בשני החוטים.

**שלט בצורת האות ש 5)**


שלט העשויה מחומר אחיד בצורת האות "ש" (כמושרט), שמסתו 4 ק"ג, תלאה בשני חוטים בנקודות K ו-M.

- חשבו את מרכז המסה של השלט ביחס למערכת צירים שראשיתה ממוקמת בנקודה K.
- מצאו את המתייחות בשני החוטים.

6) מסה תלואה על קורה שמחוברת לקיר

קורה בעלת מסה m_1 ואורך l מחוברת לקיר באמצעות ציר. בקצה הקורה קשורה מסה m_2 התלויה במנוחה.

אם מצב הקורה יוצא חוט בזווית הקשור חוזרת לקיר, הזווית שיוצר החוט עם הקורה היא α .




- מהי המתייחות בחוטים?
- מהו הכוח (גודל וכיוון) שפעיל הציר?


7) סולם נשען על קיר

סולם נשען על קיר.


קיים חיכוך סטטי בין הסולם לרצפה וגם בין הסולם לקיר. מקדם החיכוך הסטטי בין הסולם לרצפה ובין הסולם לקיר הוא s_μ . אורך הסולם הוא L וניתן להניח שמסתו מפוגגת בזורה איחוד.

מהי הזווית המינימלית עם הרצפה כך שהסולם לא יחליק?







- 8) אדם עומד על סולם שנשען על קיר. אדם עומד על סולם שנשען על קיר. אורך הסולם הוא L וניתן להניח שמסתו מפולגת בצורה אחידה. האדם עומד על הסולם כשרוחקו מהקצה התיכון של הסולם הוא שני שליש מאורכו הסולם. קיימים חיכוך סטטי בין הסולם לרצפה וגם בין הסולם לקיר. מקדם החיכוך הסטטי בין הסולם לרצפה ובין הסולם לקיר הוא μ . מסת האדם כפולה מסמת הסולם. מהי הזווית המינימלית עם הרצפה כך שהסולם לא יחליק?




- 9) מומנטים על שער שער שגובהו h ואורךו a מחובר לקיר בשני ציריים a ו- b . על מנת להקל על הציר העליון חיבורו לשער כבל ומתחו אותו עד אשר הכוח האופקי בנקודה a מתאפס.
- מהי המתיחות בכבל?
 - מהו הכוח האופקי הפועל על הציר b ?
 - מהו סכום הכוחות האנכיים המופעלים על שני הציריים?




- 10) גגון מוחזק אל קיר גגון מוחזק אל קיר בעזרת חבל וחיכוך כמפורט בשרטוט. מצא את הכוחות הפועלים על הגגון.




- 11) מסה על גגון מחלקיק גגון מוחזק לקיר בעזרת חיכוך בלבד לפי הנתונים שבשרטוט. מהו המרחק הקטן ביותר מהקיר בו ניתן לשים את המסה m מבלי לגרום לגגון להחליק מהקיר?



- 12) מטוטלת מתמטית מצא את מומנט הכוח המופעל על מטוטלת מתמטית כפונקציה של הזווית מהאנך.



- 13) מנוף מדיסקה כפולה נתונה המערכת שבשרטוט. רשם את כל הכוחות הפועלים על הדיסקה ומצא את יחס הרדיוסים בין שתי הדיסקות.




14) אדם על קורה מחזיך בחוט ושתि גלגולות
 אדם שמסתו 65kg עומד בקצה קורה שמסתה 40kg .
 הקורה מונחת על ציר הנמצא מרחק 1m מהאדם.
 האורך הכולל של הקורה הוא 6m .
 האדם מחזיך בחוט העובר דרך שתי גלגולות כפי
 שמתואר באיור.
 הגלגלת השמאלית מחוברת לתקרה, הגלגלת הימנית
 לקורה למרחק 1m מהקצה השני.

- מהו הכוח בו האדם צריך לשמור על החבל כדי לשמור על מצב של שיווי משקל?
- מהם רכיבי הכוח שהציר מפעיל על הקורה?
- מהו מקדם החיכוך הסטטי המינימלי בין האדם לקורה כדי שהאדם לא
 יחליק מהקורה?

15) T על מישור משופע*

באיור נתון גוף משטחי בצורת L.


$$\text{כפיפות המסה של הגוף היא: } \sigma = 5 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2}.$$

- 
- מהו מרכזו המסה של הגוף ביחס לפינה התחתונה השמאלית?
 - מניחים את הגוף על מישור משופע.
 מהי הזווית המקסימלית של המישור עבורה הגוף לא יתפקיד?
 - קושרים את הגוף למישור באמצעות חוט אופקי מהפינה הימנית העליונה
 ומתחים את החוט עד שהגוף מתיעשר במקביל לקרקע.
- מהי המתיחות בחוט במצב זה אם זווית המישור היא 30° והגוף במנוחה.


16) מוט נשען על דף נייר*

מוט בעל אורך L ומסה M מחובר לתקרה באמצעות ציר.
 בקצתו השני המוט מונח על דף נייר המונח על הרצפה.
 מסת דף הנייר זניחה.

הזווית בין המוט لأنך היא β ומקדם החיכוך הסטטי
 בין המוט לניר ובין הניר לרצפה הוא μ .



- מושכים את הניר ימינה בכוח F.
 מהו הכוח המינימלי הדרוש בשבייל להוציא את
 הניר מתחת למוט? הנח שהמוט נשאר במנוחה.
- חזור על סעיף א' אם הכוח פועל שמאליה.


**17) עירימת קוביות 1**

עירימת קוביות מורכבת מ-4 קוביות זהות באורך L .

הקוביות מסודרות באופן שמתואר באיוור.

מהו המרחק d המקסימלי האפשרי כך שהעירימה לא תיפול מהשולחן.

מהם x_1 ו- x_2 במצב זה?


**18) עירימת קוביות 2***

עירימת קוביות מורכבת מ-4 קוביות זהות באורך L .

הקוביות מסודרות באופן שמתואר באיוור.

מהו המרחק d המקסימלי האפשרי כך שהעירימה לא תיפול מהשולחן.

מהם x_1 ו- x_2 במצב זה?

**19) מוט עם שני מעצורים מגומי****

באיור ישנו מוט באורך 13c.m. המוחובר

בציר הנמצא במרחק 5c.m. מהקצה הימני.

בשני הקצות של המוט ישנים מעצורים זהים העשויים מגומי.


פעילים כוח $N=200$ N במרחק 4c.m. במרחק

שמאלה מהציר, הכוח גורם לכיווץ קטן של המעצורים.

המערכת אופקית, כלומר כוח הכביד פועל לתוך הדף ונitin להתעלם ממנו.

מהו הכוח שפועל על כל מעצור?

רמז: התיחס למעצורים כמו קפיצים בעלי קבוע k זהה.

**20) אדם על סולם עם שתי רגליים****

אדם עומד על סולם בעל שתי רגליים המוחוברות

באמצעות כבל במרכזה הסולם. משקל האדם הוא 800

ニュוטון ונitin להזינח את משקל הסולם ואת החיכוך

עם הרצפה.

נתונים אורכי הקטעים הבאים :

$KM = OM = 2.34\text{m}$, $KP = 1.70\text{m}$, $LN = 0.746\text{m}$

א. מצא את הכוחות שפועלים בנקודות O ו- K.

ב. מצאו את המתייחות בכבל.

רמז: יש לעשות משווה רק על חלק מהסולם.

תשובות סופיות:

$$\text{ב. } f_s = T_1 = 70\text{N} \text{, ימינה.}$$

$$T_2 \approx 180\text{N . נ (1)}$$

$$F_{\max} \approx 521\text{N (2)}$$

$$PK \approx 0.84\text{m . ב}$$

$$N_2 \approx 110\text{N . נ (3)}$$

$$T_2 = 3\text{N , } T_1 = 1\text{N . ב}$$

$$x_{c.m.} = 6.6\text{c.m. , } y_{c.m.} = 3.75\text{c.m . נ (4)}$$

$$T_K = 6.7\text{N , } T_M = 33.3\text{N . ב}$$

$$x_{c.m.} = 5\text{c.m. , } y_{c.m.} \approx 4.4\text{c.m . נ (5)}$$

$$T_1 = \frac{(m_1 + 2m_2)g}{\sin \alpha} , T_2 = m_2 g . \text{ נ (6)}$$

$$F = \sqrt{((m_1 + 2m_2)g \cot \alpha)^2 + (m_2 g)^2} , \tan \theta = -\frac{m_2}{m_1 + 2m_2} \tan \alpha . \text{ ב}$$

$$\tan \theta = \frac{1 - \mu_s^2}{2\mu_s} \text{ (7)}$$

$$\tan \theta = \frac{11 - 7\mu_s^2}{18\mu_s} \text{ (8)}$$

(9) ראה סרטון.

(10) ראה סרטון.

(11) ראה סרטון.

$$\sum \tau = -mg l \sin \theta + Tl \sin \theta = -mg l \sin \theta \text{ (12)}$$

$$\sum \tau = \frac{m}{M} = \frac{r}{R} \text{ (13)}$$

$$\text{שمالה } F_x = 10\sqrt{3}\text{N , } F_y = 1000\text{N . ב}$$

$$T_l = 20\text{N . נ (14)}$$

$$\mu_{s_{\min}} = 0.027 . \lambda$$

$$\alpha = 31^\circ . \text{ ב}$$

$$x_{c.m.} = 0.15\text{m , } y_{c.m.} = 0.25\text{m . נ (15)}$$

$$T = 3.3\text{N . \lambda}$$

$$F_{\min} = \frac{\mu_s mg \sin \beta}{\sin \beta + \mu_s \cos \beta} . \text{ ב}$$

$$F_{\min} = \frac{\mu_s mg \sin \beta}{\sin \beta + \mu_s \cos \beta} . \text{ נ (16)}$$

$$x_1 = \frac{5L}{8} , x_2 = \frac{L}{2} , d = \frac{9L}{8} \text{ (17)}$$

$$x_1 = \frac{L}{2} , x_2 = \frac{2L}{3} , d = \frac{7L}{6} \text{ (18)}$$

$$F_R \approx 45\text{N , } F_L \approx 72\text{N (19)}$$

$$T_L \approx 196\text{N . ב}$$

$$N_O \approx 291\text{N , } N_k = 509\text{N . נ (20)}$$

פיזיקה 1 מכניתה

פרק 17 - תנע זוויתי -

תוכן העניינים

206	1. נוסחאות וחוקי שימור
209	2. תנע זוויתי ביחס למרכז מסה
(לא ספר)	3. פרטציה
211	4. תרגילים בפרטציה

נוסחאות וחוקי שימוש:

שאלות:

1) תנ"ז בזריקה משופעת

אבן נזרקת בזריקה משופעת ב מהירות v_0 ובזווית α , כוח הכבוד שפועל על האבן $-mg\hat{y} = \vec{F}$.

- מהו התנ"ז של האבן ביחס לנקודת המוצא כתלות בזמן?
- מהו מומנט הכוח של כוח הכבוד?
- הראה כי השינוי של התנ"ז בזמן שווה למומנט הכוח של כוח הכבוד.



2) גוף מסתובב על שולחן ונמשך למרכז

מסה m_1 מחוברת לחוט המחבר למרכז שולחן.

המסה נעה במסלול מעגלי ברדיוס קבוע r_1 ובמהירות קבועה v_0 .

ברגע מסוים מושכים את המסה למרכז המרجل (מקצרים את אורך החוט) ומפסיקים כאשר אורך החוט שווה r_2 והמסה מסתובבת שוב בתנועה מעגלית קבועה.

רגע לאחר מכן מניחים מסה נוספת m_2 במסלול של m_1 והמסות מתנגשות התנגשות פלסטית. מצאו את מהירות המסות לאחר ההתנגשות.



3) שתי מחליקות על הקrho

שתי מחליקות תאומות בעלות מסה זהה m מחליקות בכיוונים מנוגדים ובמהירות v_0 .

המחליקות נעות על קוויים ישרים והמרחק בין הקווים הוא d . באמצע ביניהן שמי חבל.



כאשר הן מגיעות לחבל, שתיהן תופסות את החבל ומתחילות להסתובב סביב המרכז ביניהן.

- מה מהירות הזוויתית שהן מסתובבות?

ב. כעט המחליקות מושכות את החבל ומתקרבות זו לזו עד אשר המרחק

$$\text{ביןיהם הוא } \frac{d}{2}.$$

מצאו את המהירות הזוויתית החדשה של המחליקות.




4) כדור מסתובב אנכי

כדור בעל מסה m מחובר לחוט בעל אורך l ומסתובב במעגל אנכי.

נתון כי מהירות הכדור בשיא הגובה היא v_0 .

א. מצא את מומנט הכוח הפועל על הכדור כפונקציה של הזווית α .

ב. מצא את התנע הזוויתי של הכדור כפונקציה של הזווית α .

**5) כדור בתוך חרוט**

כדור קטן נעה בתוך חרוט המוחבר הפוך למשטה.


נתון כי מהירות הכדור ההתחלתית היא v_0

בכוון אופקי ומשיק לדופן החרוט.

מצא את הגובה המקסימלי אליו יגיע הכדור

(החרוט אינו צז).

הנחיות: מספיק להגעה למשווה ממעלה שלישית על h אין צורך לפתרו אותה.

**6) כדור מסתובב מחובר למסה תליה**


מסה m נעה על שולחן חסר חיכוך ומוחבר באמצעות חוט העובר דרך מרכזו השולחן למסה M התלויה באוויר.

אורך החוט הוא L . נתון כי $v = \sqrt{t}$ המסה M

נמצאת במנוחה והמסה m נמצאת במרחק R ממרכז הלוח, ב מהירות ההתחלתית v_0 ,

בכוון מאונך לרדיס.


רשום את משוואת שימור האנרגיה והתנע הזוויתי ומצא משווה דיפרנציאלית התלויה רק בגודל r , מרחק המסה m ממרכז השולחן.

**7) מומנט הכוח לא תלוי בנקודות הייחוס**

הוכיחו כי אם הכוח השקול על קבוצת גופים מתאפס אז מומנט הכוח על קבוצת הגוףאים אינם תלויים בנקודות הייחוס.

8) תנע זוויתי לא תלוי בנקודות ייחוס

הוכיחו כי אם התנע הקומי של קבוצת גופים מתאפס או התנע הזוויתי שלהם לא תלוי בנקודות הייחוס.



(9) זובב הולך על מוט*

שתי מסות נקודתיות m_1 ו- m_2 מחוברות באמצעות מוט חסר מסה באורך d . על המסה m_1 נמצא זובב בעל מסה m_3 . כל המערכת נמצאת על שולחן אופקי ומסתובבת סביב מרכז המסה שלה במהירות זוויתית קבועה ω_0 . ברגע מסוים הזובב מתחילה ליכת על המוט במהירות v ביחס למוט ונוצר כאשר הוא מגיע למרכז המסה של שלושת הגוףים (שים לב שהמסות לא מחובר לשולחן). מהי המהירות הזוויתית של המערכת כאשר הזובב נעוץ?

תשובות סופיות:

$$\text{ג. שאלת הוכחה.} \quad \text{ב. } -mgv_0 \cos \alpha t \hat{z} \quad \text{א. } -\frac{1}{2} gt^2 v_0 m \cos \alpha \hat{z} \quad (1)$$

$$u = \frac{m_1 r_1 v_0}{r_2 (m_1 + m_2)} \quad (2)$$

$$\omega'' = \frac{8v_0}{d} \quad \text{ב.} \quad \omega' = \frac{2v_0}{d} \quad \text{א.} \quad (3)$$

$$\vec{L} = lm v(-\hat{z}) \quad \text{ב.} \quad \sum \vec{\tau} = -mgl \sin \alpha \quad \text{א.} \quad (4)$$

$$(2gH + v_0^2) h_{\max}^2 + 2gh_{\max}^3 + v_0^2 H^2 \quad (5)$$

$$a + br + \frac{c}{r^2} = \dot{r}^2 \quad (6)$$


שאלה הוכחה. **7**

שאלה הוכחה. **8**

$$\omega' = \frac{(m_1 + m_3)(m_1 + m_2)}{m_1(m_1 + m_2 + m_3)} \omega_0 \quad (9)$$


תנוע זוויתית ביחס למרכז מסה:

שאלות:



- 1) מסה מתנגשת במוט עם שתי מסות**
 שתי מסות נקודתיות m_1 ו- m_2 מחוברות באמצעות מוט חסר מסה באורך d . המערכת נמצאת במנוחה על שולחן אופקי חסר חיכוך (שתי המסות על השולחן, המוט אופקי). מסה שלישית m_3 נעה במהירות v_0 ומתנגשת התרנגולות פלסטית במסה m_1 .
 נסמן את רגע ההתרנגולות ב- $t = 0$.
 $.d = 3m, v_0 = 6 \frac{m}{sec}, m_1 = m_2 = m_3 = 0.2kg$


- א. חשבו את מיקום מרכז המסה ברגע $t_1 = 0.5sec$ ביחס לראשית הנמצאת במרכז המוט בהתחלת ואינה נעה עם המוט.
 ב. חשבו את התנוע הזוויתי של המערכת ביחס לראשית הצירים ברגע t_1 .
 ג. חשבו את התנוע הזוויתי של המערכת ביחס למרכז המסה שלה ברגע t_1 .
 ד. מצאו את מהירות הזוויתית של המוט ביחס למרכז המסה לאחר ההתרנגולות.
 ה. מהי מהירות הקווית של m_1 ומהי מהירות הקווית של m_2 מיד לאחר ההתרנגולות?



- 2) שתי מסות מחוברות מסתובבות ומתנגשות בשלישית**
 שתי מסות זהות m מחוברות במוט חסר מסה באורך d ומסתובבות סביב מרכז המסה שלחן ב מהירות זוויתית קבועה ω . אחת המסות מתנגש התרנגולות פלסטית במסה זהה נוספת הנמצאת במנוחה.
 מצא את מהירות מרכז המסה של שלושת המסות המחוברות לאחר ההתרנגולות ואת מהירות הזוויתית שלחן סיבוב מרכז המסה של שלושתן.

(3) מסה נפרצת ממוט עם שתי מסות

שלוש מסות m_1 , m_2 , m_3 נתונות ומחוברות לקצה של מוט באורך 1.



הmassות m_3 , m_2 מחוברות בקצה התחתון
באיזור והmassה m_1 בקצה העליון.

המוט נמצא על שולחן חסר חיכוך (באיזור המבט
מלמעלה) ובמנוחה.

ברגע מסויים יש פיצוץ בין massות m_2 , m_3 וmassה m_1

במהירות v נתונה (ביחס לשולחן) ובמאונך למוט.
הmassה m_2 נשארת מחוברת למוט.

$$\text{נתון כי : } m_1, m_2 = M, m_3 = 3M$$

א. מצא את מהירות מרכז המסה של המוט (עם המassות המוחוברות).

ב. מצא את המהירות הזוויתית של המוט סביב מרכז המסה שלו.

תשובות סופיות:

$$\cdot L_{c.m.} = 4.8 \text{ kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{sec}} \quad \text{ג.} \quad \cdot L = 3.6 \text{ kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{sec}} \quad \text{ב.} \quad \cdot \vec{r}_{cm}(t_1) = (1_m - 1_m) \quad \text{א.} \quad (1)$$

$$\cdot V_1 = 4 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \hat{x}, V_2 = -2 \frac{\text{m}}{\text{sec}} \hat{x} \quad \text{ה.} \quad \cdot \omega = 1 \frac{\text{rad}}{\text{sec}} \quad \text{ט.}$$

$$\cdot u_{1,2,3_{c.m.}} = 0, \omega' = \frac{3}{4} \omega \quad (2)$$

$$\omega = \frac{3v}{l} \quad \text{ג.} \quad v_{1,2_{c.m.}} = \frac{3}{2} v \quad \text{א.} \quad (3)$$


תרגילים בפרשציה:

שאלות:

1) נקודה על גלגל

מסה נקודתית m

נתון גלגל בעל רדיוס r המסתובב במהירות זוויתית ω קבועה.




לגלל עובי a וראשית הצירים נמצאת במרכז העובי של הגלגל. אל הקצה העליון של הגלגל מחוברת מסה נקודתית m (ראה ציור) המסתובבת ביחד עם הגלגל.

א. הראה כי התנע הזוויתי של המסה תלוי בזמן.
 ב. הראה כי שינוי התנע הזוויתי ניתן ע"י מומנט הכוח של הכוח הцентрיפטלי.

2) מוט מסתובב בזווית עם הציר האנכי

מוט בעל אורך l ומסה M מונח בזווית φ ביחס לציר ה- z . המוט מסתובב סביב ציר ה- z במהירות זוויתית קבועה ω .

מצא את מומנט הכוח שפועל על המוט.



תשובות סופיות:

1) שאלת הוכחה.

$$\sum \vec{\tau} = -\frac{\omega^2 M l^2 \sin \varphi}{3} \hat{\theta} \quad (2)$$

פיזיקה 1 מכניתה

פרק 18 - מומנט ההتمד -


תוכן העניינים

1. הקדמה - גוף קשיח וציר סיבוב	(ללא ספר)
2. מומנט ההتمד, הסבר בסיסי וחישוב עבור גוף נקודת	(ללא ספר)
3. משפט שטינר	(ללא ספר)
4. אדרטיבות	212
5. $ z = \sqrt{x^2 + y^2}$	(ללא ספר)
6. סימטריה ל- z	(ללא ספר)
7. חישוב מומנט ההتمד של דיסקה סביב ציר Z וציר X	(ללא ספר)
8. מומנט ההتمד כמטריצה	213
9. תרגילים שונים לחישוב מומנט ההتمד	215

אדרטיביות:

שאלות:

1) דוגמה



לדסקה בעלת מסה M ורדיוס R מחברים דסקה נוספת זהה בקצת התחתון של הדסקה.
מצאו את מומנט ההתרמוד של המערכת סביב ציר המאונך למשור הדסקה והעובר בקצת העליון של הדסקה (הראשונה).


תשובות סופיות:

$$I = I_0 m R^2 \quad (1)$$

מומנט התמד כמטריצה:


שאלות:

1) דוגמה-מנואלה




- שתי מסות נקודתיות זהות m מחוברות על ידי מוטות חסרי מסה כפי שנראה באյור. אורך המוט המרכזי הוא $2b$ ואורץ כל מוט החובר לכדור הוא a .
- מצא את כל מטריצת מומנט התמד של המערכת.
 - מצא את התנע הזרויתי של המערכת ברגע המתואר באյור אם מהירות הזרוית היא $\vec{\omega} = \vec{\omega}$.

2) דוגמה-מומנט התמד של קובייה



- חשב את המומנט התמד של קובייה בעלת מסה M המפולגת באופן אחד. ראשית הצירים נמצא בפינת הקובייה, צלעות הקובייה מקבילים לצירים ואורכיהם: a, b, c . ראה איור.

3) גליל עם צפיפות התלויה בזווית



- לגלגל בעל רדיוס R וגובה H יש צפיפות מסה התלויה בזווית $(\theta) \rho = \rho_0(1 + \sin(\theta))$ כאשר θ היא הזווית ביחס לציר x בקואורדינטות גליליות.
- מהי המסה הכוללת שלגלגל?
 - מצא את מיקום מרכז המסה שלגלגל.
 - חשב את: I_{yz}, I_{xz}, I_{zz} .
 - חשב את התנע הזרוית זוויתית $\vec{\omega} = \vec{\omega}$.
 - מדוע יש הבדל בין התנע הזרוית שלגלגל בכיוונים x ו- y .

תשובות סופיות:

$$\vec{L} = -2mab\omega \hat{y} + 2ma^2\omega \hat{z} . \quad \text{ב.} \quad I = 2m \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & 0 & 0 \\ 0 & b^2 & -ab \\ 0 & -ab & a^2 \end{pmatrix} . \quad \text{א. (1)}$$

$$I = M \begin{pmatrix} \frac{b^2c^2}{3} & -\frac{ab}{4} & -\frac{ac}{4} \\ -\frac{ab}{4} & \frac{a^2+c^2}{3} & -\frac{bc}{4} \\ -\frac{ac}{4} & -\frac{bc}{4} & \frac{a^2+b^2}{3} \end{pmatrix} \quad \text{ב. (2)}$$

$$y_{\text{c.m.}} = \frac{R}{3}, \quad x_{\text{c.m.}} = 0, \quad z_{\text{c.m.}} = \frac{H}{2} . \quad \text{ב.} \quad M = \rho_0 \pi R^2 H . \quad \text{א. (3)}$$

$$I_{zz} = \frac{\pi R^4 H \rho_0}{2}, \quad I_{xz} = 0, \quad I_{yz} = -\frac{\pi R^3 H^2 \rho_0}{6} . \quad \text{ג.}$$

$$L_x = 0, \quad L_y = -\frac{\pi R^3 H^2 \rho_0}{6} \omega, \quad L_z = \frac{\pi R^4 H \rho_0}{2} \omega . \quad \text{ד.}$$

ה. מכיוון שאנו מחשבים את התנאי רק ברגע מסויים והתפלגות המסה אינה סימטרית בין x ל- y אז יש הבדל בין התנאי של כל ציר.
במוצע של זמן מחזור שלם התנאי יהיה ככל ציר.

תרגילים שונים לחישוב מומנט התמד:

שאלות:



- 1) חישוב אינטגרל של מוט לא אחיד**
חשב את מומנט ההتمד של מוט עם צפיפות ליחידה


$$\text{אורך } \lambda_0 = \frac{x}{L} \text{ סביב קצה המוט.}$$

x הוא המרחק מהקצה, L הוא אורך המוט ו- λ_0 נתון.



- 2) חישוב נוסף מוט בצפיפות לא אחידה**
מציא את מומנט ההتمד של מוט סביב מרכזו לפי
הנתונים שבشرطו.
הצפיפות הנתונה מתייחסת למרכז המוט בראשית הצירים.

- 3) שלושה מוטות מחוברים בקצת**
שלושה מוטות זהים באורך 1 ומסה m כל אחד מחוברים
באופן המוצג אייר.
מציא את מומנט ההتمד של המערכת סביב ציר הנמצא
בנקודות החיבור בין המוטות ובמאנך למשור.



- 4) מסגרת ריבועית**
נתונה מסגרת ריבועית בעלת אורך צלע a ומסה M .
מציא את מומנט ההتمד של מסגרת.


- א. סביב ציר העובר במרכזו ובמאנך למשור המסגרת.
ב. סביב ציר העובר במרכזו המסגרת ודרך מרכז שני
צלעות ומקביל לשתי הצלעות האחרות.



- 5) מומנט התמד של שער חשמלי**
מציא את מומנט ההتمד של שער חשמלי בעל מסה m
ואורך I אשר בסופו מחוברת משקולת בעלת מסה M
ואורך L המסתובב סביב מרכז המסה שלו.




- 6) מומנט התמד של ריעש**
מציא את מומנט ההتمד של הגוף שבشرطו סביב מרכז המסה
שלו בשתי דרכים שונות. אורך כל מוט l ומסתו m .

7) דיסקה עם חור


- א. מצא את מומנט ההتمד של דיסקה בעל מסה M ורדיוס R , אם ידוע כי במרקח חצי R ממרכז הדיסקה קדחו חור ברדיוס רבע R . הדיסקה מסתובבת סביב ציר במרכזו (ולא במרקח המסה של המערכת).
- ב. מצא את מומנט ההتمד של הגוף סביב מרכזו המסה שלו.




- 8) חצי חישוק ושתי מסות
מצא את מומנט ההتمד של חצי חישוק שבתמונה. רדיוסו R , מסתו M ובקצתו חוברו שתי מסות m . החישוק סובב סביב מסמר בקודקודו.



- 9) חישוב אינטגרל של ריבוע
חשב את מומנט ההتمד של לוח ריבוע בעל אורך צלע a , מסה M וצפיפות אחידה בכל אחד מהמצבים הבאים:
- ציר הסיבוב הוא אחת הפאות של הריבוע.
 - ציר הסיבוב מקביל לפאות ועובר במרקצו.
 - ציר הסיבוב אנך למישטח הריבוע ועובר במרקצו.



- 10) מומנט התמד של משולש
מצא את מומנט ההتمד של המשולש סביב קודקודו הישר.



- 11) מומנט התמד של כדור מלא
חשב את מומנט ההتمד של כדור מלא בעל רדיוס R , מסה M וצפיפות אחידה, סיבוב ציר העובר במרקצו הכדור.

- 12) מומנט התמד של קליפה כדורית
מצאו את מומנט ההتمד של קליפה כדורית ברדיוס R ומסה m סיבוב ציר העובר דרך מרכזו המסה של הקליפה.

תשובות סופיות:

$$I_0 = M \frac{L^2}{2} \quad (1)$$

$$I = \frac{12ml^2}{80} \quad (2)$$

$$I_{c.m.} = ml^2 \quad (3)$$

$$I = \frac{M}{8} \left(a^2 + \frac{l^2}{3} \right) . \text{ב} \quad I_{c.m.} = \frac{M}{4} \left(\frac{l^2}{3} + a^2 \right) . \text{א} \quad (4)$$

$$I = \left(\frac{1}{12} ml^2 + m \left(\frac{m \cdot 0 + \frac{M(1+L)}{2}}{m+M} \right)^2 \right) + \left(\frac{1}{12} (L^2 + L^2) M + M \left(\frac{1}{2} - \left(\frac{m \cdot 0 + \frac{M(1+L)}{2}}{m+M} \right) + \frac{L}{2} \right)^2 \right) \quad (5)$$

$$I = \frac{5}{12} ml^2 \quad (6)$$

$$I_0 = I_{c.m.} + \frac{15}{16} M \cdot \left(\frac{R}{30} \right)^2 . \text{ב} \quad I_0 = \frac{247}{512} MR^2 . \text{א} \quad (7)$$

$$I_l = I_{c.m.} + m'b^2 \quad (8)$$

$$I = M \frac{1}{6} a^2 . \text{ג} \quad I = \frac{1}{12} Ma^2 . \text{ב} \quad I = \frac{1}{3} Ma^2 . \text{א} \quad (9)$$

$$I_0 = \frac{1}{6} m(a^2 + b^2) \quad (10)$$

$$I = \frac{2}{5} MR^2 \quad (11)$$

$$\frac{2MR^2}{3} \quad (12)$$

פיזיקה 1 מכניתה


פרק 19 - גוף קשיח -

תוכן העניינים

1. הגדרות, ציר סיבוב ותנע קווי	(ללא ספר)
218	
2. תנע זוויתי של גוף קשיח	
220	
3. אנרגיה סיבובית של גוף קשיח	
222	
4. ניתוח לפי כוחות ומומנטים וגלגול ללא חילקה	
224	
5. גלגול עם חילקה	
225	
6. תרגילים מסכמים	
232	
7. תרגילים מסכמים כולל פרסציה	

תנע זוויתית של גוף קשיח:

שאלות:




1) כדור מתנגש בדיסקה

דיסקה בעלת מסה M ורדיוס R מחוברת באמצעות ציר העובר במרכזו לשולחן אופקי חסר חיכוך.

כדור פלסטילינה בעל מסה m נעה במהירות v_0 לעבר הדיסקה.


הכדור פוגע בדיסקה משמאלה, ובמרחק d ממרכזו. הכדור נדבק לדיסקה ושניהם מתחילים להסתובב יחדיו (סיבוב הציר במרכז הדיסקה). הדיסקה נמצאת במנוחה לפני הפגיעה וכוח הכבוד אינו משפיע על הגוף (המערכת אופקית).

מצא את מהירות הזוויתית בה יסתובבו הגוף לאחר הפגיעה.



2) אדם קופץ מディסקה


נתונה דיסקה בעלת רדיוס R המסתובבת סביב מרכזה במהירות זוויתית קבועה ω . בקצת הדיסקה עומד איש נקודתי ומסתובב ביחד עם הדיסקה. ברגע מסוים האיש קופץ מהדיסקה ונמצא כי מהירותו מיד לאחר הקפיצה היא v_0 בכיוון הרדיאלי, ביחס לקרקע. מצא את מהירות הזוויתית של הדיסקה לאחר הקפיצה אם נתונים מסת הגוף m ומסת הדיסקה M .



3) דוגמה - תנע זוויתית של תנועה משלבנת

נתון מוט בעל אורך L ומסה M .

המרחק בין הקצה התיכון של המוט עד ראשית הצירים הוא d . המוט מסתובב בכיוון השעון מסביב בראשית. חשב את התנע הזוויתית.



4) שלושה כדורים

שלושה כדורים זהים בעלי מסה m נמצאים בפינותיו של משולש שווה צלעות. ה כדורים מחוברים באמצעות שלושה מוטות חורי מסה ואורך L (צלעות המשולש).

א. חשב את מיקום מרכזו המסה של המערכת.

בuit, נתון כי הגוף מסתובב במהירות זוויתית ω נתונה, סביב מרכזו המסה שלו. ברגע מסוים, כאשר הגוף נמצא במצב המתואר בציור, הכדור התיכון ניתק מהגוף.

ב. מצא את מהירות הגוף לאחר הניתוק.

ג. מצא את מהירות מרכזו המסה של החלק הנותר.

ד. מצא את מהירות הזוויתית של החלק הנותר סביב מרכזו המסה שלו.

5) מסמר נועץ דיסקה מסתובבת

- דיסקה ברדיוס R ומסה m מונחת על שולחן אופקי במנוחה. מסובבים את הדיסקה ב מהירות זוויתית α סביב מרכו המסה של (סביב ציר Z). מסמר נופל מהשדים ופוגע בקצתה של הדיסקה ונועץ אותה לשולחן.
- מהי המהירות הזוויתית של הדיסקה סביב המסמר לאחר הנעיצה?
 - ענו שיב על השאלה רק הפעם הניחו שבנוסף לסייע, מרכז המסה של הדיסקה נע במהירות ω לפני הנעיצה.

תשובות סופיות:

$$\omega = \frac{mv_0d}{I} \quad (1)$$

$$\omega' = \frac{\left(\frac{1}{2}M + m\right)\omega_0}{\frac{1}{2}M} \quad (2)$$

$$\left(\frac{L}{2} + d\right)^2 M\omega + I_{c.m.}\omega_{c.m.} = L \quad (3)$$


$$v_{1,2_{c.m.}} = \frac{1}{2}\omega R\hat{x} \quad .\text{א} \qquad v_3 = -\omega R\hat{x} \quad .\text{ב} \qquad y_{c.m.} = \frac{1}{2\sqrt{3}}, x_{c.m.} = \frac{L}{2} \quad .\text{נ} \quad (4)$$

$$I_{1,2,3}\omega = m|v_3|R + 2mv_{1,2}y_{c.m.} + 2m\left(\frac{1}{2}L\right)^2 \cdot \tau$$


$$\frac{1}{3}\left(\omega + 2\frac{v}{R}\right) \cdot \tau \qquad \frac{1}{3}\omega \quad .\text{א} \quad (5)$$

אנרגייה סיבובית של גוף קשיח:


שאלות:




- 1) **מוט מסתובב**
מוט באורך L ומסה M מחובר לתקраה באמצעות ציר זוויתית התחלתיות ω .
מהי הזווית המקסימלית אליה הגיע המוט?



- 2) **דיסקה מחוברת למוט נופלת במצב אנכי**
גוף קשיח מורכב ממוט בעל אורך L ומסה M המחובר בקצת אחד לדיסקה מלאה בעלת מסה m המפולגת באופן אחיד ורדיוס R .
בקצת השני, המוט מחובר לציר אופקי.
המוט חופשי להסתובב סביב הציר (כלומר הגוף יכול לעשות סיבוב אנכי סביב הציר).
הגוף מתחילה במצב המתוור באוויר (מצב אנכי לא יציב) ומקבל דחיפה קטנה לתוך הדף.
מה תהיה המהירות הזוויתית של הגוף כאשר הגיע הנזוכה ביותר?



- 3) **כדור פוגע במוט שתלווי מהתקלה (כולל תנו)**
כדור בעל מסה m פוגע במוט שתלווי מהתקלה במרחק x מציר הסיבוב של המוט. המוט בעל אורך L ובבעל מסה M .
מהירותו ההתחלתית של הכדור היא u_0 מטר/sek והוא מתנגש פלסטי עם המוט.
א. מהי המהירות הזוויתית של המערכת מיד לאחר ההתנגשות?
ב. מהי הזווית המקסימלית אליה הגיע המוט?
ג. מצא x כך שהכוח שפעילה התקלה על המוט יתאפס.



- 4) **מסה מתנגשת בשתי מסות מחוברות במוט (כולל תנו)**
שני גופים נקודתיים בעלי מסה M כל אחד מחוברים בשני קצוותיו של מוט דק חסר מסה באורך L . המערכת נמצאת במנוחה על גבי משטח אופקי חלק לאורך ציר y .
כדור נוסף שמסתו m פוגע במוט במאונך למומוט ובמרחק d ממרכזו המוט. מהירותו הנוסף היא v וההתנגשות עם המוט היא אלסטית.
מה צריכה להיות מהירותו של הכדור הנוסף, כך שיישאר במנוחה לאחר ההתנגשות.

תשובות סופיות:

$$\cos \theta = 1 - \frac{L\omega_0^2}{3g} \quad (1)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{2MgL + 2mg(L+R)}{\frac{ML}{3} + \frac{1}{4}mR^2 + m(L+R)^2}} \quad (2)$$

$$\omega = \frac{mv_0x}{mx^2 + \frac{ML^2}{3}} \cdot \mathcal{N} \quad (3)$$

$$x_{c.m} = \frac{M\frac{L}{2} + mx}{M+m}, \quad I = \frac{ML^2}{3} + mx^2 : \quad \text{כאשר} \quad \cos \theta = 1 - \frac{I\omega^2}{(M+m)gx_{c.m}} \quad \text{ב.}$$


ו- ω מצאנו בסעיף א'.

$$mu_0 = M\frac{L}{r} + mx \quad \text{ג.} \quad (4)$$

$$m = \frac{2M}{1 + \frac{4d^2}{l^2}} \quad (5)$$

ניתוח לפי כוחות ומומנטים וגלגול ללא חalkה:


שאלות:



1) דוגמה - כדור על מדרון משופע

כדור בעל רדיוס R מונח בגובה H על מדרון משופע בעל זווית α . הכדור מתחילה להתגלגל ללא חalkה.


- מצאו את מהירות הכדור בתחתית המדרון.
- מצאו את תאוצת הכדור.



2) גלובוס

גלובוס (כדור) מונח ומקובע לשולחן ויכול להסתובב סביב ציר המאונך לשולחן. מ�פים חוט סיבוב מרכז הגלובוס (סיבוב קו המשווה) והחותם ממשיך מהגלובוס דרך גלגלת לאידיאלית למסה תלויה m_1 .

נתונים גם: m_2 ו- R_2 מסה ורדיוס הגלגלת, m_3 ו- R_3 מסה ורדיוס הגלובוס. המערכת מתחילה ממנוחה. מצא את תאוצת כל הגוף, קווית זוויתית ואת המתיichות בחוט.



3) יווי במישור מחובר למסה

יווי (כדור שמלופף סביבו חוט) בעל מסה m_2 ורדיוס R מונח על מישור משופע בעל זווית θ .

החותם של היווי מחובר דרך גלגלת לאידיאלית למסה m_1 . נתון כי היווי מתגלגל ללא חalkה על המישור וכי קיימים חיכוך בין היווי למישור.


- מצא لأن תנועה המערכת וכיוון החיכוך הסטטי.
- מצא את תאוצות הגוף וגודלו כוח החיכוך.

(4) מוט אופקי נופל

L, M

מוט בעל מסה M (צפיפות אחידה) ואורך L תלוי בקצתו
לקיר וחופשי להסתובב סביב נקודת התלייה.
משחררים את המוט במצב אופקי.

- א. מצא את התאוצה הזוויתית ואת תאוצת מרכזו
המסה של המוט ברגע השחרור.
כעת המוט נופל עד להגיעו במצב מאונך לקרקע.
- ב. מצא את הכוח שפעיל הציר שמחבר את המוט
לקיר על המוט, ברגע השחרור.
- ג. מצא את מהירות הזוויתית של המוט ברגע זה
(כשהוא מאונך לקרקע).
- ד. חזר על סעיפים א' ו-ב' עבור רגע זה.

**(5) משטח מלמולה ומשטח מלמטה**

כדור בעל רדיוס R לחוץ בין שני משטחים נועים.
המשטח מתחתי לכדור נע במהירות v_1 והמשטח
מעליו נע במהירות v_2 .

- א. מהי מהירות מרכזו המסה של הכדור אם
ידעו שהוא מתגלגל ללא חילקה ביחס לשני המשטחים?
- ב. חזר על סעיף א' אם המשטח העליון נע בכיוון ההפוך.

תשובות סופיות:

$$a = \frac{5}{7}g \sin \theta \quad \text{ב.} \quad mgH = \frac{1}{2}mv_{c.m.}^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}mR^2\right)\left(\frac{v_{c.m.}}{R}\right)^2 \quad \text{א.} \quad (1)$$

(2) ראה סרטון.

(3) ראה סרטון.

$$\sum F_y = ma_{y_{c.m.}}, \sum F_x = ma_{x_{c.m.}} \quad \text{ב.} \quad a_{c.m.} = \frac{3}{4}g = a_y, a_x = a_r = 0, \alpha = \frac{3}{2}\frac{g}{L} \quad \text{א.} \quad (4)$$


$$mg \frac{L}{2} = \frac{1}{2}I\omega^2 \quad \text{ג.}$$

$$\sum F_y = ma_{y_{c.m.}}, \sum F_x = ma_{x_{c.m.}}, a_\theta = 0 = a_{x_{c.m.}}, a_y = a_r = -\omega^2 \frac{L}{2}, \alpha = 0 \quad \text{ד.}$$


$$v_{c.m.} = \frac{v_1 - v_2}{2} \quad \text{ב.} \quad v_{c.m.} = \frac{v_1 + v_2}{2} \quad \text{א.} \quad (5)$$

גלגל עם החלקה:

שאלות:



- 1) כדור מחליק ללא סיבוב**
 כדור הומוגני בעל מסה M מתחילה תנועתו עם מהירות v_0 ללא סיבוב (מהירות זוויתית).
 מצא את מהירותו הסופית אם נתון מקדם החיכוך הקינטי.



- 2) כדור מסתובב מונח על רצפה**
 כדור הומוגני בעל מסה M מוחזק באוויר ומסתובב סביבמרכז המשאלו ב מהירות זוויתית ω_0 .
 הכדור מונח על הרצפה בעודו מסתובב.
 מצא את מהירותו הסופית אם נתון מקדם החיכוך הקינטי μ_k .


תשובות סופיות:

$$V_{\text{final}} = \frac{5}{7} V_0 \quad (1)$$

$$V_{\text{final}} = \frac{2}{7} \omega_0 R \quad (2)$$


תרגילים מסכימים:

שאלות:




- 1) חישוק מתגלגל מחבל**
חבל מלופף סביב חישוק בעל רדיוס R ומסה m .
(החבל מחובר לתקלה).


- א. מהי תאוצת מרכז המסה של החישוק?
ב. לאחר כמה זמן ירד החישוק לגובה של h אם התחילה תנועתו ממנוחה?




- 2) מסות וגלגלת**
שתי מסות שונות m_1 , m_2 תלויות משני הצדדים של גלגלת לא אידיאלית המקובעת במרכזזה. המסות משוחררות ממנוחה.
מצא את תאוצת המסות אם נתון:
 M מסת הגלגלת, R רדיוס הגלגלת
וכि החוט איינו מחליק על הגלגלת.



- 3) שתי דיסקות שונות במדרון**
בון המדע שבמכון ויצמן יש שתי דיסקות קלות אליון מודבקות 4 מסות כבדות כמתואר בשרטוט. את הדיסקות מניחים על שני מדרונים ובודקים מי תנועה בהגעה למישור מהר יותר.
הסביר כיצד ניתן לחשב מהירות זו על פי נתוני המערכת.




- 4) שני חישוקים מתגלגלים מחבל**
חישוק בעל מסה m ורדיוס R תלוי מחבל המלופף סביבו.
א. מה תהיה מהירותו לאחר שנפל מגובה h ?
מה תהיה תאוצתו? כמה זמן תארך הנפילה?
חישוק אחר חסר מסה בעל רדיוס R מכיל מסה נקודתית במרכזו בעלי מסה m .
ב. מה תהיה מהירותו לאחר שנפל מגובה h ?
ג. מה תהיה מהירותו אם החבל יהיה ללא חיכוך?

5) מצמד

בכלי עבודה רבים קיים מנגנון הקרויה מצמד (קלאי').
תפקיד המצמד הוא להעביר את הכוח המניע אל החלק המונע בצורה הדרגתית (למשל להעביר את כוח המנוע ברכב אל הגלגלים מבלוי לגרום לתנועה מתאומית בגלגליים).
מצמד מופעל ע"י המצמד דסקה מסתובבת אל דסקה נייחת והעברת אנרגיה מזו לעזרת כוח החיכוך.
לפניך מצמד הבניי משתי דיסקות בעלות מומנט התumed שונה.
הدسקה התחתונה מסתובבת במהירות ההתחלתית נתונה.
בשלב מסוים הדסקה העליונה מונחת על הדסקה התחתונה ובעזרת כוח המשיכה וכוח החיכוך מתחילה לנוע עצמה עד ששתי הדיסקות ינעו ביחד.

א. מצא את מהירות הסופית של הדיסקות.

ב. כמה אנרגיה אבדה בתהליך זה?

**6) מכה בצדור ללא חילקה**

צדור סנווקר ברדיוס R נמצא במנוח על שולחן
לא חיכוך (חיכוך נמוך מאוד).

מצא באיזה גובה מעל תחנית הצדור יש לתת
מכה אופקית עם המקל כך שהצדור יתגלגל ללא חילקה.

$$\text{מומנט התumed של הצדור הוא: } I_{c.m} = \frac{2}{5}mR^2$$

הדרך: ערוך תרשימים כוחות ונתח את הבעיה בשלב המכאה עצמה.

7) חוט מושך דיסקה ללא חילקה - תרגיל פשוט


חוט מלופף מסביב לגליל המונח על מישור
שאיינו חלק. רדיוס הגליל הוא R ומסתו M .
כוח F נתון מושך את הגליל.


מצא את תאוצת הגליל במקרים הבאים אם
ידעו שהגליל מתגלגל ללא חילקה:

א. הכוח פועל בכיוון אופקי.

ב. הכוח פועל בזווית θ ביחס לאופק וידעו שהגליל אינו מת蘼ם.

ג. מה כיוון החיכוך בכל מקרה?






- 8) מחליקה על קרח סגירת ידיים**
- מחליקה על הקרח מסתובבת במהירות ω_0 . המחליקה בעלת מסה זניחה אך היא מחזיקה מסה m בכל יד. הידיים פרוסות לצדדים ואורך כל יד l . לפניה המחליקה סגורת את ידה לחצי מאורכו המקורי.
- מה תהיה מהירות הסיבוב החדשה?
 - כמה אנרגיה הושקעה בתהליך?




- 9) גלגול עם חילקה**
- אל עבר דסקה בעלת מסה M ורדיוויס R נורה קליע בעל מסה m במהירות v . הדסקה מונחת על משירן בעל מקדם חיכוך נתון. מצא כמה זמן תימשך ההחלקה.



- 10) מוט משוחרר בזווית פוגע במסה**
- מוט המוחובר לציר משוחרר ממנוחה מזוינת נתונה. כשהמוט מגיע לנקודה הנמוכה ביותר הוא פוגע במסה m וודוחף אותה במהירות לא ידועה לעבר מסילה מעגלית. נתון כי הקצת התחנון של המוט נע מיד לאחר ההתנגשות במהירות משיקית u .
- מהי הזווית המקסימלית אליה יוכל המוט לאחר הפגיעה?
 - מהי מהירות המסה מיד לאחר הפגיעה?
 - מהו הכוח אותו מפעילה המסילה על המסה מיד לאחר ההתנגשות?



- 11) צמד לוליאנים בטרפז**
- בקרכס ישנו מכשיר הקורי טרפז. על הטרפז נתלה לוליין המחזיק בידו לוליין אחר. נתון כי צמד הלוליאנים התרחילה את תנועתם ממנוחה במצב מאוזן וניתקו ידיהם במצב מאונך. הניתקו כי אורך כל לוליין l ומסתו m . לאחר הניתוק הלוליין המנותק סגור את גופו לחצי מאורכו.
- מהי המהירות הזוויתית ברגע הניתוק?
 - מהי המהירות הזוויתית של הלוליין המנותק מיד לאחר הניתוק ולפנוי שסגר את גופו?
 - מהי המהירות הזוויתית לאחר שסגר את גופו?


12) מוט מתגלגל - מציאת מהירות

מוט בעל מסה m ואורך 1 מונח על רצפה וקיר חלקים בזווית נתונה θ_0 . מיד לאחר שהניחו את המוט, המוט מתחילה להחליק עד הפגיעה ברצפה. אין חיכוך בין המוט לקיר או לרצפה. מצאו את מהירותו מרכזו המסה של המוט בזמן פגיעתו ברצפה.

13) יווי מתגלגל (חוט מלמعلלה)

יווי מורכב מגליל ברדיוס r ומסה m . משתי צידי הגליל מחוברות דסוקות ברדיוס $r > R$ ומסה M כל אחת. סביב הגליל ובמרכזו מלופף חוט. היוי מונח על משטח לא חלק ומושכים את החוט בכוח F קבוע בכיוון ציר ה- x .

נתון כי היוי מתחילה את תנועתו מנוחה וכי הוא מתגלגל ללא חילקה (היוי זו בציר ה- x). כמו כן כל אותן בגוף השאלה נתונה.




- מהו מומנט ההתמד של היוי?
- מהי תאוצת מרכזו המסה של היוי?
- מהו מיקום היוי כפונקציה של הזמן?
- הנקודה B נמצאת על קצה הגליל ובודיק מעל מרכזו ב- $t=0$. מצא את מיקום הנקודה כתלות בזמן.

14) עיפרון נופל*

עיפרון באורך L ניצב אנכית על משטח. ברגע מסוים הוא מתחילה ליפול ימינה. כאשר הזווית בין לבן האנק למשטח מגיעה ל- θ_1 העיפרון מתחילה להחליק.


- עבור זווית θ שבחן עדין אין החלקה $\theta_1 < \theta$.
- מצאו את המהירות הזוויתית של העיפרון ω .
- מצאו את התאוצה הזוויתית של העיפרון α .
- מצאו את התאוצה הקויה של מרכזו המסה של העיפון.
- מצאו את גודלו וכיוונו של כוח החיכוך.
- מצאו את הכוח הנורמלי.
- מצאו את מקדם החיכוך הסטטי μ_s .

15) גליל בתוך גליל*

גליל מלא ברדיוס R ומסה M המפולגת אחידה מתגלגל ללא חילקה בתוך גליל גדול ודק שרדיוסו $4R$. הגליל הגדל מקובע במקומו.

- א. נתון שמהירות מרכזו המסה של הגליל הקטן כאשר הוא בגובה מרכזו הגליל הגדל ובדרךו מטה היא v_0 . מהו גודלו וכיוונו של כוח החיכוך הפועל על הגליל בנקודת זה? ומהו התנאי על v_0 כך שיתאפשר גלגול ללא חילקה אם מקדם החיכוך μ נתון?

- ב. מהי מהירות מרכזו המסה של הגליל הקטן כאשר הוא בתחתית הגליל הגדל?
ג. כאשר הגליל הקטן נמצא בתחתית הגליל, פוגע בו קליע נקודתי, גם הוא בעל מסה M הנע ישר כלפי מטה. הקליע נדבק לשפת הגליל לבדוק מעלה מרכזו ונע עמו (זמן התנגשות קצר מאוד וניתן להזניח את השפעת החיכוך עם הגליל הגדל בהתנסחות).
שים לב שלאחר הפגיעה הגלגול כבר לא חייב להיות ללא חילקה. מצא את מהירות מרכזו הגליל (לא מרכזו המסה) לאחר הפגיעה.


16) תיבה מתנגשת באבן*

תיבה דו מימדיות בגודל $a \times b$ ומסה M נעה על משטח אופקי חלק ב מהירות v_0 .

ברגע מסוים התיבה מתנגשת בתנגשות אלסטית באבן עם מסה m הנמצאת במנוחה על המשטח. כתוצאה מההתנגשות התיבה ממשיכה בתנועה ימינה אך גם מתחילה להסתובב.

ניתן להניח שהפינה הימנית תחתונה של התיבה כל הזמן נוגעת בקרקע.

- א. מה התנאי על v_0 כך שהතיבה לא תתפרק?
ב. מה קורה לתנאי של סעיף א' אם $b < a$?

**17) שני גלים מחוברים בחולות על מדרון משופע***

שני גלים בעלי מסה $m = 3\text{kg}$ ורדיוס $R = 20\text{cm}$ כל אחד, מחוברים בחולות אידיאלי וمتגלגלים יחד ללא חילקה במורד מדרון. זווית המדרון היא 30° . התפלגות המסה של הגלילים אינה אחידה ומומנטיהם

הסתמדים שלם סביב מרכזו המסה נתונים: $I_1 = 50\text{kg} \cdot \text{cm}^2$, $I_2 = 90\text{kg} \cdot \text{cm}^2$ מהי המתייחסות בחולות המחבר בין הגלילים?

תשובות סופיות:

$$t = \sqrt{\frac{4h}{g}} \text{ . ב.} \quad a = \frac{g}{2} \text{ . נ. } \quad (1)$$

$$a = \frac{(m_1 - m_2)g}{\frac{1}{2}M + m_1 + m_2} \quad (2)$$

ראה סרטון. **(3)**

$$g. \text{ נפילה חופשית.} \quad mgh = \frac{1}{2}mv^2 \quad \text{ב.} \quad mgh = mv^2, a = \frac{g}{2}, t = \frac{1}{2}\left(\frac{g}{2}\right)t^2 \text{ . נ. } \quad (4)$$

$$\Delta E = \frac{1}{2}I_1\omega_0^2 - \frac{1}{2}(I_1 + I_2)\omega_1^2 \text{ . ב.} \quad \omega_1 = \omega_0 \frac{I_1}{I_1 + I_2} \text{ . נ. } \quad (5)$$

$$h = \frac{2}{5}R \quad (6)$$

$$F \frac{1}{3}(1 + \cos \varphi), \frac{1}{3}F \cdot \lambda \quad a = \frac{4}{3} \frac{F}{m} \text{ . ב.} \quad a = \frac{4}{3} \frac{F}{m} \text{ . נ. } \quad (7)$$

$$\Delta E = \frac{1}{2}I_1\omega_1^2 - \frac{1}{2}I_0\omega_0^2 \text{ . ב.} \quad \omega_1 = \omega_0 \cdot 4 \text{ . נ. } \quad (8)$$

ראה סרטון. **(9)**ראה סרטון. **(10)**

$$\text{ב. אין שינוי.} \quad g \cdot \sqrt{\frac{8g}{3l}} \quad \text{נ.} \quad \sqrt{\frac{g}{6l}} \quad (11)$$

$$\sqrt{\frac{3}{4}gls \sin \theta_0} \quad (12)$$

$$F + \frac{Fr - I \frac{a}{R}}{R} = (m+2M)(a) \text{ . ב.} \quad I = 2 \frac{1}{2}MR^2 + \frac{1}{2}mr^2 \text{ . נ. } \quad (13)$$

$$B_x = \frac{1}{2}at^2 + R \sin\left(\frac{1}{2}\alpha t^2\right), B_y = R \cos\left(\frac{1}{2}\alpha t^2\right) \cdot \tau \quad x_{(t)} = \frac{1}{2}at^2 \cdot \lambda$$

$$\vec{a} = -\omega^2 r \hat{r} + \alpha r \hat{\theta} \quad .iii \quad \alpha = \frac{3g}{2L} \sin \theta \quad .ii \quad \omega = \sqrt{3 \frac{g}{L} (1 - \cos \theta)} \quad .i.N \quad (14)$$

$$\sum F_y = m(-a_r \cos \theta - a_\theta \sin \theta) \quad .v \quad \sum F_x = m(-a_r \sin \theta + a_\theta \cos \theta) \quad .iv$$

$$f_{s_{\max}}(\theta_1) = \mu_s N(\theta_1) \text{ . ב.}$$

$$v_0 = \frac{1}{2}v_1 \cdot \lambda \quad v_1 = \sqrt{v_0^2 + 4gR} \quad .\mathbf{v} \quad f_s = \frac{mg}{3}, v_0 \geq \sqrt{\frac{Rg}{\mu_s}} \text{ . נ. } \quad (15)$$

$$v_0 = \frac{1}{b} \sqrt{\frac{g}{3} \left(\sqrt{a^2 + b^2} - b \right)} \cdot \left(\frac{2(a^2 + b^2)}{\sqrt{(2a)^2 + b^2}} + \frac{M\sqrt{4a^2 + b^2}}{2m} \right) . \text{ נ } \quad (16)$$


$$v_0 = \sqrt{\frac{g}{6b}} \cdot a \cdot \left(2 + \frac{M}{2m} \right) . \text{ ב}$$

$$T \approx 0.22N \quad (17)$$

תרגילים מסכימים כולל פרטציה:

שאלות:

1) מטבע בזווית



נתונה דסקה המתגלגלת ללא החלקה במעגל ברדיוס R ב מהירות זוויתית ω .

נתון גם רדיוס הדסקה.

מצא את זווית ההטיה של הדסקה.

2) גלגל הקשור בחוט עם זווית

גלגל ברדיוס R ומסה m מחובר במרכזו לציר חסר

מסה באורך D . הציר מחובר בקצתו השני לחוט

באורך d הקשור לתקירה ויוצר זווית β עם האנך לתקירה.

מסובבים את הגלגל סביב הציר הרדיאלי העובר במרכזו

ב מהירות זוויתית קבועה: $\dot{\theta}_0 = \vec{\omega}$.


א. لأن ינוע מרכזו המסה של הגלגל ברגע הראשוני?

ב. מצא את גודלה של הזווית β .

הנח שהזווית קטנה וניתן להשתמש בקירוב של זוויתות

קטנות: $\sin \beta \approx \beta$, $\cos \beta \approx 1$.

התיחס לגלגל כחישוק.



תשובות סופיות:

$$\tan(\varphi) = \frac{2gR}{3v^2} \quad (1)$$

$$\beta = \frac{gD^3}{\omega_0^2 R^4 - dgD^2} \quad (2)$$

א. מרכזו המסה יצא מהזווית.

פיזיקה 1 מכניתה


פרק 20 - תנועה הרמוניית -

תוכן העניינים

233	1. תנועה הרמוניית פשוטה.....
236	2. בור פוטנציאלי.....
238	3. תנועה הרמוניית מרוסנת.....
240	4. תנועה הרמוניית מאולצת.....
242	5. תרגילים מסכמים.....
245	6. תרגילים מסכמים (מטוטלות שונות)
248	7. תרגילים למתקדמים.....
251	8. תרגילים לבקשת סטודנטים.....

תנועה הרמוניית פשוטה:


שאלות:



1) מסה מתנוגשת במסה

מסה m מונחת על שולחן ללא חיכוך ומחוברת לקפיץ המחבר לקיר בעל קבוע קפוץ k . מונחים את המסה מרחק d מהמקום בו הקפוץ רופיע ומשחררים ממנוחה. מצא את (t) של המסה.

2) מסה על שולחן מחוברת למסה תלוייה



מסה m_1 מונחת על שולחן ללא חיכוך ומחוברת לקפוץ בעל קבוע k . ממסה יוצאת חוט העובר דרך גלגלת אידיאלית וקשרו למסה נוספת הingesת התלויה באוויר M .

א. מצא את נקודת שיווי המשקל של המערכת (קבע את הראשית בנקודת שבה הקפוץ רופיע).

ב. מצא את תדריות התנועה של המערכת.


ג. מהי האמפליטודה המקסימלית האפשרית לתנועה כך שהמתיחות בחוט לא תתאפס במהלך התנועה?

3) דוגמה - מטוטלת מתמטית (עם מומנטים)


נתונה מטוטלת (מתמטית) התלויה מהתקarra. אורך החוט של המטוטלת הוא l .

מצא את תדריות התנועות הקטנות ואת הזווית כפונקציה של הזמן.

הנח כי המטוטלת מתחילה את תנועתה ממנוחה בזווית ידועה θ (דרך מומנטים).



$$\theta \ll \pi$$



4) דוגמה - דיסקה עם חור


מצא את תדריות התנועות הקטנות של דיסקה בעלת מסה M ורדיוס R אם ידוע כי במרחק R ממרכז הדיסקה קדחן חור ברדיוס רביעי R (הדיסקה מחוברת במסמר במרכז אל הקיר).

5) דוגמה - מטוטלת מתמטית (עם אנרגיה)

נתונה מטוטלת (מתמטית) תלוייה מהתקשה.

אורך החוט של המטוטלת הוא l .

מצא את תדריות התנודות הקטנות ואת הזווית כפונקציה של הזמן.

הנח כי המטוטלת מתחילה את תנועתה ממנוחה בזווית ידועה θ (דרך אנרגיה).

$$\theta \ll \pi$$

6) גליל מחובר לקפיץ מתגלגל ללא חילקהגליל בעל מסה m ורדיוס R נמצא על משטח אופקי

לא חלק ומוחבר באמצעות קפיצ אל הקיר.

קבוע הקפיצ הוא k והוא מחובר למרכו של הגליל.

הנח שתנועת הגליל אופקית בלבד והוא מתגלגל ללא חילקה על המשטח.

מצא את תדריות התנודות הקטנות.

פתרונות פעם אחד באמצעות אנרגיה ופעם נוספת באמצעות כוחות ומומנטים.

**7) גלגלת מסה וקפיץ**במערכת הבאה, המסה m_1 קשורה בחוט דרך גלגלת אל קפיצ המוחבר לקרקע. הגלגלת אינה איזידלית.נתון: R רדיוס הגלגלת, m_2 מסת הגלגלת, k קבוע הקפיצ.


הנח כי החוט לא מחליק על הגלגלת.

א. מצא את נקודת שיווי המשקל.

ב. מצא את תדריות התנודה.

ג. מושכים את המסה אורך d מנקודת שיווי המשקל.מהו d_{\max} המרחק המקסימלי שנייתן לשוזך את המסה

ambilי שהמתיחות בחוט תתאפס במהלך התנועה?


**8) מוט תלוי מחובר עם קפיצ לקיר**מוט בעל אורך L ומסה M (התפלגות אחידה)

תלויה מהתקשה וחופשי להסתובב סביב נקודת התלייה.

קצתו השני של המוט מחובר בקפיצ, בעל קבוע k לקיר.

הקפיצ רופיע כאשר המוט נמצא מאונך לתקרת.

א. הראה כי תנועת המוט בזווית קטנות היא תנועה הרמוניית ומצא את תדריות התנועה.

ב. מצא את הזווית של המוט כפונקציה של הזמן אם המוט משוחרר ממנוחה בזווית נתונה θ_0 .

תשובות סופיות:

$$x(t) = -\frac{v_0}{2} \sqrt{\frac{2m}{k}} \cos\left(\sqrt{\frac{k}{2m}}t + \frac{\pi}{2}\right) + x_0 \quad (1)$$

$$A_{\max} = \frac{g}{\omega^2} \quad . \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m_1+m_2}} \quad . \quad x = \frac{m_2 g}{k} \quad . \quad (2)$$

$$\theta(t=0) = -\omega A \sin \varphi \quad (3)$$

$$-\left(\frac{16}{247} \frac{g}{R}\right)(\theta - 0) = \ddot{\theta} \quad (4)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}, \quad \theta(t) = A \cos(\omega t + \varphi) \quad (5)$$

$$E = \frac{3}{4} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k x^2 \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{2k}{3m}} \quad . \quad (6) \quad \text{באמצעות אנרגיה:}$$

$$\sum F_x = -k(x - x_3) = m \ddot{x} \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{2k}{3m}} \quad . \quad \text{באמצעות כוחות ומומנטים:}$$

$$d_{\max} = \frac{m_1 g}{k} \quad . \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m_1 + \frac{1}{2} m_2}} \quad . \quad x_0 = \frac{m_1 g}{k} \quad . \quad (7)$$

$$\theta(t) = \theta_0 \cos\left(\sqrt{\frac{k^+}{m^+}} t\right) \quad . \quad \omega = \sqrt{\frac{k^+}{m^+}} \quad . \quad (8)$$

בור פוטנציאלי:

שאלות:

1) פוטנציאל לנארד-ג'ונס

פונקציית הפוטנציאל של לנארד ג'ונס מתארת את האינטראקציה בין אטומים

$$U(r) = \epsilon \left[\left(\frac{r_0}{r} \right)^{12} - 2 \left(\frac{r_0}{r} \right)^6 \right]$$

כאשר ϵ ו- r_0 קבועים ו- r הוא המרחק בין המולקולות. מצא את התדריות של תנודות קטנות סביב שיווי משקל של המערכת. ניתן להניח שמדובר בחלקיק אחד במשקל m המרגיש את הפוטנציאל מחלקיק שני במשקל M הנשאר נייח ($M \ll m$).

2) מטוטלת מתמטית וקפיץ עם אנרגיות

מטוטלת עם מסה m תלולה מהתקלה באמצעות חוט באורך L .


kosherim למסה קפיז בעל קבוע k המחבר אופקית לקיר.

הקפיז במצב רפי כאשר החוט מאונך לתקרה.

מזיזים את המסה זווית קטנה θ ימינה ומשחררים ממנוחה.

א. מצאו את הזווית של המסה כתלות בזמן.

ב. מהי המתייחסות בחוט כאשר המוט נמצא במצב א נכי תוך כדי תנועה.



3) עיפרון עם מוטות בשוויי משקל

הגוף שבאיור מורכב מעיפרון בעל מסה זניחה ואורך L .

לקצה של העיפרון מחוברים שני כדורים בעלי מסה m

באמצעות מקלות דקים חסרי מסה באורך l ובזווית α .


מניחים את הגוף על מעמד ומטילים אותו בזווית θ במישור הדף.

א. רשמו את האנרגיה הפוטנציאלית של הגוף כתלות בזווית θ .

ב. באיזו זווית θ יהיה הגוף בשוויי משקל?

ג. מה התנאי לכך ששוויי המשקל יהיה יציב?

ד. מהו זמן המחזור של התנדות סביב נקודת שוויי המשקל?



תשובות סופיות:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{72\varepsilon}{mv_0}} \quad (1)$$

$$T = mg + (mg + kL)\theta_0^2 \cdot \text{ב} \quad \theta(t) = \theta_0 \cos\left(\sqrt{\frac{mg + kL}{mL}} \cdot t\right) \cdot \text{א} \quad (2)$$


$$L < l \cos \alpha \cdot \text{ג} \quad \theta = 0 \cdot \text{ב} \quad U = 2mg(L - l \cos \alpha) \cos \theta \cdot \text{א} \quad (3)$$

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{l \cos \alpha - L}{L^2 + l^2 - 2Ll \cos \alpha}}} \cdot \text{ט}$$

תנועה הרמוניית מרוסנת:

שאלות:


1) כדור במיכל מים



כדור בעל מסה m ורדיויס R נמצא בתחום מיכל מים ומחובר באמצעות קפיץ אופקי לדופן המיכל. קבוע הקפיץ הוא k . בתנועת הגוף במים, מפעלים המים על הכדור כוח התנגדות המתכוונתי וההפוך למחרותו. כוח זה נקרא כוח סטוקס וגודלו הוא: $-6\pi R^2 \eta \ddot{x}$. כאשר \ddot{x} היא צמיגות המים ו- R הוא רדיוס הכדור.

התיחס ל- m , k , η , R נתונים ומצא את תדירות התנודות של הכדור בהנחה ש- $R < \frac{\sqrt{mk}}{3\pi\eta}$.

2) שני קפיצים בנוזל



כדור נמצא בתחום תיבת מלאה במים ומחובר עם קפוץ אידיאלי לקצה העליון של התיבה ועם קפוץ אידיאלי נוסף זהה לקצה התיכון של התיבה.

נתון: R - רדיוס הכדור, ρ_b - צפיפות המסה של הכדור, ρ_l - צפיפות המסה של המים, K - קבוע שני הקפיצים ו- η - צמיגות המים.

(תזכורת: כאשר כדור מצוי בתחום נוזל פועלים עליו כוח ציפה: $F = \rho_l V g$ וכוח סטוקס: $F = 6\pi R \eta \ddot{x}$).

א. מצא את נקודת שיווי המשקל של המערכת.

ב. מה התנאי שייהו תנודות הרמוניות?

מצא את התדירות בהנחה שתנודות אלו מתקינות.

ג. מצא את התנאי בו יחולר הכדור כדי מהר לנקודת שיווי המשקל.

3) איבוד אנרגיה במחזור

בתנועה הרמוניית מרוסנת קיימים ריסוון חלש כך שהאמפליטודה של התנועה יורדת ב-2.5 אחוז כל מחזור. בכמה אחוז יורדת האנרגיה בכל מחזור?

4) משקלות במיכל מים תלוייה מהתקרה

משקלות שמסתה : $M = 1\text{kg}$ נמצאת במיכל מים ומחוברת לתקרה באמצעות כפץ בעל קבוע : $\frac{N}{m} = 20 = k$. כוח הה拮נות שפעילים המים הוא מהצורה של : $\vec{F} = -\lambda \vec{t}$ כאשר : $\lambda = \frac{\text{kg}}{\text{sec}} = 4$ ו- \vec{t} היא מהירות המסה. הניחו שהמשקלות אינה יוצאת מהמים ואנייה פוגעת ברצפה.

- א. תוק כמה זמן תרד האמפליטודה לחמישית מגודלה ההתחלתית?
(הניחו שהפאזה היא אפס)

ב. לאחר כמה מחזוריים זה יקרה?

5) מסה באmbט מים וدبש

מסה : $m = 2\text{kg}$ נמצאת באmbט מלא מים, המסה מחוברת באמצעות שני קבועים והם בעלי קבוע : $\frac{N}{m} = 25 = k$ לשתי דפנות האmbט ונעה ללא חיכוך עם ריצפת האmbט. מזיזים את המסה 0.5m מנקודת שיווי המשקל ומשחררים ממנה. התגנות המים מפעילה כוח גראן : $\vec{F} = -\lambda \vec{t}$ כאשר : $\lambda = \frac{\text{kg}}{\text{sec}} = 10$.

- א. מהו העתק המסה כתלות בזמן?
ב. מחליפים את המים בדבש מה שמנגדיל את λ פי $\sqrt{2}$. מזיזים שוב את המסה 0.5m ומשחררים, מהו העתק המסה כתלות בזמן?

תשובות סופיות:

$$\tilde{\omega} = \sqrt{\frac{k}{m} - \left(\frac{3\pi R \eta}{m}\right)^2} \quad (1)$$

$$\frac{2K}{m} = \frac{6\pi\eta R^2}{2m} \quad \text{ג.} \quad \omega^* = \sqrt{\frac{2K}{m} - \left(\frac{6\pi\eta R}{2m}\right)^2} \quad \text{ב.} \quad y_{eq} = \frac{F_b}{2K} \quad \text{א.} \quad (2)$$


5% (3)

ב. בערך מחזור אחד. 1.6 sec. א. (4)

$$x(t) = \left(\frac{1}{2} + \frac{5}{\sqrt{2}}t\right)e^{-5\sqrt{2}t} \quad \text{ב.} \quad x(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{-5t} \cos\left(5t + \frac{\pi}{4}\right) \quad \text{א.} \quad (5)$$

תנועה הרמוניית מאולצת:

שאלות:



על המסה פועל כוח גרא: $-F = -bv$. ב- $t=0$ הקירות מתחילה לוזו. ראשית הזרמים ממוקמת במרכז התנועה של הקיר השמאלי והכוון החיווי ימינה. מיקום הקירות כתלות בזמן הוא: $x_1(t) = d \sin(\omega t)$, $x_2(t) = 2L + 2d \sin(\omega t)$. נתונים: m , d , L , ω , b .


- מהי תדירות התנועה ומהי האמפליטודה?
- מה התנאי לתהודה בהנחה כי הריסון חלש מאוד?

2) מציאת תדרות רביע אמפליטודה

מסה m מחוברת לקפיץ אופקי בעל קבוע k , המסה נעה על מישור חלק ללא חיכוך. על המסה פועל כוח גרא: $-F = -f \cdot \cos(\omega t)$ וכוח מאלץ: $f = b \cdot v$. מצא את תדרות הכוח בה אמפליטודת התנועה במצב העמיד תהיה רביע מהאמפליטודה המקסימלית. הנח כי: $d = \sqrt{mk}$, m , b , k , ω נתונים וכי:

3) מסה תלולה על קרש נע

מסה M מחוברת באמצעות קפיץ אנכי לקרש אופקי הנע בציר ה- y לפי: $y(t) = y_0 \cos(\omega t)$.



קבוע הקפיץ k ואורכו הרפווי l_0 נתונים. מצא את מיקום המסה כפונקציה של הזמן.

תשובות סופיות:


$$\omega \sim \sqrt{\frac{2k}{m}} \quad \text{ב.} \quad A(\omega) = \frac{\frac{3kd}{m}}{\sqrt{\left(\frac{2k}{m} - \omega^2\right)^2 + \left(\frac{b}{m}\right)^2 \omega^2}} \quad \text{א.} \quad (1)$$

$$\omega_{1,2} = \sqrt{\frac{B \pm \sqrt{B^2 - 4C}}{2}} \quad (2)$$

$$y(t) = \frac{\frac{F_0}{m}}{\frac{k}{m} - \omega^2} \cos \omega t + y'_0 \quad (3)$$

תרגילים מסכימים:


שאלות:



1) דיסקה כפולה מסה וקפיץ


נתונה דיסקה ממושמתה במרכזה לקיר (כלומר הדיסקה יכולה להסתובב אך לא לנוע מעלה ומטה). הדיסקה בנויה משתי דיסקות מודבקות בעלות רדיוס r לדיסקה הקטנה ו- R לדיסקה הגדולה. סיבוב הדיסקות מלווה חוטים כמתואר בשרטוט. עוד נתון כי אין החלקה לחוטים.

- מצאו את תדריות התנודות.
- מהי האנרגיה הכוללת של המערכת?



2) מוט על שני גלגלים

מוט בעל מסה M מונח על שני גלגלים המקובעים במרכזם. הגלגלים מסתובבים במהירות זוויתית ω כך שהגלגל הימני מסתובב נגד כיוון השעון והشمالي עמו כיוון השעון. בין המוט והגלגלים קיימים חיכוך ומקדם החיכוך הקינטי נתון. מניחים את המוט כך שמרכזו נמצא במרחק A מהמרכז בין הגלגלים. מצא את תדריות התנודה של המוט.




3) מסה על משטח על קפיץ אנכי

על קפיץ שקבועו א' מונח משטח שמסתו m_1 , המשטח צמוד לקצוות של הקפיץ. על המשטח מונח גוף שמסתו m_2 . מכוחים את הקפיץ בשיעור Δy ומשחררים.

א. מה צריך להיות Δy_{\min} כדי שהגוף יתנתק מן המשטח באיזה שהוא שלב?


ב. הניחו: $m_2 = 0.06\text{kg}$, $m_1 = 0.04\text{kg}$, $k = 10 \frac{\text{Nr}}{\text{m}}$, $\Delta y = 2\Delta y_{\min}$ ומצאו את רגע הניתוק.

ג. באמצעות הנתונים המופיעים מסעיף ב', מהו מקומו ומהירותו של המשטח ברגע שהגוף ניתק מן המשטח?



4) משטח על דיסקה מחובר לקפיץ

נתונה מערכת כבשותות (אין החלקה במערכת).
מהי תדירות?



5) תנודה בתעלת כדורי

בתוך כדור הארץ נחרפה תעלה כבשותות.
מסת כדור הארץ M .

מהי תדירות התנודות הקטנות של מסה החופשית לנوع בתעלת?

6) שתי מסות מחוברות בקפיץ**

שתי מסות m_1 ו- m_2 מחוברות בקפיץ בעל קבוע k ואורך רפי l .
הmassות נמצאות במנוחה על מישור אופקי חלק.

נתנים דחיפה ימינה למסה m_1 המKENה לה מהירות ההתחלתית v_0 .

א. מהי תדירות התנודות של התנועה (כתלות בנתוני הפעיה)?

רמז : על מנת לפתור את המשוואות יש להחליף משתנים
-ל-

$$x_{c.m.} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}; x_{rel} = x_1 - x_2$$

ב. מצאו את מיקום המסה m_2 כתלות בזמן.

תשובות סופיות:

$$E_{\text{total}} = \frac{1}{2}Kx^2 - mgx + \frac{1}{2}I\omega^2 + \frac{1}{2}m\dot{x}^2 \quad \text{ב.ג.} \quad \sqrt{\frac{2kR}{\frac{1}{2}MR + \frac{r^2}{R}}} \cdot \omega \quad \text{(1)}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{\mu_k g}{d}} \quad \text{(2)}$$

$$t_1 = \frac{1}{\omega} \cos^{-1} \left(-\frac{1}{2} \right) \cdot \text{ב.ג.} \quad \Delta y_{\min} = \frac{(m_1 + m_2)}{k} \cdot \omega \quad \text{(3)}$$

$$v(t) = \dot{y}(t) = -2\Delta y_{\min} \omega \sin(\omega t), \Delta y_{\min} = \frac{(m_1 + m_2)}{k} \cdot \omega \quad \text{(3)}$$

$$\ddot{x} = -\left(\frac{K}{m+2M} \right) x \quad \text{(4)}$$

$$\ddot{x} = -\left(\frac{M}{R^3} \right) (x - 0) \quad \text{(5)}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}}, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \cdot \omega \quad \text{(6)}$$

$$, \quad A = \frac{\sqrt{v_0^2 + l^2 \omega^2}}{\omega}, \quad x_2(t) = \frac{m_1}{m_1 + m} (l + v_0 t) - \frac{m_1}{m_1 + m_2} A \cos(\omega t + \varphi) \quad \text{ב.ג.}$$

$$\tan \varphi = -\frac{v_0}{\omega l}$$

תרגילים מסכימים (מטוטלות שונות):

שאלות:

1) שני חצאי דיסקה

נתונים שני חצאי דיסקה התלויים על מסמר כמתואר בشرطוט.

מסת הדיסקה ורדיוסה נתונים.

מצא את התדריות של כל אחד מחצאי הדיסקה.



2) חצי חישוק ושתי מסות

מצא את תדריות חצי החישוק שבתמונה.

רדיוס R ומסתו M , בקצבותיו חוברו שתי מסות m .

הчисוק תלוי ממסמר בקודקודה.



3) מטוטלת על עגלה נעה

עגלה בעלת מסה m_2 חופשיה לנוע על משטח אופקי ללא חיכוך.

אל העגלה מחובר מוט אנכי עליו תליה מטוטלת מתמטית עם מסה m_1 ואורך חוט a .

משחררים את המסה (של המטוטלת) בזווית נתונה כאשר כל המערכת נמצא במנוחה.


א. רשמו את מהירות המטוטלת במערכת העגלה כפונקציה של θ ו- $\dot{\theta}$.

ב. רשמו את מהירות העגלה והמטוטלת כפונקציה של θ ו- $\dot{\theta}$.

ג. רשמו את משוואת שימור האנרגיה המכנית של המערכת.

ד. רשמו את משוואת שימור האנרגיה בתנודות קטנות.

ה. מצאו את תדריות התנודה של המסה M .



4) קפיז מוט ומסה

נתונה מסה m המחברת לקפיז בעל קבוע k .

המסה גם מחוברת למוט חסר מסה בעל אורך l .


המוט מחובר לרצפה בציר המאפשר לו להסתובב.

המערכת בשרטוט נמצא במצב שיווי משקל.

א. מהי תנודות התנודות הקטנות של המערכת?

ב. מהי המסה המקסימלית שתאפשר תנודות זו?



5) מטוטלת בשדה מגנטי

מטוטלת מתמטית שאורכה L , מסתה m ומטענה q נתונה בשדה מגנטי אופקי B היוצא מהדף. השדה המגנטי יוצר כוח מגנטי על המטוטלת כאשר היא בתנועה לפי הנוסחה: $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$.

- מצא את הכוחות הפועלים על המטוטלת במהלך התנועה כתלות בזווית θ ובמהירות v .
- מסיטים את המטוטלת זווית קטנה θ_0 ומשחררים במנוחה. מצא את משוואת התנועה של המטוטלת ומשם את מיקום המטוטלת כתלות בזמן עברו זווית קטנות.
- מהי הਮתייחות בחוט כתלות בזמן.
- מהי המтиיחות המקסימלית בחוט ובאיזה זווית ומהירות מצב זה מתרחש?

תשובות סופיות:

$$\text{דיסקה 2 : ראה סרטוון.} \quad \text{דיסקה 1 : } -\left(\frac{A}{B}\right) \cdot (\theta - (0)) = \ddot{\theta} \quad \text{(1)}$$

$$-\frac{(2m+M) \cdot gb}{I} \theta = \ddot{\theta} \quad \text{(2)}$$

$$v_x = \dot{\theta}a \cos \theta, v_y = \dot{\theta}a \sin \theta \quad \text{א. 3}$$

$$v_{I_x} = \left(1 + \frac{m_1}{m_2}\right)^{-1} a \dot{\theta} \cos \theta, v_{I_y} = \dot{\theta} a \sin \theta \quad \text{ב.}$$

$$E = \frac{1}{2} m_1 \left(\left(1 + \frac{m_1}{m_2}\right) \left(1 + \frac{m_1}{m_2}\right) \right)^{-2} a^2 \dot{\theta}^2 \cos^2 \theta + \dot{\theta}^2 a^2 \sin^2 \theta - m_1 g a \cos \theta \quad \text{ג.}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{\frac{ga^2}{2}}{\left(1 + \frac{m_1}{m_2}\right)^{-1} a^2}} \quad \text{ה.} \quad E = \frac{1}{2} m_1 \left(\left(1 + \frac{m_1}{m_2}\right)^{-1} a^2 \dot{\theta}^2 + \frac{ga}{2} \theta^2 \right) - m_1 g a \frac{1}{2} \quad \text{ט}$$

$$m < \frac{lk}{gv} \quad \text{ב.} \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{g}{l}} > 0 \quad \text{א. 4}$$


$$\theta(t) = \theta_0 \cos \left(\sqrt{\frac{g}{L}} t \right) \quad \text{ב.} \quad \text{כיוון החוצה מהמעגל.} \quad \vec{F} = qvB \quad \text{א. 5}$$

$$\theta_0 \ll \frac{2qB}{m} \sqrt{\frac{L}{g}} \quad \text{עבור} \quad T(t) = -qB \sqrt{gL} \theta_0 \sin \left(\sqrt{\frac{g}{L}} t \right) + mg \quad \text{ג.}$$


$$T_{\max} = mg + qB \sqrt{gL} \theta_0 \quad \text{ט}$$

תרגילים למתקדמים:


שאלות:



- 1) מסה בין שני קפיצים עם אורך זניח**
 בין שני קירות במרחק L נמצאת מסה m המחברת לקירות בקפיצים בעלי מקדם k ואורך רפי זניח.
 א. מצא את תדריות התנודות הקטנות בציר ה- x .
 ב. מצא את תדריות התנודות הקטנות בציר ה- y .




- 2) מסה בין שני קפיצים** (אורך רפי לא זניח)**
 בין שני קירות במרחק L נמצאת מסה m המחברת לקירות בקפיצים בעלי מקדם k ואורך רפי l_0 .
 מצא את תדריות התנודות הקטנות בציר ה- y .




- 3) מוט על חצי כדור****
 מוט בעל אורך l ומסה m מונח על כדור בעל רדיוס R .
 א. מצא את תדריות התנודות הקטנות של המוט.
 ב. מצא את גובה מרכז המסה של המוט כפונקציה של זווית ההטייה.



- 4) עכבייש בשוויי משקל יציב***
 מוט בעל מסה M ואורך l מחובר ברבע מגובהו לציר. מתחתיית המוט עכבייש בעל מסה m מטפס כלפי מעלה. מצא את תדריות המערכת כפונקציה של מיקום העכבייש ומוצא את משקל העכבייש המקסימלי שישאיר את המערכת בשוויי משקל יציב.




- 5) תיבה על כיפה חצי כדורית****
 תיבה שטסהה M מונחת על כיפה גלילית חצי עגולה ברדיוס R . גודל התיבה הוא $2a \times 2b$.
 מניחים את התיבה על ראש הכיפה כך שמרכזה בדיקוק מעל מרכז הכיפה. לאחר מכן מטים את התיבה מעט הצידה כך שהיא מתגלגת ללא החלקה על הכיפה.
 מצא את תדריות התנודות הקטנות של התיבה על ראש הכיפה מה התנאי שהיו תנודות?



**6) מסה בתוך חישוק מסתובב
(כולל קוריואלייס וקורודיניות פולריות)**

גוף שמסתו m נמצא במרכז תעלת הנמצאת לאורך קוטרו של חישוק. המערכת מונחת על השולחן כך שכוח הכבידת לתוכה הגוף. הגוף מחובר לשני קבועים זהים אחד מכל צד המצויים במצב הרפיי כאשר הגוף במרכז החישוק. קבוע הקבועים הוא a . מסובבים את החישוק ב מהירות זוויתית Ω ומרחיקים את המסה מעט מהמרכז. רשום משווה כוחות במערכת החישוק, מה התנאי לתנועה הרמוניית ומהי תדריות התנועה אם התנאי מתקיים? (מומלץ לפתור גם באמצעות ק. פולריות).



**7) מסה בתוך חישוק מסתובב עם חיכוך
(כולל קוואורדיניות פולריות, קוריואלייס, ותנועה מרוסנת)**

גוף שמסתו m נמצא במרכז תעלת הנמצאת לאורך קוטרו של חישוק. המערכת מונחת על השולחן כך שכוח הכבידת לתוכה הגוף. הגוף מחובר לשני קבועים זהים אחד מכל צד המצויים במצב הרפיי כאשר הגוף במרכז החישוק. קבוע הקבועים הוא a . מסובבים את החישוק ב מהירות זוויתית Ω ומשחררים את המסה ממנוחה במרקם d מהמרכז. בין המסה והדופן של התעלה קיים חיכוך (אין חיכוך עם הבסיס). מקדמי החיכוך הסטטי והקינטי הם: μ_k , μ_s .

א. רשום משווה כוחות במערכת החישוק, מהם התנאים לתנועה הרמוניית? האם צריך את מקדם החיכוך הסטטי?

ב. מצא את המיקום כתלות בזמן בהנחת התנאים של סעיף א', מהו מקדם האיכות של המערכת? (מומלץ לפתור גם באמצעות ק. פולריות).

תשובות סופיות:

$$\omega_y = \sqrt{\frac{2k}{m}} . \text{ב} \quad \omega_x = \sqrt{\frac{2k}{m}} . \text{א} \quad (1)$$

$$-\left(2k \frac{L \cdot l_0}{L}\right)y = \ddot{y} \quad (2)$$

$$y_{c.m} = R \left(1 + \frac{\theta^2}{2}\right) . \text{ב} \quad \omega = \sqrt{\frac{12gR}{l^2}} . \text{א} \quad (3)$$

$$-\left(m'g \frac{C}{I}\right)\theta = \ddot{\theta} \quad (4)$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g(R-a)}{\frac{1}{3}(a^2+b^2)+a^2}} \quad (5)$$

$$(-2k - \Omega^2 m)x = m\ddot{x}, \quad 2k - \Omega^2 m > 0, \quad \omega = \sqrt{\frac{2k - m\Omega^2}{m}} \quad (6)$$

$$-2kx + m\Omega^2 x - 2\mu_k m\Omega \dot{x} = m\ddot{x}, \quad \Omega^2 \left(1 + \mu_k^2\right) < \frac{2k}{m} . \text{א} \quad (7)$$


$$Q = \frac{\omega_0}{\Gamma} = \frac{\sqrt{\frac{2k}{m}}}{2\mu_k \Omega}, \quad x(t) = e^{-\frac{\Gamma}{2}t} \left(d \cos(\tilde{\omega}t) - \frac{d\sqrt{1-\omega_0^2}}{\tilde{\omega}} \sin(\tilde{\omega}t) \right) . \text{ב}$$

תרגילים לבקשת סטודנטים:

שאלות:

1) כדור מתגלגל בциינור.

דיסקה בעלת רדיוס r מתגלגלת בתוך צינור מקובע לרצפה בעל רדיוס R . מותר להשתמש בקירות זוויתות קטנות ומותר להזניח את הרדיוס הקטן ביחד גדול.



- מה תהיה תזרירות התנודות הקטנות של הדיסקה, בהנחה שאין חיכוך?
- מה תהיה התשובה לסעיף א' אם יוסיפו חיכוך עם הרצפה והגלגול יהיה ללא חילקה?
- מה תהיה התזרירות עם בנוסף לחיכוך עם הרצפה יתווסף כוח חיכוך : $F = -bv$?

2) קפץ נמתח להतארכות מקסימלית

קליע בעל מסה זניחה נע במהירות לא ידועה לעבר מסה m_2 שמחוברת למסה m_1 דרך קפוץ בעל מקדם אלסטי k .




- המסה m_1 ניצבת בצדוד לקיר כמתואר בשרטוט. לאחר פגיעה הקליע הקפוץ מתכווץ במצב המקסימלי ומאביד d מאורכו. מהי מהירות מרכזו המסה מייד לאחר שהמערכת מתנתקת מהקיר?
- על מערכת בעלת נתוני זהים ואורך קפוץ d מופעל כוח קבוע F לכיוון המסתמן בציור. מה ההתארכות המקסימלית של הקפוץ?




3) דיסקה כפולה מסה וקפיז

נתונה דיסקה ממושמרת במרכזו לקיר (כלומר הדיסקה יכולה להסתובב אך לא לנוע מעלה ומטה). הדיסקה בניה משתי דיסקות מודבקות בעלות רדיוס r לדיסקה הקטנה ו- R לדיסקה הגדולה. שביב הדיסקות מלופפים חוטים כמתואר בשרטוט. עוד נתון כי אין חילקה לחוטים.

- מצא את תזרירות התנודות.
- מהי האנרגיה הכוללת של המערכת?



(4) הרמוניית עם גזירה של חוט ורק למי שמכיר את הנושא של תאוצות לא שווות) במערכת הבאה הגלגולות והקפיץ אידיאליים.



- קבוע הקפיץ הוא: $M = 4\text{kg}$ $k = 50 \frac{\text{N}}{\text{m}}$ והמסה: .
- מצאו את התארכויות הקפיץ במצב שיווי המשקל.
 - מה ההעתק של המשקולת במצב שיווי המשקל (ביחס למצבה כשהקפיץ רופוי).
 - מהי תדריות התנודות של המערכת?
 - モותחים את המשקולת מטה 20cm מנקודת שיווי המשקל ומשחררים ממנוחה.
- רשוו ביטוי למקומות של המשקולת כתלות בזמן.

תשובות סופיות:

$$\omega' = \sqrt{\omega_0^2 \cdot \left(\frac{b}{2}\right)^2} . \quad \omega = \sqrt{\frac{2g}{3R}} . \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{R}} . \quad (1)$$

$$\Delta = \frac{F}{2k + k \frac{m_2 - m_1}{m_1}} . \quad v_{c.m.} = \frac{\sqrt{\frac{k}{m_2}} d}{m_1 + m_2} . \quad (2)$$

$$E_{\text{total}} = \frac{1}{2} kx^2 - mgx + \frac{1}{2} I\omega^2 + \frac{1}{2} mx^2 . \quad \omega = \sqrt{\frac{kR}{\frac{1}{2}MR + \frac{r^2}{R}}} . \quad (3)$$

$$3.54 \frac{\text{rad}}{\text{sec}} . \quad 0.05\text{m} . \quad 0.2\text{m} . \quad (4)$$

$$x(t) = 0.2 \cos(3.54t) \text{ מישורי משקל.} . \quad (5)$$

פיזיקה 1 מכניתה

פרק 21 - כבידה וכוח מרכזי -

תוכן העניינים

253	1. תנועה תחת כוח מרכזי וכוח הכבוד
256	2. חוקי קפלר
257	3. תרגילים נוספים

תנועה תחת כוח מרכזי וכוח הכבוד:

שאלות:



- 1) טיל יוצא מכדה"א וחוזר טיל נוראה מכדור הארץ.

הטיל מתפרק מכדור הארץ וחוזר אליו בחזרה. נתון שבאיוזהה נקודה במסלול המרחק של הטיל מכדה"א הוא R_1 .


נתונה הזוויות בין R_1 ל מהירות באותו רגע v_1 היא 30 מעלות.

רדיויס כדה"א הוא R_E וזוויות הפגיעה של הטיל בצד"א היא θ .

א. מצא את: v_2 , v_0 , θ_0 . (מהירות פגעת הטיל בצד"א).

ב. חשב את: R_{\max} (המרחק המקסימלי של הטיל מכדה"א)

ו- v_{\min} (המהירות באותה נקודה).



- 2) חלק עף ב מהירות מילוט

חללית בעלת מסה m סובבת את כדה"א במסלול מעגלי ברדיוס R . ברגע מסוים החללית מתפצלת לשני חלקים. אחד החלקים בעל מסה של שלישי m עף בכיוון הרדייאלי ב מהירות המילוט.

מצא את הרדיוס המינימלי והמקסימלי של החלק השני.

- 3) פוטנציאלי אפקטיבי

גוף בעל מסה m נעה בתנועה מעגלית תחת השפעת הפוטנציאלי: $U(r) = -\frac{A}{\sqrt{r}}$

כאשר A קבוע נתון. נתון גם התנועה הزوיתית של הגוף T .

א. מצא את רדיוס המעגל.

ב. מצא את מהירות הגוף.


- 4) זמן מחזור

גוף בעל מסה m נעה בקו ישר (מייד אחד) תחת הפוטנציאלי: $U(x) = B|x|$.


נתון כי המרחק המינימלי אליו מגיע הגוף הוא A .

א. מצא את ערך האנרגיה הכללית של הגוף.

ב. מצא את זמן המחזור.

**5) גוף נע במנהרה למרחק מהמרכז**

גוף נע במנהרה הנמצאת למרחק $\frac{R}{2}$ ממרכז כדור בעל מסה M . הגוף מתחליל ממנוחה בקצת המנהרה ואין חיכוך. מצא את מיקום הגוף כפונקציה של הזמן.

**6) מדידת מסה של חור שחור**

חור שחור הינו גוף שמיימי כבד מאוד.

כדי למדוד את המסה M של חור שחור הנמצא למרחק גדול מאוד R מאנטו ובמנוחה ביחס אלינו, יורים לעברו טיל בעל מסה m הקטנה מאוד ביחס למסת החור.

המהירות ההתחלתית של הטיל היא v_0 והיא מוסטת בזווית δ קטנה מאוד לכיוון המדויק אל החור.

מכשור שנמצא על הטיל יכול להורות לנו מה הזווית φ אליו הוטט הטיל לאחר זמן רב ביחס לזווית ממנה התחיל. ניתן להניח כי האנרגיה הפוטנציאלית למרחק R זינחה.

א. מהי האקסצנטריות של מסלול הטיל סביב החור השחור?

מהו סוג המסלול? (מעגל, אליפסה או היפרבולה).

ב. מהי הזווית של מהירות הטיל לאחר שהתרחק מאוד מהחור ביחס לציר ה- x ?

ג. מצא קשר בין הזווית של סעיף ב' ל- φ ובטא את מסת החור

באמצעות: φ , δ , R , v_0 .

תשובות סופיות:

(1) ראה סרטון.

(2) ראה סרטון.

$$v = \frac{L}{m \left(\frac{2L^2}{mA} \right)^{\frac{2}{3}}} . \quad \text{ב.} \quad r_0 = \left(\frac{2L^2}{mA} \right)^{\frac{2}{3}} . \quad \text{א.} \quad (3)$$

$$T = 8A \sqrt{\frac{2B}{m}} . \quad \text{ב.} \quad E(x_{\max}) = 0 + B \cdot A . \quad \text{א.} \quad (4)$$

$$x(t) = -\frac{\sqrt{3}}{2} R \cos \left(\sqrt{\frac{GM}{R^3}} t \right) \quad (5)$$

$$\cos \theta = -\frac{1}{\varepsilon} . \quad \text{ב.} \quad \varepsilon = \sqrt{1 + \left(\frac{v_0^2 R \sin \delta}{GM} \right)^2} , \quad \text{א. היפרבולה,} \quad (6)$$

$$M = \frac{1}{G} v_0^2 R \sin \delta \tan \frac{\varphi}{2} . \quad \text{ג.}$$


חוקי קפלר:

שאלות:

1) **מציאת זמן מחזור**

גוף נע סיבוב המשמש במסלול אליפטי כך שמהירותו המקסימלית ומרחיקו המינימלי מהשמש נתוניים.

נתון גם שטח האליפסה שעשויה הגוף.
מצא את זמן המחזור של הגוף.




תשובות סופיות:

$$T = \left(\frac{r_{\min} v_{\max}}{2S} \right)^{-1} \quad (1)$$

תרגילים נוספים:

שאלות:



- 1) לוין נכנס למסלול אליפטי לוין נורח אנכית מפני כדה"א. הלוין מגיע לשיא גובה של $2R_E$. ברגע זה ניתנת לו מהירות בכוון 60 מעלות עם האנך לכדור הארץ שגודלה u . (הטעלים מסיבוב ותנועת כדור הארץ).
- א. מצא תנאי על המהירות u כך שהלוין ישאר במסלול סגור.
 ב. מצא תנאי נוסף על u כך שהלוין לא יפגע בכדור הארץ.

2) יקום דו מימי

ביקום דו מימי פועל כוח שמרכזו בנקודה (x_0, y_0)

$$\text{גודלו: } \frac{k}{\left((x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 \right)^{\frac{3}{4}}}. \text{ כיוון הכוח הוא תמיד לכיוון מרכזו.}$$

א. האם הכוח הוא כוח משמר? אם כן, מצא את האנרגיה הפוטנציאלית של הכוח.

חשב את העבודה שמבצע הכוח על מסה M אשר נעה בין הנקודות (x_1, y_1)

לבין הנקודה (x_2, y_2) .

ב. מסה M נמצאת במיקום (Bx_0, By_0) ויש לה מהירות: $\vec{v} = A(\hat{x} + \hat{y})$.

מה תהיה מהירות המסה כשהמרחק בין מרכזו הכוח יהיה d ?
 $(d, A, B, \text{ גדולים מאפס}).$


ג. מסה M נמצאת במרחב r ממרכז הכוח.

למסה מהירות v וידוע שהמסה נמצאת בשיווי משקל בכל זמן.

מצא קשר בין v לבין r .

ד. פצחה בעלת מסה M מסתובבת סביב מרכזו הכוח וברגע שגודל המהירות שלה הוא v_2 והמרחק שלה הוא r_2 , כיוון המהירות מאונך לכיוון המיקום שלה ביחס למרכז הכוח. באותו רגע הפצחה מתפוצצת לשני חלקים אחד בגודל m והשני בגודל $m-M$.

החלק $m-M$ ממשיך באותו כיוון מהירות כמו לפני הפיצוץ. מה צריכה להיות מהירות החלק m על מנת שהחלק $m-M$ יהיה במרחב קבוע ממרכז הכוח לאחר הפיצוץ והלאה?

**(3) פיתוח משוואת האליפסה**

באליפסה סכום המרחקים של כל נקודה משני המוקדים של האליפסה הוא קבוע ושווה ל- $2a$ (רוחב האליפסה).

נתונה אליפסה שהמוקדים שלה נמצאים בנקודות $(0,0)$ ו- $(-2c,0)$.

$$\varepsilon = \frac{c}{a} \quad r(\theta) = \frac{r_0}{1 + \varepsilon \cos \theta} \quad \text{כאשר}$$

$$r_0 = \frac{(a^2 - c^2)}{a}$$

תשובות סופיות:

$$\sqrt{\frac{GM}{2R_E}} < |u| < \sqrt{\frac{GM}{R_E}} . \quad \text{ב} \quad |u| < \sqrt{\frac{GM}{R_E}} . \quad \text{א} \quad (1)$$

$$, r' = \left((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad \text{U} \quad \text{כasher} \quad (r')^2 = -2kr'^{-\frac{1}{2}}, \quad \text{א. משמר}, \quad (2)$$

$$W = 2k \left[\left((x_2 - x_0)^2 + (y_2 - y_0)^2 \right)^{-\frac{1}{4}} - \left((x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 \right)^{-\frac{1}{4}} \right]$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{k}{m}} r_1^{-\frac{1}{4}} . \quad v = \left(2A^2 - \frac{4k}{m} \left[d^{-\frac{1}{2}} - (B-1)^{-\frac{1}{2}} \cdot (x_0^2 + y_0^2)^{-\frac{1}{4}} \right] \right)^{\frac{1}{2}} . \quad \text{ב}$$

$$u_2 = \frac{1}{m} (M-m) \sqrt{\frac{k}{m}} r_1^{-\frac{1}{4}} - \frac{M}{m} v_1 \quad \text{ד. אחוריה}$$

הוכחה.

פיזיקה 1 מכניתה

פרק 22 - מסות מצומדות-

תוכן העניינים

260	1. מימד אחד
(ללא ספר)	2. דז ותלת מימד
261	3. שילוב עם כבידה

מימד אחד:

שאלות:

1) שני גופים עם כוח חשמלי דוחה

שני גופים בעלי מסות m ו- $2m$ מאולצים להיות רק על ציר ה- x .

לכל אחד מהגופים יש מטען חשמלי q .
כתוצאה מהטען החשמלי פועל בין הגוף
כוח חשמלי משמר (במקרה זה כוח דחיה).

$$\text{האנרגייה הפוטנציאלית של הכוח היא: } U(x_1, x_2) = \frac{q^2}{|x_2 - x_1|}$$

ברגע $t=0$ המתוואר בשרטוט, הגוף השמאלי נמצא ב- $-d=x$ והגוף הימני
בראשית הציר.

ברגע זה הגוף השמאלי מתחילה לנוע במהירות v לעבר הגוף הימני הנמצא במנוחה.
א. מהו מיקום מרכז המסה של שני הגוףים ב- $t=0$?

$$\text{ב. מה מיקום מרכז המסה ברגע } t_1 = \frac{d}{2v} ?$$

ג. מצא את המרחק המינימלי בין הגוףים.

ד. מהי מהירותו של הגוף השמאלי ביחס למעבده ברגע בו המרחק מינימלי?


תשובות סופיות:

$$x_{\text{relmin}} = \frac{q^2}{\frac{1}{3}mv^2 + \frac{q^2}{d}} \text{ ג.} \quad x_{\text{c.m.}} = -\frac{d}{3} \text{ ב.} \quad x_{\text{c.m.}} = -\frac{2}{3}d \text{ א. (1)}$$

$$v = v_{\text{c.m.}} = \frac{2}{3}v \text{ ד.}$$


שילוב עם כבידה:

שאלות:



- 1) מסות מצומדות מסתובבות**
 שתי מסות m זהות מחוברות על ידי קפיץ חסר
 מסה בעל קבוע k ואורך רפי l_0 .
 המסות נמצאות במנוחה על שולחן לאורך ציר ה- x .
 מסה שלישית זהה נעה במהירות v_0 בכיוון המסה
 הימנית ולאורך ציר ה- y .
 המסה מתנגשת במסה הימנית התנגשות פלסטית.

- א. מהו מיקום מרכז המסה של כל הגוףים כתלות בזמן לאחר ההתנגשות?
 ב. מהו התנע הזוויתי של הגוףים לאחר ההתנגשות?
 ג. מהו הכוון המינימלי של הקפץ לאחר ההתנגשות?
 יש רק להגיעה למשווה ריבועית ממנו ניתן למצוא את הפתרון.



- 2) מסות מצומדות עם פוטנציאלי ריבועי**
 נתונים שני גופים אשר ביניהם פועל כוח משיכה
 משמר עם הפוטנציאלי $V(r) = Ar^2 + B$, כאשר r
 הוא המרחק בין הגוףים ו- A, B קבועים נתונים.
 מסות הגוףים הן m_1 ו- m_2 .
 בתחלת התנועה המרחק בין הגוףים נתון והוא r_0 ,
 המסה m_2 במנוחה והמסה m_1 נעה במהירות v_0
 ובזווית θ_0 ביחס לקו המחבר בין שתי המסות (ראה איור).

- א. מצא את התנאי על v_0 ועל θ_0 כך שהמרחב בין הגוףים יישאר קבוע
 במהלך התנועה.

כעת הניח שהמרחב במהלך התנועה אינו קבוע ו- θ_0, v_0 נתונים.

- ב. חשב את התנע הזוויתי והאנרגיה הכוללת כפי שאלה נמדדים במערכת
 מרכז המס. האם גדים אלו נשמרים במהלך התנועה? נמק מדוע.
 ג. מצא את המרחק המינימלי והמקסימלי בין הגוףים במהלך תנועה.

תשובות סופיות:

$$L = \frac{mv_0 l_0}{3} . \text{ז} \quad x_{c.m}(t) = \frac{l_0}{3} , y_{c.m}(t) = 0 + \frac{v_0}{3} \cdot t . \text{א} \quad (1)$$

$$mv_0^2 r_{\text{rel}}^2 = mv_0^2 l_0^2 + 6k(r_{\text{rel}} - l_0)^2 r_{\text{rel}}^2 . \text{ג}$$

$$v_0 = \sqrt{\frac{2Ar_0^2}{\mu}} , v_0 \cos \theta_0 = 0 \Rightarrow \theta_0 = \pm \frac{\pi}{2} . \text{א} \quad (2)$$

$$E = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} v_0^2 + Ar_0 + B , L_{c.m} = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} r_0 v_0 \sin \theta_0 . \text{ז}$$

$$r_{\text{min}}^{\text{max}} = \sqrt{\frac{E - B + \sqrt{(B - E)^2 - 4A \frac{L_{c.m}^2}{2\mu}}}{2A}} . \text{ג}$$

פיזיקה 1 מכניתה


פרק 23 - יחסות פרטית -

תוכן העניינים

263	1. טרנספרמציה לורנץ למיקום והזמן
265	2. טרנספורמציה לורנץ לזמן
266	3. תרגילים לטרנספרמציה למיקום ומהירות
269	4. דינמיקה יחסותית
272	5. תרגילים לדינמיקה יחסותית
274	6. תרגילים נוספים
277	7. כוחות ודינמיקה יחסותית

טרנספורמציה לורנץ למיקום וזמן:

שאלות:




1) מציאת מהירות ומיקום אופנווע

אופנווע נסע ב מהירות קבועה בקו ישר צופה על ה الكرקע מודד כי האופנווע נסע מרחק של 540km.

צופה הנע ב מטוס מהיר $v = 0.5c$, בכיוון נסיעת האופנווע מודד כי זמן נסיעת האופנווע היה 0.01 שניות.

- מציאת מהירות האופנווע ב מערכת כדיה'א.
- מציאת המרחק שעבר האופנווע כפי שמדד הצופה ב מטוס.



2) בדיקת ירי

שתי חלליות בעלות אורך מנוחה זהה, עוברות זו במקביל זו ב מהירות גובהה. בזנב החללית S מצוי תותח המכונן בניצב לכיוון תנועת החללית ולעבר מסלול התנועה של החללית 's' (איור 1).

בחללית S מתבצעת בדיקת ירי בתותח ברגע

שהנקודה a בראש החללית מתלכדת עם הנקודה 'a' (זנב 's').

מכיוון שאורך החללית 's' קצר מהאורך העצמי בחללית ב-s מניחים כי הטיל יפספס את החללית השניה (איור 2).

אולם ב מערכת 's' אורך החללית S קצר מהאורך העצמי ולכן כאמור a ו-'a' מתלכדות האסטרונואוט S יפגע (איור 3). ישביי את הفرضוקס.

3) מוט פולט אור לשירוגין

מוט בעל אורץ l_0 נע ב מהירות v נתונה ביחס לכדיה'א.

נתון כי $t = 0$ הказה השמאלי של המוט נמצא ב- $x = 0$.

ברגע זה המוט פולט אור מקצהו הימני.

לאחר זמן τ המוט פולט אור מקצהו הימני.


מציאת הפרש הזמןים כפי שראה אותם צופה מכדיה'א (הפרש הזמןים בין הגעת האור משני המאורעות בראשית).



(4) פיצוץ בכוכב אלפה

החללית אנטרייז יוצאת מכוכב אלפה חוזרת לכדה"א. בדרך היא עוברת ליד הירח של כוכב אלפה ורואה פולס אלקטרו מגנטי חזק יוצא לכיוון הכוכב. ידוע שבירח ישנה קבוצת חייזרים תוקפניים בשם "קליגונים". 1.3 שניות מאוחר יותר היא רואה פיצוץ בכוכב. המרחק בין הכוכב לירח שלו הוא 500 מיליון מטרים כפי שנמדד במערכת החללית.

מהירות החללית ביחס לכוכב ולירח היא $c = 0.9c$.



- מהו מרוחך הזמן בין גילוי הגל לפיצוץ במערכת הכוכב והירח?
- מה משמעות הסימן בהפרש הזמן?
- אם הפולס גורם לפיצוץ או להיפך?

תשובות סופיות:

$$(1) \text{ א. } x'_2 = -10.32 \cdot 10^5 \text{ m} \quad \text{ב. } v = 5.65 \cdot 10^7 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$$

(2) ראה סרטון.

$$(3) \Delta t = \gamma_0 (1 + \beta) \left(\tau - \frac{l_0}{c} \right)$$

$$(4) \text{ א. הפיצוץ היה לפני הגעת הגל לכוכב וגם לפני ירי הגל.} \quad t_3 = -3.525 \text{ sec}$$


ג. לא יכול להיות שהפיצוץ גורם לירוי של הפולס, $m \cdot 10^8 \cdot 10^8 \text{ m} > 10.575 \cdot 10^8 \text{ m}$

טרנספורמציה לורנץ ל מהירות:

שאלות:

1) מהירות יחסית בין מכוניות

שתי מכוניות נסעות האחת במאונך לשנייה כך שמהירות המכונית הראשונה היא $0.6c$ ומהירות המכונית השנייה היא $0.9c$.
מצא את המהירות היחסית.




תשובות סופיות:


$$v'_{2_x} = -0.6c, v'_{2_y} = -0.72c \quad (1)$$

תרגילים לתרנספרמציה מיקום ומהירות:


שאלות:



- 1) דודה יוצאה לטיל**
המבחן בפיזיקה התחיל בשעה 00:00 והמשגיחה
יצאה לטיל ב מהירות c (דודה זריזה במיוחד).
לאחר שעה לפיה שעונה היא שולחת לסטודנטים
אות רדיו לסייע בבחינה.
כמה זמן ארכה הבחינה עבור הסטודנטים?



- 2) כדור מתגלגל בחללית**
חללית בעלת אורך עצמי של 200 מטר נעה
ב מהירות c ביחס למערכת אינרציאלית S .
כדור קטן מתגלגל לאורכה ב מהירות $c = u'$ ב
בכיוון ציר x , כפי שנמדד ע"י צופה בחללית.
א. מהי מהירות הכדור כפי שנמדד ע"י צופה ב- S ?
(הבא את התשובה ביחידות של c).
ב. מהו הזמן שייקח לכדור לעבור מקצתו לקצתו של החללית כפי שנמדד ב- S ?
(הבא את התשובה ב מיליוןיות שנייה).
ג. איזה מרחק עבר הכדור לפני צופה במערכת S ? (ביחידות של ק"מ).




- 3) חלקיקים נוצרים בגובה ומתרפרקים**
שני חלקיקים נוצרים בגובה h מעל הקרקע.
אחד נפלט בזווית 225 מעלות עם ציר ה- x
והשני בזווית 45 – מעלות עם ציר ה- x .

החלקיק הראשון מתרפרק לאחר זמן T בגובה $\frac{3h}{4}$
והחלקיק השני מתרפרק לאחר זמן T_2 בגובה $\frac{h}{4}$.
התעלם מהכבידה בבבואה.


- א. הביא את מהירותי החלקרים באמצעות h ו- T .
ב. מצא את זמן החיים העצמי של כל חלקיק (זמן החיים במערכת המנוחה).
ג. מצא מערכת ' s' הנעה בכיוון החיובי של ציר ה- x בה התפרקויות
מתרחשות באותו הזמן.
ד. מה המרחק בין התפרקויות במערכת ' s' ?

4) מיוואו מתפרק ליד אלקטרון

- מיוואו (μ) נוצר ברגע מסוים ונע ב מהירות $c_0 = 0.7c$ ביחס לקרקע.
- המיואו מתרפרק לאחר שגע 3 ק"מ ממקום היוצרו.
- כמה זמן חי המיוואו במערכת העצמית שלו?
 - אלקטרון נע במקביל למיוואו וב מהירות $c_0 = 0.5c$ ביחס למעבده.
 - מהי מהירות המיוואו ביחס לאלקטרון?
 - איזה מרחק נע המיוואו ביחס לאלקטרון.

**5) זווית של מוט נע**

- מוט בעל אורך 1 (לא נתון) נע ב מהירות v_1 בכיוון ציר ה- y ביחס לצופה הנמצא במעבדה. הצופה במעבדה מודד זווית α_1 של המוט ביחס לציר ה- x .
- איזו זווית ימודד צופה הנע ב מהירות \hat{v}_2 ביחס למעבדה?

**6) תדר יחסי**

במערכת s' הנעה ב מהירות v ביחס למערכת המעבדה S , נמצא משדר רדיו הפולטאותות בתקדיות f_0 ?

- מה תהיה התקדיות שתיקלט במעבדה?
- מה תהיה התקדיות שתיקלט במערכת s' הנעה ב מהירות $\hat{v} = -v$ ביחס למעבדה?

תשובות סופיות:

$$\Delta t = 1.08 \cdot 10^4 \text{ sec} \quad (1)$$

$$x_1 = 10.78 \text{ km} . \lambda \quad t_1 = 39.62 \mu\text{s} . \beth \quad v_x = 0.907c . \aleph \quad (2)$$

$$\tau_1 = T \sqrt{1 - \frac{h^2}{8T^2c^2}}, \quad \tau_2 = 2T \sqrt{1 - \frac{9h^2}{64T^2c^2}} . \beth \quad v_1 = \frac{h}{2\sqrt{2}T}, \quad v_2 = \frac{3h}{4\sqrt{2}T} . \aleph \quad (3)$$

$$d'^2 = \frac{\frac{5h^4}{4} - 3c^2T^2h^2 + c^4T^4}{h^2 - c^2T^2} . \beth \quad v_0 = \frac{c^2T}{h} . \lambda$$

$$\Delta x_{12} = 0.98 \text{ km} . \lambda \quad V_{12} = 0.31c . \beth \quad \tau = 10^{-5} \text{ sec} . \aleph \quad (4)$$

$$\tan \alpha' = \gamma_2 \left(\tan \alpha_1 + \frac{v_1 v_2}{c^2} \right) \quad (5)$$

$$f'' = \sqrt{\left(\frac{1-\beta}{1+\beta} \right)^2} f_0 . \beth \quad f_s = \sqrt{\frac{1 - \frac{v}{c}}{1 + \frac{v}{c}}} f_0 . \aleph \quad (6)$$

динמיקה יחסותית:

שאלות:

1) הגעת נויטרונו ממרחקים

מצא את האנרגיה הדרישה לנויטרונו להגיע לכדור הארץ מרחק של 5 שנות אור בהינתן שזמן החיים של נויטרונו הוא 881 שנים והמסה שלו היא: $M_n = 940MeV/c^2$.

2) התנגשויות בסיסית

חלקיק בעל מסה m מתנגש בחלקיק בעל מסה $3m$.

לחלקיק הראשון אנרגיה כוללת לפני ההתנגשיות $5mc^2$ ונתון כי התנע הכלול שלהם במערכת המעבדה הוא אפס. כהוצאה מהתנגשויות שני החלקיקים מושמדים ונוצר חלקיק חדש הנמצא במנוחה.

א. מצאו את האנרגיה הקינטית של החלקיק הראשון.

ב. מצאו את פקטורי לורנץ של החלקיקים לפני ההתנגשויות ואת האנרגיה הקינטית של החלקיק השני.


ג. מצאו את מסת החלקיק הנוצר לאחר ההתנגשויות.

3) חלקיק מתפרק לפוטון וחלקיק נוסף

חלקיק בעל אנרגיה כוללת E_1 ומסת מנוחה m_1 נע במעבדה בכיוון החיוויי של ציר ה- x .

ברגע מסוים מתפרק החלקיק לפוטון וחלקיק נוסף.

אנרגיה הפוטון נתונה E_y וידוע כי הפוטון נע בציר $-y$, בכיוון החיוויי.



א. מהו התנע של החלקיק הראשון לפני ההתפרקות?

ב. מהי הזווית של התנע של חלקיק 2 ביחס לציר ה- x ?

ג. מצא מערכת ייחוס חדשה 'S' שבה הפוטון יפלט בכיוון נגדי לכיוון תנועתו של חלקיק מס' 2.

מה מהירותה של מערכת זו ביחס למערכת המעבדה?

4) פוטון פוגע בפרוטון ויוצר פיאו

פוטון פוגע בפרוטון הנמצא במנוחה במערכת המעבדה.

נתונות מסת הפרוטון והפיאו M_p , M_π .

מהי האנרגיה המינימלית הדרישה לפוטון על מנת שלאחר ההתנגשויות ייווצרו פרוטון ופיאו (π)?

5) דוגמה - חישוב תנע ואנרגיה קינטית של אלקטרון ופרוטון
 חשבו את התנע והאנרגיה הקינטית של פרוטון ואלקטרון בעלי אנרגיה של 1GeV במערכת המעבדה.

6) דוגמה - גמה וביטה של אלקטרון
 מסת האלקטרון היא: $9.10938188 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ומהירות האור היא: 299792458 m/sec .
 מצאו בדיק ש 6 ספירות את γ ו- β של אלקטרון שהאנרגיה הקינטית שלו היא: $K = 100.000\text{MeV}$ במערכת המעבדה.

7) בטיח של מיליאונים מתפרקים
 מסת מיואון היא פי 207 מסת האלקטרון.
 זמן מחצית החיים הממוצע של מיואון הוא $2.20 \mu\text{s}$.
 מיליאונים נעים ביחס למעבדה בניסוי קלשו.
 זמן החיים הנמדד של המיליאונים ביחס למערכת המעבדה הוא: $6.90 \mu\text{s}$.
 מהם β , התנע והאנרגיה הקינטית של המיליאונים ביחידות $\frac{\text{MeV}}{\text{c}}$?

תשובות סופיות:

$$E_n = 1.69 \cdot 10^8 \text{ MeV} \quad (1)$$

$$m_3 = 6.91m_e \quad \gamma_1 = 5, \quad \gamma_2 = \sqrt{\frac{11}{3}}, \quad E_{k_2} = 3mc \left(\sqrt{\frac{11}{3}} - 1 \right) \cdot v \quad E_{k_1=4mc^2} \cdot v \quad (2)$$

$$\tan \theta = -\frac{E_\gamma}{\sqrt{E_1^2 - m_1^2 c^4}} \cdot v \quad \vec{p}_1 = \sqrt{\left(\frac{E_1}{c}\right)^2 - m_1^2 c^2} \cdot \hat{x} \cdot v \quad (3)$$

$$v_0 = \sqrt{1 - \left(\frac{m_1 c^2}{E_1}\right)^2} \cdot c \cdot v$$

$$E_\gamma = \frac{1}{2m_p} (m_\pi^2 + 2m_\pi m_p) c^2 \quad (4)$$

$$K = 0.999 \text{ GeV}, P = 1 \frac{\text{GeV}}{c} : \text{אלקטرون} \quad (5)$$

$$K = 0.062 \text{ GeV}, P = 0.347 \frac{\text{GeV}}{c} : \text{פרוטון}$$


$$\gamma = 196.695, \beta = 0.999987 \quad (6)$$

$$\beta = 0.898, P = 314 \frac{\text{MeV}}{c}, K = 226 \text{ MeV} \quad (7)$$

תרגילים לדינמיקה יחסותית:

שאלות:

- 1) **חלקיק מתפרק לשני חלקיקים**
 חלקיק בעל מסה m הנמצא במנוחה מתפרק לשני חלקיקים בעלי מסות מנוחה m_1 , m_2 .
 מה יהיה האנרגיה והתנע של החלקיקים שנוצרו? (כל המסות נתונות).



- 2) **אלקטرون חופשי פולט פוטון**
 הראו כי אלקטרון חופשי הנע בזווית איינו יכול לפולט פוטון בודד.

- 3) **התנגשות חלקיקים זהים ויצירת חלקיקים**
 חלקיק בעל מסת מנוחה m פוגע בחלקיק זהה לו הנמצא במנוחה. כתוצאה מההתנגשות נוצרים שני חלקיקים בעלי מסות מנוחה m_1 ו- m_2 .
 מצא את אנרגיית הסף לייצור ריאקציה זו. (הנחה: $m_1 + m_2 > 2m$).

- 4) **פיון מתפרק**
 פיוון (π^+) מתפרק למיאוון חיובי ($M_\mu = 160Me \frac{c}{c^2}$) לפני ההתקפרות
 וניטרינו חסר מסה.
 מצא את מסת המנוחה של הפיוון אם למיאוון אנרגיה קינטית של $5MeV$.

- 5) **פוטון מתנגש אלסטי באלקטרון**
 אלקטרון נע במהירות v ומתנגש בפוטון בעל אנרגיה E_γ הנע ל夸רכטו.
 מצא את הערך של v אם ידוע כי הפוטון מוחזר באותו אנרגיה בה פגע.
 הנה כי מסת האלקטרון ידועה.

תשובות סופיות:

$$, E_1 = m_1 c^2 \gamma_1 = \frac{c^2}{2m} (m^2 + m_1^2 - m_2^2) , p_1 = c \sqrt{\frac{1}{2m} (m^2 + m_1^2 - m_2^2)^2 - 1} \quad (1)$$

$$E_2 = m_2 c^2 \gamma_2 = \frac{c^2}{2m} (m^2 + m_2^2 - m_1^2) , p_2 = m_2 c \sqrt{\gamma_2^2 - 1} = c \sqrt{\frac{1}{2m} (m^2 + m_2^2 - m_1^2)^2 - 1} \quad (2)$$

שאלת הוכחה.


$$E_{\min} = \frac{1}{2m} c^2 ((m_1 + m_2)^2 - 2m^2) \quad (3)$$

$$M_\pi = 144 \frac{MeV}{c^2} \quad (4)$$

$$v = c \left| 1 - \left(\left(\frac{E_\gamma}{m_e c^2} \right)^2 + 1 \right)^{-1} \right|^{\frac{1}{2}} \quad (5)$$

תרגילים נוספים:

שאלות:



- 1) פוטון מתנש ומעבר למרכז מסה**
פוטון עם אנרגיה E_0 מתנש אלסטית עם חלקיק בעל מסה m הנמצא במנוחה (במערכת המעבדה).
- מצא את מהירות מערכת מרכז המסה של המערכת פוטון פלוס חלקיק.
 - מצא את התנע והאנרגיה של החלקיק והפוטון לפני ההתנשאות במערכת מרכז המסה.
 - מצא את התנע והאנרגיה של הפוטון והחלקיק אחרי ההתנשאות אם ידוע שהפוטון מפוזר בזווית θ ביחס לכיוון בפגיעה במערכת מרכז המסה (ראה איור).
 - מהם האנרגיה והערך המוחלט של התנע של הפוטון והחלקיק לאחר ההתנשאות במערכת המעבדה?
 - מצא את הזווית θ עבורה האנרגיה של הפוטון במערכת המעבדה תהיה מינימלית.

2) שאלת 1

נתונים שני גופים הנעים בניצב זה לזה. ידוע כי מסת הגוף זהה ושווה ל- M , וכן כי התנעים של הגוף הם : p_1, p_2 .
ברגע מסוים, הגוף מתנש ומוסיעים ארבעה גופים חדשים.
מסות הגוף החדש שנוצרו הן : $m, 2m, 3m, 4m$.
מהו m המקסימלי האפשרי?
נתון : $p_1 = 6Mc, p_2 = 17Mc$

3) שאלת 2

נתונים שני חלקיקים בעלי מסה m , וכן נתונות האנרגיות שלהם E_1, E_2 .
החלקיקים נעים זה אל עבר זה, ומתנשאים.
חשבו את מסת החלקיק M הנוצר כתוצאה מההתנשאות החלקיקים.
נתון : $E_1 = 4mc^2, E_2 = 7mc^2$.

4) שאלה 3

שתי חלליות יוצאות מאותה נקודת, בכיוון ניצב אחת לשנייה.

חללית א' טסה ב מהירות v_1 , וחללית ב' טסה ב מהירות v_2 .

חשבו את וקטור המהירות של חללית ב' ביחס לחללית א'.

$$\text{נתון : } v_1 = 0.8c(+\hat{x}), v_2 = 0.9c(-\hat{y})$$

5) שאלה 4

חלקיקים 1,2 נוצרים במעבדה ונמצאים במנוחה.

ידוע לגבי זמני החיים שלהם כי: $t_2 = 0.75t_1$ (במצב מנוחה חלקיק 2 נעלם

לפני חלקיק 1).

מהי המהירות אליה יש להאיץ את חלקיק 2, כדי שלא ידעך לפני חלקיק 1?

6) זריקה אופקית יחסותית

מסלולו של חלקיק במערכת S נתון ע"י: $y = \frac{1}{2}at^2$, $x = vt$ כאשר a , v קבועים ידועים.

מצא את תאוצת החלקיק במערכת S הנעה ב מהירות v בכיוון ציר ה- x ביחס ל- S .

תאר את צורת המסלול בשתי המערכות (v אינה זיניה ביחס ל מהירות האור).

תשובות סופיות:

$$v_{c.m} = \frac{E_0 \cdot c}{mc^2 + E_0} \text{ נ. } \quad (1)$$

ב. פוטון לפני ההתנגשות :

$$E'_{pH} = E_0 \sqrt{\frac{mc^2}{2E_0 + mc^2}}, P'_{pH} = \frac{E_0}{c} \sqrt{\frac{mc^2}{2E_0 + mc^2}}$$

חלוקת לפני ההתנגשות :

$$E'_m = mc^2 \left(\frac{mc^2 + E_0}{\sqrt{m^2 c^4 + 2E_0 mc^2}} \right), P'_{m_x} = \frac{-mE_0 c}{\sqrt{m^2 c^4 + 2E_0 mc^2}}$$

פוטון אחרי ההתנגשות : אותו דבר כמו לפני ההתנגשות.

חלוקת אחרי ההתנגשות : אותו דבר כמו לפני ההתנגשות.

כיוון התנוע : $\vec{P}_{pH} = (P(-\cos \theta), P \sin(\theta), 0), \vec{P}_m = -\vec{P}_{pH} = (P \cos \theta, P \sin \theta, 0)$

$$E'_m = mc^2 \left(\frac{mc^2 + E_0}{\sqrt{m^2 c^4 + 2E_0 mc^2}} \right), |P_m| = \sqrt{\left(\frac{E_m}{c} \right)^2 - m^2 c^2} \text{ ג.}$$

$$\theta = \frac{\pi}{2} \text{ ד.}$$

$$m_{max} \approx 1.45M \quad (2)$$

$$M \approx \sqrt{112}m \quad (3)$$

$$\vec{v} = (-0.8c, -0.54c, 0) \quad (4)$$

$$v \approx 0.66c \quad (5)$$

$$x' = 0, y' = \frac{1}{2} a \gamma_0^2 t'^2 \quad (6)$$

כוחות ודינמיקה יחסותית:

שאלות:

1) דוגמה-כוח קבוע בזמן

כוח קבוע F פועל על חלקיק בעל מסה m הנמצא במנוחה.
מצא את מהירות החלקיק כתלות בזמן.

2) כוח קבוע

כוח קבוע F פועל על חלקיק יחסותי בעל מסה m המתחיל תנועתו ממנוחה.

- כתוב את משוואת התנועה של החלקיק.
- מצא את מהירות החלקיק כתלות בזמן.
- מצא את מיקום החלקיק כתלות בזמן.
- רשום תנאי ומהירות נוכחות והראה שהביוטי שקיבלה למהירות ולמיקום מתכנס לפתרון הקליני ב מהירות נוכחות.

$$\text{ה. ציר גוף של מהירות היחסותית והקליני כתלות בזמן עד זמן } t = \frac{mc}{F}.$$

$$\text{ו. ציר גוף של המיקום היחסותי והקליני כתלות בזמן עד זמן } t = \frac{mc}{F}$$

3) כוח גורר מתכונתי לתנועה היחסותי

כוח קבוע F פועל על מסה m המתחילה תנועתה במערכת המעבדה.
בנוסף פועל על המסה כוח גורר המתכונתי לתנועה היחסותי $p = -f\lambda$ כאשר λ קבוע נתון.

א. רשום משוואת תנועה לתנועה היחסותי.

ב. פטור את המשוואת ומצא מהו קבוע הזמן האופייני להתייכבות התנועה על ערך קבוע.

ג. מצא את מהירות הגוף כתלות בזמן.

ד. מהי מהירות בגבול של זמנים קצרים וזמן ארכויים ביחס ל קבוע הזמן שמצויה בסעיף ב? להזכיר הפתרון של המקרה הקליני בו פועל כוח קבוע F על גוף וכוח גורר $p = -f\lambda$ הוא:

$$v(t) = \frac{F}{\lambda m} \left(1 - e^{-\lambda t} \right)$$


תשובות סופיות:

$$v(t) = \frac{\frac{F \cdot t}{m}}{\sqrt{1 + \left(\frac{F \cdot t}{mc}\right)^2}} \quad (1)$$

$$v = \frac{\frac{Ft}{m}}{\left(1 + \left(\frac{Ft}{mc}\right)^2\right)^{\frac{1}{2}}} \quad (2)$$

ד. ראה סרטון.

$$x(t) = \frac{mc^2}{F} \left(\left(1 + \left(\frac{Ft}{mc}\right)^2\right)^{\frac{1}{2}} - 1 \right) \quad (2)$$



$$p(t) = \frac{F}{\lambda} \left(1 - e^{-\lambda t}\right), \quad \tau = \frac{1}{\lambda} \quad (1)$$

$$F - \lambda p = \frac{dp}{dt} \quad (3)$$

ד. זמן קצר $v(t) \approx \frac{F}{\lambda m} \left(1 - e^{-\lambda t}\right) = v(t)$

$$v(t) = \frac{\frac{F}{\lambda m} \left(1 - e^{-\lambda t}\right)}{\left(1 + \left(\frac{F}{\lambda mc} \left(1 - e^{-\lambda t}\right)\right)^2\right)^{\frac{1}{2}}} \quad (2)$$

זמן ארוך: $v(t) \approx \frac{\frac{F}{\lambda m}}{\left(1 + \left(\frac{F}{\lambda mc}\right)^2\right)^{\frac{1}{2}}} \neq v(t) = \frac{F}{\lambda m}$

פיזיקה 1 מכניתה

פרק 24 - תרגילים במכניתה ברמת מבחן -


תוכן העניינים

279 1. תרגילים ברמת מבחן

תרגילים ברמת מבחן:

שאלות:

1) ארץ סובב שמש




כדור הארץ סובב סביב המשמש בהקפה אליפטית. נתונים המרחקים בשיא האליפסה (המרחק הקצר ביותר והארוך ביותר).

נתונה גם מהירות כדור הארץ בנקודה הקרובה ביותר.

- מצא את מהירות כדור הארץ בנקודה הרחוקה ביותר.
- רשות את משווהת שימוש האנרגיה לשתי נקודות אלה.
- מצא את מסת השמש, אם נקבע קבוע הגרביטציה G .

2) חישוק ומשולש בתוכו


נתון גוף הבנוי מחישוק ברדיוס R בעל מסה M , ובתוכו משולש שווה צלעות שאורך כל צלע $3R$ ומסתו m . עובי החלקים בגוף זניח וצפיפותם אחידה.



- מהו מומנט ההתמד של הגוף?
- מהו כוח F במצב של שוויי המשקל?
- בזמן $t=0$ מתחילה לפעול הכוח F , כך ש- $F = (m+M)3g$. הטענה מתגללת מעלה ללא החלטה.
- מצאו את התאוצה הזוויתית של הטענה.
- מהי האנרגיה הקינטית של הגוף כפונקציה של הזמן?

3) מסה נופלת על משולש

נתון משולש שווה צלעות בעל מסה M (צפיפותו אחידה) ועליו מוט חסר מסה ובסומו מסה m .



גודל כל האורךים בשרטוט הוא L . המשולש מחובר בסיסו לשני גלגלים קטנים כך שהוא חופשי לנutation. המסה מתחילה ליפול ממנוחה כך שהרגע $t=0$ היא נמצאת מאוזנת לקרקע.


שלושת הסעיפים מתייחסים לרגע זה.

- מצא את מרכז המסה של העגלה.
- מצא את מהירות המסה m .
- מצא את הנורמלים שפעילים שני הגלגלים על העגלה.

4) מתנויה מעגלית לפגיעה במטרה (מבט מלמעלה)

חותם מסובב מסה ממנוחה עם תאוצה זוויתית.
המתיחות המקסימלית בחותם היא k ומעבר למתחות זו החותם נקרע.

א. מה צריכה להיות התאוצה על מנת שהמסה תפגע במטרה?



ב. מה תהיה מהירות הפגיעה?

התיחס לנתונים כפי שופיעים בשרטוט.

הشرطוט מתאר את רגע תחילת התרגיל.

על המסה להשתחרר לפני שהיא מסיימת הקפה
אתה של המעגל.


5) תנועה תחת פי

גוף נקודתי בעל מסה m נעה במסלול ציקלואידי המצוואר

$$\text{ע''י: } y = \alpha(1 - \cos \theta), \quad x = \alpha(\theta - \sin \theta).$$

כאשר α קבוע ו- θ הינו משתנה של הבעייה.

הגוף מתחילה את תנועתו ממנוחה מנק' $(0,0)$,
נע בשדה גראביטצייה g כמפורט בשרטוט.



נקודות החותם לאנרגיה הפוטנציאלית תהיה בתחתיית המסלול (בנקודה בה: $\alpha = 2\alpha$).

א. מהי מהירותו של הגוף בתחתיית המסלול?

ב. כתבו את המשוואת התנועה עבור הגוף θ לאורך המסלול.
יש לבטא את המשוואת התנועה וקבועי השאלה (α , g).

ג. פטור את המשוואת התנועה של סעיף ב' על פי תנאי ההתחלה
עבור: $y(t), x(t), \theta(t)$.


ד. הראו שהגוף יבצע תנועה מחזורית עם זמן מחזור המתאים למוטולת
מתמטית בעלת אורך 1.

מהו 1 המתאים לבועיה הניל?

6) נחום תקום, מבחן ת"א

גוף מורכב מחרוט בעל זווית מפתח α , בסיס הרדיוס a

וגובה a היושב על חצי כדור בעל רדיוס דומה כמו המצוואר בשרטוט.
לחצי חרוט ולכדור צפיפות מסה אחידה וזזה k .




א. חשב את מרכזו המסה של החרוט ביחס לראשית 0
הנמצאת על משטח החיבור בין הגוף.

(ראה ציור עם הגדרות ראשית הגוףים).

ב. חשב את מרכזו המסה של כל המערכת בהינתן מרכזו


$$\text{המסה של חצי כדור: } Z_{c.m} = \frac{-3a}{8}.$$

ג. מטילים את הגוף הניל בזווית θ ביחס לאנך.
מהי האנרגיה הפוטנציאלית כתלות בזווית זו?



ד. מצאו תחת אילו תנאים (נתונים גיאומטריים a , h , α) המערכת תהיה ב:

- i. שיווי משקל אדיש ($E_p = \text{const}$)
- ii. שיווי משקל יציב המאפשר תנודות קטנות.
- iii. שיווי משקל לא יציב.



7) מסות על חרוט, מבחן ת"א

מסה m_1 נמצאת בתווך קונוס, בעל זווית מרכזית α , המסתובבת במהירות קבועה ω . המסה מחוברת במסילה לקונוס, הגרמת לה להסתובב יחד אליו במהירות קבועה.


בנוסף המסה יכולה לנוע מעלה ומטה על הדופן של הקונוס ללא חיכוך.

- א. מהו רדיוס הסיבוב r שבו m_1 תהיה בשיווי משקל, ככלור המסה המשטובבת לא תנוע מעלה או מטה על גבי דופן הקונוס? (כמפורט בشرط א').

- ב. כתע מניחים על גבי מסה m_1 מסה נוספת, m_2 (כמפורט בشرط ב'). מקדם החיכוך הסטטי בין המסות הוא μ . מהירות הסיבוב של מסה m_1 אינה משתנה כתוצאה מהוספת המסה m_2 למערכת, ובנוסף המסה החדשה אינה מחליקה על גבי מסה m_1 .

האם רדיוס התנועה, שבו נמצאת המערכת בשיווי משקל, ישנה? הסבר.

- ג. מהו ערךו המינימלי של מקדם החיכוך הסטטי μ שימנע חילוקה בין המסות? הנח כי החלק העליון של m_1 הוא אופקי.



8) כזרים פוגעים במוטות, מבחן ת"א

שני מוטות דקים וארוכים במנוחה, בעלי מסה m ואורך L כל אחד מחוברים בזווית ישרה בנק' O, ראשית הצירים, כמפורט בشرط.

שתי המסות m נעות בניצוב למוטות ומתנגשות בקצת המוטות במהירות: $\vec{v}_1 = -v_0 \hat{x}$, $\vec{v}_2 = v_0 \hat{y}$.


נתון כי בזמן $t=0$ המסות נצמדות למוטות בבהת אחת.

- א. מצאו את וקטור המיקום של מרכז המסה (t) עבור $t=0$.

- ב. מצאו את וקטור המיקום של מרכז המסה (t) עבור $t > 0$, ביחס למרכז המסה בזמן $t=0$ (ברגע הצמדות המסות למוטות):


$$\vec{r}_{c.m}(t > 0) - \vec{r}_{c.m}(t = 0) = ?$$

- ג. מהי המהירות הזוויתית (ω) של המערכת בתנועה הסיבובית ביחס למרכז המסה שוחוש בסעיף ב' ($\vec{r}_{c.m}(t)$)?
- ד. מצאו את וקטור המיקום (\vec{r}) של הנקודה O, ביחס למיקומה בזמן $t=0$.


**9) מצוף בתנועה הרמוניית, מבחן ת"א**

נתונים מסה כדורית קטנה m שרדiosa R וקפיץ ארכוי אידיאלי וחסר מסה, בעל קבוע קפיץ k . הקפיץ ממוקם בתחום נוזל צמיגי ציפויו r וצמיגותו η . המצב הרפואי של הקפיץ הוא כאשר הוא בגובה פני הנוזל, כמתואר בשרטוט. זכרו כי ערכי כוח העילי וכח סטוקס הם: ρg (כאשר V הוא נפח הגוף) ו- $\frac{1}{2} \rho \eta r^2$, בהתאם.

- א. כאשר המסה ממוקמת על שפת הנוזל, כמתואר בשרטוט, מעוניינים לה מהירות ההתחלתית v_0 כלפי מעלה, מה יהיה הגובה המקסימלי אליו הגיע המסה?
- ב. מהי משווהת התנועה של המסה, כאשר היא נעה בתחום הנוזל? הניחו כי מרגע נגיעה המסה בפני הנוזל כשהגוף נכנס במלואו לנוזל (יש להעתים משלבי כניסה הגוף לנוזל). כמו כן יש להניח כי לפני הנזול לא השתנו בשל כניסה הגוף לנוזל.رمز: לפישוט המשוואה, יש לבצע החלפת משתנים.
- ג. בהנחה ריסון חלש, מהו הפתרון הכללי של משווהת התנועה בתחום הנוזל? מהם תנאי ההתחלה של התנועה? את התשובות הסופיות יש להציג במונחי המשתנה בו השתמשTEM. רמז: בפתרון המד"ר יש להעזר בדף הנוסחים הנתון.
- ד. בעבר כמה זמן, מרגע כניסה הגוף למים, תחזור המסה לפני המים (ה מצב המתואר בתחילת סעיף ב')?

10) מגדל קוביות

דני מנסה לבנות מגדל מ-5 קוביות זהות בעלות פאה באורך a . מהו המרחק המקסימאלי הנitin להניח את הקובייה העליונה ביותר כך שהמגדל לא ייפול? (מדוד את המרחק בין הצלע השמאלית של הקובייה הראשונה לצלע השמאלית של הקובייה העליונה). רמז: התחל את החישוב מהקובייה העליונה.

11) זובב על דיסקה

דיסקה עגולה שטוחה שمسתה M ורדiosa R מסתובבת במהירות זוויתית התחלטית ω_0 סביב מרכזה הנמצא במנוחה על גבי שולחן חסר חיכוך (הדיסקה אינה מחוברת לשולחן!). מתחת למרכז הדיסקה, על השולחן מצוירת נקודה ירוקה (להלן הנקודה O). במרכז הדיסקה ישן זובב נקודתי ירוק שמסתו m . על הדיסקה קו רדייאלי ירוק.


- ברגע $t = 0$ מתעורר הזובב והוא מתחילה לכלת על גבי הקו הרדייאלי. מצאו את מיקום הנקודה O (על השולחן) ביחס לזובב כפונקציה של המרחק h בין הזובב למרכז הדיסקה.
- הניחו כי הזובב נמצא בראשית, ציר x שלו מכוכן בכיוון מרכזו הדיסקה וציר y מאונך לו במישור הדיסקה.
- מצאו את המהירות הזוויתית של הדיסקה כאשר הזובב מגיע לשפתה.
- בדקו את תשובתכם לטעיף ב' עבור $M << m$ ו- $M \gg m$.
- אם הזובב נע במהירות קבועה v_0 ביחס לדיסקה, מהו כוח החיכוך בין הזובב לדיסקה רגע לפני שהזובב הגיע לשפת הדיסקה?

12) חצי כדור בתנועה הרמוניית


חצי כדור ברדיוס R ומסה M מונח על משטח. מסיטים את החצי כדור בזווית קטנה ממצב שיווי המשקל ומשחררים ממנוחה.

מצוא את תדריות התנודות הקטנות אם הכדור מתגלגל

$$\text{לא החלקה (מרכז המסה של חצי כדור נמצא במרקם: } d = \frac{3}{8}R \text{ ו- } M \text{ ממרכז הכדור המלא).}$$

**13) אנרגיה אבודה בהחלקה**

על מסוע בעל מקדם חיכוך קינטי נתון מונחת מסה m . כוח חיצוני מושך את המסוע במהירות קבועה a . נתון כי המסעה הונחה בזמן $t = 0$ במנוחה.




- מהו הכוח המופעל על המסוע?
- מהי תאוצת המסעה?
- כמה זמן תמשך ההחלקה?
- מהו המרחק אותו עבר המסוע בזמן זה?
- מהו המרחק אותו עברה המסעה בזמן זה?
- כמה עבודה השקיע הכוח החיצוני?
- כמה עבודה השקיע כוח החיכוך?
- כמה אנרגיה עבדה לחום?

14) גולש על סקייטבורד

גולש על סקייטבורד נכנס למסלול כמתואר בشرطוט.

רדיסוס המעלג R , גובהה האנכי של המקפיצה גם
בן R ואורך הקפיצה הוא d .



א. מהו הגובה המינימלי של L על מנת
שהפעולן ישלים סיוב במעל?

ב. מהו הגובה המינימלי של L על מנת שהגולש יחצה בשלום את המקפיצה?
כעת נתון כי הגולש יכול לקפוץ מהסקייטבורד בעודו באוויר במהירות אופקית
של v_0 יחסית לסקייטבורד, בהנחה שהוא מתחילה מהגובה שמצאוño בסעיף א'.


ג. כמה זמן לאחר הקפיצה הגולש צריך להתחילה את הקפיצה על מנת להגיע
בדוק לכתה התעללה?

ד. מהו המרחק המקסימלי אותו הגולש יחצה בשלום?

15) מטרונים

מצא את תדריות המטרונים שבشرطוט המשתנה על פי
מיוקם המסעה הנעה על גביו.

נתון כי ציר המטרונים נמצא רביע אורך מעלה קצחו התחתון.

**16) התנגשות במשולש על רצפה**

מסה m נזרקת ב מהירות אופקית v_0 מראש מגדל.

אחרי שעברה גובה h מנקודת הזרקה, המסעה


מתנגשת בגוף משולש שנמצא במנוחה ומסתו M .

נתון כי ההתנגשות בין שתי המסעות לא אלסטית

ובמהלך ההתנגשות אובדת שליש מהאנרגיה הקינטית.

נתון גם כי לאחר ההתנגשות המסה m נעה ב מהירות

אופקית שמאליה v_1 והגוף M נעה ב מהירות אופקית ימינה v_2 .



א. מצא את מהירות הפגיעה של המסה m בגוף M , יש למצא גודל ורכיבים בשני
הציריים.

ב. מצא את גודל המהירות של המסות לאחר ההתנגשות (v_1 , v_2).
ידעו כי זמן ההתנגשות הוא Δt .


ג. מצא את הגודל של הכוח הנורמלי המוצע שפעילה הקrukע במהלך ההתנגשות.

17) לוין יורה זנב בכיוון התנועה

לוין שמסתו M נע במסלול אליפטי סביב כדור הארץ כך שמרחקו המינימלי ממרכזו של כדור הארץ הוא R_A ומרחקו המקסימלי הוא R_B .
הלוין נע בכיוון השעון (ניתן לראות בשרטוט המצורף).

כאשר הלוין נמצא נקודה A הלוין מתפרק לשניים
ויורה את זנבו בכיוון משיק למסלולו.
מסת הזנב הנורה היא m .

לאחר הירי החלק שנותר מהלוין נכנס למסלול מעגלי סביב כדור הארץ.
 M - מסת כדור הארץ.
 R_E - רדיוס כדור הארץ.




$$U_g = -G \frac{m_1 m_2}{r}$$

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

- הביעו את מהירות הלוין בנקודה A לפני הירי.
- הביעו את מהירות שאירת הלוין (החלק ללא הזנב) לאחר הירי.
- אם הלוין יורה את זנבו ימינה או שמאליה, לאורך המשיק למסלול בנקודה A? נמקו!
- הביעו את מהירות זנב החללית מיד לאחר הירי.

18) עבודה לאורך דרכם במסילה

חרוז בעל מסה m מושחל על מסילה חלקה.
המסילה נמצאת במישור XY.
כוח הכבוד פועל בכיוון השילילי.
צורת המסילה מתוארת בשרטוט.




- מהי מהירות ההתחלתית המינימלית שיש להעניק לחרוז בראשית הצירים כדי שיוכל להגיע לנקודה A?
- נותנים לחרוז מהירות ההתחלתית v_0 . מהו שיא הגובה שאליו יוכל הגיעו אם נתנו כי החרוז עבר את הנקודה A?
- כעת, במקומות כוח הכבוד מופעל על החרוז כוח: $F = (x, e^{x^2})$
והחרוז משוחרר ממנוחה בראשית הצירים.
מה תהיה מהירות החרוז בקצת המסילה?

19) מסה וקפייז בתחום מסגרת


בציור הבא מתואם מתקן ניסוי-מסגרת ABCD ומטוטלת קפייז שמחוברת למסגרת. קבוע הקפייז K ומסת המשקלת m נתונים, מסת הקפייז קטנה מאוד וזניחה.

כל אלו גורמים למסkolot להתנדנד. ידוע כי כשהמשkolot מגיעה לנקודה העליונה אורץ הקפייז ברגע זה הוא המצב הרפוי.



- מצא את האמפליטודה בתנועה של המשkolot?
בטא את תשובתך בפרמטרים (K, m).

- ב. תנועת המשקולת מתוארת לפי הפונקציה הבאה : $x = A \sin(\omega t + \varphi_0)$.
 הכוון של ציר ה- x מוגדר בשרטוט. הפרמטר A מסמן את האמפליטודה.
 רגע תחילת המדידה הוא $t=0$. ידוע שבתחלת המדידה המשקולת נמצאת
 בנקודה $A = 0.9x$ ונהה כלפי מטה.
 מצא את הפאזה φ_0 כביטוי של הפונקציה $x(t)$? בטא את תשובתך ברדיאנטים.
- ג. המישור התיכון מפעיל כוח נורמלי על מסגרת ABCD בגלל תנודות המשקולות.
 כוח זה הוא לא קבוע אלא משתנה עם הזמן. נתונה מסה m_2 של המסגרת.
 מצא את הגודל המינימלי והמקסימלי של הכוח הנורמלי (N_{\min}, N_{\max}) .
 בטא את תשובתך בפרמטרים (K, m, m_2) .



20) שתי מסות בגלגלת נעה וכוח חיצוני
 שני גופים שמסותם m_1, m_2 מונחים זה על זה על פני
 מדרון משופע בזווית θ .
 ניתן לראות כי מדרון אחד מפעיל כוח נורמלי על הגוף השני
 ביןיהם בעזרת מערכות גלגלות חסרות מסה.
 בין שני הגוף קיים חיכוך בעוד שבין m_2 למדרון
 אין חיכוך.
 נתון כי מקדם החיכוך הקינטי בין שני הגוף הוא μ_k .

ברגע $t=0$ המערכת משוחררת ממנוחה ומתחליה לנעו כך שהגוף הגדול m_2
 יורץ במדרון (בכוון ציר x החיצוני).

ברגע זה מתחליל גם לפעול על m_1 , כלפי המדרון ובמאונך לו, כוח התלויה בזמן :


$$F(t) = \frac{mg}{2} (1 + \sin(\omega t)) \quad \text{כאשר } \omega \text{ הוא קבוע חיובי.}$$

יש להניח ש- m_2 מספיק ארוך כדי ש- m_1 לא יפול ממנו.

א. יש намק ולהוכיח כי במערכת הנתונה מתקיימים הקשרים : $a_1 = -3a_2$.

ב. מצאו את תאוצות הגוף : $(a_1(t), a_2(t))$ כפונקציה של הזמן.
 אין צורך לפתרו את המשוואות.

ג. מצאו את השינוי Δx , שחול במרקח שבין הגוףים לאורך המדרון, מרגע
 תחילת התנועה ועד לרגע t כלשהו.
 אין צורך לפתרו את המשוואות.

(21) כדור נזק בשיפוע

כדור ברדיוס $R = 20 \text{ cm}$ העשויה מחומר אחיד ואלסטי נזק

במהירות $v_0 = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ בניצב למשור חלק (לא חיכוך),

המשופע בזווית $30^\circ = \alpha$ לאופק.

א. מצא היקן יייפול הכדור על המשור המשופע.

ב. מצא את וקטור המהירות של הכדור מיד לאחר הפגיעה במשור.

cut נתון שבין המשטח לכדור יש חיכוך ומקדם החיכוך הוא $\mu_k = 0.2$, נתון כי ההתגשות בניצב למשור היא עדין אלסטית.

ג. חזר על סעיף ב'.

ד. מהי המהירות הסיבובית של הכדור לאחר הפגיעה?

ה. מהי מהירות נקודת המגע של הכדור עם המשור מיד לאחר הפגיעה?

(22) מסה קשורה למסה ולקפץ א נכי

גוף שמסתו $m_2 = 4 \text{ kg}$ נקשר לגוף נוסף שמסתו $m_1 = 1 \text{ kg}$ בחוט.

הגוף שמסתו m_1 קשור לקפץ א נכי בעל קבוע קפץ $k = 100 \frac{\text{N}}{\text{m}}$.

המערכת נמצאת בשיווי משקל ובמנוחה.


ב- $t=0$ נקרע החוט הקשור בין המסות.

א. מהי מושעת התנדות?

ב. מהו זמן המחוור של התנדות?

ג. מהו הביטוי למקומות כתלות בזמן?

ד. מהי האנרגיה האלסטית האgorה במערכת בנקודת הגובה?

**(23) מסה תלוי גלגלת ושלוש מסות על שולחן**

שלוש מסות: $m_1 = m_2 = m_3 = 15 \text{ kg}$ נמצאות על

שולחן אופקי ומחוברות בחוט דק למסה $M = 20 \text{ kg}$.

החותן עובר דרך גלגלת איחידה בעלת רדיוס $R = 15 \text{ cm}$.

ומומנט התמד $I = 0.7 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ כמפורט באירור.

חותן אינו מחליק על הגלגלת ואין חיכוך בין המסות m_1, m_2, m_3 לשולחן.

בין המסות m_2 לשולחן ישנו חיכוך ומקדם החיכוך הוא: $\mu_s = 0.23$.

א. מצא את תאוצת המסה M ברגע שמשחררים את המערכת ממנוחה.

ב. מהו יחס המתיichויות $\frac{T_1}{T_3}$ ברגע שמשחררים את המערכת ממנוחה?

ג. כמה זמן ייקח לגלגלת להשלים סיבוב אחד מרגע שחרור המערכת?

תשובות סופיות:

$$\frac{1}{2}mv^2 - G \frac{m \cdot M}{R_1} = \frac{1}{2}mv_2^2 - G \frac{m \cdot M}{R_2} \text{ .ג} \quad v_2 = v \frac{R_1}{R_2} \text{ .א} \quad (1)$$

$$M = \frac{v^2 \cdot R_1}{2G \cdot R_2} \cdot (R_1 + R_2) \text{ .ג}$$

$$a = \alpha R \text{ .ג} \quad F = \frac{(m+M)g}{2} \text{ .ג} \quad I_{\text{total}} = R^2 \left(M + \frac{1}{2}m \right) \text{ .א} \quad (2)$$

$$E_{k(t)} = \frac{1}{2}ma^2t^2 + \frac{1}{2}I\alpha^2t^2 \text{ .ט}$$

$$-v_g = \sqrt{2gl} \text{ .ג} \quad x_M = \frac{ml}{M+m} \text{ .א} \quad (3)$$

$$N_2 = \frac{\sqrt{3}Mg - 4mg}{2\sqrt{3}}, N_1 = M \cdot g - \left(\frac{\sqrt{3}Mg - 4mg}{2\sqrt{3}} \right) \text{ .ג}$$

$$v_\theta = \sqrt{\frac{PR}{m}} \text{ .ג} \quad \frac{6P}{7\pi Rm} \text{ .א} \quad (4)$$

$$l = 4a \text{ .ט} \quad \phi = \sqrt{\frac{g}{a}}t + c \text{ .ג} \quad \dot{\phi}^2 = \frac{g}{a} \text{ .ג} \quad v_F = 2\sqrt{ga} \text{ .א} \quad (5)$$

$$U(\theta) = m_T g Z_{c.m} \cos \theta \text{ .ג} \quad Z_{c.m} = \frac{h^2 - 3a^2}{4h + 8a} \text{ .ג} \quad Z_{c.m} = \frac{h}{4} \text{ .א} \quad (6)$$

$$h > \sqrt{3} \text{ .iii} \quad h < \sqrt{3}a \text{ .ii} \quad h = \sqrt{3}a \text{ .i .ט}$$

$$\mu_s \geq \frac{1}{\tan \alpha} \text{ .ג} \quad \text{ב. r לא משתנה.} \quad R = \frac{g}{\tan \alpha \cdot \omega^2} \text{ .א} \quad (7)$$

$$\omega = \frac{30}{37} \frac{v_0}{1} \text{ .ג} \quad \vec{r}_{c.m} = \frac{v_0 t}{4} (\hat{y} - \hat{x}) \text{ .ג} \quad \vec{r}_{c.m} = \frac{3}{8} L(1,1) \text{ .א} \quad (8)$$

$$\vec{r}_0 = \frac{v_0 t}{4} (\hat{y} - \hat{x}) + \frac{3l}{8} \sqrt{2} \left(\cos \left(\frac{30}{37} \frac{v_0}{1} t + \frac{5\pi}{4} \right) \hat{x} + \sin \left(\frac{30}{37} \frac{v_0}{1} t + \frac{5\pi}{4} \right) \hat{y} \right) \text{ .ט}$$

$$\ddot{z} + \frac{\lambda}{M} \ddot{z} + \frac{k}{M} z = 0 \text{ .ג} \quad h = \Delta x = \frac{-mg + \sqrt{(mg)^2 + kmv_0^2}}{k} \text{ .א} \quad (9)$$

$$, \quad y(t) = Ae^{-\frac{\Gamma}{\alpha}t} \cos(\omega t + \varphi) + y_0, \quad z(t) = Ae^{-\frac{\Gamma}{\alpha}t} \cos \left(\sqrt{\frac{k}{M} - \frac{\lambda^2}{4}} t + \varphi \right) \text{ .ג}$$

$$y(0) = 0, \quad \dot{y}(0) = -v_0$$

$$0 = \frac{g(m - \rho V)}{k} \sqrt{1 + \left(\frac{\Gamma}{2\omega} + \frac{kv_0}{\omega g(m - \rho V)} \right)^2}. \quad \text{ט}$$

$$e^{-\frac{\Gamma}{2}t} \cos \left(\omega t - \tan^{-1} \left(\frac{\Gamma}{2\omega} + \frac{kv_0}{\omega g(m - \rho V)} \right) \right) - \frac{g(m - \rho V)}{k}$$

$$x_{\max} = \frac{25a}{24} \quad \text{(10)}$$

ג. ראה סרטון.

$$\omega_p = \frac{(M+m)^2 \omega_0}{3m^2 + 4mM + M^2} \quad \text{ב} \quad x_0 = \frac{Mh}{M+m} \quad \text{א} \quad \text{(11)}$$

$$f_s = -\frac{mM(M+m)^3 \omega_0^2 R}{(3m^2 + 4mM + M^2)^2} \hat{r} + mMv_0 \omega_0 \left(\frac{(M+m)2}{3m^2 + 4mM + M^2} - \frac{4m}{(M+3m)^2} \right) \hat{\theta} \quad \text{ט}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{15g}{26R}} \quad \text{(12)}$$

$$x = u \cdot \frac{u}{\mu g} \quad \text{ט} \quad T = \frac{u}{\mu g} \quad \text{ג} \quad a' = \mu g \quad \text{ב} \quad F_{\text{ext}} = \mu mg \quad \text{א} \quad \text{(13)}$$

$$\Delta E = mu^2 - \frac{1}{2}u^2 \quad \text{ט} \quad W' = \frac{1}{2}mu^2 \quad \text{ג} \quad W = mu^2 \quad \text{ב} \quad x' = \frac{1}{2}\mu g \cdot \left(\frac{u}{\mu g} \right)^2 \quad \text{א}$$

ראה סרטון. (14)

$$\frac{-\left(-m_1g\left(x - \frac{L}{4}\right) + m_2g\frac{L}{4} - m_3g\frac{L}{4}\right)\theta}{I} = \ddot{\theta} \quad \text{(15)}$$

ראה סרטון. (16)

ראה סרטון. (17)

$$mgh + \frac{1}{2}mv_y^2 = mgH \quad \text{ב} \quad \frac{1}{2}mv_i^2 = mgh \quad \text{א} \quad \text{(18)}$$

$$\frac{1}{2}x_A^2 + 5\left(e^{\frac{1}{5}(5x_A^2)} - e\right) = \frac{1}{2}mv_s^2 \quad \text{ג}$$

$$\varphi_0 = \pi - 1.12 \approx 2 \quad \text{ב} \quad \Delta = \frac{mg}{K} = A \quad \text{א} \quad \text{(19)}$$

$$N_{\min} = m_2g, N_{\max} = m_2g + 2m_1g \quad \text{ג}$$

$$\Delta = \frac{4}{3}x_{l(t)} \quad \text{ג} \quad \text{ב. ראה סרטון.} \quad \text{א. שאלת הוכחה.} \quad \text{(20)}$$

$$\vec{v} = 23.1 \frac{m}{sec} \hat{x} + 20 \frac{m}{sec} \hat{y} \quad \text{ב} \quad x(t) \approx 53.3 \frac{m}{sec} \quad \text{א} \quad \text{(21)}$$

$$v_{Ax} = 2.1 \frac{m}{sec}, v_{Ay} = 20 \frac{m}{sec} \quad \text{ט} \quad \omega_F = -75 \frac{rad}{sec} \quad \text{ט} \quad u_x = 17.1 \frac{m}{sec} \quad \text{ג}$$

$$y(t) = 0.4 \cos(\sqrt{50}t + 0) + 0.2 \quad \text{ג.} \quad T \approx 0.89 \text{sec.} \quad \text{ב.} \quad A = 0.4 \text{m.} \quad \text{א. (22)}$$

$$U_{el} = 2J. \quad \text{ט.}$$

$$t \approx 1 \text{sec.} \quad \text{ג.} \quad \frac{T_1}{T_3} \approx 11.63 \quad \text{ב.} \quad a \approx 1.87 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}. \quad \text{א. (23)}$$

פיזיקה 1 מכניתה

פרק 25 - הידרו-סטטיקה והידרו-динמיקה -

תוכן העניינים

291 1. הידרו-סטטיקה והידרו-динמיקה


הידרו-סטטיקה והידרו-динמיקה:

שאלות:

- 1) מעבר ייחדות בדוגמה של צפיפות מים
מצא מהי צפיפות המים ביחסות של גرم לאינץ' עמוק.

$$1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \times \frac{1000\text{gr}}{1\text{kg}} \times \left(\frac{1\text{m}}{39.3\text{in}} \right)^3$$


- 2) שני כדורים קשורים בחוט בתוך המים



שני כדורים בעלי נפח זהה $V = 20\text{c.m}^3$ קשורים בחוט זה זהה.
מניחים את ה כדורים במים ולאחר זמן רב
רואים שהמערכת התייצבה כך שצדור 1
נמצא כולו בתוך המים ורכ חצי מנפחו של
צדור 2 שקע לתוך המים, ראה איור.
המסה של הצדור 1 גדולה פי 4 מזו של הצדור 2.

א. מהי המסה של כל הצדור?


ב. מהי צפיפות המסה של כל הצדור?



- 3) צינורית במיכל כספית
מיכל גדול מאוד מכיל כספית ונמצא בחדר לחץ בו לחץ
האויר אינו ידוע. טובלים במיכל צינורית זוכנית דקה
הסגורת בחלקה העליון. כאשר מחזיקים את הקצה
העליון של הצינורית בגובה 6 ס"מ מעל פני הכספית
במיכל, גובה הכספית בצינורית הוא 4 ס"מ מתחת לפני
הכספית במיכל. כאשר מחזיקים את הקצה העליון של
הצינורית בגובה 17 ס"מ מעל פני הכספית במיכל, גובה
הכספית בצינורית הוא 5 ס"מ מעל פני הכספית במיכל.
הנח שגובה פני הכספית במיכל קבוע.

א. מהו לחץ האויר בחדר?

ב. באיזה גובה צריך להחזיק את קצה הצינורית מעל
המיכל כך שפנוי הכספית בצינורית יהיה בגובה הכספית של המיכל?


4) שלושה נוזלים בצינור

האיור הבא מתאר צינור סגור שבתוכו שלושה נוזלים שונים.

כפיות הנוזלים הן :


$$\rho_1 = 800 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}, \rho_2 = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}, \rho_3 = 1200 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

מצא את הגובה y באյור.

**5) מים בנפילה + צינורית מד-לחץ**

נתונה המערכת שבסרטוט.


מצא את החלצים בנקודות השונות.

**6) צינור ונטורי ללא חיכוך**

נתונה זרימה על פי הشرطוט
(מקדם הצמיגות ידוע).


בחלק מס' 3 שטח החתך של הצינור
הינו שליש מבשר הצינור.

מצא את הלחץ בכל הנקודות 1-5 ומצא
את גובה עמוד המים מעל נקודת 3.

**7) איבוד אנרגיה עקב צמיגות**

נתון נוזל בעל צמיגות ידועה.

מצא על פי הנתונים שבסרטוט, מהי מהירות
הזרימה בצינור אם נתון מקדם הצמיגות,
רדיוס הצינור, אורך הצינור וגובה מאגר.


**8) צינור ונטורי עם חיכוך**

נתונה המערכת שבסרטוט.

שטח חתך הצינור בנקודת 3 כפול
מבשר הצינור.

א. מהי מהירות הזרימה בהנחה שאין
איבוד אנרגיה?

ב. מהי מהירות הזרימה אם נתון
מקדם הצמיגות?

**9) לחץ ממושך אדם מלא בריכת**

צינורית בקוטר d ואורך L מחוברת לתתיתית בריכה רדודה. מעלים את הלחץ בבריכה ע"י כך שמניחים אדם בעל מסה m על משטח בגודל S , כך שהמשטח לווחץ את האויר תחתיו מכובד משקל האדם (המשטח בדיק בגודל הבריכה ויכול לנוע מעלה ומטה אך האזoor תחתיו נשאר אותו).

תוק כמה זמן הבריכה תתרוקן אם נתון כי נפל המים בבריכה בתחילת הוא K וצמיגות המים היא μ ?

תשובות סופיות:

$$0.016 \frac{\text{gr}}{\text{in}^3} \quad (1)$$

$$\rho_1 = 1.6 \frac{\text{gr}}{\text{c.m}^3}, \rho_2 = 0.4 \frac{\text{gr}}{\text{c.m}^3} \quad \text{ב.} \quad m_2 = 8\text{gr}, m_1 = 32\text{gr} \quad \text{א.} \quad (2)$$

$$x = 10.8\text{c.m} \quad \text{ב.} \quad P_0 \approx 0.656\text{atm} \quad \text{א.} \quad (3)$$

$$y = 25\text{c.m} \quad (4)$$

ראה סרטון. (5)

$$P_3 = P_2 - \frac{1}{2} \rho \cdot 8V^2, P_2 = P_4 = P_{\text{atm}} + \rho gh_2 - \frac{1}{2} \rho V^2, P_1 = P_5 = P_{\text{atm}} \quad (6)$$

$$P_3 = \rho g \tilde{h}_3 + P_{\text{atm}} \quad (7)$$

ראה סרטון.

$$V^* = \sqrt{2gh_1} \quad (8)$$

ראה סרטון. (9)

פיזיקה 1 מכניתה

פרק 26 - טמפרטורה התפשטות תרמית וחוק הגז האידיאלי

תוכן העניינים

294 1. הרצאות ותרגילים

הרצאות ותרגילים:

שאלות:

1) דוגמה-טמפרטורה שווה

- א. גוף נמצא בטמפרטורה של 37°C .
מה הטמפרטורה של הגוף בפרנהייט?
- ב. מודדים את הטמפרטורה של הגוף פעם אחת בצלזיווס ופעם אחת בפרנהייט.
ומקבלים שכמוות הערך הנמדד זהה (כלומר אותו מספר בצלזיווס ובפרנהייט).
מהי טמפרטורת הגוף?

2) דוגמה-גשר ברזל

מוטות הברזל שתומכות בגשר הן באורך של 80 מטר כאשר הטמפרטורה היא 20°C מעלה צלזיווס.
אם הטמפרטורות בסביבה בו מציגים את הגשר נעות בין -10°C – $+50^{\circ}\text{C}$
מה האורך המקסימלי והמינימי של המוטות?

3) דוגמה-טבעת על מוט

הקוטר של מוט ברזל הנמצא ב- 20°C הוא 5.50cm .
רוצה ללביש טבעת, העשויה ברזל גם כן, על המוט.
קוטרה הפנימי של הטבעת ב- 20°C הוא 5.48cm .
לאיזה טמפרטורה צריך לחמם את הטבעת אם נרצה שקוטרה הפנימי יהיה ב- 0.005cm גדול מזה של המוט?

4) דוגמה-מייל מים

מייל בצורתה של גליל ברדיוס 20cm וגובה 60cm עשוי מזוכkeit רגילה.
מלאים את המייל במים בבוקר כאשר הטמפרטורה היא 15°C
(ניתן להניח שזו טמפרטורה המיאיל והמים).
כמה מים ישפכו עד השעה 00:14 בה הטמפרטורה היא 40°C ?
הזנה איבוד מים הנגרם מאידי.

5) דוגמה-בלון הליום

- א. מהי המסה האטומית של אטום הליום (He) בעל שני פרוטונים ושני נויטرونים?
ב. חשב את המסה המולקולרית של הליום?
ג. כמה מולים יש בבלון המכיל 50 גרם הליום?
ד. כמה אטומים של הליום יש בבלון?

6) דוגמה-ערובות הליום עם מיימן

ערובבו 50 מול של מיימן עם 30 מול של הליום 4. מהי מסת החומר לאחר הערבוב?

7) דוגמה-בקבוק מים

בקבוק מים מכיל 2 ליטר מים. הנח שצפיפות המים היא: 1 k g/L .

- חשב את המסה המולקולרית של מים (H_2O).
- כמה מולאים של מים יש בבקבוק?
- הצליחו לפרק כל מולקולת בבקבוק לשני אטומים של מיימן ואטום של חמץ.
- כמה מולאים של מיימן וכמה מולאים של חמץ יש בבקבוק?

8) דוגמה-חנקן דו חמוצני

חנקן דו חמוצני (O_2N) מורכב מאטום חנקן ושני אטומי חמץ.

רוצים להכין 50 מול של חנקן דו חמוצני ע"י ערובוב של מיכל המכיל חמוץ (O_2) בלבד ומיכל המכיל חנקן בלבד.

- כמה מולאים צריכים להיות בכל מיכל לפני הערבוב?
- כמה מולאים היו צריכים להיות במיכל החמצן אם חמצן היה גז חד אטומי (כלומר כל חלקיק בגז היה מורכב מאטום יחיד של חמוץ)?
- מהי מסת החמצן ומהי מסת החנקן לפני הערבוב?

9) דוגמה-מחממים גז במיכל סגור

גז מוחזק במיכל ברזל סגור בלחץ של 1 atm ובטמפרטורה של 25°C . מחממים את המיכל לטמפרטורה של 100°C . מה יהיה הלחץ של הגז במיכל?

10) דוגמה-נפח של מול ב-STP

מצא מהו הנפח של מול אחד של גז כלשהו ב-STP?

11) מנפחים בלון

מנפחים בלון בגז הליום עד אשר הוא מגיע לנפח של 2 L ב-STP.

- מהו מספר המולאים של הליום שהוכנסו לבלון?
- מהי מסת הגז שהוכנסה לבלון?
- מהי התשובה לسؤال אם הטמפרטורה היא טמפרטורת החדר (27°C).

12) לחץ בצמיג

מנחחים צמיג לפני נסיעה ללחץ של $32 \text{ psi} \approx 6,895 \text{ Pa}$ ביום בו הטמפרטורה היא 27°C . לאחר נסיעה ארוכה טמפרטורת הצמיג עולה כתוצאה מחיוך עם הכביש ל- -60°C . מה יהיה הלחץ החדש בצמיג ב- -60°C ? (שים לב שהלחץ הנמדד בצמיג הוא ביחס לחץ אטמוספרי).

13) דוגמה- מולקולות בנשימה

הערך כמה מולקולות ישנים בנשימה אחת אם בערך נפח האויר בנשימה הוא יותר אחד.

14) סרט מדידה

סרט מדידה עשוי מברזל, הסרט כoil בטמפרטורה של 15°C . מודדים עם הסרט ביום בו הטמפרטורה היא 35°C .

- אם המדידה שיראה הסרט נמוכה או גבוהה מהאורך האמיתי?
- חשב את אחוז הטעות במדידה של הסרט.

15) צולנן מנפח ריאות

צולנן מנפח את הריאות לנפח מקסימלי של 25 כאשר הוא 7 מטר מתחת לפני המים. מה יהיה נפח הריאות של הצולנן אם יעלה לפני המים ויחזיק את נשימתו עצורה? הערכה: לחץ בתחום מים גדול ב- 9.8 Pa לכל מילימטר גובה (או עומק) מתחת לפני המים.

16) מתי למלא דלק


הצפיפות של דלק ב- 0°C היא: $0.68 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$.

- מה הצפיפות של דלק ביום חם בו הטמפרטורה היא 40°C ?
- מה אחוז השינוי בצפיפות?
- אם מחיר הדלק קבוע לפי ליטרים (כלומר לפי הנפח) מתי עדיף למלא דלק ביום קר או חם?


17) שני מיכלים מחוברים ב津ור

שני מיכלים מלאים בגזים שונים ונמצאים באותה הטמפרטורה.

נפח מיכל אחד הוא 7 ולחץ בו P וນפח המיכל השני הוא $2V$ ולחץ בו $2P$. מחברים את המיכלים津ור בערך זניח. בעת הערבוב כל מולקולת מיכל



אחד מתרכבה עם מולקולת מיכל 2 ונוצרת מולקולת אחת חדשה (לא כל המולקולות במיכל 2 מתרכבות). מה הלחץ במיכלים לאחר החיבור בהנחה כי הטמפרטורה לא משתנה? (הבא תשובה באמצעות P).

**18) צינורית במיכל כספית**

מיכל גדול מאוד מכיל כספית ונמצא בחדר לחץ בו לחץ האויר אין ידוע. טובלים במיכל צינורית זוכנית דקה הסgorה בחלוקת העליון. כאשר מחזיקים את הקצה העליון של הצינורית בגובה 6 ס"מ מעל פני הכספית במיכל, גובה הכספית בצינורית הוא 4 ס"מ מתחת לפני הכספית במיכל. כאשר מחזיקים את הקצה העליון של הצינורית בגובה 17 ס"מ מעל פני הכספית במיכל, גובה הכספית בצינורית הוא 5 ס"מ מעל לפני הכספית במיכל קבוע. הנה שגובה פני הכספית במיכל קבוע.

א. מהו לחץ האויר בחדר?

ב. באיזה גובה צריך להחזיק את קצה הצינורית מעל המיכל כך שפni הכספית בצינורית יהיו בגובה הכספית של המיכל?

תשובות סופיות:

$$-40^{\circ}\text{C} \quad \text{ב.} \quad 98.6^{\circ}\text{F} \quad \text{א.} \quad \text{(1)}$$

$$l_{\max} = 80.0288_m, l_{\min} = 79.9712_m \quad \text{(2)}$$

$$T = 400^{\circ}\text{C} \quad \text{(3)}$$

$$V = 0.3563 \cdot \text{c.m}^3 \quad \text{(4)}$$

$$\text{ד. } 7.53 \cdot 10^{24} \text{ אטומים} \quad \text{ג. } 12.5\text{mol}$$

$$M = 4\text{gr} \quad m_a \approx 4_u \quad \text{א.} \quad \text{(5)}$$

$$170\text{gr} \quad \text{(6)}$$

$$111\text{mol} \quad \text{ב.} \quad 18u \quad \text{א.} \quad \text{(7)}$$

$$50\text{mol} \quad \text{א.} \quad 50\text{mol} \quad \text{ב.} \quad \text{חנקן} \quad \text{(8)}$$

$$\approx 1.25\text{atm} \quad \text{(9)}$$

$$\approx 22.41\text{L} \quad \text{(10)}$$

$$0.359\text{gr} \quad \text{ב.} \quad 0.0892\text{mol} \quad \text{א.} \quad \text{(11)}$$

$$\approx 37\text{psi} \quad \text{(12)}$$

$$\approx 2.45 \cdot 10^{22} \quad \text{(13)}$$

$$0.024\% \quad \text{ב.} \quad \text{א. נוכחה} \quad \text{(14)}$$

$$\approx 8.42\text{L} \quad \text{(15)}$$

$$0.655 \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \quad \text{א.} \quad \text{(16)}$$

$$\frac{4}{3}p \quad \text{א.} \quad \text{(17)}$$

$$10.8\text{c.m} \quad \text{ב.} \quad 0.656\text{atm} \quad \text{א.} \quad \text{(18)}$$

פיזיקה 1 מכניתה

פרק 27 - התיאוריה הקינטית של הגזים

תוכן העניינים

299 1. הסברים ותרגומ.....

הסברים ותרגול:

שאלות:

- 1) **דוגמה-אנרגייה של מולקולת האנרגיה הקינטית הממוצעת של מולקולת גז אידיאלי בטמפרטורת החדר (בערך 20°C)?**
- 2) **מהירות של מולקולת באוויר**
מצא את גודל ה- v_{rms} של מולקולת חמצן O₂ ושל מולקולת חנקן N₂ באוויר, בטמפרטורת החדר 20°C .
- 3) **דוגמה-שינוי נפח ובטמפרטורה**
גז המקיים את חוקי הגז האידיאלי נמצא במיכל סגור שיכול לשנות את נפחו.
א. מה יהיה השינוי v_{rms} של מולקולת גז אם מכפילים את נפח המיכל כאשר מחזיקים את הלחץ והטמפרטורה קבועים.
ב. פי כמה צריכה להשתנות הטמפרטורה של הגז בשביל שה- v_{rms} תגדל פי 2?

- 4) **דוגמה-מיכל הליום מלא בלוניים**
משתמשים במיכל הליום על מנת לנפח בלוניים. עם כל בלון שמנפחים מספר המולאים של הגז במיכל קטנים. האם מהירות המולקולות תגדל, תקטן או לא תשתנה?

תשובות סופיות:

$$E_k = 6.07 \cdot 10^{-21} J \quad (1)$$

$$V_{rms_{O_2}} \approx 478 \frac{m}{sec}, V_{rms_{N_2}} \approx 513 \frac{m}{sec} \quad (2)$$

$$\text{ב. פי } 4. \text{ } V_{rms} \text{ לא ישתנה.} \quad (3)$$

$$\text{א. } V_{rms} \text{ לא ישתנה, P יקטן.} \quad (4)$$

פיזיקה 1 מכניתה

פרק 28 - חום והחוק הראשון של התרמודינמיקה

תוכן העניינים

1. חום טמפרטורה ואנרגיה פנימית.....	300
2. קיבול חום ושיטת הקלורימטריה.....	301
3. חום כמוס	303
4. החוק הראשון וניתוח תהליכיים פשוטים	305
5. קיבול חום של גזים ועקרון חלוקה השווה	310
6. הקשר בין לחץ ונפח בהתפשטות אדיابتית.....	311
7. הולכה הסעה וקרינה.....	314
8. סיכום.....	317

חום טמפרטורה ואנרגיה פנימית:

סיכום כללי:

הערות	תיאור	הנוסחה
אנרגיה הפנימית של הגז תלוי רק בטמפרטורה	אנרגייה פנימית של גז אידיאלי <u>מוניאטומי</u> n - מספר המולאים $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{k}}$ T - טמפרטורה בKelvin	$E_{\text{int}} = \frac{3}{2} nRT$
תלויה רק בטמפרטורה	עבור גז אידיאלי <u>דו-אטומי</u>	$E_{\text{int}} = \frac{5}{2} nRT$

שאלות:

- 1) דוגמה - שורפים קלוריות לאיזה גובה צריך לטפס אדם שמסתו 60 ק"ג בשביל לשrown (100kilocal) 100Cal ?

תשובות סופיות:

700m (1)

קיבול חום ושיתות הקלורימטריה:

סיכום כללי:

הערות	תיאור	הנוסחה
	c - קיבול חום סגול ליחידת מסה	$Q = mc\Delta T$

שאלות:

- 1) דוגמה - מחממים ספל מים**
 ספל מים שוקל 200 גרם ועשוי מצוכית.
 כמה חום נדרש בשבייל לחםם את הספל בטמפרטורת החדר (20°C) ל- 80°C אם:
 א. הספל ריק ממים.
 ב. הספל מכיל 200 גרם מים (הנמצאים גם בטמפרטורת החדר בהתחלה).
- 2) דוגמה - הקפה מתקרר**
 מוזגים 200 סמ"ק קפה בטמפרטורה של 90°C לכוס זכוכית בעלת מסה של 150 גרם הנמצאת בטמפרטורה של 20°C .
 מה תהיה טמפרטורת הקפה בכוס במצב שיווי משקל?
 הנח כי המערכת מבודדת בקירוב.
- 3) דוגמה - מציאת קיבול חום באמצעות קלוריימטר**
 נרצה למצוא את קיבול החום של תרכובת מתכאות חדשה.
 מחממים 100 גרם מהתרכובת ל- 500°C ומעבירים אותה במהירות לתוך קלוריימטר.
 הקלוריימטר מורכב מミיכל אלומיניום בעל מסה של 0.200 kg המכיל 0.500 kg מים בטמפרטורה של 22.4°C . הטמפרטורה הסופית הנמדדת על ידי המדוחם היא 40.8°C .
 מהו קיבול החום הסגול של התרכובת?
 ניתן להזניח את החום שהולך למדוחם והחום שיווץ מהבידוד.
- 4) תרגיל וניסוי - קומקום מחם מים**
 קומקום חשמלי פועל בהספק של 1850 וואט.
 כמה זמן ייקח לקומקום לחם חצי ליטר של מים בטמפרטורה של 22.2°C ל- 100°C ?

- 5) **תרגיל ניסוי - קומוקום מחם מים - הפעם עם הקומוקום המשך של התרגיל הראשון, גם הפעם נחם חצי ליטר מים באותו הקומוקום (1850W) אבל הפעם לא נחם את הקומוקום לפני הניסוי ונחשבשוב, כמה זמן ייקח לחם את המים?**
- טמפרטורת החדר היא 21.9°C מסת הקומוקום היא 754 גרם ונניח כי הוא עשוי נירוסטה וקיבול החום של נירוסטה הוא: $500 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$.

תשובות סופיות:

$6 \cdot 10^4 \text{ J}$	ב.	10^4 J	א.	(1)
81°C				(2)
$911 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{C}}$				(3)
90 sec				(4)
100 sec				(5)

חום כמוס:

סיכום כללי:

הערות	תיאור	הנוסחה
L_F - חום כמוס להתקה (מעבר ממוקך לנוזל או להיפך) L_V - חום כמוס לרתיחה (מעבר מנוזל לגז או להיפך)	L - החום הכמוס	$Q = m \cdot L$

שאלות:

1) דוגמה - קרח במים

מכניסים קוביית קרח בטמפרטורה של 0°C – ומסה של 300 גרם לתוך מיכל מים המכיל 1.5kg מים בטמפרטורה של 20°C . מה תהיה הטמפרטורה הסופית של התערובת?

2) דוגמה - מציאת חום כמוס של כספית

ЛОקחים 1kg כספית הנמצאת במצב מוצק ובטמפרטורת ההתקה שלה, 39°C . מניחים את הכספית בתוך קלוריימטר המורכב ממיכל אלומיניום במשקל של 0.40kg ומכיל 0.47kg מים בטמפרטורה של 20°C . הכספית מותכת והטמפרטורה הסופית של התערובת היא 12°C . מהו החום הכמוס הסגוליל הדורש להתקת כספית? קיבול החום הסגוליל של כספית במצב הנוזלי הוא: $c = 140 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{C}^{\circ}}$.

3) תרגיל וניסוי - متى יגמרו המים בסיר

מחממים 400ml מים על הגז בסיר נירוסטה שמשקלו 177 גרם. מודדים את טמפרטורת המים פעם אחת ורואים שהוא 60.0°C . 63.3°C 16.68 שניות לאחר מכן הטמפרטורה היא 63.3°C .
 א. מהו קצב מעבר החום למים?
 מחממים את המים עד לנקודת הרתיחה 100°C .
 ב. כמה זמן ייקח לכל המים בסיר להפוך לאדים?

(4) רוכב אופניים

רוכב אופניים שוטה 7 ליטר מים במהלך רכיבה של 3 שעות. נניח כי בקירוב כל האנרגיה של הרוכב הולכת לאידוי המים דרך זיעה. כמה אנרגיה בקילו-קלוריות השתמש הרוכב בנסיעה? (מכיוון שהיעילות של הגוף היא בערך 20% ההערכה שככל האנרגיה הולכת לחום היא לא רוחקה).

(5) ברזל בקלורימטר

מחממים חתיכה של 300 גרם ברזל ל-180 מעלות צלזיוס ושמים אותה בקלורימטר העשו מミיכל אלומיניום בעל מסה של 90 גרם שמכיל 285 גרם גליקרים ב-12 מעלות צלזיוס. הטמפרטורה הסופית של התערובת היא 38 מעלות צלזיוס. הערך מהו קיבול החום הסגולי של גליקרים.

תשובות סופיות:

$$2^{\circ}\text{C} \quad (1)$$

$$11 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \quad (2)$$

$$\text{ב. בערך } 40 \text{ דקות.} \quad 300 \frac{\text{J}}{\text{sec}} \quad (3)$$

$$4500\text{kcal} \quad (4)$$

$$2.3 \cdot 10^3 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{C}^{\circ}} \quad (5)$$

החוק הראשון וניתוח תהליכי פשוטים:

סיכום כללי:

הערות	תיאור	הנוסחה
חום היא אנרגיה שעוברת רק בגלל הפרשי טמפרטורות. עבודה היא אנרגיה שעוברת מכל סיבה אחרת. אם המערכת מבצעת עבודה אז W יהיה חיובי ואם מותבצעת עבודה על המערכת אז W יהיה שלילי. אם חום נכנס למערכת אז Q חיובי ואם חום יוצא מהמערכת אז Q שלילי.	חוק הראשון	$\Delta E_{int} = Q - W$
כולל אנרגיה קינטית ופוטנציאלית של כל המערכת כגוף אחד (או של מרכז המסה שלה). בדרך מתיחס למערכות מכניות כמו גופים קשיחים (אבן שנזרקת לדוגמה).	חוק ראשון נוסחה מורתבת	$\Delta U + \Delta E_k + \Delta E_{int} = Q - W$
מתיחס כאשר המערכת צמודה למ Lager חום גדול והתהליך הוא קוויזיסטי (מאוד איטי).	, $T = \text{const}$ $Q = W, \Delta E_{int} = 0$	תהליך איזותרמי - טמפרטורה קבועה
מתיחס אם המערכת מבודדת או אם התהליך מהיר והחום לא מספיק לעבור.	$\Delta E_{int} = W$	תהליך אדיابتטי - $Q = 0$
		תהליך איזוברי (לחץ קבוע) וαιיזוכורי (נפח קבוע)
חיובי כאשר הנפח גדול ושלילי כאשר הנפח קטן הנוסחה נכונה לנזירים, נזלים ולሞצקים	W - עבודה שמבצעת המערכת על הסביבה P - לחץ V - נפח	$W = \int P dV$
אי אפשר לצירר התפשטות חופשית בדיאגרמת $P-V$ מכיוון שימושתני המצב לא מוגדרים במהלך ההתפשטות.	תהליך שבו גז מתפשט במרחב בצורה אדיابتית וambilי לעשות עבודה.	התפשטות חופשית - (free expansion)

שאלות:**1) דוגמה - חוק ראשון**


מוסיפים למערכת 1500 J של חום ועושים על המערכת עבודה של 1000 J. מה השינוי באנרגיה הפנימית של המערכת?

2) דוגמה - אנרגיה קינטית לחום

קליע במסה של 3.0 g נזרק לתוך עץ במהירות של 300 m/s לשניה. כמה חום נוסף למערכת קליע ועץ?

3) דוגמה - חישוב חום בתהליכי איזובי וαιיזוכורי

גז אידיאלי מתחילה מה מצב המתוור בנקודת A בגרף. דוחסים את הגז בתהליכי איזובי עד לנקודת B ולאחר מכן מתחממים את הגז בתהליכי איזוכורי עד לנקודת C. הגף המחבר בין A-L-C הוא גף איזותרמי.
א. מהי העבודה הכוללת שנעשתה בכל התהליכי A עד C?
ב. מהו החום שנוסף לגז בכל התהליכי?

**4) דוגמה - עבודה של גז במנוע**

במנוע 0.4 mol של גז אידיאלי מונואטומי מתרחבים במהירות ובצורה אדיابتית נגד הבוכנה. בתהליך, הטמפרטורה של הגז יורדת מ-1100K ל-400K. כמה עבודה ביצעה הגז?


5) מכוניות בולמות

מכונית במשקל 1300 kg נסעת במהירות 80 km/h. כמה חום נוצר במהלך הבלימה עד לעצרה מוחלטת? רשמו את התשובה בಗאול ובקילו קלוריות.

6) **תהליך נפח קבוע ולחץ קבוע**
 גז אידיאלי עובר תהליך המורכב משני שלבים.
 בשלב הראשון, AB בגרף, אפשרים לחום לצאת מהגז תוך שמירה על נפח קבוע.
 כתוצאה לכך הלחץ של הגז יורד מ- 7.5 atm ל- 3 atm .
 בשלב השני, BC הגז מתרחב בלחץ קבוע מנפח 2.0 L לנפח 5.0 L ובכך חוזר לטמפרטורה שהייתה לו בתחילת כל התהליך.

חשבו את :

- א. העבודה הכוללת שנעשתה על ידי הגז בתחילת.
- ב. השינוי באנרגיה הפנימית של הגז.
- ג. כמות החום הכוללת שייצאה או נכנסה לגז.



7) גז מתפשט איזותרמית
 1.50 מולים של גז אידיאלי בנפח 2.50 m^3 ובטמפרטורה $K = 280^\circ$ מתפשטים איזותרמית עד לנפח 5.00 m^3 .
 א. מהי העבודה שעשווה הגז?
 ב. מהו השינוי באנרגיה הפנימית של הגז?
 ג. מהו החום שנוסף לגז?

8) גז מתפשט אדיابتית
 שניים וחצי מולים של גז אידיאלי מונואטומי מתפשטים אדיابتית
 וمبرאים $\Delta V = 1.3 \cdot 10^4 \text{ L}$ של עבודה בתחילת.
 מהו השינוי בטמפרטורה של הגז במהלך ההתפשטות?

9) גז בתהלייך ריבועי*

גז אידיאלי עובר תהלייך כפי שמתואר באיור, התהלייך מתחילה במצב A ועושה סיבוב שלם עם השעון עד לחזרה למצב A.

בתהלייך אחר שבו הגז עבר מהנקודה D לנקודה C בלחץ קבוע ידוע כי: $J_{D \rightarrow C} = 38 \text{ J}$

בתהלייך שלישי שהתרחש מהנקודה B לנקודה D ידוע כי: $J_{B \rightarrow D} = -85 \text{ J}$ ו- $J_{B \rightarrow D} = W_{B \rightarrow D}$ (סוג התהלייך לא ידוע).


כמו כן ידוע כי: $J_{A \rightarrow B} = 15 \text{ J}$, $P_A = 2.2 P_D$ ו- $E_B - E_A = 55 \text{ J}$.
כל התהלייכים התרחשו על אותו הגז.

A. תאר במילים כל שלב בתהלייך הראשי, מהו סוג התהלייך, האם נעשתה עבודה, האם האנרגיה הפנימית גדלה או קטנה, האם נכנס או יצא חום מהמערכת?

B. מהי העבודה הכוללת שנעשתה על ידי הגז?

C. מהי הנצילות של התהלייך?

נצילות היא העבודה הכוללת שנעשתה חלקו החום שהושקע (כלומר נכנס לגז), כפול 100%.



תשובות סופיות:

2500J	(1)
135J	(2)
710J ב.	–710J א. (3)
א.	3500J (4)
$Q = 3.2 \cdot 10^5 \text{ J} = 77 \text{ kcal}$	(5)
910J ג.	910J א. (6)
2420J ג.	2420J א. (7)
–0.042°K	(8)

- A. B - תהליך בליחס קבוע, הגז עושה עבודה על הסביבה, האנרגיה הפנימית גדולה, נכנס חום למערכת.
- C → B - תהליך בנפח קבוע, לא נעשית עבודה, האנרגיה הפנימית קטנה, חום יוצא מהמערכת.
- D → C - תהליך בליחס קבוע, נעשית עבודה על הגז, האנרגיה הפנימית קטנה. חום יוצא מהמערכת.
- A → D - תהליך בנפח קבוע, לא נעשית עבודה, האנרגיה הפנימית גדולה, חום נכנס למערכת. ב. J 46% ג. 40%

קיבול חום של גזים ועקרון החלוקה השווה:

סיכום כללי:

הערות	תיאור	הנוסחה
	$Q_V/Q_P = Q_V/Q_V - \text{כמויות החום שעוברות בתהליכי נפח/לחץ קבוע.}$ $C_P/C_V - \text{קיבול חום בנפח/לחץ קבוע (למול)}$	$Q_V = nC_V\Delta T$ $Q_P = nC_P\Delta T$
	$m_{mol} - \text{מסה מולרית.}$ $c_P/c_V - \text{קיבול חום בנפח/לחץ קבוע (ליקידת מסה)}$	$C_V = m_{mol}c_V$ $C_P = m_{mol}c_P$
	$\text{ההפרש בין קיבול החום בלחץ קבוע לקיבול החום בנפח קבוע תמיד שווה לקבוע R}$	$C_P - C_V = R$

שאלות:

(1) אנשים מחממים אולם קולנוו

אולם קולנוו מכיל 1800 מקומות ישיבה. נפח האולם הוא: $2.0 \cdot 10^4 \text{ m}^3$.
בערב הבכורה של הסרט "טריגל חם" האולם היה מלא ומערכת האוורור התקללה.
בכמה מעלות עלתה הטמפרטורה במשך השעותים של הקרנת הסרט אם אדם
ממוצע פולט חום בקצב של 70 וואט.
הנח שהאוורור הוא גז אידיאלי דואטומי וטמפרטורת החדר היא בערך 20°C .

(2) לחץ לינארי בטמפרטורה*

גז אידיאלי דו אטומי מכיל 3.00 מולים בלחץ של 1.00 atm ובטמפרטורה של K^{430} .
הגז עובר תהליך שבו הלחץ שלו גדל לינארית עם הטמפרטורה.
הטמפרטורה הסופית היא K^{680} והלחץ הסופי הוא 1.80 atm.
הנח שבכל התהליכי יש 5 דרגות חופש פעילות.
א. מהו השינוי באנרגיה הפנימית של הגז?
ב. מהי העבודה שנעשתה על ידי הגז?
ג. החום שנוסף לגז?

תשובות סופיות:

(1) 53°C

(2) א. 13900J ב. -1720 J ג. 15600J


הקשר בין לחץ ונפח בהתרפשות אדיابتית:

סיכום כללי:

הערות	תיאור	הנוסחה
	הקשר בין לחץ ונפח בתהליכי אדיابتטי קווזיסטטי	$P \cdot V^\gamma = \text{const}$

שאלות:

- 1) דוגמה - מכווצים גז אדיابتטי ואיזותרמיות גז אידיאלי מונואטומי עבר תהליך כפי שמתואר בגרף. התהליך מתחילה מהמצב A והגז עבר כיוך אדיابتטי עד למצב B ומשם הוא מכועץ איזותרמיות עד לנקודה C.
- נתון: $P_A = 2.00\text{kPa}$, $V_A = 2.00\text{m}^3$, $P_B = 4.00\text{ kPa}$, $V_C = 1.00\text{m}^3$ ו- P_C ו- V_B אינם ידועים.
- א. מצא את V_B .
- ב. מהי העבודה הכוללת שנעשתה על הגז בתהליכי?



- 2) לחץ וטמפרטורה בהתרפשות אדיابتית גז 1.00mol של גז מונואטומי אידיאלי בלחץ של 1.00atm ובטמפרטורה של 20°C מתפשט אדיابتטי לנפח הגדול פי 2.25 מנפחו המקורי. מהם הלחץ והטמפרטורה הסופיים של הגז?

- 3) גז דו-אטומי מתפשט אדיابتטי גז דו-אטומי מתפשט אדיابتטי. הטמפרטורה בהתחלה היא 15°C והטמפרטורה בסוף היא 25°C . הנפח בהתחלה הוא: 0.036m^3 . מהו נפח הגז בסוף התהליכי?

4) גז עובר תהליך בשלושה שלבים

ומס. 1.00 של גז אידיאלי מונואטומי שנמצא בלחץ 1.00 atm עובר את התהליך הבא:

שלב 1 - הגז מתפשט אדיابتית מ- $T_A = 578^\circ\text{K}$ עד ל- $T_B = 388^\circ\text{K}$.

שלב 2 - הגז נדחס בלחץ קבוע עד שהטמפרטורה שלו מגיעה ל- T_C .

שלב 3 - הגז חוזר לטמפרטורה ולהלחץ הראשונים שלו בתהליכי של נפח קבוע.

א. שרטטו את התהליכי בתיאוגרפיה V – P.

ב. מהו T_C ?

ג. חשבו את השינוי באנרגיה הפנימית, את העובודה שביצע הגז ואת החום שנוסף לגז בכל שלב בנפרד ובתהליכי כולל.

5) צבר אוויר עולה בגובה **

צבר אוויר הוא אוסף של מולקולות בעלי משקל עצמי מצב אחדים (לחץ וטמפרטורה) כשהצבר אוויר עולה בגובה הוא משנה את הלחץ שלו בהתאם ללחץ של האוויר

$$\text{מסביבו, ולפי הנוסחה: } \frac{dP}{dy} = -\rho g.$$

כאשר ρ הוא צפיפות המסה של הצבר והוא תלוי בגובה.

במהלך התנועה כלפי מעלה, הנפח גדול, ומכיון שאויר הוא מוליך חום גרווע אפשר להניח שההתפשטות היא אדיابتית.

א. הראה שעובר גז אידיאלי שעובר תהליכי אדיابتוי: $P^{1-\gamma} T^\gamma = \text{const}$

ב. הראה כי הקשר בין הלחץ לטמפרטורה של הצבר נתון לפי

$$\text{הנוסחה: } 0 = \gamma \frac{P}{T} \frac{dT}{dy} + \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right).$$

ג. הראה כי התלות של הטמפרטורה בגובה היא: $\frac{dT}{dy} = \frac{1-\gamma}{\gamma} \frac{mg}{k}$,

כאשר m היא מסה ממוצעת של מולקולה ו- k הוא קבוע בולצמן.

ד. בהינתן שאויר הוא גז דו אטומי עם מסה ממוצעת של 29,


$$\text{הראה ש- } \frac{dT}{dy} = -9.8^\circ\text{C/m}.$$

ה. בקליפורניה ישנו רוחות שמנויות מהרים של מדבר סיריה בנבדה.

גובה ההרים הוא כ- 4000 m . הרוחות מגיעות לעمق המות שגובהו 100 m –

ביחס לפני הים. אם טמפרטורת הרוח היא 5°C – בהרים של נודעה מה תהיה

הטמפרטורה של הרוח בעמק?




תשובות סופיות:

$$3.4 \cdot 10^3 \text{ נ. ב. J}^3 \quad \text{מ}^3 \quad \text{(1)}$$

$$P = 0.258 \text{ atm}, T = -103^\circ\text{C} \quad \text{(2)}$$

$$0.052 \text{ m}^3 \quad \text{(3)}$$

$$214^\circ\text{K} \quad \text{ב. נ. א. (4)}$$



ג. שלב AB : $Q = 0, \Delta E_{int} = -2370 \text{ J}, W = 2370 \text{ J}$

שלב BC : $Q = -2170 \text{ J}, \Delta E_{int} = -2170 \text{ J}, W = -1450 \text{ J}$

שלב CA : $Q = 3030 \text{ J} = \Delta E_{int}, W = 0$

כל התהליך : $Q = 920 \text{ J}, \Delta E_{int} = 0, W = 920 \text{ J}$

- 5) א. הוכחה. ב. הוכחה. ג. הוכחה. ד. הוכחה. ה. 35°C

הולכה הסעה וקרינה:

סיכום כללי:

הערות	תיאור	הנוסחה
אם אחד מהמשתנים אינו קבוע אז עוברים לנוסחה דיפרנציאלית $\frac{dQ}{dt} = -kA \frac{dT}{dx}$ המינוס בנוסחה אומר שקצב הולכת החום הוא בכיוון הפוך לגדיאנט הטמפרטורה (כלומר קצב הולכת החום הוא מהטמפרטורה הגבוהה לנמוכה)	קצב הולכת חום - $\frac{\Delta Q}{\Delta t}$ k - מוליכות תרמית A - שטח חותך. l - אורך.	$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = kA \frac{(T_1 - T_2)}{l}$
R גובה אומר מבודד טוב. לשים לב- R תלוי גם באורך של החומר ולא רק בסוג.	R- value	$R = \frac{l}{k}$
שימוש לב-הקצב תלוי בטמפרטורה בריבועית. ϵ - תוכנה של פני הגוף שקוורן בגופים שחורים (לדוגמה פחים) $1 \approx \epsilon$, במתכונות מבריקות. $0 \approx \epsilon$.	משוואת סטפן בולצמן - קצב החום הנפלט מגוף עיי' קרינה. $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8} \frac{W}{m^2 \cdot K^4}$ קבוע סטפן בולצמן. T - הטמפרטורה של הגוף הפלט. ϵ - קוורן (אמיסיביות) $0 < \epsilon < 1$	$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = \epsilon \sigma A T^4$
האמיסיביות זהה לקליטה ופליטה. הקצב של קליטה קשור לטמפרטורה של הסביבה בריבועית.	קצב קליטה של קרינה. T_2 - הטמפרטורה של הסביבה.	$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = \epsilon \sigma A T_2^4$
	הנתו של קצב פליטה הקרן (פליטה פחות קליטה) T_1 - הטמפרטורה של הגוף הפלט. T_2 - הטמפרטורה של הסביבה.	$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = \epsilon \sigma A (T_1^4 - T_2^4)$
הקבוע הסולרי $1350 \frac{W}{m^2 \cdot s}$ האטמוספירה יכולה לספג עד 70% מהקרן. ביום בהיר הקבוע בערך $1000 \frac{W}{m^2 \cdot s}$	כמות החום שספג גוף כתוצאה מקרינה-המשמש ביום בהיר	$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = \left(1000 \frac{W}{m^2 \cdot s} \right) \epsilon A \cos \theta$

שאלות:**1) דוגמה - איבוד חום דרך חלונות בבית**

מקור רציני לאיבוד החום בבית הוא דרך החלונות.

חשבו את קצב איבוד החום דרך חלון זכוכית בגודל $1.0m \times 1.5m$ ועובי $2.8mm$.
 אם הטמפרטורה מצד הפנימי של החלון היא $18^{\circ}C$ ובצד החיצוני היא $17^{\circ}C$.

2) דוגמה - קירור באמצעות קרינה

אדם יושב בחדר לובש בגדי ים בלבד.

הקיריות של החדר נמצאים בטמפרטורה של $15^{\circ}C$.

הערץ את כמות החום שהאדם מאבד כתוצאה מקרינה.

הנח שטמפרטורת העור היא בערך $34^{\circ}C$ ו- $0.70 = \epsilon$.

שטח הפנים של האדם שבמגע עם האוויר הוא: $-1.5m^2$.

3) דוגמה - הערך את הרדיוס של הכוכב ביטלגוס

כוכב הענק ביטלגוס פולט קרינה בקצב שהוא פי 10^4 גדול מהקצב של השימוש שלו.

הטמפרטורה על פני הכוכב ביטלגוס היא בערך חצי מזו של השימוש.

הערך את הרדיוס של הכוכב אם $\epsilon = 1$ עבור השימוש וביטלגוס ורדיווס השימוש

הוא: $m^8 \cdot 10 \cdot R_s = 7 \cdot 4\pi R^2$. הנוסחה לשטח פני כדור היא:

4) מוט נחושת עם טמפרטורות שונות בקצוות

מוט נחושת באורך של $m. 42c$ וקוטר $m. 2.6c$ מוחזק מצד אחד בטמפרטורה

של $320^{\circ}C$ ובצדו השני המוט טבול במים בטמפרטורה של $20^{\circ}C$.

חשבו את קצב מעבר החום במוט.

5) מוט נחושת מחובר למוט אלומיניום


מוט נחושת מחובר בקצה למוט אלומיניום, שני המוטות בעלי אותו שטח חתך

ואותו האורך. הקצה השני של האלומיניום נמצא בתוך תנור בטמפרטורה

קבועה של $215^{\circ}C$ והקצה השני של הנחושת נמצא בתוך קרח בטמפרטורה

קבועה של $0^{\circ}C$.

חשבו את הטמפרטורה בנקודת החיבור של המוטות.




6) קרח נמס בצדנית

צדנית בגודל $m = 50c.m \times 30c.m \times 20c.m$ עשויה מלקר. הקירות של הצדנית הן בעובי $m = 1.5c.m$. ממלאים את הצדנית בקרח ב- 0°C . כמה זמן ייקח לקרח להתמוסס אם הצדנית נמצאת בחדר בו הטמפרטורה היא 32°C ?

המוליכות התרמית של מלקר היא: $\frac{W}{m \cdot K} = 0.033$ והצפיפות של קרח היא: $9.17 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$.

7) קרח נמס בשמש

כמה זמן לוקח לשמש להמיס קוביית קרח ביום בהיר אם הקרח נמצא בטמפרטורה של 0°C וצורתו היא משטח ישר בגודל 1.0m^2 ובעובי $m = 1.0c.m$. הנח שהזווית של הקרןאים עם האנך למשטח היא 30° והאmissיות של הקרא הוא 0.050.

**8) איבוד חום דרך קיר עם שכבה בידוד**

בידוד של קיר מורכב משכבה של לבנים ברוחב של $m = 20c.m$. השכבה בידוד נוספת נוספת בעלת: $R_{-value} = 3 \frac{\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{C}^{\circ}}{\text{J}}$. מהו קצב החום המועבר אם השטח של הקיר הוא 15m^2 והפרש הטמפרטורות הוא 30°C .

תשובות סופיות:

$$(1) \frac{450 \text{ J}}{\text{sec}}$$

$$(2) \frac{120 \text{ J}}{\text{sec}}$$

$$(3) 2.8 \cdot 10^{11} \text{ m}$$

$$(4) \frac{140 \text{ J}}{\text{sec}}$$

$$(5) 74^{\circ}\text{C}$$

$$(6) \text{בערך } 58 \text{ שניות.}$$

$$(7) \text{בערך } 20 \text{ שניות.}$$

$$(8) \frac{140 \text{ J}}{\text{sec}}$$

סיכום:**טבלאות:**

קיבול חום סגולי (Specific Heats) (ב 20°C ו- 1 atm إلا إذا تم ذكر المقدار آخر)		
Substance	Specific Heat, c kcal/kg · $^{\circ}\text{C}$ (= cal/g · $^{\circ}\text{C}$)	J/kg · $^{\circ}\text{C}$
Aluminum	0.22	900
Alcohol(ryhyl)	0.58	2400
Copper	0.093	390
Glass	0.20	840
Iron or steel	0.11	450
Lead	0.031	130
Marble	0.21	860
Mercury	0.033	140
Silver	0.056	230
Wood	0.4	1700
Water		
Ice (-5°C)	0.50	2100
Liquid (15°C)	1.00	4186
Steam (110°C)	0.48	2010
Human body (average)	0.83	3470
Protein	0.4	1700

חום כמוס (בלחץ של 1 atm)						
Substance	Melting Point ($^{\circ}\text{C}$)	Heat of Fusion		Boiling Point ($^{\circ}\text{C}$)	Heat of Vaporization	
		kcal/kg*	kJ/kg		kcal/kg*	kJ/kg
Oxygen	-218.8	3.3	14	-183	51	210
Nitrogen	-210.0	6.1	26	-195.8	48	200
Ethyl alcohol	-114	25	104	78	204	850
Ammonia	-117	8.0	33	-33.4	33	137
Water	0	79.7	333	100	539	2260
Lead	327	5.9	25	1750	208	870
Silver	961	21	88	2193	558	2300
Iron	1808	69.1	289	3023	1520	6340
Tungsten	3410	44	184	5900	1150	4800

קיבול חום של גזים ב 15°C						
Gas	Specific heats (kcal/kg · K)		Molar specific heats (cal/mol · K)		$C_V - C_P$ (cal/mol · K)	$\gamma = \frac{C_P}{C_V}$
	c_V	c_P	C_V	C_P		
Monoatomic						
He	0.75	1.15	2.98	4.97	1.99	1.67
Ne	0.148	0.246	2.98	4.97	1.99	1.67
Diatomeric						
N_2	0.177	0.248	4.96	6.95	1.99	1.40
O_2	0.155	0.218	5.04	7.03	2.00	1.40
Triatomic						
CO_2	0.153	0.199	6.80	8.82	2.03	1.30
H_2O (100°C)	0.350	0.482	6.20	8.20	2.00	1.32

מוליכיות תרמיות		
Substance	Thermal Conductivity,k kcal (s.m.C°)	J (s.m.C°)
Silver	10×10^{-2}	420
Copper	9.2×10^{-2}	380
Aluminum	5.0×10^{-2}	200
Steel	1.1×10^{-2}	40
Ice	5×10^{-4}	2
Glass	2.0×10^{-4}	0.84
Brick	2.0×10^{-4}	0.84
Concrete	2.0×10^{-4}	0.84
Water	1.4×10^{-4}	0.56
Human tissue	0.5×10^{-4}	0.2
Wood	0.3×10^{-4}	0.1
Fiberglass	0.12×10^{-4}	0.048
Cork	0.1×10^{-4}	0.042
Wood	0.1×10^{-4}	0.040
Goose down	0.06×10^{-4}	0.025
Polyurethane	0.06×10^{-4}	0.024
Air	0.055×10^{-4}	0.023

פיזיקה 1 מכניתה


פרק 29 - החוק השני של התרמודינמיקה

תוכן העניינים

1. הקדמה לחוק השני של התרמודינמיקה ומנועי חום.....	319
2. תהליכיים הפיכים ובלתי הפיכים ומנוע קרנו.....	322
3. מקרים מגנים ומשאבות חום.....	325
4. אנתרופיה.....	327
5. סיכום	(לא ספר)
6. פרשנות סטטיסטית לאנתרופיה והחוק השני.....	331

הקדמה לחוק השני של התרמודינמיקה ומנועי חום:

סיכום כללי:

הערות	תיאור	הנוסחה
שיםו לב לסימנים! כל הסימנים חיוביים! T_L ו- T_H נקבעות העובודה טמפרטורות המנוע	Q_H - כמות החום שיצאת מהמאגר החם. Q_L - כמות החום שוכנסת אל המאג'ר הקד. W - העבודה שהמנוע מבצע על הסביבה.	 $Q_H = W + Q_L$
		$\eta = \frac{W}{Q_H} = 1 - \frac{Q_L}{Q_H}$

שאלות:

1) דוגמה - נצילות של מנוע מכוני

למנוע של מכונית יש נצילות של 20%. המנוע מפיק $\text{J} 25\text{k}$ של עבודה כל שנייה.

א. כמה חום נדרש להכניס למנוע כל שנייה?

ב. כמה חום נפלט מהמנוע כל שנייה?

2) חישוב נצילות של מנוע חום

מנוע חום פולט $\text{J} 6900\text{6}$ של חום כאשר הוא מבצע עבודה של $\text{J} 2300\text{.}$

מה הנצילות של המנוע באחוזים?

3) חום שפולטת תחנת כוח

תחנת כוח מייצרת $\text{MW} 560$ של הספק חשמלי.

העריכו את החום שנפלט כל שנייה אם הנצילות של התחנה היא 35%.

4) מנוע 6 צילינדרים

למנוע עם 6 צילינדרים של אותו יש נצילות של 24%. המנוע מספק 180 J של עבודה בכל מחזור עבור כל צילינדר. המנוע עושה 25 מחזוריים בשניה.

- מהי העבודה הכוללת שמבצע המנוע בשניה?
- מהו החום שנוצר משריפת הדלק כל שנייה?
- אם האנרגיה הנוצרת מדלק הוא 32 MJ ליטר, כמה זמן מחזיק מכל דלק מלא המכיל 40 ליטר דלק?


5) מנוע הפיך עם גז ארגון

מנוע הפיך מכיל 1.00 m^3 של גז ארגון, גז מונואטומי כמעט אידיאלי.

התהליך שעובר המנוע מתואר באירור כאשר הגז בהתחלה בנקודה A ב-STP. הנקודות B ו-C נמצאות על עקומה איזותרמית בטמפרטורה $T = 433 \text{ K}$.

התהליך AB הוא תהליך בנפח קבוע וההתהליך AC הוא תהליך בלחץ קבוע.

- אם המנוע מבצע את התהליך באירור עם כיוון השעון או נגד השעון?
- מהי הנצילות של המנוע?

**6) מנוע בנזין אידיאלי**

אפשר לתאר את הפעולה של מנוע דיזל בקרוב על ידי התהליך המחזורי באירור.

אויר נשאב לצילינדר בפיעמת ינית (לא חלק מהמחזור באירור).

האויר נדחס אדיابتית, שלב AB.

בנקודה B דלק דיזל מזרק לתוך הצילינדר.

הדלק נשרף ישיר כי הטמפרטורה מאוד גבוהה.

הבעירה היא יחסית איטית ובמהלך החלק הראשון

של פיעמת העבודה הגז מתרפש כמעט בנפח קבוע, שלב BC.

בשלב השני של פיעמת העבודה, אחורי שהבעירה מסתיימת, הגז מתרפש אדיابتית, שלב CD.

שלב DA מתאר את פיעמת הפליטה.

- הראה שעובר מנוע שעובר את התהליך הנ"ל עם גז אידיאלי הנצילות האידיאלית

$$\text{היא: } \frac{(V_A/V_c)^{-\gamma} - (V_A/V_B)^{-\gamma}}{\gamma[(V_A/V_c)^{-1} - (V_A/V_B)^{-1}]} = 1 - \eta.$$

V_A/V_B נקרא יחס הדחיסה ו- V_A/V_c נקרא יחס התרחבות "expansion ratio".


- חשב את הנצילות אם הגז הוא דו אטומי, $V_A/V_B = 16$ ו- $V_A/V_c = 4.5$

תשובות סופיות:

- | | | | |
|-------|----|---------|------------------------|
| 100kJ | ב. | 125kJ | (1) |
| 25% | | | (2) |
| | | 1000J | (3) |
| 3.2hr | | 110000J | ב. (4) |
| | | 27000J | א. (5) |
| | | | א. עם השעון. ב. 9% (6) |
| | | | א. הוכחה. ב. 55% |


תהליכיים הפיכים ובלתי הפיכים ומנוע קרנו:

סיכום כללי:

הערות	תיאור	הנוסחה
השתח שסגור בתוך הכלולאה שווה לעבודה נטו שנעשית על ידי המנוע. מורכב מ процесים הפיכים ולכן לא קיימים במציאות, ניתן רק לשאוף אליו.	מחזור קרנו	
נראית גם נצילות אידיאלית או מקסימאלית	נצילות במנוע קרנו	$\eta = 1 - \frac{T_L}{T_H}$

שאלות:

- 1) דוגמה - טענה לא הגיוניות
 יזכר רכוב טוען כי במנוע שייצר קצב הכניסה של החום הוא 5 kJ/s בטמפרטורה של 162°C וקצב הפליטה של החום הוא 4.1 kJ/s בטמפרטורה של 22°C .
 האם אתם מאמינים ליוצר?



- 2) דוגמה - נצילות של מנוע עיריה
 המחזoor של מנוע עיריה מתואר באוויר.
 הניחו שהחומר העבודה הוא גז אידיאלי.
 א. הראו כי הנצילות של המנוע היא:

$$\eta = 1 - \left(\frac{V_A}{V_B} \right)^{1-\gamma}$$
.
 ב. חשבו את הנצילות של המנוע אם יחס הדחיסה הוא: $\frac{V_A}{V_B} = 7.0$ והגז הוא דוatomic בדומה ל- O_2 או N_2 .

**(3) מנוע חום עם חנקן נוזלי**

זה לא הכרחי שהמאגר החם של מנוע חום יהיה יותר חם מהסבירה. חנקן נוזלי זול בערך כמו בקבוק מים והטמפרטורה שלו היא בערך 77 K . מה תהיה הנזילות המקסימאלית של מנוע הפעול בין הטמפרטורה של חנקן נוזלי לטמפרטורת החדר 293 K ?

(4) מנוע W100

מנוע קרנו פועל בטמפרטורות 190°C ו- 25°C . ההספק של המנוע הוא $W100$. כמה חום פולט המנוע כל שנייה?

(5) מטפס הרים

הניחו שאדם ששוקל 70 kg צריך $10^3 \cdot 4.3 \text{ kcal}$ של אנרגיה בשבייל يوم אחד של פעילות. הערכו את הגובה המקסימאלי שאוטו אדם יכול לטפס על הר עם כמות זו של אנרגיה. כהערכה גסה אפשר להתייחס לאדם כמנוע הפעול בין טמפרטורות הגוף 37°C לטמפרטורת הסביבה 20°C .

(6) טמפרטורת עבודה בנסיעה

מכוניות מייצרת עבודה בקצב של בערך $7 \frac{\text{kJ}}{\text{sec}}$ כאשר היא נוסעת במהירות

קבועה של $\frac{m}{sec} 25$ בכביש אופקי, זהה עבודה נגד כוח החיכוך.

המכונית יכולה לנסוע 14 km לכל ליטר דלק.

מה ערך המינימלי של T_h אם $T_l = 25^\circ\text{C}$ והאנרגיה הזמין מליטר אחד של דלק היא: $J \cdot 10^7 \cdot 3.2$?

(7) חישובים במחזור קרנו

מול אחד של גז מונואטומי עבר תהליך של מחזור קרנו, כאשר 380°C $T_h = 180^\circ\text{C}$ ו- $T_l = 7.8\text{ atm}$.


לחץ ההתחלתי הוא 7.8 atm במהלך ההתרחבות האיזותרמית הנפח מוכפל.


א. מהם לחץ והנפח בנקודות: A, B, C, D?

ב. מצאו את W , Q , ו- ΔE_{int} עבר כל שלב בתהליך.

ג. חשבו את הנזילות של המנוע באמצעות

$$\text{המשוואות: } \eta = 1 - \frac{T_l}{T_h} \quad \text{ו-} \quad \eta = 1 - \frac{Q_L}{Q_H}$$





8) יחס דחיסה במנוע עיריה
 במנוע שמתנהג בקרוב כמו המחזור של מנוע עיריה
 הדלק מצוי בסוף שלב הדחיסה האדיابتית.

טמפרטורת החצחה של דלק מסוג אוקtan 95 היא 280°C
 ובנחה שחומר העבודה הוא גז שmagiu מהאוויר
 (דו אטומי בטמפרטורה 25°C) קבעו מהו יחס הדחיסה

$$\cdot \frac{V_A}{V_B}$$

תשובות סופיות:

1. לא.

2. ב. הוכחה. א. 54%.

3. 74%

4. 5000J

5. 1400m

6. 400°K

7. $P_B = 4 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, $V_B = 1.4 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3$, $P_A = 7.9 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, $V_A = 0.69 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3$.

$P_D = 3.2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, $V_D = 1.2 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3$, $P_C = 1.6 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, $V_C = 2.4 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3$

ב. $\Delta E_{\text{int}}_{BC} = -2500 \text{ J}$, $Q_{BC} = 0$, $W_{BC} = 2500 \text{ J}$, $\Delta E_{\text{int}}_{AB} = 0$, $Q_{AB} = W_{AB} = 3800 \text{ J}$


$\Delta E_{\text{int}}_{DA} = 2500 \text{ J}$, $Q_{DA} = 0$, $W_{DA} = -2500 \text{ J}$, $\Delta E_{\text{int}}_{CD} = 0$, $Q_{CD} = W_{CD} = -2600 \text{ J}$

ג. $\eta = 31\%$

7.1 (8)

מקררים מזגנים ומשאבות חום:

סיכום כללי:

הערות	תיאור	הנוסחה
	מקדם הייעילות של מקרר או מזגן	$COP = \frac{Q_L}{W} = \frac{Q_L}{Q_H - Q_L}$
	עבור מקרר או מזגן אידיאלי (לא מושלם)	$COP_{ideal} = \frac{T_L}{T_H - T_L}$
תמיד גدول אחד	מקדם הייעילות של משאבת חום	$COP = \frac{Q_H}{W}$

שאלות:

1) דוגמה - מכינים קרח

למקפיה יש מקדם יעילות של 3.6 והוא עובד בהספק של $W=200$.
כמה זמן ייקח למקפיה להקפיה מגש קוביות קרח אם המגש הוכנס למקרר המכיל 400g מים ב- 0°C ?

2) דוגמה - משאבת חום

למשאבת חום מקדם יעילות של 3.0 והספק של $W=1200$.

א. כמה חום היא מוסיפה לחדר כל שנייה?

ב. אם הופכים את פעלת המשאבה בקיז' כך שתשתמש כמזגן, מה תצפו
шибיהה מקדם הייעילות שלה?

(3) מקדם יעילות של מקרר אידיאלי

מקרר אידיאלי מחזק את הטמפרטורה בתוכו ב- $C^{\circ}4$ כאשר הטמפרטורה בבית היא $C^{\circ}25$. מהו מקדם הייעילות של המקרר?

(4) מנוע קרנו עובד הפוך

למנוע אידיאלי (מנוע קרנו) יש נצילות של 37%. אם היה אפשר להפעיל את המנוע הפוך כך שייעבוד בתור משאבת חום, מה היה מקדם הייעילות של המנוע?

(5) מקרר קרנו אידיאלי מקפיא מים

"מקרר קרנו" (מנוע קרנו שעבוד הפוך) מוציא חום מתא ההקפאה הנמצאת בטמפרטורה של $C^{\circ}15$ – ופולט אותו לחדר בטמפרטורה של $C^{\circ}25$.

א. הראו כי אם מקדם הייעילות של מקרר מוגדר לפי:

$$COP = \frac{Q_L}{W}$$

אז מקדם הייעילות של מקרר קרנו הוא:

$$COP_{ideal} = \frac{T_L}{T_H - T_L}$$

ב. כמה עבדה מבצע המנוע לשנות $kg\cdot0.6$ של מים ב- $C^{\circ}25$ לקרח ב- $C^{\circ}-15$?
אם ההספק של המדחס במנוע הוא W_{160} , מהו הזמן המינימלי הדרוש להקפיא מים בטמפרטורה של $C^{\circ}25$ לקרח ב- $C^{\circ}0$?

(6) משאבת חום לא אידיאלית

משאבת חום פועלת כמזון ושמורת את הטמפרטורה בתחום הבניין על $C^{\circ}24$ כאשר הטמפרטורה בחוץ היא $C^{\circ}40$.

בשביל לבצע זאת המשאבה שואבת $J^7 10 \cdot 3$ חום בשעה מתוך הבניין בייעילות של 25% מהיעילות האידיאלית (זו של מקרר קרנו).

א. מהו מקדם הייעילות של המשאבה?

ב. מהו ההספק של המדחס במשאבה? רשום תשובה בכוח סוס.

תשובות סופיות:

1) בערך 3 דקוט.

2) א. 4600J ב. 2

3) 13

4) 2.7

5) א. הוכחה. ב. $4.4 \cdot 10^4$


6) א. 4.6 ב. 2.4HP

אנטרופיה:**סיכום כללי:**

הערות	תיאור	הנוסחה
רק בטמפרטורה קבועה ובתהליך חפייך T - בקלוין!	Q - כמות החום שנכנסת למערכת	$\Delta S = \frac{Q}{T}$
	האנטרופיה היא משתנה מצב של המערכת	השינוי באנטרופיה לא תלוי בתהליך

שאלות:**1) דוגמה - שינוי באנטרופיה כמשמעותם מים**מערבבים 5 kg מים ב- 20°C עם 5 kg מים ב- -24°C .

- א. מה תהיה הטמפרטורה הסופית של המים המערבים?
 ב. הערכו את השינוי באנטרופיה של כל המערכת.

**2) דוגמה - שינוי באנטרופיה בהתפשטות חופשית**גז מתפשט לצורה אדיאבטית וחופשית
(כפי שמתואר בפרק הקודם בסרטון התפשטות
חופשית) מנפח V_1 לנפח V_2 .

- א. חשבו את השינוי באנטרופיה של הגז.
 ב. מהו השינוי באנטרופיה של הסביבה?
 ג. הערך את השינוי באנטרופיה עבור $1.00 = \text{ח ו}-V_1$. $V_2 = 2.00V_1$

3) דוגמה - נחושת חמה נזרקת לתוך אגםגוש נחושת חם בעל מסה של 2.00kg בטמפרטורה של $K = 840^\circ$ נזרק לאגםגדול בטמפרטורה של $K = 280^\circ$.הניחסו כי האגם מספיק גדול כך שהטמפרטורה שלו לא משתנה באופן מהותי.
מהו השינוי באנטרופיה של :

- א. הנחושת.
 ב. האגם.
 ג. הכלול.

4) דוגמה - קוביות קרח נמסה

קוביות קרח במשקל של 1.00kg ובטמפרטורה של 0°C נמצאת ב מגע עם מאגר חום גדול שהטמפרטורה שלו היא מעט מעל 0°C .
 כתוצאה לכך הקרח נמס מאוד לאט למים.
 מה השינוי באנטרופיה של:
 א. הקרח.
 ב. המאגר.

5) שינוי באנטרופיה של מים שהופכים לאדים

מהו השינוי באנטרופיה של 150g מים ב- -100°C שהופכים לאדים ב- -100°C ?

6) קופסה מחליקה על משטח עם חיכוך

קופסה בעלת מסה של 6.5kg מחליקה על משטח אופקי לא חלק (קיים חיכוך קינטי).
 חשבו את השינוי באנטרופיה של היקום מתחילה תנועתה של הקופסה ב מהירות $\frac{5}{\text{sec}}$ ועד לעצירתה. הניחו שכל הגוף נמצאים בטמפרטורת החדר 293K .

7) מים מתקררים ממאגר קרח


1.0L של מים ב- 0°C נמצאים ב מגע עם כמות גדולה של קרח ב- -10°C .
 כתוצאה לכך המים קופאים ומתקקרים גם ל- -10°C .
 חשבו את השינוי הכלול באנטרופיה.

8) מוט ברזל נזרק למים

מוט ברזל בעל מסה של 1.8kg ובטמפרטורה של 43°C נזרק למיכל מים המצופה ב קלקר.
 המיכל מכיל 1.2kg מים בטמפרטורת החדר (20°C).
 מהו השינוי הכלול באנטרופיה?

9) גז אידיאלי מתחפט איזותרמית

גז אידיאלי מתחפט איזותרמית $K = T = 350^{\circ}\text{C}$ מנפח 2.30L ולחץ 6.9atm לחץ 1.0atm .
 מהו השינוי באנטרופיה של הגז?



- 10) גז אידיאלי עובר תהליך מוזר**
 גז אידיאלי המכיל n מוללים עובר את התהליך המצוואר באיוור.
 הטמפרטורה בנקודות A ו-B זהה.
 חשבו את השינוי באנטרופיה של הגז בעקבות התהליך.
 nV_A , V_A , nV_B , נתוניים.

11) שני גזים מתערכבים

deg 1.00mol של גז חנקן ו-1.00mol של גז חמצן נמצאים בתאים נפרדים, זהים בגודלם, באותה הטמפרטורה וմבודדים מהסביבה. מחברים בין התאים והגזים (האידיאלים) מתערכבים:
 מהו השינוי באנטרופיה של:
 א. כל המערכת?
 ב. של הסביבה?
 ג. חוזר על סעיף א' אם התא של אחד הגזים גדול פי שניים מהתא של השני.

12) קיבול חום מולרי משתנה

קיבול החום המולרי של אשלגן בטמפרטורות נמוכות משתנה עם הטמפרטורה לפי $C_V = \alpha T + \beta T^3$ כאשר $\alpha = 2.08 \frac{\text{mJ}}{\text{mol} \cdot \text{K}^4}$ ו- $\beta = 2.57 \frac{\text{mJ}}{\text{mol} \cdot \text{K}^2}$.
 מצאו את השינוי באנטרופיה של 1.00mol של אשלגן כאשר הטמפרטורה שלו יורדת מ-4.0K ל-2.0K בתהליכי בנפח קבוע.

תשובות סופיות:

$$1 \frac{\text{J}}{\text{k}} \cdot \text{ב.} \quad 22^\circ\text{C} \cdot \text{א.} \quad (1)$$

$$5.76 \frac{\text{J}}{\text{k}} \cdot \text{ג.} \quad \Delta S = 0 \cdot \text{ב.} \quad \Delta S = nR \ln \frac{V_2}{V_1} \cdot \text{א.} \quad (2)$$

$$703 \frac{\text{J}}{\text{K}} \cdot \text{ג.} \quad 1560 \frac{\text{J}}{\text{K}} \cdot \text{ב.} \quad -857 \frac{\text{J}}{\text{K}} \cdot \text{א.} \quad (3)$$

$$1220 \frac{\text{J}}{\text{K}} \cdot \text{ב.} \quad -1220 \frac{\text{J}}{\text{K}} \cdot \text{א.} \quad (4)$$

$$910 \frac{\text{J}}{\text{K}} \quad (5)$$

$$0.28 \frac{\text{J}}{\text{K}} \quad (6)$$

$$48 \frac{\text{J}}{\text{K}} \quad (7)$$

$$2.2 \frac{\text{J}}{\text{K}} \quad (8)$$

$$8.8 \frac{\text{J}}{\text{K}} \quad (9)$$

$$nR \ln \frac{V_B}{V_A} \quad (10)$$

$$13 \frac{\text{J}}{\text{K}} \cdot \text{ג.} \quad 0 \cdot \text{ב.} \quad 5.8 \frac{\text{J}}{\text{K}} \cdot \text{א.} \quad (11)$$


$$-11 \frac{\text{mJ}}{\text{K}} \quad (12)$$

פרשנות סטטיסטית לאנטרופיה והחוק השני:

סיכום כללי:

הערות	תיאור	הנוסחה
	k - קבוע בולצמן Ω - פונקציית הממצבים המיקרוסקופיים	$S = k \ln \Omega$

שאלות:



- 1) דוגמה - התפשטות חופשית גישה סטטיסטית**
 השתמשו במשוואת בולצמן לאנטרופיה וחשבו את השינוי באנטרופיה במקרה של התפשטות חופשית של מול אחד של גז אידיאלי מנפח V_1 לנפח V_2 .
 הניחו ש- Ω אומרת את מספר המיקומים האפשרים של כל המולקולות. השוו לחישוב שנעשה בדוגמה הקודמת של התפשטות חופשית באמצעות הנוסחה של קלאוזיוס.

2) אנטרופיה להטלת 4 מטבעות

השתמשו בפונקציית הממצבים Ω וחשבו מה האנטרופיה בכל אחד מהמצבים המיקרוסקופיים שתוארו בדוגמה של הטלת 4 מטבעות.

מספר הממצאים המיקרוסקופיים	המצאים המיקרוסקופיים המתאימים (H-ראש , T-זנב)	המצב המיקרוסקופי
1	HHHH	4 ראש
4	THHH , HTHH , HHTH , HHHT	3 ראש, 1 זנב
6	TTHH , THTH , HTTH , THHT , HTHT , HHTT	2 ראש, 2 זנב
4	HTTT , THTT , TTHT , TTTH	1 ראש, 3 זנב
1	TTTT	4 זנב

3) הטלת 5 מטבעות

- דני לkeh 5 מטבעות והטיל אותן בצורה אקראית על השולחן.
 א. רשמו טבלה ובנה את מספר הממצאים המיקרוסקופיים המתאימים לכל מצב מקאו.
 ב. מהי ההסתברות שהטלה יצאו 3 מטבעות ראש ו-2 זנב?
 ג. מהי ההסתברות שכל המטבעות יפלו על זנב?
 ד. מהי ההסתברות שהטלה יפלו לפחות 3 מטבעות על זנב?

4) שינוי באנטרופיה בסידור 10 מטבעות

על שולחן ישנים 10 מטבעות כאשר 9 מתוכם נמצאים עם הראש כלפי מעלה ואחד עם הזנב כלפי מעלה. הופכים 3 מטבעות שהיו עם הראש כלפי מעלה.

מה השינוי באנטרופיה של המערכת?

השוואה לשינוי באנטרופיה של מערכת טרמודינמית מאחד הדוגמאות הקודומות.

ניתן לחשב את פונקציית המცבים גם באמצעות מקדמי הבינום של ניוטון: $\frac{n!}{k!(n-k)!}$

כאשר n הוא מספר המטבעות ו- k מספר המטבעות עם הזנב (או הראש) כלפי מעלה.

5) גז עם 10 אטומים בתיבה

נניח שישנה מערכת דמוית גז המכילה $10 = n$ אטומים ב מהירות זזהות. ה"גז" נמצא בתוך תיבת נסמן את מספר האטומים הנמצאים בחצי השמאלי של התיבה $-k$. מספר האפשרויות לסדר את האטומים כך k אטומים יהיו

$$\text{בחצי השמאלי הוא: } \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$


נניח כי כל ערך של k מסמל מצב מיקרוסקופי של המערכת.

ב מצב א' שבאיור כל 10 האטומים בצד שמאל של התיבה ($10 = k$)

וב מצב ב' שבאיור 5 בחצי הימני ו-5 בשמאלי ($5 = k$).

א. מהו השינוי באנטרופיה במעבר בין מצב א' למצב ב'?
אם התהליך יכול להתרחש בצורה ספונטנית?

ב. מהו השינוי באנטרופיה במעבר בין מצב ב' למצב א'?
אם התהליך יכול להתרחש בצורה ספונטנית?



תשובות סופיות:

Rln(2) (1)

(2)

המצב האנטרופיה	המצב המיקרוסקופי
0	ר'אש 4
$1.91 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}$	ר'אש, 1 זנב 3
$2.47 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}$	ר'אש, 2 זנב 2
$1.91 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}$	ר'אש, 3 זנב 1
0	זנב 4

. א (3)

המצב המיקרוסקופי	המצבים המיקרוסקופיים	פונקציית הממצבים Ω
5-H , 0-T	HHHHH	1
4-H , 1-T	HHHHT , HHHTH , HHTHH , HTHHH , THHHH	5
3-H , 2-T	HHHTT , HHTHT , HTHHT , THHHT , HHTTH HTTHH , THTHH , TTHHH , HTHTH , THHTH	10
2-H , 3-T	כמו 2-H , 3-T רק להחליפן ב-T	10
1-H , 4-T	כמו 1-T , 4-H רק להחליפן ב-T	5
0-H , 5-T	כמו 0-T , 5-H רק להחליפן ב-T	1

50% . ת

ג. 3.125%

ב. 31.25%

 $4.2 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}$ (4) $. 7.63 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}$, כנ. ב. $-7.63 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}$ לא. (5)