

מבנים בדידים וקומבינטוריקה

פרק 28 - אינדוקציה

תוכן העניינים

1. אינדוקציה.....1

אינדוקציה

שאלות

הוכיחו באינדוקציה את הטענות הבאות :

$$1 + 3 + 5 + 7 + \dots + (2n-1) = n^2 \quad (1)$$

$$\sum_{k=1}^n (4k+1) = n(2n+3) \quad (2)$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n}{6}(n+1)(2n+1) \quad (3)$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1} \quad (4)$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{(4k-3)(4k+1)} = \frac{n}{4n+1} \quad (5)$$

$$\sum_{k=1}^n 2^k = 2(2^n - 1) \quad (6)$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{3}{4^{k-1}} = 4 - \frac{1}{4^{n-1}} \quad (7)$$

$$\sum_{k=1}^{3n} k = 1\frac{1}{2}n(3n+1) \quad (8)$$

$$\sum_{k=1}^{3n} (4k-1) = 3n(6n+1) \quad (9)$$

$$\sum_{k=1}^n (n+k) = \frac{n}{2}(3n+1) \quad (10)$$

$$\sum_{k=1}^n 3^{n+k} = \frac{3^{n+1}(3^n-1)}{2} \quad (11)$$

$$(12) \quad 13 \mid (4^{2n+1} + 3^{n+2})$$

$$(13) \quad \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} < \frac{2+3}{2}$$

(14) הוכיחו באינדוקציה על n שהנוסחה הנתונה היא אכן פתרון לנוסחה הרקורסיבית הנתונה:

$$. a_0 = a_1 = 1 \text{ , כאשר } a_{n-1} \mid 2a_{n-1} \mid a_n = 0, n > 1$$

$$. a = (-1)^n (1 - 2n), n \geq 0 \text{ לכל } a = (-1)^n (1 - 2n), n \geq 0$$

לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il