# מבוא לסטטיסטיקה והסתברות

## פרק 31 - התפלגויות רציפות מיוחדות-התפלגות אחידה

תוכן העניינים

1. כללי ..... 1

# התפלגויות רציפות מיוחדות – התפלגות אחידה:

## רקע:

זו התפלגות שפונקציית הצפיפות שלה קבועה בין $a$ לבין $b$.

$X \sim U(a,b)$.

**פונקציית הצפיפות:**

$$f(x)=\frac{1}{b-a}$$
$$a \le x \le b$$

**פונקציית ההתפלגות המצטברת:**

$$F(t)=\frac{t-a}{b-a}.$$

**התוחלת :**

$$E(X)=\frac{a+b}{2}.$$

**השונות:**

$$V(x)=\frac{(b-a)^2}{12}.$$


© כל הזכויות שמורות לברק קנדל

דוגמה (פתרון בהקלטה):

X - משתנה מקרי רציף המתפלג באופן אחיד בין 20 ל-40.

מה הסיכוי ש-X קטן מ-25?

מה התוחלת והשונות של X?

$a = 20 \ , \ b = 40$

$X \sim U(20,40)$.

א. $P(x<25) = f(25) = \frac{25-20}{40-20} = 0.25$.

ב. $E(x) = \frac{20+40}{2} = 30$

$V(x) = \frac{(40-20)^2}{12} = 33\frac{1}{3}$.


© כל הזכויות שמורות לברק קנדל

## שאלות:

**1)** משך (בדקות) הפסקה בשיעור, X, מתפלג: $U(13,16)$.

א. מהי התוחלת ומהי סטית התקן של משך ההפסקה?

ב. מהי ההסתברות שהפסקה תמשך יותר מ-15 דקות?

ג. מהי ההסתברות שמשך ההפסקה יסטה מהתוחלת בפחות מדקה?

**2)** רכבת מגיעה לתחנה בשעות היום כל עשר דקות. אדם הגיע לתחנה בזמן אקראי.

א. הסבר כיצד מתפלג זמן ההמתנה לרכבת?

ב. אם זמן ההמתנה לרכבת ארך יותר מ-5 דקות, מהי ההסתברות שבסך הכל האדם ימתין לרכבת פחות מ-8 דקות?

ג. מה תוחלת מספר הימים שיעברו עד הפעם הראשונה שהאדם ימתין לרכבת יותר מ-9 דקות?

**3)** מכונה אוטומטית ממלאת גביעי גלידה. משקל הגלידה לגביע מתפלג אחיד בין 100-110 גרם (המשקל הוא של גלידה ללא הגביע).

א. מה ההסתברות שמשקל הגלידה בגביע יהיה מעל 108 גרם?

ב. נתון שהגלידה בגביע עם משקל נמוך מ-107 גרם. מה ההסתברות שמשקל הגלידה יהיה מעל 105 גרם?

ג. מה העשירון העליון של משקל הגלידה בגביע?

ד. עלות גביע גלידה היא 0.5 שקל. כל גרם של גלידה עולה 0.22 אגורות. מהי התוחלת ומהי סטיית התקן של עלות הגביע ביחד עם הגלידה?

## תשובות סופיות:

**1)** א. תוחלת: 14.5, שונות: 0.866. ב. $\frac{1}{3}$. ג. $\frac{2}{3}$.

**2)** א. $X \sim U(0,10)$. ב. 0.6. ג. 10.

**3)** א. 0.2. ב. $\frac{2}{7}$. ג. 109.

ד. תוחלת: 73.1 אגורות, סטיית תקן: 0.635 אגורות.


© כל הזכויות שמורות לברק קנדל