

סטטיסטיקה ב

פרק 3 - התפלגות הדגימה ומשפט הגבול המרכזי

תוכן העניינים

1. התפלגות ממוצע המדגם ומשפט הגבול המרכזי.....1

התפלגות ממוצע המדגם ומשפט הגבול המרכזי:

רקע:

בפרק זה נדון בהתפלגות של ממוצע המדגם: $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$

מכיוון שממדגם למדגם אנו יכולים לקבל ממוצע מדגם שונה, אזי ממוצע המדגם הוא משתנה מקרי ויש לו התפלגות.

גדלים המתארים התפלגות כלשהי או אוכלוסייה כלשהי נקראים פרמטרים. להלן רשימה של פרמטרים החשובים לפרק זה:

ממוצע האוכלוסייה נסמן ב- μ (נקרא גם תוחלת).

שונות אוכלוסייה נסמן ב- σ^2 .

סטיית תקן של אוכלוסייה: σ .

תכונות התפלגות:

ממוצע כל ממוצעי המדגם האפשריים שווה לממוצע האוכלוסייה: $E(\bar{x}) = \mu_{\bar{x}} = \mu$.

שונות כל ממוצעי המדגם האפשריים שווה לשונות האוכלוסייה מחולק ב- n .

תכונה זו נכונה רק במדגם מקרי: $V(\bar{x}) = \sigma_{\bar{x}}^2 = \frac{\sigma^2}{n}$.

יש יחס הפוך בין גודל המדגם לבין שונות ממוצעי המדגם.

אם נוציא שורש לשונות נקבל סטיית תקן של ממוצע המדגם שנקראת גם

טעות תקן: $\sigma(\bar{x}) = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

דוגמה (פתרון בהקלטה):

השכר הממוצע במשק הינו 9000 ₪ עם סטיית תקן של 4000. דגמו באקראי 25 עובדים.

א. מיהי אוכלוסיית המחקר? מהו המשתנה הנחקר?

ב. מהם הפרמטרים של האוכלוסייה?

ג. מה התוחלת ומהי סטיית התקן של ממוצע המדגם?

דגימה מהתפלגות נורמאלית:

אם נדגום מתוך אוכלוסייה שהמשתנה בה מתפלג נורמאלית עם ממוצע μ ושונות σ^2 .

$$\text{ממוצע המדגם גם יתפלג נורמאלית: } Z_{\bar{x}} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}, \bar{x} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

דוגמה (פתרון בהקלטה):

משקל תינוק ביום היוולדו מתפלג נורמאלית עם ממוצע 3400 גרם וסטיית תקן של 400 גרם.
מה ההסתברות שבמדגם של 4 תינוקות אקראיים בעת הולדתם המשקל הממוצע של התינוקות יהיה מתחת ל-3.5 ק"ג?

משפט הגבול המרכזי:

אם אוכלוסייה מתפלגת כלשהו עם ממוצע μ ושונות σ^2 אזי עבור מדגם מספיק

$$\text{גדול } (n \geq 30) \text{ ממוצע המדגם מתפלג בקירוב נורמאלי: } \bar{x} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

דוגמה (פתרון בהקלטה):

משקל חפיסת שוקולד בקו ייצור מתפלג עם ממוצע 100 גרם וסטיית תקן של 4 גרם.
דגמו מקו הייצור 36 חפיסות שוקולד אקראיות.
מה ההסתברות שהמשקל הממוצע של חפיסות השוקולד שנדגמו יהיה מתחת ל-102 גרם?

שאלות:

- (1) מתוך כלל הסטודנטים במכללה שסיימו סטטיסטיקה א נדגמו שני סטודנטים. נתון שממוצע הציונים של כלל הסטודנטים היה 78 עם סטיית תקן של 15.
- מיהי האוכלוסייה?
 - מה המשתנה?
 - מהם הפרמטרים?
 - מהו גודל המדגם?
 - מהו תוחלת ממוצע המדגם?
 - מהי טעות התקן?
- (2) משקל תינוק ביום היוולדו מתפלג נורמאלית עם ממוצע 3400 גרם וסטיית תקן של 400 גרם.
- מה ההסתברות שתינוק אקראי בעת הלידה ישקול פחות מ-3800 גרם? נתון כי ביום מסוים נולדו 4 תינוקות.
 - מה ההסתברות שהמשקל הממוצע שלהם יעלה על 4 ק"ג?
 - מה ההסתברות שהמשקל הממוצע של התינוקות יהיה מתחת ל-2.5 ק"ג?
 - מה ההסתברות שהמשקל הממוצע של התינוקות יהיה רחוק מהתוחלת בלא יותר מ-50 גרם?
 - הסבירו ללא חישוב כיצד התשובה לסעיף הקודם הייתה משתנה אם היה מדובר על יותר מ-4 תינוקות?
- (3) הגובה של המתגייסים לצה"ל מתפלג נורמאלית עם תוחלת של 175 ס"מ וסטיית תקן של 10 ס"מ. ביום מסוים התגייסו 16 חיילים.
- מה ההסתברות שהגובה הממוצע שלהם יהיה לפחות 190 ס"מ?
 - מה ההסתברות שהגובה הממוצע שלהם יהיה בדיוק 180 ס"מ?
 - מה ההסתברות שהגובה הממוצע שלהם יסטה מתוחלת הגבהים בפחות מ-5 ס"מ?
 - מהו הגובה שבהסתברות של 90% הגובה הממוצע של המדגם יהיה נמוך ממנו?

- (4) הזמן הממוצע שלוקח לאדם להגיע לעבודתו 30 דקות עם שונות של 16 דקות רבועות. האדם נוסע לעבודה במשך שבוע 5 פעמים. לצורך הפתרון הניחו שזמן הנסיעה לעבודה מתפלג נורמאלי.
- א. מה ההסתברות שבמשך שבוע משך הנסיעה הממוצע יהיה מעל 33 דקות?
- ב. מהו הזמן שבהסתברות של 90% ממוצע משך הנסיעה השבועי יהיה גבוה ממנו?
- ג. מה ההסתברות שממוצע משך הנסיעה השבועי יהיה מרוחק מ-30 דקות בלפחות 2 דקות?
- ד. כיצד התשובה לסעיף הקודם הייתה משתנה אם האדם היה נוסע לעבודה 6 פעמים בשבוע?
- (5) נפח היין בבקבוק מתפלג נורמאלי עם תוחלת של 750 סמ"ק וסטיית תקן של 10 סמ"ק.
- א. בארגז 4 בקבוקי יין. מה ההסתברות שהנפח הממוצע של הבקבוקים בארגז יהיה בדיוק 755 סמ"ק?
- ב. בארגז 4 בקבוקי יין. מה ההסתברות שהנפח הממוצע של הבקבוקים בארגז יהיה יותר מ-755 סמ"ק?
- ג. בארגז 4 בקבוקי יין. מה ההסתברות שהנפח הממוצע של הבקבוקים בארגז יהיה לפחות 755 סמ"ק?
- ד. בקבוקי היין שבארגז נמזגים לקערה עם קיבולת של שלושה ליטר. מה ההסתברות שהיין יגלוש מהקערה?
- (6) משתנה מתפלג נורמאלי עם תוחלת 80 וסטיית תקן 4.
- א. מה ההסתברות שממוצע המדגם יסטה מתוחלתו בלא יותר מיחידה כאשר גודל המדגם הוא 9?
- ב. מה ההסתברות שממוצע המדגם יסטה מתוחלתו בלא יותר מיחידה שגודל המדגם הוא 16?
- הסבר את ההבדל בתשובות של שני הסעיפים.
- (7) לפי הערכות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה השכר הממוצע במשק הוא 8000 ₪ עם סטיית תקן של 3000 ₪.
- מה ההסתברות שבמדגם מקרי של 100 עובדים השכר הממוצע יהיה יותר מ-8500 ₪?

8) אורך צינור שמפעל מייצר הינו עם ממוצע של 70 ס"מ וסטיית תקן של 10 ס"מ.

א. נלקחו באקראי 100 מוטות, מה ההסתברות שממוצע אורך המוטות יהיה בין 68 ל 78 ס"מ?

ב. יש לחבר 2 בניינים באמצעות מוטות. המרחק בין שני הבניינים הינו 7200 ס"מ. מה ההסתברות ש 100 המוטות יספיקו למלאכה?

ג. מה צריך להיות גודל המדגם המינימאלי, כדי שבהסתברות של 5% ממוצע המדגם יהיה קטן מ-69 ס"מ. היעזרו במשפט הגבול המרכזי.

9) נתון ש- $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. דגמו 5 תצפיות מאותה התפלגות והתבוננו בממוצע

המדגם $\bar{X}$. לכן: $P(\bar{X} > \mu)$ יהיה (בחרו בתשובה הנכונה):

א. 0.

ב. 0.5.

ג. 1.

ד. לא ניתן לדעת.

10) נתון ש- X מתפלג כלשהו עם תוחלת μ ושונות σ^2 .

החליטו לבצע מדגם בגודל 200 מתוך ההפלגות הנתונה לפי משפט הגבול המרכזי מתקיים (בחרו בתשובה הנכונה):

א. $X \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{200}\right)$.

ב. $\mu \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{200}\right)$.

ג. $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2)$.

ד. $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{200}\right)$.

11) נתון ש- $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. אם נדגום n תצפיות מתוך ההתפלגות ונגדיר: $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$,

אזי (בחרו בתשובה הנכונה):

א. μ ו- $\bar{X}$ יהיו משתנים מקריים.

ב. μ יהיה משתנה מקרי ו- $\bar{X}$ קבוע.

ג. $\bar{X}$ יהיה משתנה מקרי ו- μ קבוע.

ד. μ ו- $\bar{X}$ יהיו קבועים.

תשובות סופיות:

- (1) א. כלל הסטודנטים במכללה שסיימו סטטיסטיקה א. ב. ציון. ג. ממוצע: 78, סטיית תקן: 15. ד. 2. ה. 78. ו. 10.6. ז. 0.1974. ח. 0. ג. 0.0013. ט. 0.8413. י. 0.178.205. יא. 0. ב. 0. (2) א. 0.8413. ב. 0.0013. ג. 0.0. ד. 0.178.205. ה. 0.9544. ו. 0.2628. ז. 0.1587. ח. 0.5. ט. 0.6826. י. 0.0475. יא. 0.0228. יב. 0.271. יג. 0.9772. יד. 0.0465. יה. 0.1587. יז. 0.271. יח. 0.0228. יט. 0.9772. כ. 0.0465. כא. 0.1587. כב. 0.271. כג. 0.0228. כד. 0.9772. כה. 0.0465. כו. 0.1587. כז. 0.271. כח. 0.0228. כט. 0.9772. כס. 0.0465. כא. 0.1587. כב. 0.271. כג. 0.0228. כד. 0.9772. כה. 0.0465. כו. 0.1587. כז. 0.271. כח. 0.0228. כט. 0.9772. כס. 0.0465.
- (2) א. 0.8413. ב. 0.0013. ג. 0.0. ד. 0.178.205. ה. 0.9544. ו. 0.2628. ז. 0.1587. ח. 0.5. ט. 0.6826. י. 0.0475. יא. 0.0228. יב. 0.271. יג. 0.9772. יד. 0.0465. יה. 0.1587. יז. 0.271. יח. 0.0228. יט. 0.9772. כ. 0.0465. כא. 0.1587. כב. 0.271. כג. 0.0228. כד. 0.9772. כה. 0.0465. כו. 0.1587. כז. 0.271. כח. 0.0228. כט. 0.9772. כס. 0.0465.
- (3) א. 0. ב. 0. ג. 0. ד. 0.178.205. ה. 0.9544. ו. 0.2628. ז. 0.1587. ח. 0.5. ט. 0.6826. י. 0.0475. יא. 0.0228. יב. 0.271. יג. 0.9772. יד. 0.0465. יה. 0.1587. יז. 0.271. יח. 0.0228. יט. 0.9772. כ. 0.0465. כא. 0.1587. כב. 0.271. כג. 0.0228. כד. 0.9772. כה. 0.0465. כו. 0.1587. כז. 0.271. כח. 0.0228. כט. 0.9772. כס. 0.0465.
- (4) א. 0.0465. ב. 0.271. ג. 0.2628. ד. התשובה הייתה קטנה. ה. 0.1587. ו. 0.5. ז. 0.6826. ח. 0.0475. ט. 0.0228. י. 0.9772. יא. 0.0465. יב. 0.1587. יג. 0.271. יד. 0.2628. יה. 0.5. יז. 0.6826. יח. 0.0475. יט. 0.0228. כ. 0.9772. כא. 0.0465. כב. 0.1587. כג. 0.271. כד. 0.2628. כה. 0.5. כו. 0.6826. כז. 0.0475. כח. 0.0228. כט. 0.9772. כס. 0.0465.
- (5) א. 0. ב. 0.1587. ג. 0.1587. ד. 0.5. ה. 0.6826. ו. 0.0475. ז. 0.0228. ח. 0.9772. ט. 0.0465. י. 0.1587. יא. 0.271. יב. 0.2628. יג. 0.5. יד. 0.6826. יה. 0.0475. יז. 0.0228. יח. 0.9772. יט. 0.0465. כ. 0.1587. כא. 0.271. כב. 0.2628. כג. 0.5. כד. 0.6826. כה. 0.0475. כו. 0.0228. כז. 0.9772. כח. 0.0465. כט. 0.1587. כס. 0.271.
- (6) א. 0.5468. ב. 0.6826. ג. 0.0475. ד. 0.0228. ה. 0.9772. ו. 0.0465. ז. 0.1587. ח. 0.271. ט. 0.2628. י. 0.5. יא. 0.6826. יב. 0.0475. יג. 0.0228. יד. 0.9772. יה. 0.0465. יז. 0.1587. יח. 0.271. יט. 0.2628. כ. 0.5. כא. 0.6826. כב. 0.0475. כג. 0.0228. כד. 0.9772. כה. 0.0465. כו. 0.1587. כז. 0.271. כח. 0.2628. כט. 0.5. כס. 0.6826.
- (7) א. 0.0475. ב. 0.0228. ג. 0.271. ד. 0.2628. ה. 0.5. ו. 0.6826. ז. 0.0475. ח. 0.0228. ט. 0.9772. י. 0.0465. יא. 0.1587. יב. 0.271. יג. 0.2628. יד. 0.5. יה. 0.6826. יז. 0.0475. יח. 0.0228. יט. 0.9772. כ. 0.0465. כא. 0.1587. כב. 0.271. כג. 0.2628. כד. 0.5. כה. 0.6826. כו. 0.0475. כז. 0.0228. כח. 0.9772. כט. 0.0465. כס. 0.1587.
- (8) א. 0.9772. ב. 0.0228. ג. 0.271. ד. 0.2628. ה. 0.5. ו. 0.6826. ז. 0.0475. ח. 0.0228. ט. 0.9772. י. 0.0465. יא. 0.1587. יב. 0.271. יג. 0.2628. יד. 0.5. יה. 0.6826. יז. 0.0475. יח. 0.0228. יט. 0.9772. כ. 0.0465. כא. 0.1587. כב. 0.271. כג. 0.2628. כד. 0.5. כה. 0.6826. כו. 0.0475. כז. 0.0228. כח. 0.9772. כט. 0.0465. כס. 0.1587.
- (9) ב'.
- (10) ד'.
- (11) ג'.