מתמטיקה להנדסאי תעשיה וניהול

פרק 25 - חשבון אינטגרלי - חישובי נפחים של גופים


תוכן העניינים

1. חישוב נפחים באמצעות האינטגרל 1


חישוב נפחים באמצעות האינטגרל:

סיכום כללי:

- נפח הגוף שנוצר עקב סיבוב הפונקציה $f(x)$ סביב ציר ה-x בגבולות: $x=a$ ו-$x=b$ נתון ע"י האינטגרל הבא: $\boxed{V=\pi\int_a^b\left(f(x)\right)^2dx}$.




- בפרט עבור גוף הנוצר ע"י בסיס שטח הכלוא בין הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$ נקבל את הנוסחה הבאה: $\boxed{V=\pi\int_a^b\left[\left(f(x)\right)^2-\left(g(x)\right)^2\right]dx}$.



שאלות:


1) נתונה הפונקציה: $f(x)=x^2+1$.
השטח הכלוא בין הפונקציה, הישר $x=3$ והצירים מסתובב סביב ציר ה-x.
חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל באופן זה.




2) באיור שלפניך נתונה הפונקציה: $f(x)=\sqrt{4-x^2}$.

א. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ב. חשב את נפח הגוף שנוצר ע"י סיבוב גרף הפונקציה סביב ציר ה-x.




3) נתונה הפונקציה: $f(x)=\frac{12}{x+3}$ בתחום: $x\geq 0$.




גרף הפונקציה מסתובב סביב ציר ה-x.
מסמנים את נפח הגוף שנוצר בין הגבולות $0\leq x\leq 1$ ב-V_1 ואת נפח הגוף שנוצר בתחום: $1\leq x\leq 3$ ב-V_2.
חשב את היחס: $\frac{V_1}{V_2}$.

4) נתונה הפונקציה: $f(x)=\frac{12}{x+3}$ בתחום: $x\geq 0$.




גרף הפונקציה מסתובב סביב ציר ה-x.
מסמנים את נפח הגוף הנוצר בין הגבולות $0\leq x\leq a$ ב-V_1 ואת נפח הגוף שנוצר בתחום: $a\leq x\leq 3$ ב-V_2.
מתקיים: $V_1=V_2$. מצא את a.

5) נתונה הפונקציה $f(x)=\sin x+\cos x$ בתחום: $0\leq x\leq 2\pi$.




השטח הכלוא בין גרף הפונקציה והצירים ברביע הראשון מסתובב סביב ציר ה-x.
מצא את נפח גוף הסיבוב שנוצר.

6) בשרטוט נתונות הפונקציות ברביע הראשון: $g(x)=\frac{1}{x}$, $f(x)=\sqrt{x}$.




מצא את נפח גוף הסיבוב שנוצר, כאשר השטח הכלוא בין הפונקציות והישר $x=2$ מסתובב סביב ציר ה-x.

7) נתונות הפונקציות: $g(x)=\sqrt{\cos x}$, $f(x)=\frac{1}{\cos x}$.




השטח הכלוא בין הפונקציות לישר $x=\frac{\pi}{6}$ מסתובב סביב ציר ה-x.
חשב את נפח גוף הסיבוב שנוצר.

8) חשב את נפח גוף הסיבוב שנוצר כאשר השטח המוגבל בין הגרפים של פונקציות: $f(x)=\frac{1}{x}$, $g(x)=2x-1$, ציר ה-x והישר $x=3$ מסתובב סביב ציר ה-x.




9) נתונים הגרפים של הפונקציות: $f(x)=\sqrt{x}$ ו- $g(x)=(2x-3)^2$.



א. הראה כי הפונקציות נפגשות בנקודה שבה $x=1$.

ב. השטח הכלוא בין הפונקציות ונמצא משמאל לאנך לציר ה-x, היוצא מקודקוד הפרבולה $g(x)$ מסתובב סביב ציר ה-x.
מצא את נפח גוף הסיבוב שנוצר.


10) ענה על השאלות הבאות:



א. הוכח את הזהות: $\sin 3\alpha = 3\sin\alpha - 4\sin^3\alpha$.

ב. נתונות הפונקציות: $f(x)=2\sin x-\cos 2x$
ו- $g(x)=2\sin^2 x$ בתחום $[0:\pi]$.
השטח הכלוא בין גרפים של שתי הפונקציות בתחום הנתון מסתובב סביב ציר ה-x.
חשב את נפח גוף הסיבוב שנוצר.

11) הפונקציות: $f(x)=x^2$ ו- $g(x)=8-x^2$
נחתכות בנקודות A ו-B כמתואר באיור.
נסמן את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $g(x)$ עם ציר ה-x ב-C ו-D.



א. מצא את שיעורי הנקודות A, B, C ו-D.


ב. השטח הנוצר בין הגרפים של שתי הפונקציות מסתובב סביב ציר ה-x.
מצא את נפח גוף הסיבוב שנוצר.

ג. השטח הכלוא בין הגרפים של הפונקציות וציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x.
מצא את נפח גוף הסיבוב שנוצר באופן זה.


12) חשב את נפח גוף הסיבוב שנוצר ע"י סיבוב השטח הכלוא בין הגרפים של

הפונקציות $f(x)=x-5$ ו- $g(x)=-2\sqrt{25-x^2}$

וציר ה-x סביב ציר ה-x.



13) לפניך גרף הפונקציה: $f(x)=|x-5|$.



א. חשב את נפח הגוף שנוצר כאשר השטח בין גרף הפונקציה בתחום $0\le x\le 10$ ובין ציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x.

ב. האם תוצאת החישוב של הסעיף הקודם תשתנה אם במקום $f(x)=|x-5|$ נשתמש בפונקציה $g(x)=x-5$? נמק.

תשובות סופיות:

1) $69\frac{3}{5}\pi$ יח"נ $V=$.

2) א. $(-2,0)$, $(2,0)$.

ב. $10\frac{2}{3}\pi$ יח"נ $V=$.

3) $\frac{V_1}{V_2}=1$.

4) $a=1$.

5) $\frac{1}{2}\pi+\frac{3\pi^2}{4}\approx 8.97$ יח"נ $V=$.

6) π יח"נ $V=$.

7) 0.243 יח"נ $V=$.

8) $\frac{5}{6}\pi$ יח"נ $V=$.

9) $\frac{21}{40}\pi$ יח"נ $V=$.

10) א. שימוש בזהות של $\sin(\alpha+\beta)$ ייתן את המבוקש.

ב. 17.46 יח"נ $V=$.

11) א. $D(-8,0)$, $C(\sqrt{8},0)$, $B(-2,4)$, $A(2,4)$.

ב. $170\frac{2}{3}\pi$ יח"נ $V=$.

ג. 22.42π יח"נ $V=$.

12) 240π יח"נ $V=$.

13) א. $83\frac{1}{3}\pi$ יח"נ $V=$

ב. לא.