# כימיה וביוכימיה לסיעוד

## פרק 2 - מבנה האטום

### תוכן העניינים

1. המודל הגרעיני של האטום ..... 1
2. ספקטרום אטומי בחלקיקים חד-אלקטרונים ..... 5
3. מבנה של אטומים מרובי אלקטרונים ..... 8
4. תכונות מחזוריות של אטומים ..... 13

# המודל הגרעיני של האטום

## שאלות

**1)** ליון $^{127}_{52}Te^{2-}$ :

א. מספר מסה 50.

ב. 127 פרוטונים בגרעין.

ג. 127 חלקיקים בגרעין.

ד. 50 פרוטונים.

**2)** מי מהזוגות הבאים מהווים איזוטופים?

a) $^{3}_{1}H$ $^{2}_{1}H^{+}$

b) $^{4}_{2}He$ $^{3}_{2}He$

c) $^{14}_{7}N^{+}$ $^{12}_{6}C$

d) $^{4}_{2}He^{-}$ $^{3}_{1}H$

א. b בלבד.

ב. a ו-d.

ג. a ו-c.

ד. a ו-b.

**3)** בחר את הסעיף שבו מופיעים צורונים בעלי אותו מספר האלקטרונים כמו של אטום קריפטון $_{36}Kr$ :

א. $_{19}K,\ _{20}Ca,\ _{35}Br^{-}$

ב. $_{34}Se^{2-},\ _{20}Ca^{2+},\ _{35}Br^{-}$

ג. $_{37}Rb^{+},\ _{34}Se^{2-},\ _{38}Sr^{2+}$

ד. $_{38}Sr^{3+},\ _{37}Rb^{2+},\ _{35}Br^{-}$

**4)** מהי השורה הנכונה מבין הבאות?

| | סמל | מספר פרוטונים | מספר נייטרונים | מספר אלקטרונים |
|---|---|---|---|---|
| א. | $_{34}Se$ | 34 | 45 | 34 |
| ב. | $^{88}_{38}Sr^{2+}$ | 40 | 50 | 38 |
| ג. | $_{18}Ar$ | 15 | 16 | 18 |
| ד. | $^{210}_{85}At^{-}$ | 85 | 210 | 86 |


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתבה ופתרה – ד"ר אבלינה ברט ©

**5)** לאטום מיונן של יסוד מסוים, $X^{2+}$, יש 24 אלקטרונים ו-30 נויטרונים.
איזו טענה נכונה:

א. מספרו האטומי 24 ומספר המסה 54.

ב. מספרו האטומי 54 ומספר המסה 24.

ג. מספרו האטומי 56 ומספר המסה 26.

ד. מספרו האטומי 26 ומספר המסה 56.

**6)** להלן שלושה חלקיקים: $^{23}_{11}X^{+}$, $^{24}_{11}Y^{+}$, $^{24}_{12}Z^{+}$.
אילו טענות נכונות:

א. $Y^{+}$ ו-$Z^{+}$ הם איזוטופים של אותו יסוד.

ב. ל-$Y^{+}$ ו-$Z^{+}$ אותו מספר אלקטרונים.

ג. ל-$Y^{+}$ ו-$Z^{+}$ אותו מספר נייטרונים.

ד. ל-$X^{+}$ ו-$Z^{+}$ אותו מספר נייטרונים.

ה. $X^{+}$ ו-$Y^{+}$ הם איזוטופים של אותו יסוד.

**7)** נתונים חמישה צורנים שסומנו באופן שרירותי באותיות הבאות:
$^{19}_{10}T^{-}$, $^{19}_{9}W^{+3}$, $^{22}_{10}Z$, $^{20}_{11}Y^{-}$, $^{20}_{10}X^{+2}$.

א. אילו מבין הצורנים הנתונים הם איזוטופים?

ב. לאיזה צורון מספר האלקטרונים הוא הגדול ביותר?

ג. לאיזה צורון מספר הנייטרונים הוא הגדול ביותר?

**8)** בטבלה הבאה נתונים חמישה חלקיקים של יסודות:

| חלקיק | מספר פרוטונים | מספר נייטרונים | מספר אלקטרונים |
|---|---|---|---|
| **A** | 10 | 12 | 10 |
| **B** | 12 | 12 | 10 |
| **C** | 16 | 16 | 16 |
| **D** | 17 | 18 | 18 |
| **E** | 16 | 18 | 18 |

א. מהו המטען החשמלי של כל חלקיק?

ב. האם ישנם איזוטופים בטבלה?


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתבה ופתרה – ד"ר אבלינה ברט ©

**9)** לפחמן (C) ישנם שלושה איזוטופים יחסית יציבים. מהי הקביעה **הלא** נכונה:

א. כל האיזוטופים של פחמן בעלי מטען גרעיני שווה.

ב. באיזוטופים של פחמן מספר האלקטרונים יכול להיות שונה ממספר הפרוטונים.

ג. לכל האיזוטופים של פחמן אותו מספר מסה.

ד. לכל האיזוטופים של פחמן אותו מספר אטומי.

**10)** בטבלה הבאה נתון ההרכב הגרעיני של החלקיקים הבאים:

| **החלקיק** | $A^{-2}$ | $B^{-}$ | C | $D^{+}$ | E |
|---|---|---|---|---|---|
| **מספר פרוטונים** | 13 | 12 | 10 | 13 | 11 |
| **מספר נייטרונים** | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 |

התייחסו לכל אחד מהמשפטים הבאים וציינו האם הוא נכון או לא. נמקו.

א. ל-E ו-$A^{-2}$ אותו מספר האלקטרונים.

ב. ל-$B^{-}$ ו-$D^{+}$ אותו מספר האלקטרונים.

ג. ל-E מספר המסה הגדול ביותר.

ד. $A^{-2}$ ו-C הם איזוטופים.

ה. $A^{-2}$ ו-$D^{+}$ הם איזוטופים.

**11)** נתונים החלקיקים הבאים:

| החלקיק | מספר האלקטרונים | מספר המסה |
|---|---|---|
| $A^{-2}$ | 9 | 19 |
| $B^{+}$ | 6 | 16 |
| $C^{3+}$ | 9 | 22 |
| $D^{3+}$ | 10 | 22 |

ציינו את ההיגד(ים) הנכון(ים):

א. $A^{-2}$ ו-$C^{3+}$ הם איזוטופים.

ב. מטען הגרעין של $C^{3+}$ זהה לזה של $D^{3+}$.

ג. $C^{3+}$ ו-$D^{3+}$ הם איזוטופים.

ד. $A^{-2}$ ו-$B^{+}$ הם איזוטופים.


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתבה ופתרה – ד"ר אבלינה ברט ©

## תשובות סופיות

1) ג
2) ד
3) ג
4) א
5) ד
6) ד, ה.
7) א. $T^{-}, Z, X^{+2}$ ב. $Y^{-}$ ג. Z
8) א. $A: 0,\ B: +2,\ C: 0,\ D: -1,\ E: -2$ ב. כן, C ו-E. ג. A
9) ג
10) ה
11) ד


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתבה ופתרה – ד"ר אבלינה ברט ©

# ספקטרום אטומי בחלקיקים חד-אלקטרונים

## שאלות

**1)** חשבו את האנרגיה הדרושה לעירור האלקטרון באטום מימן מרמת היסוד לרמת האנרגיה $n=8$.

**2)** מהו אורך הגל של הפוטון, שייפלט כשאלקטרון יורד מרמה $n=4$ לרמת היסוד ביון גזי $C^{+5}$?

**3)** חשבו את אנרגיית היינון (ביחידות J/mol) ממצב היסוד, עבור היונים $Li^{2+}$ ו- $He^{+}$.

**4)** ענו על הסעיפים הבאים:

א. ביון $He^{+}$ מעורר האלקטרון יורד מרמת האנרגיה n= 6 לרמת היסוד. חשבו את אורך הגל של הפוטון באנגסטרם.

ב. פוטון באורך גל של 218.1 A נקלט על ידי היון $He^{+}$.
כתוצאה מכך $He^{+}$ הופך ל- $He^{2+}$, והאלקטרון הנפלט ממשיך לנוע.
מהי האנרגיה הקינטית של האלקטרון הנפלט?

**5)** סדרת הקווים הראשונה בתחום האינפרה-אדום, בספקטרום אטומי מימן, נקראת סדרת פַּשֶׁן. אחד הקווים של סדרה זו מופיע באורך גל של 1094 nm.
מאיזו רמת אנרגיה בוצע המעבר?
* סדרת פַּשֶׁן (Paschen Series) מראה את המעברים לרמת האנרגיה השלישית מרמות גבוהות יותר.

**6)** ענו על הסעיפים הבאים:

א. מהם ערכי האנרגיה עבור ארבע רמות האנרגיה הראשונות בחלקיק $Li^{+2}$?

ב. מצאו את אורך הגל המתאים לעירור של יוני $Li^{+2}$, מרמת היסוד לרמה $n=4$.

ג. יוני $Li^{+2}$, המעוררים ל- $n=4$, דועכים לרמות האנרגיה נמוכות יותר, תוך פליטת פוטונים.

1. כמה קווים ספקטרליים מתקבלים בדעיכה?
2. איזה קו ספקטרלי, מאלו שנמצאו ב-1, בעל אורך הגל הקצר ביותר? האם העין תוכל להבחין באור שנפלט, אם נתון שאורכי גל הנמצאים בתחום של האור הנראה הם בטווח של 300nm – 700nm.


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתבה ופתרה – ד"ר אבלינה ברט ©

**7)** אטום מימן ברמת היסוד בולע פוטון בעל אורך הגל של $97.2\ \text{nm}$, ואחר כך פולט פוטון בעל אורך הגל $486\text{nm}$.
מה מספר רמת האנרגיה הסופית בה נמצא האלקטרון?

**8)** חלקיק דמוי מימן במצב היסוד בולע פוטונים באורכי-גל (nm): $4.8,\ 2.54,\ 1.8$.
נתון שרק פוטון אחד מבין פוטונים אלה גרם לעירורו, ואילו שאר הפוטונים גרמו לפליטת האלקטרון מהיון הזה. אחד מן הפוטונים שגרם לפליטת האלקטרון הקנה לו מהירות מסוימת, ואילו הפוטון השני הביא לעקירת האלקטרון בלבד.

א. איזה פוטון גרם לעירור האלקטרון? נמקו.

ב. 1. איזה פוטון גרם לעקירת האלקטרון? נמקו.
2. מהו מטען היון שהתקבל, כתוצאה מעקירת האלקטרון?

ג. חשבו את מהירות תנועת האלקטרון עקב בליעת הפוטון המתאים.

**9)** נתון יון דמוי מימן שהאלקטרון שלו מצוי ברמה מעוררת $n$.
אנרגיית היינון של היון מן הרמה המעוררת היא $7.65\ \text{eV}$.
הקרנה באור עם תדירות של $6.65\cdot10^{14}\,\text{Hz}$ גורמת למעבר לרמה המעוררת $n+1$.
חשבו את הרמה $n$. האם היון הוא $Li^{2+}$ או $He^{+}$?

**10)** פוטונים שנפלטים מאדי כספית הם בעלי אורך גל של $3130\ \text{A}^0$.
הפוטונים פוגעים בשפופרת המכילה גז של יוני $Li^{+2}_{(g)}$ במצב היסוד.
האם תיתכן פליטת האלקטרונים מיוני $Li^{+2}_{(g)}$? במידה וכן, הסבירו.
במידה ולא, חשבו באיזו רמה מעוררת חייבים יוני $Li^{+2}_{(g)}$ להימצא, כדי לקבל את פליטת האלקטרונים מהם.


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתבה ופתרה – ד"ר אבלינה ברט ©

## תשובות סופיות

**1)** $13.388\ eV$

**2)** $2.7nm$

**3)** $He^{+}: 523.98\cdot10^{4}\ J/mol;\ Li^{2+}: 1178.96\cdot10^{4}\ J/mol$

**4)** א. $234\ A^{0}$ ב. $4.02\cdot10^{-19}\ J$

**5)** $n=6$

**6)** א. $-13.6\,eV, -30.6, -122.4, -7.65$ ב. $10.81nm$ ג.1. שישה קווים.
2. אינו נראה לעין.

**7)** $n=2$

**8)** א. $4.8nm$ ב.1. $2.54nm$ 2. $+5$ ג. $8.405\cdot10^{6}\ m/s$

**9)** $Li^{2+},\ n=4$

**10)** לא תיתכן פליטת אלקטרונים. רמת האנרגיה מספר 6.


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתבה ופתרה – ד"ר אבלינה ברט ©

# מבנה של אטומים מרובי אלקטרונים

## שאלות

**1)** מהן הקביעות הנכונות לגבי שלושת המספרים הקוונטיים בסעיפים הבאים? תקנו את הקביעות הלא נכונות.

א. $n=2,\ \ell=1,\ m_\ell=+1$

ב. $n=3,\ \ell=3,\ m_\ell=-3$

ג. $n=3,\ \ell=2,\ m_\ell=-3$

ד. $n=0,\ \ell=0,\ m_\ell=0$

**2)** רשמו את הערכים החסרים עבור ארבעת המספרים הקוונטיים הבאים:

א. $n=?,\ \ell=2,\ m_\ell=0,\ m_s=?$

ב. $n=2,\ \ell=?,\ m_\ell=-1,\ m_s=-\frac{1}{2}$

ג. $n=4,\ \ell=1,\ m_\ell=2,\ m_s=?$

**3)** כמה אלקטרונים של אטום אחד יכולים להיות בעלי המספרים הקוונטיים הבאים:

א. $n=2,\ \ell=1$

ב. $n=4,\ \ell=2,\ m_\ell=-2$

ג. $n=2$

ד. $n=3,\ \ell=2,\ m_\ell=+1,\ m_s=-\frac{1}{2}$

**4)** איזו מתת-הרמות שלהלן יכולה להתקיים באטום:

א. 2d

ב. 3f

ג. 6g

ד. 6i


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתבה ופתרה – ד"ר אבלינה ברט ©

**5)** נתונות היערכויות אלקטרונים עבור יון $X^{+2}$ במצב היסוד.
רשמו את היערכות האלקטרונים עבור יסוד $X$.

א. $[Ar]3d^7$

ב. $[Kr]4d^7$

ג. $[Kr]4d^{10}5s^2$

ד. $[Xe]4f^{14}5d^{10}$

**6)** איזה צירוף של מספרים קוונטים מתאים לאלקטרון ערכיות (ברמה האחרונה) של אטום $Br$?

| | $n$ | $l$ | $m_l$ | $m_s$ |
|---|---|---|---|---|
| א. | 4 | 0 | 0 | $+\frac{1}{2}$ |
| ב. | 4 | 1 | $-1$ | $+\frac{1}{2}$ |
| ג. | 4 | 1 | 0 | $-\frac{1}{2}$ |

ד. כל התשובות נכונות.

**7)** כתבו את היערכות האלקטרונים במצב היסוד וציינו את מספר האלקטרונים הלא-מזווגים עבור החלקיקים:

א. $Ga^+$

ב. $Cu^{2+}$

ג. $Pb^{2+}$

ד. $Se^{2-}$

**8)** קבעו אם היערכויות האלקטרונים הבאות מייצגות את מצב היסוד או את המצב המעורר של האטום:

א. $C:\ \underset{1s}{\uparrow\downarrow}\ \underset{2s}{\uparrow\downarrow}\ \underset{2p}{\uparrow\downarrow}$


ב. $N:\ \underset{1s}{\uparrow\downarrow}\ \underset{2s}{\uparrow\downarrow}\ \underset{2p_x}{\uparrow}\ \underset{2p_y}{\downarrow}\ \underset{2p_z}{\uparrow}$


ג. $Be:\ \underset{1s}{\uparrow\downarrow}\ \underset{2s}{\uparrow}\ \underset{2p}{\uparrow}$


ד. $O:\ \underset{1s}{\uparrow\downarrow}\ \underset{2s}{\uparrow\downarrow}\ \underset{2p_x}{\uparrow\downarrow}\ \underset{2p_y}{\uparrow}\ \underset{2p_z}{\uparrow}$



לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתבה ופתרה – ד"ר אבלינה ברט ©

**9)** להלן מספר היערכויות אפשריות של רמת הערכיות של אטום ניטרלי מסוים.
מהו היסוד ואיזו היערכות מייצגת את מצב היסוד שלו?

א.



ב.



ג.



ד.



**10)** נתונים ארבעה יונים בעלי הקונפיגורציות:

$Z^{+2}$: $[Ar]3d^{10}p^1$ $\quad Y^{+}$: $[Ar]4p^4$ , $X^{+4}$: $[Ar]3d^{10}4p^2$ , $A^{+5}$: $[Ar]3d^6$.

לאילו יונים יש **אותו מספר** אלקטרונים **בלתי** מזווגים:

א. ל- $Z^{+2}$ ו- $A^{+5}$.

ב. ל- $X^{+4}$ ו- $Y^{+}$.

ג. ל- $A^{+5}$ ו- $Y^{+}$.

ד. ל- $Z^{+2}$ ו- $X^{+4}$.

**11)** נתונות היערכויות האלקטרוניות עבור מס' חלקיקים.
קבעו אילו מהם נמצאים במצב מעורר, ורשמו עבורם את ההערכות האלקטרונית שמתאימה למצב היסוד.

א. $1s^2 2s^1 2p^3$

ב. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^5$

ג. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5 3d^1$

ד. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^3$

**12)** רשמו את הערכות האלקטרונים עבור:

א. $Ge^{2+}$

ב. $Mn^{+}$

ג. $Ba^{2+}$

ד. $Au^{+}$


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתבה ופתרה – ד"ר אבלינה ברט ©

**13)** אילו מהקונפיגורציות הבאות לא יכולות להתקיים על פי חוק פאולי?

א. $1s^2 2s^3 2p^3$

ב. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^8$

ג. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^6$

ד. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$

ה. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1 4s^2 3d^{14}$

**14)** איזה היגד **נכון**, לאלקטרון שיש לו את המספרים הקוונטיים $\ell = 2,\ m_\ell = 0$ :


א. האלקטרון חייב להימצא באורביטל 3d.

ב. האלקטרון יכול להימצא באורביטל 3p.

ג. האלקטרון יכול להימצא באחד מחמישה אורביטלי d (בעלי אנרגיה שווה) ה"פזורים" במרחב שמסביב לאטום.

ד. האלקטרון יכול להיות שייך לאטום סידן, Ca.

**15)** ליסוד מסוים X יש את המערך האלקטרוני הבא:




מה ניתן ללמוד מכך על היסוד X?

א. ל-X יש אורביטלי d ו-f ריקים.

ב. ביכולתו של X ליצור <u>תרכובות יוניות</u> עם מתכות.

ג. X שייך לגוש d, מכיוון שאורביטל d מאוכלס באלקטרונים.

ד. הרמה הרביעית של X **מלאה**.

ה. ל-X מערך אלקטרוני דומה למערך האלקטרוני של Kr, ולכן שניהם שייכים לאותה "משפחה".

**16)** איזה מהמשפטים הבאים **אינו** נכון:

א. מספר ערכי $\ell$ האפשריים עבור $n=3$ שווה ל-3.

ב. מספר האורביטלים בעלי המספרים הקוואנטים $n=3,\ \ell=1$, הוא 3.

ג. מספר האלקטרונים המקסימלי הניתנים לאכלוס באורביטלים המאופיינים במספרים הקוואנטים $n=2,\ \ell=1$, שווה ל-3.

ד. מספר ערכי $m_\ell$ עבור $\ell=1$, שווה ל-3.


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתבה ופתרה – ד"ר אבלינה ברט ©

## תשובות סופיות

**1)** א

**2)** א. $n \geq 3$ ; $m_s = \pm\frac{1}{2}$ ב. $\ell = 1$ ג. $m_\ell = -1,0,1$; $m_s = \pm\frac{1}{2}$

**3)** א. 6 ב. 2 ג. 8 ד. 1

**4)** ג

**5)** א. $[Ar]3d^7 4s^2$ ב. $[Kr]4d^7 5s^2$ ג. $[Kr]4d^{10}5s^2 5p^2$

ד. $[Xe]4f^{14}5d^{10}6s^2$

**6)** ד

**7)** $Ga^+$ : אין אלקטרונים בלתי מזווגים ; $Cu^{2+}$ : אלקטרון אחד בלתי מזווג ;
$Pb^{2+}$ : אין אלקטרונים בלתי מזווגים ; $Se^{2-}$ : אין אלקטרונים בלתי מזווגים.

**8)** א-ג. מצב מעורר. ד. מצב היסוד.

**9)** ד ; יסוד Ge .

**10)** ב

**11)** א, ג, ד.

**12)** א. $[Ar]4s^2 3d^{10}$ ב. $[Ar]4s^1 3d^5$ ג. $[Kr]5s^2 4d^{10}5p^6$

ד. $[Xe]5d^{10}$

**13)** א, ג, ה.

**14)** ג

**15)** א, ג.

**16)** ג


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתבה ופתרה – ד"ר אבלינה ברט ©

# תכונות מחזוריות של אטומים

## שאלות

**1)** מה **לא נכון** לגבי אטומי כלור וזרחן?

א. רדיוס אטומי של כלור גדול מזה של זרחן.

ב. אנרגיית היינון הראשונה של זרחן נמוכה מזו של כלור.

ג. האטומים האלה שייכים לגוש p בטבלה המחזורית.

ד. אלקטרושליליות של אטומי כלור גבוהה מזו של אטומי זרחן.

**2)** מהי הקביעה **הלא נכונה** לגבי גודל הצורון:

א. $R\left(S^{-2}\right) > R\left(Ar\right)$

ב. $R\left(Si^{+4}\right) < R\left(Ar\right)$

ג. $R\left(Se^{-2}\right) < R\left(S^{-2}\right)$

ד. $R\left(Se^{-2}\right) > R\left(Ar\right)$

**3)** אנרגיית היינון הראשונה של רובידיום (Rb) שווה ל- $403\,kJ/mol$, ושל סידן (Ca) $590\,kJ/mol$. לכן, אנרגיית היינון הראשונה של אשלגן (K) תהיה:

א. גבוהה מ- $590\,kJ/mol$.

ב. נמוכה מ- $403\,kJ/mol$.

ג. גבוהה מ- $403\,kJ/mol$, אך נמוכה מ- $590\,kJ/mol$.

ד. לא ניתן לקבוע לפי נתוני השאלה.

**4)** הסיבות להבדל בין אנרגיית היינון של $Al^+$ לאנרגיית היינון של $Mg^+$, היא:

א. מספר הנייטרונים בגרעין של $Al^+$ גדול יותר ממספר הנייטרונים בגרעין של $Mg^+$.

ב. מטען הגרעין של $Al^+$ גדול ממטען הגרעין של $Mg^+$.

ג. יון $Mg^+$ מכיל אלקטרון s אחד, בעוד ש- $Al^+$ מכיל שני אלקטרוני s.

ד. מספר האלקטרונים שמכיל $Al^+$ גדול ממספר האלקטרונים שמכיל $Mg^+$.


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתבה ופתרה – ד"ר אבלינה ברט ©

**5)** איזו קביעה מבין הבאות מדגישה ביותר את יציבות אלקטרוני ה- p :

א. הזיקה האלקטרונית של אטומי פלואור $(F)$ גבוהה מזו של אטומי חמצן $(O)$.

ב. אנרגיית היינון הראשונה של חנקן $(N)$ גבוהה מזו של אטומי זרחן $(P)$.

ג. אנרגיית היינון השנייה של חמצן $(O)$ גבוהה מזו של אטומי פלואור $(F)$.

ד. הזיקה האלקטרונית של אטומי בריליום $(Be)$ גבוהה מזו של אטומי בור $(B)$.

**6)** סדרו את החלקיקים הבאים לפי סדר עולה של נפחם, ונמקו :

א. $S, P, O, Se, As$

ב. $N^{-3}, F^{-}, O^{-2}, Ne$

ג. $K^{+}, S^{-2}, Cl^{-}, P^{-3}$

**7)** נתונים ארבעה יסודות מהשורה השלישית במערכה המחזורית : $A, B, C, D$.
בטבלה שלהלן רשומות אנרגיות היינון העוקבות של אטומים אלו :

| **A** | **B** | **C** | **D** | יסודות / אנרגיית היינון |
|---|---|---|---|---|
| 578 | 496 | 789 | 738 | $E_1$ |
| 1817 | 4563 | 1573 | 1451 | $E_2$ |
| 2745 | 6913 | 3232 | 7733 | $E_3$ |
| 11578 | 9594 | 4356 | 10541 | $E_4$ |
| 14831 | 13352 | 16091 | 13629 | $E_5$ |

א. באיזה טור נמצא כל יסוד?

ב. רשמו את המערך האלקטרוני עבור היסודות $A, B, C, D$.

ג. הסבירו מדוע

$E_1(D) > E_1(B); E_1(D) > E_1(A); E_2(D) > E_1(D); E_2(B) > E_2(D)$.


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתבה ופתרה – ד"ר אבלינה ברט ©

**8)** נתונה טבלה מחזורית שבה חלק מהיסודות סומנו באותיות באופן שרירותי, כאשר המיקום המקורי חופף למיקום האות שכתובה בו.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | R | | M | Q | | |
| | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | L | | | | | | | | Z | Y | X | E | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

א. 1. רשמו את ההערכות האלקטרונית **(המלאה)** של X ו-$L^{+2}$.

2. כמה אורביטלים מכל סוג מאוכלסים באלקטרונים (אכלוס מלא או חלקי) מכיל יסוד Y?

ב. ל-X מתאימים שלושה יונים יציבים: $X^{-3}$; $X^{+3}$; $X^{+5}$.

1. רשמו את ההיערכות האלקטרונית **(המלאה)** עבורם.

2. סדרו את היונים לפי רדיוס עולה.

ג. לאיזה יסוד זיקה אלקטרונית גבוהה יותר? הסבירו.

1. X או E?

2. Y או X?

**9)** נתונים היסודות מגנזיום (Mg), בריום (Ba), זרחן (P), חמצן (O), גופרית (S), פחמן (C) וחנקן (N).

בטבלה שלהלן מובא רדיוס של שבע יסודות שסומנו באותיות באופן שרירותי:

א. התאימו את היסודות לאותיות.

ב. סדרו את היסודות על פי אנרגיית היינון שנייה, והסבירו.

ג. לאיזה יסוד זיקה אלקטרונית נמוכה יותר? הסבירו.

1. גופרית או זרחן.

2. חנקן או פחמן.

| יסוד | M | L | R | W | Z | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רדיוס [Å] | 0.77 | 0.72 | 1.04 | 0.70 | 1.98 | 1.10 | 1.36 |


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתבה ופתרה – ד"ר אבלינה ברט ©

**10)** שישה יסודות בעלי מספרים אטומיים עוקבים, סומנו באופן שרירותי באותיות U,V,W,X,Y,Z . ליסוד U המספר האטומי הקטן ביותר, וליסוד Z הגדול ביותר.
בטבלה להלן מובאים אנרגיות היינון הראשונות של היסודות W, X ו-Y :

| יסוד | אנרגיית היינון הראשונה, בערכי $\frac{kJ}{mole}$ |
|---|---|
| W | 1251 |
| X | 1521 |
| Y | 419 |

א. קבעו לאיזה טור במערכה המחזורית שייך כל אחד מהיסודות מ-U עד Z.

ב. 1. האם אנרגיית היינון של Z תהיה גבוהה מזו של Y או נמוכה ממנה? נמקו.

2. האם אנרגיית היינון הראשונה של U תהיה גבוהה מזו של V או נמוכה ממנה? נמקו.

ג. סדרו את היסודות U,V,W,X,Y,Z , לפי אנרגית יינון שנייה.

ד. סדרו את היסודות U,V,W,X,Y,Z , לפי נפח אטומי עולה.


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתבה ופתרה – ד"ר אבלינה ברט ©

## תשובות סופיות

**1)** א

**2)** ג

**3)** ג

**4)** ב, ג.

**5)** ג

**6)** א. $O < S < P < Se < As$ ב. $Ne < F^- < O^{2-} < N^{3-}$ ג. $K^+ < Cl^- < S^{2-} < P^{3-}$

**7)** א. A – טור 3 ; B – טור 1 ; C – טור 4 ; D – טור 2.

ב. $A: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$, $B: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

$C: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$, $D: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

**8)** א.1. $L^{2+}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^2$, $X: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^3$

א.2. $s - 4;\ p - 8;\ d - 5$

ב.1. $X^{5+}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10}$, $X^{3+}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$

$X^{3-}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6$

ב.2. $X^{5+} < X^{3+} < X^{3-}$

**9)** א. $X - Mg;\ Y - P;\ Z - Ba;\ M - C;\ L - N;\ W - O;\ R - S$

ב. $Ba < Mg < P < S < C < N < O$ ג.1. S ב.2. C

**10)** א. U – טור 5 ; V – טור 6 ; W – טור 7 ; X – טור 8 ; Y – טור 1 ; Z – טור 2.

ב.1. Z ב.2. גבוהה.

ג. $Z < U < W < V < X < Y$

ד. $X < W < V < U < Z < Y$


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתבה ופתרה – ד"ר אבלינה ברט ©