# אינפי 2

## פרק 18 - משוואות מסדר ראשון

### תוכן העניינים


1. מבוא ..... (ללא ספר)
2. הפרדת משתנים ..... 1
3. משוואה הומוגנית ..... 3
4. משוואה מהצורה $(ax+by+c)dx+(dx+ey+f)dy=0$ ..... 5
5. משוואה מדויקת ..... 6
6. גורם אינטגרציה ..... 8
7. משוואה לינארית מסדר ראשון ..... 11
8. משוואת ברנולי ..... 13
9. משוואת ריקטי ..... 14
10. הצבות שונות ומשונות ..... 15
11. משפט הקיום והיחידות על שם פיאנו ופיקארד ..... 16
12. פתרונות גרפיים ונומריים למשוואה מסדר ראשון ..... 19
13. משוואות מסדר ראשון וממעלה גבוהה ..... 21

# הפרדת משתנים

## שאלות

פתרו את המשוואות הבאות:

**1)** $\frac{dy}{dx}=\frac{x^2}{y} \quad (y\neq 0)$

**2)** $(1-x)y'=y^2$

**3)** $yy'\sqrt{1+x^2}+x\sqrt{1+y^2}=0$

**4)** $(x-1)\frac{dy}{dx}=4y \quad ; \quad y(2)=1$

**5)** $\frac{dy}{dx}=xy+3y-3x-9 \quad ; \quad y(1)=-1$

**6)** $\left(x^2y-2+2x^2-y\right)dx-\left(xy^2-4-4x+y^2\right)dy=0$

**7)** $dy=2t\left(y^2+4\right)dt$

**8)** $\frac{dx}{dt}=x^2-2x+2$

**9)** $y'+y^2\sin x=0 \quad ; \quad y(\pi)=1$

**10)** $\frac{dy}{dx}=y\sec^2 x \quad ; \quad y(0)=5 \quad (\cos x\neq 0)$

**11)** $\frac{dy}{dx}=\frac{xy^3}{\sqrt{1+x^2}} \quad ; \quad y(0)=1$


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתב ופתר – גיא סלומון ©

## תשובות סופיות

**1** $y=\pm\sqrt{\frac{2}{3}x^3+k}$

**2** $y=\frac{1}{\ln|1-x|-c},\quad y=0$

**3** $\sqrt{1+y^2}=-\sqrt{1+x^2}+c$

**4** $\frac{1}{4}\ln|y|=\ln|x-1|$

**5** $\ln|y-3|=\frac{x^2}{2}+3x+\ln 4-3.5$

**6** $y=2\pm\sqrt{(x-1)^2+k}$

**7** $y=2\tan\left(2t^2+k\right)$

**8** $x=1+\tan\left(t+c\right)$

**9** $y=-\frac{1}{\cos x}$

**10** $\ln|y|=\tan x+\ln 5$

**11** $\frac{1}{-2y^2}=\sqrt{1+x^2}-1.5$


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתב ופתר – גיא סלומון ©

# משוואה הומוגנית

## שאלות

פתרו את המשוואות בשאלות **1-8**:

**1)** $\left(y^3+x^3\right)dx+xy^2dy=0$

**2)** $y'=\frac{4y-3x}{2x-y}$

**3)** $y^2+x^2y'=xyy'$

**4)** $\left(3xy+y^2\right)dx+\left(x^2+xy\right)dy=0$

**5)** $\left(x-y\cos\frac{y}{x}\right)dx+x\cos\frac{y}{x}dy=0$

**6)** $y'=\frac{2xye^{(x/y)^2}}{y^2+y^2e^{(x/y)^2}+2x^2e^{(x/y)^2}}$

**7)** $y(1)=0\ ;\ \left(y+\sqrt{x^2+y^2}\right)dx-xdy=0$

**8)** $\left(2x^2t-2x^3\right)dt+\left(4x^3-6x^2t+2xt^2\right)dx=0$

**9)** נתונה המשוואה $\left(y^2+x^2\right)dx+xy^ndy=0$.

א. מה צריך להיות הערך של הקבוע $n$, על מנת שהמשוואה תהיה הומוגנית?

ב. פתרו את המשוואה עבור הערך של $n$ שנמצא בסעיף א.


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתב ופתר – גיא סלומון ©

## תשובות סופיות

**1** $-\ln|x|=\frac{1}{6}\ln\left|2(y/x)^3+1\right|+c\,,\qquad y=-\frac{x}{2^{1/3}}$

**2** $\ln|x|=\frac{1}{4}\ln\left|(y/x)-1\right|-\frac{5}{4}\ln\left|(y/x)+3\right|+c\,,\quad y=x,\ y=-3x$

**3** $-\ln|x|=\ln\left|(y/x)\right|-(y/x)+c,\quad y=0$

**4** $-\ln|x|=\frac{1}{4}\ln\left|2(y/x)^2+4\right|+c,\quad y=0,\quad y=-2x$

**5** $\ln|x|=-\sin(y/x)+c$

**6** $\ln\left(1+e^{(x/y)^2}\right)=\ln|y|+c,\quad y=0$

**7** $\ln x=\sinh^{-1}\left(\frac{x}{y}\right)+c$

**8** $\ln|t|=-\frac{1}{2}\ln\left|(x/t)-(x/t)^2\right|+c,\quad x(t)=0,\quad x(t)=t$

**9** $n=1,\quad \ln|x|=-\frac{1}{4}\ln\left(1+2(y/x)^2\right)+c$


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתב ופתר – גיא סלומון ©

# משוואה מהצורה $(ax+by+c)dx+(dx+ey+f)dy=0$

## שאלות

פתרו את המשוואות הבאות:

**1)** $\frac{dy}{dx}=\frac{x+y+1}{x+y+2}$

**2)** $(x+2y+3)dx+(2x+4y-1)dy=0$

**3)** $\frac{dy}{dx}=\frac{2y-x+5}{2x-y-4}$

**4)** $\frac{dx}{dy}=\frac{3+x+2y}{1+x+y}$

**5)** $(2x+y-3)dx+(x+y-1)dy=0$

## תשובות סופיות

**1)** $x=\frac{1}{2}(x+y+1)+\frac{1}{4}\ln\left(2(x+y+1)+1\right)+\frac{1}{4}+c,\quad y=-x-1.5$

**2)** $\ln|x-1|=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{y+2}{x-1}-1\right|-\frac{3}{2}\ln\left|\frac{y+2}{x-1}+1\right|+c\ ,y=x-3\ ,\quad y=-x-1$

**3)** $0=14y-(x+2y+3)^2+k$

**4)** $\ln|x-1|=\frac{1}{4}\left[-\left(2+\sqrt{2}\right)\ln\left|\sqrt{2}-2\frac{y+2}{x-1}\right|+\left(-2+\sqrt{2}\right)\ln\left|\sqrt{2}+2\frac{y+2}{x-1}\right|\right]+c$

$y=\sqrt{0.5}x-2-\sqrt{0.5}\ ,\ y=-\sqrt{0.5}x-2+\sqrt{0.5}$

**5)** $\ln|x-2|=\frac{1}{2}\ln\left(2+2\frac{y+1}{x-2}+\left(\frac{y+1}{x-2}\right)^2\right)+c$


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתב ופתר – גיא סלומון ©

# משוואה מדויקת

## שאלות

פתרו את המשוואות בשאלות **1-6**:

**1)** $\left(2x^3+3y\right)dx+\left(3x+y-1\right)dy=0$

**2)** $\left(y^2e^{xy^2}+4x^3\right)dx+\left(2xye^{xy^2}-3y^2\right)dy=0$

**3)** $\left(y\cos x+2xe^y\right)dx+\left(\sin x+x^2e^y-1\right)dy=0$

**4)** $\left(1+y^2\sin 2x\right)dx-2y\cos^2 xdy=0$

**5)** $\left(y^2-\frac{y}{x(x+y)}+2\right)dx+\left(\frac{1}{x+y}+2y(x+1)\right)dy=0$

**6)** $\left(2x^2t-2x^3\right)dt+\left(4x^3-6x^2t+2xt^2\right)dx=0$

**7)** נתונה המשוואה $\left(3x^2+ye^{xy}\right)dx+\left(2y^3+kxe^{xy}\right)dy=0$, כאשר $k$ קבוע.

א. מה צריך להיות הערך של הקבוע $k$, על מנת שהמשוואה תהיה מדויקת?

ב. פתור את המשוואה עבור הערך של $k$ שנמצא בסעיף א.


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתב ופתר – גיא סלומון ©

## תשובות סופיות

1) $0.5x^4+3yx+0.5y^2-y=c$

2) $e^{xy^2}+x^4-y^3=c$

3) $y\sin x+x^2e^y-y=c$

4) $x-\frac{y^2\cos 2x}{2}-\frac{y^2}{2}=c$

5) $\ln|x+y|+(x+1)y^2+2x-\ln|x|=c$

6) $x^2t^2-2x^3t+x^4=c$

7) $k=1,\ \ x^3+e^{xy}+\frac{y^4}{2}=c$


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתב ופתר – גיא סלומון ©

# גורם אינטגרציה

## שאלות

**1)** הראו שהמשוואה $x^2y^3+x\left(1+y^2\right)y'=0$ אינה מדויקת,
ופתרו אותה בעזרת גורם האינטגרציה $\frac{1}{xy^3}$.

**2)** הראו שהמשוואה $\left(\frac{\sin y}{y}-2e^{-x}\sin x\right)dx+\left(\frac{\cos y+2e^{-x}\cos x}{y}\right)dy=0$
אינה מדויקת, ופתרו אותה בעזרת גורם האינטגרציה $ye^x$.

**3)** הראו שהמשוואה $\left(x+2\right)\sin ydx+x\cos ydy=0$ אינה מדויקת,
ופתרו אותה בעזרת גורם האינטגרציה $xe^x$.

פתרו את המשוואות בשאלות **4-9**:

**4)** $\left(x^2+y^2+x\right)dx+\left(xy\right)dy=0$

**5)** $\left(x-x^2-y^2\right)dx+ydy=0$

**6)** $\left(2xy^3+y^4\right)dx+\left(xy^3-2\right)dy=0$

**7)** $\left(y^2-y\right)dx+xdy=0$

**8)** $\left(y-xy^2\right)dx+\left(x+x^2y^2\right)dy=0$

**9)** $y'=\frac{3yx^2}{x^3+2y^4}$ ; $y\left(1\right)=-1$


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתב ופתר – גיא סלומון ©

**10)** נתונה מד"ר לא מדויקת $M(x,y)dx+N(x,y)dy=0$.

א. הוכיחו: אם $\frac{M_y-N_x}{N}=f(x)$, אז $e^{\int f(x)dx}$ הוא גורם אינטגרציה.

ב. הוכיחו: אם $\frac{M_y-N_x}{M}=g(y)$, אז $e^{-\int g(y)dy}$ הוא גורם אינטגרציה.

**11)** נתונה המשוואה הדיפרנציאלית $\left(y^4-4xy\right)dx+\left(2xy^3-3x^2\right)dy=0$.

מצאו את גורם האינטגרציה של המשוואה, בהנחה שהוא פונקציה של $xy$ בלבד.

כלומר, גורם האינטגרציה מהצורה $\mu(xy)$.

**12)** נתונה המשוואה $\left(5x^2+3y^3+2xy\right)dx+\left(3x^2+3xy^2+6y^3\right)dy=0$.

מצאו את גורם האינטגרציה, בהנחה שהוא מהצורה $\mu(x+y)$.

**13)** נתונה המשוואה הדיפרנציאלית $M(x,y)dx+N(x,y)dy=0$.

מצאו תנאי על המשוואה, על מנת שיהיה לה גורם אינטגרציה

שהוא פונקציה של $\frac{x}{y}$ בלבד.

**14)** נתונה המשוואה הדיפרנציאלית $\left(x^2y^3\right)dx+\left(x+xy^2\right)dy=0$.

מצאו את גורם האינטגרציה של המשוואה, בהנחה שהוא פונקציה של $x^\alpha y^\beta$.

כלומר, גורם אינטגרציה מהצורה $\mu\left(x^\alpha y^\beta\right)$.

**15)** נתונה המשוואה הדיפרנציאלית $M(x,y)dx+N(x,y)dy=0$.

א. מצאו תנאי על המשוואה, על מנת שיהיה לה גורם אינטגרציה שהוא פונקציה של $xy$ בלבד.

ב. היעזרו בסעיף א' על מנת למצוא את גורם האינטגרציה של המשוואה $\left(y-xy^2\ln x\right)dx+xdy=0$.

**16)** נתונה המשוואה הדיפרנציאלית $M(x,y)dx+N(x,y)dy=0$.

מצאו תנאי על המשוואה על מנת שיהיה לה גורם אינטגרציה

שהוא פונקציה של $x+y$ בלבד.


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתב ופתר – גיא סלומון ©

## תשובות סופיות

**1)** $0.5x^2+\frac{y^{-2}}{-2}+\ln|y|=c$

**2)** $e^x\sin y+2y\cos x=c$

**3)** $\sin y\cdot e^x\cdot x^2=c$

**4)** $0.25x^4+0.5x^2y^2+\frac{x^3}{3}=c$

**5)** $\frac{1}{2}\ln\left(x^2+y^2\right)-x=c$

**6)** $x^2+xy+\frac{1}{y^2}=c$

**7)** $x-\frac{x}{y}=c$

**8)** $-\ln x-\frac{1}{xy}+y=c$

**9)** $-\frac{x^3}{y}+\frac{2y^3}{3}=\frac{1}{3}$

**10)** שאלת הוכחה.

**11)** $\mu(xy)=(xy)^2$

**12)** $\mu(x+y)=(x+y)^2$

**13)** $\text{if: }\frac{y^2\left(M_y-N_x\right)}{yN+xM}=h\left(x/y\right)\quad\text{then: I.F.: }\mu=e^{\int\frac{y^2\left(M_y-N_x\right)}{yN+xM}}$

**14)** $\mu=\frac{1}{xy^3}$

**15)** א. $\text{if : }\frac{M_y-N_x}{yN-xM}=h(xy)\quad\text{then: I.F. : }\mu=e^{\int\frac{M_y-N_x}{yN-xM}}$ ב. $\mu=\frac{1}{x^2y^2}$

**16)** $\text{if : }\frac{M_y-N_x}{N-M}=h(x+y)\quad\text{then:I.F.: }\mu=e^{\int\frac{M_y-N_x}{N-M}}$


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתב ופתר – גיא סלומון ©

# משוואות ליניאריות מסדר ראשון

## שאלות

פתרו את המשוואות הבאות:

**1)** $\frac{dy}{dx}+2xy=4x$

**2)** $xy'=y+x^3+3x^2-2x$

**3)** $(x>2)\quad (x-2)y'=y+2(x-2)^3$

**4)** $(x>0)\quad x^3y'+(2-3x^2)y=x^3$

**5)** $y(0)=1\ ;\ \frac{dy}{dt}+y=2+2t$

**6)** $(\sin x>0)\quad \frac{dy}{dx}+y\cot x=5e^{\cos x}$

**7)** $(\sin x>0)\quad y'-2y\cot x=1$

**8)** $z(\pi)=0\ ;\ x^2z'+2xz=\cos x$

**9)** $ydx=(2x+y^3)dy$


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתב ופתר – גיא סלומון ©

## תשובות סופיות

1) $y = 2 + C \cdot e^{-x^2}$

2) $y = x\left[\frac{x^2}{2} + 3x - 2\ln x + C\right]$

3) $y = (x-2)\left[x^2 - 4x + C\right]$

4) $y = \frac{1}{2}x^3 + C \cdot x^3 e^{\frac{1}{x^2}}$

5) $y = 2t + e^{-t}$

6) $y = \frac{1}{\sin x}\left[-5e^{\cos x} + C\right]$

7) $y = \sin^2 x\left[-\cot x + C\right]$

8) $z = \frac{\sin x}{x^2}$

9) $x(y) = y^2(y + c)$


כתב ופתר – גיא סלומון ©

# משוואת ברנולי

## שאלות

פתרו את המשוואות הבאות:

**1)** $x^2y'+2xy-y^3=0$

**2)** $\left(x^2+1\right)y'-2xy-y^2=0$

**3)** $x\frac{dy}{dx}-2y=x^2y^{1/2}$

**4)** $y'-\left(\frac{1}{x}+5x^4\right)y=-x^3y^2 \quad ; \quad y(1)=2.5$

**5)** $z'-\cot x\cdot z=\frac{1}{\sin x}z^3 \qquad \left(\sin x\neq 0\right)$

## תשובות סופיות

**1)** $y=\pm\frac{1}{\sqrt{\frac{2}{5x}+c\cdot x^4}}$

**2)** $y=\frac{x^2+1}{-x+C}$

**3)** $y=x^2\left(\frac{x}{2}+C\right)^2$

**4)** $y=\frac{5xe^{x^5}}{e^{x^5}+e}$

**5)** $z=\pm\sqrt{\frac{\sin^2 x}{\cos x+C}}$


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתב ופתר – גיא סלומון ©

# משוואת ריקטי

## שאלות

פתרו את המשוואות הבאות:

**1** $y'=e^{2x}+\left(1+\frac{5}{2}e^{x}\right)y+y^{2}$

**2** $y'=1+\left(x-y\right)^{2}$

**3** $y'=1+x+2x^{2}\cos x-\left(1+4x\cos x\right)y+2y^{2}\cos x$

## תשובות סופיות

**1** $y\left(x\right)=-0.5e^{x}+\frac{e^{x}}{-\frac{2}{3}+Ce^{-1.5x}}$

**2** $y\left(x\right)=x+\frac{1}{-x+C}$

**3** $y\left(x\right)=x+\frac{1}{\cos x-\sin x+Ce^{x}}$


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתב ופתר – גיא סלומון ©

# הצבות שונות ומשונות

## שאלות

פתרו את המשוואות הבאות:

**1)** $y'=\cos(y-x)$

**2)** $y'=\frac{2y}{x}+\cos\left(\frac{y}{x^2}\right);\ y(1)=0$

**3)** $y'-x^2y+y^2=x-\frac{x^4}{4},\ y(0)=1$

## תשובות סופיות

**1)** $-\frac{1}{\sin z}+c$

**2)** $\frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+\sin z}{1-\sin z}\right)$

**3)** $y=\frac{x^2}{2}+\frac{1}{x+1}$


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתב ופתר – גיא סלומון ©

# משפט הקיום והיחידות על שם פיאנו ופיקארד

## שאלות

**1)** נתונה הבעיה $y'=-\frac{1}{2}x+\sqrt{\frac{1}{4}x^2+y}$ , $y(2)=-1$.

א. הוכיחו ש-$y_2(x)=-\frac{1}{4}x^2$, $y_1(x)=-x+1$ הם פתרונות לבעיה.
קבעו באיזה תחום תקף כל אחד מהפתרונות.

ב. הסבירו מדוע קיום שני פתרונות לא סותר את משפט היחידות.

**2)** נתונה הבעיה $y'=\sqrt[3]{y}+4$ , $y(0)=0$.

א. הוכיחו שהבעיה מקיימת את תנאי משפט הקיום.

ב. הוכיחו שהבעיה אינה מקיימת את תנאי היחידות.

ג. הוכיחו שלבעיה קיים פתרון יחיד, ומצאו אותו.

**3)** פתרו את הבעיה $y'=\left(x^2+y^2\right)\cos\left(\frac{\pi}{2}-y\right)+x^2\sin y$ , $y(4)=0$.

**4)** נתונה הבעיה $y'=(y-1)\left(x^2+y\right)^5$ , $y(0)=4$.

א. הראו שכל פתרון של הבעיה בהכרח חסום מלמטה.

ב. הראו שכל פתרון של הבעיה בהכרח עולה בתחום הגדרתו.

**5)** נתונה המד"ר $ydx=\left(2x+y^3\right)dy$.

א. הראו שעבור $x=x(y)$ המד"ר ליניארית מסדר ראשון,
ופתרו אותה ככזאת.

ב. קבעו, על פי משפט הקיום והיחידות למד"ר ליניארית,
מהן נקודות ההתחלה $(x_0,y_0)$, כך שלמד"ר הנתונה קיים פתרון יחיד,
העובר דרך $(x_0,y_0)$.
צטטו את המשפט עבור המד"ר הליניארית שקיבלתם.
מהו הקטע הארוך ביותר שבו קיים פתרון יחיד העובר דרך $(x_0,y_0)$?


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתב ופתר – גיא סלומון ©

**6)** נתונה בעיית ההתחלה $\begin{cases} y' = 2xy \\ y(0) = 1 \end{cases}$.

א. מצאו 3 קירובי פיקארד לפתרון הבעיה.

ב. מצאו צורה כללית לקירוב פיקארד מסדר $n$ (הוכיחו באינדוקציה).

ג. פתרו את המד"ר ישירות, והראו כי קירוב פיקארד מסדר $n$ מתכנס לפתרון כאשר $n \to \infty$.

**7)** כמה פתרונות יש לבעיית ההתחלה $\begin{cases} y' = \frac{1}{x}|\sin y| \\ y(1) = \pi \end{cases}$ $(x > 0)$?

**8)** נתונה בעיית התחלה $\begin{cases} y' = 5 + 5y^2 \\ y(0) = 0 \end{cases}$.

א. מצאו קטע כלשהו שבו לבעיה קיים פתרון יחיד.

ב. מצאו את הקטע הגדול ביותר, שבו משפט הקיום והיחידות יודע להגיד שקיים פתרון יחיד.

ג. הראו, על ידי חישוב ישיר, שקיים קטע גדול יותר מהקטע שנמצא בסעיף ב', בו קיים לבעיה פתרון יחיד.

**9)** נתונה בעיית התחלה $\begin{cases} y' = -\frac{x}{y} \quad (y > 0) \\ y(0) = 1 \end{cases}$.

א. מצאו קטע כלשהו שבו לבעיה קיים פתרון יחיד.

ב. מצאו את הקטע הגדול ביותר, שבו משפט הקיום והיחידות יודע להגיד שקיים פתרון יחיד.

ג. הראו, על ידי חישוב ישיר, שקיים קטע גדול יותר מהקטע שנמצא בסעיף ב', בו קיים לבעיה פתרון יחיד.

**10)** הראו כי לבעיה $\begin{cases} y' = x + \sin y \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ יש פתרון יחיד על כל הישר הממשי.

**11)** הראו כי לבעיה $\begin{cases} y' = x \cdot \sin xy \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ יש פתרון יחיד על כל הישר הממשי.

**12)** הראו כי לבעיה $\begin{cases} y' = xye^{-y^2} \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ יש פתרון יחיד על כל הישר הממשי.


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתב ופתר – גיא סלומון ©

## תשובות סופיות

**1)** א. שאלת הוכחה. ב. שאלת הסבר.

**2)** א. שאלת הוכחה. ב. שאלת הוכחה. ג. שאלת הוכחה.

**3)** $y(x)=0$

**4)** א. שאלת הוכחה. ב. שאלת הוכחה.

**5)** א. ראו שאלה אחרונה בנושא 'מד"ר ליניארית מסדר ראשון'.

ב. כל נקודת התחלה $(x_0,y_0)$, שעבורה $y_0\neq 0$.

הקטע הארוך ביותר: $(0,\infty)$ או $(-\infty,0)$.

**6)** א. $y_0(x)=1,\quad y_1(x)=1+x^2,\quad y_2(x)=1+\frac{x^2}{1!}+\frac{x^4}{2!},\quad y_3(x)=1+\frac{x^2}{1!}+\frac{x^4}{2!}+\frac{x^6}{3!}$

ב. $y_n(x)=1+x^2+\frac{x^4}{2!}+\frac{x^6}{3!}+\ldots+\frac{x^{2n}}{n!}$ ג. הוכחה.

**7)** אחד.

**8)** א. $[-0.08,0.08]$ ב. $[-0.1,0.1]$ ג. הוכחה.

**9)** א. $\left[-\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right]$ ב. $[-0.5,0.5]$ ג. הוכחה.

**10)** הוכחה.

**11)** הוכחה.

**12)** הוכחה.


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתב ופתר – גיא סלומון ©

# פתרונות גרפיים ונומריים למשוואה מסדר ראשון

## שאלות

**1)** שרטטו שדה כיוונים למשוואה הדיפרנציאלית $y'=2y-x$.

**2)** התאימו כל אחת מהמשוואות שבסעיפים א'-ג' לשדה הכיוונים שלה:

א. $y'=\frac{x}{y}$

ב. $y'=xy$

ג. $y'=x+y$



איור 1



איור 2



איור 3

**3)** נתונה המד"ר $y'=y-x$ , $y(0)=2$.

מצאו בקירוב את $y(1)$ בעזרת שיטת אוילר עם $h=0.1$.

**4)** נתונה המד"ר $y'=x+y$ , $y(1)=2$.

מצאו בקירוב את $y(2)$ בעזרת שיטת אוילר עם $h=0.2$.


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתב ופתר – גיא סלומון ©

## תשובות סופיות

**1)**



**2)** איור 1 – סעיף ג', איור 2 – סעיף ב', איור 3 – סעיף א'.

**3)** $y(1)=4.593$

**4)** $y(2)=6.95328$


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתב ופתר – גיא סלומון ©

# משוואות מסדר ראשון וממעלה גבוהה

**הערה: נושא זה לא נלמד בדרך כלל; בדקו עם המרצה אם הוא נדרש או לא.**

**הערת סימון:** בתת-פרק זה נסמן $p = y' = \frac{dy}{dx}$ .

## שאלות

פתרו את המשוואות הבאות:

**1)** $4x^2p^2 - 4x^2p - 2xy - y^2 = 0$ $\quad (p = y')$

**2)** $x^2p^2 + xyp - 6y^2 = 0$ $\quad (p = y')$

**3)** $xyp^2 + \left(x^2 + xy + y^2\right)p + x^2 + xy = 0$ $\quad (p = y')$

**4)** $y = 2px + p^4x^2$ $\quad (p = y')$

**5)** $xp^2 - 2yp + 4x = 0$ $\quad (p = y')$

**6)** $6p^2y^2 + 3px - y = 0$ $\quad (y > 0)$ $\quad (p = y')$


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתב ופתר – גיא סלומון ©

## תשובות סופיות

**1)** $\left(y-2x-\sqrt{x}\cdot c_1\right)\cdot\left(\ln|y|+\frac{1}{2}\ln|x|-c_2\right)=0$

**2)** $\left(\ln|y|-2\ln|x|-c_1\right)\cdot\left(\ln|y|+3\ln|x|-c_2\right)=0$

**3)** $\left(y+0.5x-\frac{c_1}{x}\right)\cdot\left(\frac{y^2}{2}+\frac{x^2}{2}-c_2\right)=0,\ \ x>0$

**4)** $y=\pm 2\sqrt{cx}+c^2$

**5)** $y=\frac{1}{2}cx^2+\frac{2}{c}$

**6)** $6\left(\frac{c}{y^2}\right)^2y^2+3\left(\frac{c}{y^2}\right)x-y=0$


לפתרון מלא בסרטוני וידאו היכנסו לאתר www.GooL.co.il
כתב ופתר – גיא סלומון ©