

# משוואות דיפרנציאליות חלקיות

פרק 10 - שאלות מסכמות ברמת בחינה

תוכן העניינים

1. תרגילים ..... 1

## שאלות מסכמות ברמת בחינה

### שאלות

פתרו את הבעיות בשאלות 1-2:

$$u_x + u_y = u \quad x, y > 0$$

$$u(x,0) = \begin{cases} 0 & x > 1 \\ 1 & 0 < x < 1 \end{cases} \quad u(0,y) = 0 \quad (1)$$

$$u_{tt} = u_{xx} \quad 0 < x < \infty \quad t > 1$$

$$u(x,0) = f(x) = 0 \quad u_t(x,0) = g(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x < 1 \\ 0 & \text{else} \end{cases} \quad (2)$$

$$\Delta u = r \quad 1 < r < 2$$

$$u(1,\theta) = 1 + \sin \theta \quad \text{פתרו את הבעיה הבאה:} \quad (3)$$

$$u(2,\theta) = 1 + 2 \cos \theta$$

$$u_x + u_y + u = (2x+1)e^{x^2} \quad y \geq e^{-x}$$

$$u(x, e^{-x}) = e^{x^2} + e^{-x} \quad \text{פתרו את המשוואה:} \quad (4)$$

$$: 0 < x < 1, t > 0 \text{ בתחום, } \begin{cases} u_t = u_{xx} + 4u_x + 4u \\ u(x,0) = x(1-x)e^{-2x}\sqrt{e} \\ u(0,t) = (1,t) = 0 \end{cases} \quad (5)$$

נתונה הבעיה

$$\text{הוכיחו: } u\left(\frac{1}{2}, 1\right) < \frac{1}{4\sqrt{e}}$$

רמז: הגדירו את הפונקציה  $h(x,t) = u(x,t)e^{\delta x}$ , עבור קבוע  $\delta$  מתאים.

(6) עבור איזו פונקציה לפתרון של הבעיה הבאה:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + 10u & 0 < x < 1, t > 0 \\ u(x,0) = h(x) \\ u(0,t) = 0 & u(1,t) = 0 \end{cases}$$

הגבול  $\lim_{t \rightarrow \infty} u(x,t)$  קיים וסופי.

$$(7) \quad \begin{cases} \Delta u = x^2 + y^2 & \text{in } x^2 + y^2 < 1 \\ u|_{x^2+y^2=1} = 1+x \end{cases} \quad \text{פתרו את הבעיה הבאה:}$$

והביעו את הפתרון בקואורדינטות קרטזיות.

$$(8) \quad \begin{cases} u_{tt} = u_{xx} & -\infty < x < \infty \quad t > 0 \\ u(x, 0) = 1 \end{cases} \quad \text{נתונה משוואת הגלים הבאה:}$$

$$u_t(x, 0) = g(x) = \begin{cases} 1-x^2 & -1 < x < 1 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

חשבו את  $u(x, 1)$ .

$$(9) \quad \begin{cases} \Delta u = 0 & x^2 + y^2 < 1 \\ u|_{x^2+y^2=1} = \cosh(x) \sinh(y) \end{cases} \quad \text{נתונה הבעיה הבאה:}$$

חשבו את  $u(0, 0)$ .

$$\Delta u = 0 \quad 1 < x^2 + y^2 < 4$$

$$(10) \quad \begin{cases} u|_{x^2+y^2=1} = \ln(2+x) \\ u|_{x^2+y^2=4} = \ln(e^{2019} - 2 + x) \end{cases} \quad \text{נתונה הבעיה הבאה:}$$

הוכיחו כי לכל  $1 < x^2 + y^2 < 4$  מתקיים  $0 < u(x, y) < 2019$ .

(11) מצאו את הפתרון הכללי של המשוואה הבאה, בתחום  $x, y > 0$ .

$$x^2 u_{xx} + 2xy \cdot u_{xy} + y^2 u_{yy} = 4x^2$$

(12) השתמשו באינטגרל אנרגיה כדי להראות את יחידת הפתרון לבעיה הבאה:

$$\begin{cases} u_{tt} + \beta \cdot u_t + F(x, t) & 0 < x < L, \quad t > 0, \quad \beta > 0 \\ u_x(0, t) = A(t) & u_x(L, t) = B(t) \\ u(x, 0) = f(x) \\ u_t(x, 0) = g(x) \end{cases}$$

$$\text{רמז: הגדירו } E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L w_t^2(x, t) + w_x^2(x, t) dx$$

13) פתרו על ידי הפרדת משתנים את משוואת החום הבאה:

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} & 0 < x < L, \quad t > 0 \\ u(x, 0) = x \\ u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0 \end{cases}$$

14) נתונה המשוואה  $2u_{xx} + 2yu_{yy} + u_y = 0$ , בתחום  $y > 0$ .

- א. הראו כי המשוואה אליפטית.  
 ב. העבירו את המשוואה לצורה קנונית.

15) פתרו את הבעיה הבאה:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + e^{-t} & 0 < x < \infty \\ u(0, t) = e^{-t} - 1 \\ u(x, 0) = 1 \quad u_t(x, 0) = 2 \sin(x) - 1 \end{cases}$$

16) נתונה הבעיה:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} & 0 < x < 1, \quad t > 0 \\ u_x(0, t) = 0 \quad u_x(1, t) = 0 \\ u(x, 0) = 0 \\ u_t(x, 0) = x^2(1-x) \end{cases}$$

$$\text{חשבו } \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^1 u_t^2(x, t) + u_x^2(x, t) dx$$

17) מצאו את הפתרון הכללי של המשוואה הבאה:

$$u_{xx} - 2 \sin(x) u_{xy} - \cos^2(x) u_{yy} - \cos(x) u_y = 0$$

$$\begin{cases} u_t + u_x = u_{xx} & 0 < x < 1, \quad t > 0 \\ u(x, 0) = e^{\frac{1}{2}x} \\ u(0, t) = 0 \quad u(1, t) = 0 \end{cases} \quad \text{18) נתונה הבעיה הבאה:}$$

$$\text{חשבו } \lim_{t \rightarrow \infty} e^{\left(\frac{1}{4} + \pi^2\right)t} \int_0^1 e^{-\frac{1}{2}x} u_t(x, t) dx$$

$$\begin{aligned}
 u_x + 2u_y = u & \quad 1 + y - 2x > 0, \quad x < 0 \\
 u(x, x^2) = x + \sin(x^3) & \quad x < 0
 \end{aligned}$$

**19** פתרו את המשוואה

$$\begin{aligned}
 u_t = u_{xx} + \cos(\pi x) & \quad 0 < x < 1, \quad t > 0 \\
 u_x(0, t) = u_x(1, t) = 1 & \quad \text{פתרו את הבעיה הבאה:} \\
 u(x, 0) = x
 \end{aligned}$$

רמז: התבוננו בפונקציה  $v(x, t) = u(x, t) - x$ .

**21** נתון כי  $u(r, \theta)$  הוא פתרון של הבעיה הבאה:

$$\begin{aligned}
 \Delta u = 1 & \quad 0 \leq r < 1 \\
 u(1, \theta) = c + \sin(2020 \cdot \theta)
 \end{aligned}$$

עבור איזה קבוע  $c$  מתקיים  $?$   $\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{u(r, \theta)}{r^2} = \frac{1}{4}$

**22** נתונות הבעיות הבאות:

$$\begin{cases} \Delta u = r^2 & 0 \leq r < 1 \\ u(1, \theta) = \sin^{2019}(\theta) & 0 \leq \theta < 2\pi \end{cases}
 \quad
 \begin{cases} \Delta v = r^2 & 0 \leq r < 1 \\ v(1, \theta) = \cos^{2020}(\theta) \end{cases}$$

הוכיחו כי  $u(0, 0) > v(0, 0)$ .

$$\begin{cases} \Delta u_n = \left(\frac{r}{2}\right)^n \\ u_n(1, \theta) = \sin(\theta) \end{cases}
 \quad
 0 \leq r < 1$$

**23** נתון כי  $u_n(r, \theta)$  הוא פתרון של הבעיה:

מצאו את  $u_n(r, \theta)$  וחשבו  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(r, \theta)$ .

24) הוכיחו את יחידות הפתרון של בעיית החום הבאה, עבור  $b > 0$ .

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + F(x,t) & 0 < x < 1 \\ u(x,0) = h(x) \\ v_x(0,t) - b \cdot v(0,t) = f(t) & t \geq 0 \\ u_x(1,t) + b \cdot u(1,t) = g(t) & t \geq 0 \end{cases}$$

רמז: היעזרו באינטגרל האנרגיה  $E(t) = \frac{1}{2} \int_0^1 w^2(x,t) dx$

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + e^{-t} \sin(\pi x) & 0 < x < 2, t > 0 \\ u(x,0) = \sin(\pi x) \\ u(0,t) = 0 & u(2,t) = 0 \end{cases} \quad \text{25) פתרו את הבעיה הבאה:}$$

26) פתרו את הבעיה הבאה:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + 3 \sin(2x) + \frac{\pi - x}{\pi} & 0 < x < \pi, t > 0 \\ u(x,0) = \frac{x}{\pi} + \sin(x) \\ u(0,t) = t & u(\pi,t) = 1 \end{cases}$$

רמז: הגדירו  $u(x,t) = v(x,t) + t \frac{\pi - x}{\pi} + 1 \cdot \frac{x}{\pi}$

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + 1 + \sin(2\pi x) & 0 < x < 1, t > 0 \\ u(x,0) = \sin(\pi x) \\ u(0,t) = u(1,t) = t \end{cases} \quad \text{27) פתרו את הבעיה הבאה:}$$

רמז: כדאי להגדיר פונקציית עזר  $v(x,t) = u(x,t) - t$

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + \cos(x) & -\infty < x < \infty, t > 0 \\ u(x,0) = \cos(x) + \begin{cases} 1 & -1 < x < 1 \\ 0 & \text{else} \end{cases} \\ u_t(x,0) = 0 \end{cases} \quad \text{28) נתונה הבעיה הבאה:}$$

חשבו  $\int_{-2}^2 |u(x,3)|^2 dx$

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & x^2 + y^2 < 1 \\ u(x, y)|_{x^2+y^2=1} = x^2 + xy + y^2 \end{cases} \quad \text{(29) נתונה הבעיה הבאה:}$$

$$\text{האם ייתכן כי } \iint_{x^2+y^2 < 1} u(x, y) dx dy = \frac{7\pi}{4} ?$$

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} & 0 < x < 3, t > 0 \\ u(0, t) = \frac{3}{\sqrt{1+t^2}} & u(3, t) = 3 \\ u(x, 0) = 3 + 3x - x^2 \end{cases} \quad \text{(30) נתונה הבעיה הבאה:}$$

$$\text{הוכיחו כי } u\left(\frac{3}{2}, 1\right) < 2e$$

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} & 0 < x < \pi, t > 0 \\ u(0, t) = \arctan(t) & u(\pi, t) = 0 \\ u(x, 0) = x(x - \pi) \end{cases} \quad \text{(31) נתונה הבעיה הבאה:}$$

$$\text{הוכיחו כי } u\left(\frac{\pi}{2}, 1\right) > -\frac{\pi^2}{4}$$

(32) נתונה הבעיה הבאה

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} & 0 < x < \infty, t > 0 \\ u(x, 0) = f(x) = \begin{cases} 1 - x^2 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & x > 1 \end{cases} & u_t(x, 0) = g(x) = 0 \\ u_x(0, t) = 0 \end{cases}$$

$$\text{חשבו } \int_0^2 \left| u(x, 1) - \frac{1}{2} \right|^2 dx$$

$$\begin{cases} \Delta u = r & 0 \leq r < 1 \\ u(1, \theta) = \sin^{2019}(\theta) \end{cases} \quad \text{(33) נתונה הבעיה הבאה:}$$

$$\text{חשבו } u(0, 0)$$