# מבוא להסתברות

## פרק 14 - תלות ואי תלות בין מאורעות

### תוכן העניינים

1. אי תלות בין מאורעות ( מורחב) ..... 1

# תלות ואי תלות בין מאורעות:

## רקע:

אם מתקיים ש: $P(B|A)=P(B)$, נגיד שמאורע $B$ בלתי תלוי ב- $A$.

הדבר גורר גם ההפך: $P(A|B)=P(A)$, כלומר, גם $A$ אינו תלוי ב- $B$.

כשהמאורעות בלתי תלויים מתקיים ש: $P(A\cap B)=P(A)\cdot P(B)$.

הוכחה לכך: $P(A/B)=P(A)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}\Rightarrow P(A\cap B)=P(A)\cdot P(B)$.

נשתמש בנוסחאות של מאורעות בלתי תלויים רק אם נאמר במפורש שהמאורעות בלתי תלויים בתרגיל או שמההקשר אפשר להבין ללא צל של ספק שהמאורעות בלתי תלויים.

למשל,

חוקר מבצע שני ניסויים בלתי תלויים הסיכוי להצליח בניסוי הראשון הנו 0.7 והסיכוי להצליח בניסוי השני הוא 0.4.

א. מה הסיכוי להצליח בשני הניסויים יחדו?

כיוון שהמאורעות הללו בלתי תלויים:

$$P(A\cap B)=P(A)\cdot P(B)=0.7\cdot 0.4=0.28$$

ב. מה הסיכוי להיכשל בשני הניסויים?

באופן דומה:

$$P(\bar{A}\cap\bar{B})=P(\bar{A})\cdot P(\bar{B})=(1-0.7)(1-0.4)=0.18$$

**הרחבה: אי תלות בין *n* מאורעות:**

$n$ מאורעות $A_1,\ldots,A_n$ הם בלתי תלויים אם ורק אם: $P\left(\bigcap_{i=1}^{n}A_i\right)=\prod_{i=1}^{n}P(A_i)$.


© כל הזכויות שמורות לברק קנדל

## שאלות:

**1)** נתון: $P(A\cup B)=0.6$ , $P(B)=0.5$ , $P(A)=0.2$.
האם המאורעות הללו בלתי תלויים?

**2)** תלמיד ניגש לשני מבחנים שהצלחתם לא תלויה זו בזו.
הסיכוי שלו להצליח במבחן הראשון הוא 0.7 והשני 0.4.
א. מה הסיכוי להצליח בשני המבחנים יחדו?
ב. מה הסיכוי שניכשל בשני המבחנים?

**3)** במדינה מסוימת יש 8% אבטלה, נבחרו באקראי שני אנשים מהמדינה.
א. מה ההסתברות ששניהם מובטלים?
ב. מה ההסתברות שלפחות אחד מהם מובטל?

**4)** מוצר צריך לעבור בהצלחה ארבע בדיקות בלתי תלויות לפני שיווקו, אחרת הוא נפסל ולא יוצא לשוק. הסיכוי לעבור בהצלחה כל אחת מהבדיקות הוא 0.8. בכל מקרה מבוצעות כל 4 הבדיקות.
א. מה הסיכוי שהמוצר יפסל?
ב. מה ההסתברות שהמוצר יעבור בהצלחה לפחות בדיקה אחת?

**5)** במדינה מסוימת יש 8% אבטלה, נבחרו באקראי חמישה אנשים מהמדינה.
א. מה ההסתברות שכולם מובטלים במדגם?
ב. מה ההסתברות שלפחות אחד מהם מובטל?

**6)** עבור שני מאורעות $A$ ו- $B$ המוגדרים על אותו מרחב מדגם נתון ש:
$P(A\cup B)=0.9$ , $P(A\cap \overline{B})=0.3$ , $P(A|B)=0.6$.
האם $A$ ו- $B$ מאורעות בלתי תלויים?

**7)** הוכיח שאם: $P(A/B)=P(B/A)$, אז: $P(A)=P(B)$.


© כל הזכויות שמורות לברק קנדל

**8)** קבעו אילו מהטענות הבאות נכונות. נמק!

א. אם: $P(A\cup B)=P(A)\cdot P(B)$, אזי המאורעות בלתי תלויים.

ב. מאורע $A$ כלול במאורע $B$: $0<P(B)<1$, $P(A)>0$, לכן: $P(A/B)<P(A)$.

ג. $A$ ו- $B$ מאורעות זרים שסיכוייהם חיובים לכן הם מאורעות תלויים.

ד. $A$ ו- $B$ מאורעות תלויים שסיכוייהם חיובים לכן $A$ ו- $B$ מאורעות זרים.

ה. $\overline{P}\left(\overline{A}\cap\overline{B}\right)=1-P(A)-P(B)$ לכן $A$ ו- $B$ מאורעות זרים.

**9)** זוג מעוניין להביא ילד לעולם, בבדיקה גנטית שהם עשו לאב התגלה שהאב אינו נשא של מחלה Q. מערכים את הסיכוי של האם להיות נשאית למחלץ Q להיות 0.2. אם האם נשאית היא תלד בכל פעם ילד חולה בסיכוי 0.5 באופן בלתי תלוי בין הלידות. האם ילדה שני ילדים. האם המאורעות "הילד הראשון בריא" ו-"הילד השני בריא" הם מאורעות בלתי תלויים?

**10)** מטילים פעמיים מטבע עם הסתברות $p$ לעץ בכל הטלה, $0<p<1$.


$A$ – יצא עץ בהטלה ראשונה.

$B$ – יצאו תוצאות שונות.

עבור איזה ערכים של $p$ המאורעות $A$ ו- $B$ בלתי תלויים?

**11)** הוכח אם $A$ ו-$B$ בלתי תלויים, אזי $\overline{A}$ , $\overline{B}$ בלתי תלויים.

**12)** נתונה מערכת חשמלית שבשרטוט, כל מתג יכול להיות פתוח או סגור בהסתברויות שונות, אך באופן בלתי תלוי זה בזה.




להלן ההסתברות של כל מתג להיות סגור:

$P(A_1)=0.7$ , $P(A_2)=0.8$ , $P(B)=0.9$.

א. מה ההסתברות שיעבור זרם במערכת החשמלית?

ב. אם לא עובר זרם במערכת , מה הסיכוי שמתג $B$ סגור?

**13)** מטילים שתי קוביות הוגנות. נגדיר שלושה מאורעות:

$A$ – תוצאה של קובייה ראשונה זוגית.

$B$ – תוצאה של קובייה שניה אי זוגית.

$C$ – סכום התוצאות של שתי הקוביות זוגי.

האם המאורעות בלתי-תלויים?


© כל הזכויות שמורות לברק קנדל

**14)** ענה על הסעיפים הבאים:

א. המאורעות $A$ ו-$B$ הם מאורעות זרים של ניסוי כלשהו.
חוזרים על אותו ניסוי שוב באופן בלתי תלוי זה בזה.
הוכיחו שהסיכוי שמאורע $A$ יתרחש בניסוי לפני שמאורע $B$ יתרחש בניסוי הוא: $\frac{P(A)}{P(A)+P(B)}$.

ב. מטילים קובייה הוגנת פעם אחרי פעם, מה הסיכוי שתתקבל תוצאה זוגית עוד לפני שתתקבל התוצאה 3?

ג. מטילים קובייה הוגנת פעם אחרי פעם, מה הסיכוי שתתקבל תוצאה זוגית עוד לפני שתקבל תוצאה גדולה מ-4?

## תשובות סופיות:

**1)** כן.

**2)** א. 0.28. ב. 0.18.

**3)** א. 0.0064. ב. 0.1536.

**4)** א. 0.5904. ב. 0.9984.

**5)** א. $0.08^5$. ב. 0.3409.

**6)** לא, הם תלויים.

**7)** שאלת הוכחה.

**8)** א. לא נכון. ב. לא נכון. ג. נכון. ד. לא נכון. ה. נכון.

**9)** תלויים.

**10)** 0.5.

**11)** שאלת הוכחה.

**12)** א. 0.846. ב. 0.3506.

**13)** תלויים.

**14)** א. שאלת הוכחה. ב. $\frac{3}{4}$. ג. $\frac{1}{2}$.


© כל הזכויות שמורות לברק קנדל