

# פיזיקה 1 לתעשייה וניהול 10012011

פרק 42 - גלים

תוכן העניינים

1. גלים והתאבכות גלים.....1

## גלים והתאבכות גלים:

### שאלות:

#### (1) תרגול גל 1

פולס נע ימינה בחבל.



מתוארת צורתו בשני זמנים שונים:  $t = 0$ ,  $t = 2\text{sec}$ .

א. מה משרעת הפולס?

ב. מה מהירות התקדמותו?


ג. מה כיוון תנועת החלקיק בחבל שנמצא בנקודה A ברגע  $t = 0$ ?

ד. מה כיוון תנועת החלקיק בחבל שנמצא בנקודה B ברגע זה?

#### (2) תרגול גל 2

מציירים בחבל שתי הפרעות כמתואר בתרשים:  $v = 10 \frac{\text{cm}}{\text{sec}}$ .

שרטט את החבל בזמנים הבאים:



א.  $t = 8\text{sec}$

ב.  $t = 16\text{sec}$

ג.  $t = 18\text{sec}$


ד.  $t = 22\text{sec}$

#### (3) תרגול גל 3

בחבל מייצרים שתי הפרעות שונות בשני קצותיו שמתקדמות אחת לקראת

השנייה, כמתואר בתרשים:  $v = 0.5 \frac{\text{cm}}{\text{sec}}$ .

שרטט את צורת החבל בזמנים הבאים:



א.  $t = 8\text{sec}$

ב.  $t = 12\text{sec}$

ג.  $t = 13\text{sec}$

ד.  $t = 16\text{sec}$

#### (4) תרגול גל 4


פולס משולש נע בחבל ומגיע לקצהו. שרטט את החבל + הפולס במקרים הבאים:

א. קצה החבל קשור לקיר.


ב. קצה החבל מולבש על טבעת חופשיה למנוע על פני ציר שעובר דרכה.

ג. קצה החבל קשור לחבל כבד יותר.

ד. קצה החבל קשור לחבל קל יותר.

**(5) תרגול גל עומד**

חוט AB, שאורכו 1m, קשור בקצהו B למחולל תנודות, ובקצהו A למוט קבוע (ראה תרשים).  
כאשר תלמיד מפעיל את מחולל התנודות, נוצר בחוט AB גל, שמוחזר מהקצה A.  
התלמיד מגדיל ברציפות את תדירות מחולל התנודות ורושם את התדירויות בכל פעם שנוצר בחוט AB גל עומד. תוצאות הניסוי רשומות בטבלה שלפניך:

| $\frac{1}{\lambda} (\text{m}^{-1})$ | $\lambda (\text{m})$ | צורת הגל העומד                                                                    | f - תדירות התנודות (Hz) |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                     |                      |  | 24                      |
|                                     |                      |                                                                                   | 45                      |
|                                     |                      |                                                                                   | 67                      |
|                                     |                      |                                                                                   | 88                      |

התייחס לנקודה B כנקודת צומת.

א. העתק את הטבלה למחברתך, ורשום בעמודה את אורך הגל  $\lambda$ , לכל אחד מארבעת הגלים העומדים שנוצרו בחוט?

ב. רשום בעמודה המתאימה בטבלה את הערך  $\frac{1}{\lambda}$  לכל אחד מארבעת הגלים,

וסרטט גרף של התדירות f כפונקציה של  $\frac{1}{\lambda}$ .

ג. מצא בעזרת הגרף את מהירות התפשטותו של גל בחוט AB.

ד. התלמיד ממשיך להגדיל את תדירות מחולל התנודות.

מהי התדירות הראשונה (הגבוהה מ-88Hz) שייוצר בה גל עומד בחוט AB? נמק.

**(6) תרגול גל מחזורי 1**

מופיעים לפניכם גרפי העתק זמן והעתק מקום של חבל מסוים.



א. מהי משרעת הגל?

ב. מהו אורך הגל המתקדם בחבל?

ג. מה זמן המחזור של הגל?



ד. מה מהירות הגל?

ה. לאיזה נקודה/נקודות בחבל יכול להתאים גרף ההעתק זמן (השמאלי)?



**7) תרגול גל מחזורי 2**

לפניכם גרף העתק-מקום והעתק-זמן של הגוף מהשאלה הקודמת.  
 מכפילים את תדירות מחולל הגלים (מקור).  
 שרטטו את גרף העתק-זמן והעתק-מקום החדשים.


**8) תרגול גל מחזורי 3**

- לפניך שני תצלומים (נראים זהים). הימני : גל מתקדם, השמאלי : גל עומד בקהל.
- קבע את אורך הגל של כל אחד מהגלים בחבל.
  - שרטט את החבל  $\frac{1}{4}$  זמן מחזור לאחר תצלום זה.
  - שרטט את החבל  $\frac{1}{2}$  זמן מחזור לאחר תצלום זה.
  - בחר בכל תצלום נקודה מימין ומשמאל למשרעת, וצייר את כיוון תנועתה מיד לאחר צילום זה.


**9) תרגיל 1**

מהירות גל במיתר מתוח 25 מטר בשנייה. קושרים את היתר בין שני כנים שהמרחק ביניהן 3 מטר.  
 מניעים את המיתר בעזרת מתנד.  
 באיזו תדירות יש לנדנד אותו כך שיווצר בו גל עומד עם 12 נקודות צומת (כולל הקצוות)?

- 45.8 הרץ.
- 70 הרץ.
- 8.3 הרץ.
- 75 הרץ.
- 80.7 הרץ.

**(10) תרגיל 2**

מיתר בעל אורך 90 ס"מ קשור בשני קצותיו. כשמנדנדים אותו בתדירות 150 הרץ, נוצר בו גל עומד עם 8 נקודות צומת (כולל הקצוות). מהירות גל במיתר הנ"ל:

א.  $15.3 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$

ב.  $38.6 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$

ג.  $17 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$

ד.  $34.3 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$

**(11) תרגיל 3**

מנדנדים מיתר מתוח הקשור בשני קצותיו בתדירות 100 הרץ. אורך המיתר 3 מטר. במיתר נוצר גל עומד עם 5 נקודות צומת (כולל הקצוות). מהי מהירות הגל במיתר?

א.  $150 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$

ב.  $100 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$

ג.  $330 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$

ד.  $20 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$

ה.  $340 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$

**(12) תרגיל 4**

מיתר של גיטרה משמיע עם הפריטה עליו צליל בתדירות של 300 הרץ. אם רוצים להפיק מהמיתר צליל בעל תדירות של 900 הרץ:

א. אין כל דרך להפיק את התדירות הנ"ל מהמיתר.

ב. יש להקטין את המתיחות במיתר פי 3.

ג. יש לקצר את המיתר פי 3.

ד. יש להאריך את המיתר פי 3.


ה. יש להגדיל את המתיחות פי 2.

**(13) תרגיל החזרה גלים דו ממדיים**

נתון אמבט גלים הבא בו מתקדם גל ישר  $A_0B_0$ . באמבט קיים גם מחסום.

א. הוסף לתרשים חץ המתאר את כיוון התקדמות הגל  $A_0B_0$ .

ב. הוסף לתרשים את חזית הגל לאחר שהחזרה מהמחסום.



ג. הוסף לתרשים חיצים המתארים את זוויות פגיעת והחזרת הגל כפי שהן מוחזרות לאור.

ד. הוסף לתרשים חיצים המתארים את זוויות פגיעת והחזרת הגל כפי שהן מוחזרות לגלי מים.

ה. הוסיפו לתרשים את חזית הגל, ברגע שבו אמצע חזית הגל נוגעת במחסום.

**(14) תרגול מעבר תווך גלי מים**

נתון אמבט גלים בו נע גל לפי התרשים הבא.

במרכז האמבט מוקם מחסום כך שגובה המים

בחלק הימני נמוך יותר.

מקור גלים בקצה השמאלי של האמבט מייצר גל

ישר מחזורי בתדירות 4 הרץ.

מהירות הגל במים בחלק העמוק היא 20 ס"מ לשנייה.

הגל מתקדם ועובר לתווך הימני כמתואר בתרשים.


א. מה מהירות גל המים בתווך הרדוד יותר?

ב. מהו אורך הגל  $\lambda_1$  בחלק העמוק?

ג. מהו אורך הגל  $\lambda_2$  בחלק הרדוד?

ד. הוסיפו לתרשים (איכותית) עוד 2 אורכי גלים לאחר


מעבר גל המים לתווך הרדוד.

**(15) תרגול אנרגיה ומשרעת של גל**

גל מעגלי מתפשט באמבט גלים. משרעתו, כשהיה מעגל ברדיוס 3cm, הייתה 1cm.

א. פי כמה תהיה קטנה האנרגיה שלו כשיתפשט לרדיוס של 15cm?

ב. מה תהיה משרעתו במצב זה?

**(16) התאבכות גלי מים – תרגיל 1**

נתון תרשים של אמבט גלים ובו 2 מקורות בעלי אורך

גל זהה ושווי מופע.

קווים רציפים מייצגים שיא בגל וקווים מקווקוים – שפל.

זהו את קווי המקסימום והמינימום בתרשים.

**17) התאבכות גלי מים – תרגיל 2**

נתון אמבט גלים בו 2 מקורות שהמרחק ביניהם 7 ס"מ.

המקורות מכים במים במופע זהה בתדירות 20 הרץ.

מהירות התקדמות הגלים באמבט היא 25 ס"מ לשנייה.

א. מה אורך הגל של הגלים שיוצרים המקורות?

ב. קבע, לגבי כל אחת מהנקודות הבאות: A, B, C, D בתרשים,

האם היא על קו מקסימום, על קו מינימום או נקי ביניים:

i. A - מרחקה מהמקור הראשון - 4 ס"מ ומהמקור השני - 2.8 ס"מ.

ii. B - מרחקה מהמקור הראשון - 5 ס"מ ומהמקור השני - 3.2 ס"מ.

iii. C - מרחקה מהמקור הראשון - 7 ס"מ ומהמקור השני - 3.4 ס"מ.

iv. D - מרחקה מהמקור הראשון - 8 ס"מ ומהמקור השני - 6.5 ס"מ.

ג. כמה קווי מקסימום וכמה קווי מינימום יופיעו באמבט?

**18) שאלה 1 בהתאבכות גלי מים**

שני מקורות גל זהים A ו-B נמצאים בנקודות  $(0,0)$  ו- $(6,0)$ . המקורות משדרים

באורך גל של 1cm לכל הכיוונים. על ציר y מתקבלת התאבכות בונה בנקודות

הבאות (המספרים בס"מ):

א.  $(0,1.1)$   $(0,2.5)$   $(0,4.5)$   $(0,8)$   $(0,17.5)$ .

ב.  $(0,1)$   $(0,2)$   $(0,4)$   $(0,8)$   $(0,16)$   $(0,32)$ .

ג.  $(0,6)$   $(0,12)$   $(0,18)$   $(0,24)$   $(0,30)$ .

ד.  $(4,4.5)$   $(4,8)$   $(4,17.5)$   $(3,2)$ .

ה.  $(0,4.2)$   $(0,8.7)$   $(0,16.5)$   $(0,0)$ .

ו.  $(0,4.5)$   $(0,8)$   $(0,17.5)$ .

**19) שאלה 2 בהתאבכות גלי מים**

שני מקורות גל זהים ושווי מופע ממוקמים בנקודות  $(0,0)$  ו- $(5,0)$

(הערכים בס"מ). אורך הגל של כל אחד מהם 2 ס"מ.

היכן על ציר y תתקבל התאבכות בונה מסדר ראשון? (הערכים בס"מ).

א.  $(5,2.5)$ .

ב.  $(0,5.25)$ .

ג.  $(0,6)$ .

ד.  $(0,2.5)$ .

ה.  $(0,-5.25)$ .

**20) שאלה 3 בהתאבכות גלי מים**

שני מקורות גל זהים A ו-B נמצאים בנקודות (0,5) ו-(0,-5). בנקודה (10,10) מתקבלת התאבכות בונה מסדר ראשון (כל המספרים נתונים בס"מ) אורך הגל הוא בקירוב:

- א. 8.5 ס"מ.
- ב. 5 ס"מ.
- ג. 7.3 ס"מ.
- ד. 15 ס"מ.
- ה. 6.8 ס"מ.

**21) שאלה 4 בהתאבכות גלי מים**

באמבט גלים ממקמים שני מתנדים בשתי נקודות (4,2) ו-(7,6). המתנדים רוטטים בתדירות זהה ובאותו מופע. בנקודה (10,10) מתקבלת התאבכות בונה מסדר שלישי. מהו אורך הגל? (הגדלים המספריים במטרים).

- א. 1.67m
- ב. 0.62m
- ג. 2.79m
- ד. 6.83m
- ה. 1.23m

**22) שאלה 1 – גלי קול**

אם נניח, כי עוצמת סף השמע היא:  $10^{-16} \frac{W}{cm^2}$

מהי העוצמה ביחידות הנ"ל בסף הכאב 140dB (כלומר, כמה  $\frac{W}{cm^2}$  יש ב-140dB)?

- א.  $14 \cdot 10^{-16} \frac{W}{cm^2}$
- ב.  $10^{-14} \frac{W}{cm^2}$
- ג.  $140 \frac{W}{cm^2}$
- ד.  $10^4 \frac{W}{cm^2}$
- ה.  $10^{-2} \frac{W}{cm^2}$



**(23) שאלה 2 – גלי קול**

פי כמה גדולה עוצמת קול של 100 דציבל מעוצמת קול של 10 דציבל?

- א. פי 10.
- ב. פי 100.
- ג. פי 1,000.
- ד. פי 10,000.
- ה. פי 1,000,000.
- ו. פי 1,000,000,000.
- ז. פי 10,000,000,000.

**(24) שאלה 3 – גלי קול**

אם עוצמת הקול המינימאלית שבני אדם מסוגלים לשמוע (סף השמע)

היא:  $10^{-16} \frac{W}{cm^2}$ , מהי עוצמת הקול באותן יחידות ב-130 דציבל (סף הכאב),

וכמה אנרגיה פוגעת בעור התוף החשוף לעוצמה הזו (130dB) במשך שעה? נתון ששטחו של עור התוף כ-0.7 סמ"ר.

- א. העוצמה:  $10^{-13} \frac{W}{cm^2}$ , וסה"כ אנרגיה בשעה: 5.3J.
- ב. העוצמה:  $10^{-3} \frac{W}{cm^2}$ , וסה"כ אנרגיה בשעה: 5.3J.
- ג. העוצמה:  $130 \frac{W}{cm^2}$ , וסה"כ אנרגיה בשעה: 75J.
- ד. העוצמה:  $1.3 \cdot 10^{-3} \frac{W}{cm^2}$ , וסה"כ אנרגיה בשעה: 2.52J.
- ה. העוצמה:  $0.001 \frac{W}{cm^2}$ , וסה"כ אנרגיה בשעה: 2.52J.

**(25) שאלה 4 – גלי קול**

אם נניח כי עוצמת סף השמע היא:  $10^{-16} \frac{W}{cm^2}$  (ווט לסמ"ר),

מהי העוצמה I ביחידות הנ"ל ב-120dB, וכמה אנרגיה E פוגעת בעור התוף של אוזנו של אדם, החשוף לעוצמת קול זו במשך 4 שעות? הניחו ששטחו של עור התוף 0.7 סמ"ר.

- א.  $I = 12 \cdot 10^{-16} \frac{W}{cm^2}$  ו-  $E = 5.8 \text{Joule}$ .
- ב.  $I = 13 \cdot 10^{-14} \frac{W}{cm^2}$  ו-  $E = 5.8 \text{Joule}$ .

ג.  $E = 1.01 \text{ Joule}$  ו-  $I = 10^{-4} \frac{\text{W}}{\text{cm}^2}$

ד.  $E = 10.1 \text{ Joule}$  ו-  $I = 10^{-4} \frac{\text{W}}{\text{cm}^2}$

ה.  $E = 1.2 \cdot 10^6 \text{ Joule}$  ו-  $I = 120 \frac{\text{W}}{\text{cm}^2}$

### 26) שאלה 5 – גלי קול

כאשר אדם נחשף לקול בעוצמה של 20 דציבל בפרק זמן של שעה, כמות האנרגיה הכוללת המגיעה לעור התוף של אוזנו היא:  $2.5 \cdot 10^{-11} \text{ Joule}$ .  
 מהי כמות האנרגיה הכוללת המגיעה לעור התוף כאשר האוזן נחשפת לקול בעוצמה של 120 דציבל למשך זמן של 20 דקות?

א.  $0.08 \text{ Joule}$

ב.  $0.75 \text{ Joule}$

ג.  $25 \text{ Joule}$

ד.  $2.5 \cdot 10^{-5} \text{ Joule}$

ה.  $5 \cdot 10^{-11} \text{ Joule}$

### 27) שאלה 6 – גלי קול

כאשר אדם נחשף לקול בעוצמה של 20 דציבל בפרק זמן של שעה, כמות האנרגיה הכוללת המגיעה לעור התוף של אוזנו היא:  $2.5 \cdot 10^{-11} \text{ Joule}$ .  
 מהי כמות האנרגיה הכוללת המגיעה לעור התוף כאשר האוזן נחשפת לקול בעוצמה של 120 דציבל למשך זמן של 30 דקות?

א.  $0.125 \text{ Joule}$

ב.  $1.130 \text{ Joule}$




ג.  $37.52 \text{ Joule}$

ד.  $3.8 \cdot 10^{-5} \text{ Joule}$

ה.  $7.5 \cdot 10^{-11} \text{ Joule}$

### תשובות סופיות:


(1) א.  $A = 0.3 \text{ m}$  ב.  $V = 0.2 \frac{\text{m}}{\text{sec}}$  ג. למעלה. ד. למטה.



(5) א.

| $\frac{1}{\lambda} (\text{m}^{-1})$ | $\lambda (\text{m})$ | צורת הגל העומד | f - תדירות התנודות (Hz) |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| 0.5                                 | 2                    |                | 24                      |
| 1                                   | 1                    |                | 45                      |
| 1.5                                 | 2/3                  |                | 67                      |
| 2                                   | 1/2                  |                | 88                      |





א.  $f = 111 \text{ Hz}$     ב.  $f = v \frac{1}{\lambda}$



א.  $A = 0.15 \text{ m}$     ב.  $\lambda = 1 \text{ m}$     ג.  $t = 4$     ד.  $v = 25 \frac{\text{cm}}{\text{sec}}$

ה.  $(0.5, 0)$ ,  $(1.5, 0)$ ,  $(2.5, 0)$ 

(7) הגל הירוק בשרטוט:


(8) א. מתקדם:  $\lambda_1 = 80 \text{ cm}$ , עומד:  $\lambda_2 = 80 \text{ cm}$ .

(9) א.

(10) ב.


(11) א.

(12) ג.




(13)

(14) א.  $v_2 = 13.7 \frac{\text{cm}}{\text{sec}}$  ב.  $\lambda_1 = 5\text{cm}$  ג.  $\lambda_2 = 3.42\text{cm}$



(15) א. 5 ב.  $0.45\text{cm}$



(16)

**(17) א. 1.2 ס"מ.**

**ב.i. A - נק' מקסימום מסדר ראשון.**

**ii. B - נק' צומת מסדר שני.**

**iii. C - נק' מקסימום מסדר שלישי, נק' על קו מקסימום.**

**iv. D - נק' ביניים.**

**ג. 11 קווי מקסימום, 12 קווי מינימום.**

**(18) א' מלאה ו-ו' חלקית.**

**(19) ב' ו-ה.**

**(20) ה.**

**(21) א'.**

**(22) ה.**

**(23) ו'.**

**(24) ה.**

**(25) ג'.**

**(26) א'.**

**(27) א'.**