

מכינה כללית במתמטיקה

פרק 23 - חשבון דיפרנציאלי - הפונקציה הממשית

תוכן העניינים

1. מושג הפונקציה (ללא ספר)
2. הפונקציה הלינארית (ללא ספר)
3. הפונקציה הריבועית (ללא ספר)
4. הפונקציה המעריכית והלוגריתמית (ללא ספר)
5. הזזות ושיקופים של פונקציות (ללא ספר)
6. פתרון תרגילי הפרק 1
7. תרגול נוסף בתחום הגדרה (ללא ספר)
8. קבוצות ופונקציות - מבט לעומק (ללא ספר)

הפונקציה הממשית

שאלות:

(1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציות הבאות:

$$y = x^3 - x^2 - 4x + 1 \quad \text{א.} \quad y = \frac{1}{x^2 - 4} \quad \text{ב.}$$

$$y = \frac{4x+1}{x^2+1} \quad \text{ג.} \quad y = \frac{1}{x^3 - x} \quad \text{ד.}$$

$$y = \frac{x^2}{x^2 - x - 2} \quad \text{ה.} \quad y = \sqrt{x-4} \quad \text{ו.}$$

$$y = \sqrt{x^2 + x - 2} \quad \text{ז.} \quad y = \sqrt[3]{x^2 + x - 1} \quad \text{ח.}$$

$$y = \frac{1}{\sqrt{1-|x|}} \quad \text{ט.} \quad y = \ln(x^2 + x - 2) \quad \text{י.}$$

$$y = \log x + \frac{1}{\log x} \quad \text{יא.} \quad y = e^{x^2+x+1} \quad \text{יב.}$$

$$y = \log_x(x+4) \quad \text{יג.} \quad y = \tan(10x) \quad \text{יד.}$$

$$y = \cot(4x) \quad \text{טו.} \quad y = \arctan(x+4) \quad \text{טז.}$$

$$y = \arcsin(x-4) \quad \text{יז.} \quad y = \arccos(x+1) \quad \text{יח.}$$

(2) נתונות הפונקציות הבאות: $f(x) = x-4$, $g(x) = x^2$, $h(x) = \frac{4}{x}$.

חשב את הפונקציות המרוכבות הבאות:

$$f(g(1)) \quad \text{א.} \quad h(g(f(5))) \quad \text{ב.} \quad f(g(x)) \quad \text{ג.}$$

$$h(f(x)) \quad \text{ד.} \quad h(f(x)) \quad \text{ה.} \quad h(h(x)) \quad \text{ו.}$$

(3) נתון: $f(x) = \frac{x-2}{x-1}$. חשב $f(f(x))$ עבור $x=3$.

(4) נתון: $g(x) = \frac{5-x}{x-7}$ $f(x) = \frac{x-3}{x+2}$. חשב $f(g(x)) + g(f(x))$ עבור $x=8$.

(5) נתון: $f(x) = x^2 - 7x$ $g(x) = \ln x$. חשב $f(g(x))$ עבור $x=e^2$.

(6) נתון: $g(x) = \ln x$ $f(x) = e^{2x}$. חשב $f(g(x))$ עבור $x=2$.

(7) נתון: $g(x) = \begin{cases} x+3 & x > 4 \\ 3x & x \leq 4 \end{cases}$ $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & x > 0 \\ x^2 & x \leq 0 \end{cases}$. חשב $f(g(x))$, $g(f(x))$.

(8) בתרגילים הבאים הוכח שהפונקציה הנתונה היא חח"ע בתחום הגדרתה ומצא את הפונקציה ההפוכה לה. בנוסף, מצא את התמונה של הפונקציה.

א. $f(x) = \frac{x-1}{3}$ ב. $f(x) = \frac{x+1}{x}$

ג. $f(x) = \frac{3x-2}{x-2}$ ד. $f(x) = x^2 - 4, x \geq 0$

(9) בתרגילים הבאים, בדוק האם הפונקציה היא חח"ע. בנוסף, מצא את התמונה של הפונקציה:

א. $f(x) = x + \frac{1}{x}$ ב. $f(x) = x^2 - x$ ג. $f(x) = \sqrt{1-x^2}$

(10) בתרגילים הבאים, בדוק האם הפונקציה היא חח"ע, אם כן, מצא את הפונקציה ההפוכה ואת התמונה של הפונקציה.

א. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$ ב. $y = \frac{x^2+3}{2x-1}$ ג. $f(x) = \left(\frac{2x-1}{2x+1}\right)^3$

(11) נתונה $f(x) = \frac{x+2}{\sqrt{x-1}}$. האם הפונקציה היא חח"ע?

מצא את התמונה של הפונקציה.

(12) מצא איזה מבין הפונקציות הבאות הן אי זוגיות ואיזה זוגיות :

- | | | |
|----------------------|------------------------------|--------------|
| א. $y = 4x^3$ | ב. $y = x^4 + x^{10}$ | ג. $y = 1$ |
| ד. $y = \frac{1}{x}$ | ה. $y = x^2 + \sin^2 x$ | ו. $y = 2^x$ |
| ז. $y = \ln x + x^2$ | ח. $y = \sin x \cdot \cos x$ | |

(13) מצא את המחזור של כל אחת מן הפונקציות הבאות :

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| א. $y = 2 \sin x$ | ב. $y = 5 + 3 \sin(4x + 1)$ |
| ג. $y = \tan \frac{x}{3}$ | ד. $y = \sin^2 x$ |

(14) רשום כל אחת מהפונקציות הבאות כפונקציה מפוצלת¹ ושרטט את גרף הפונקציה :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| א. $y = x - 2 $ | ב. $y = 3 x + 1 $ |
| ג. $y = x^2 + 2 x - 1 $ | ד. $y = \frac{ x }{x}$ |

תשובות סופיות:

- (1) א. כל x** **ב. $x \neq \pm 2$** **ג. כל x** **ד. $x \neq 0, 1, -1$**
- ה. $x \neq 2, -1$** **ו. $x \geq 4$** **ז. $x \leq -2, x \geq 1$** **ח. כל x**
- ט. $-1 < x < 1$** **י. $x < -2, x > 1$** **יא. $x > 0, x \neq 1$** **יב. כל x**
- יג. $x > 0, x \neq 1$** **יד. $x \neq \frac{\pi}{20} + \frac{\pi k}{10}$** **טו. $x \neq \frac{\pi k}{4}$** **טז. כל x**
- יז. $3 < x < 5$** **יח. $-2 < x < 0$**

¹ נקראת גם: פונקציה "מפוצלת", "מוטלאת", פונקציית "תפר" או פונקציה "לפי מקרים".

$$x.1 \quad x-8 .7 \quad \frac{4}{x-4} .7 \quad x^2-4 .1 \quad 4 .1 \quad -3 .N \quad (2)$$

$$4 \quad (6 \quad -10 \quad (5 \quad \frac{69}{13} \quad (4 \quad 3 \quad (3$$

$$f(g(x)) = \begin{cases} \frac{1}{x+3} & x > 4 \\ \frac{1}{3x} & 0 < x \leq 4 \\ (3x)^2 & x \leq 0 \end{cases}, g(f(x)) = \begin{cases} x^2 + 3 & x < 2 \\ 3x^2 & -2 \leq x \leq 0 \\ \frac{1}{x} + 3 & 0 < x < \frac{1}{4} \\ 3\frac{1}{x} & x \geq \frac{1}{4} \end{cases} \quad (7)$$

$$y \neq 1, f^{-1}(x) = \frac{1}{x-1} \quad \text{ב.} \quad \text{א. } y \neq 1, f^{-1}(x) = 3x+1 \quad (8)$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x+4} \quad , y \geq -4 \quad .7$$

$$y - \frac{1}{2} = \pm \sqrt{x + \frac{1}{4}} \quad , \quad x + \frac{1}{4} \geq 0 \quad \text{ב. לא.} \quad \text{9. נ. לא.} \quad y \geq 2 \quad \text{או} \quad y \leq -2$$

$0 \leq y \leq 1$.ל. λ

ב. לא. $y \leq -1.3$ או $y \geq 2.3$ $f^{-1}(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$ $x > 0$, $y > 0$. כן. (10)

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{1 - \sqrt[3]{x}} - \frac{1}{2}, \quad y \neq 1.$$

$$y \geq \frac{6}{\sqrt{3}}. \quad (11)$$

(12) זוגית: 2,3,5,8. אי-זוגית: 1,4. כלליות: 6,7.

$$\pi \cdot 7 \qquad 3\pi \cdot \lambda \qquad \frac{\pi}{2} \cdot \mathfrak{b} \qquad 2\pi \cdot \aleph \quad (13)$$

$$y = \begin{cases} 3x+3 & x \geq -1 \\ -3x-3 & x < -1 \end{cases} \quad \text{و} \quad y = \begin{cases} x-2 & x \geq 2 \\ 2-x & x < 2 \end{cases} \quad \text{ن (14)}$$

$$y = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases} \quad y = \begin{cases} x^2 + 2x - 2 & x \geq 1 \\ x^2 - 2x + 2 & x < 1 \end{cases}$$