

סטטיסטיקה א

פרק 19 - תרגול טענות

תוכן העניינים

1. כללי

תרגול טענות:

שאלות:

להלן מספר טענות.

צינוו לגבי כל טענה נכון/נכון ונמקו (תשובה ללא נימוק לא תתקבל).

(1) בסדרה שבה כל התצפויות שוות זו לזו, השונות הינה 0.

(2) ציוו התקן של החציון תמיד יהיה 0.

(3) ציוו התקן של האחזון ה-70 בהתפלגות אסימטרית ימנית (חיובית) תמיד יהיה חיובי.

(4) אם נוסיף תצפויות לסדרה של תצפויות, הדבר בהכרח יגדיל את הממוצע של הסדרה.

(5) בסדרה החציון הינו 80. הוספו שתי תצפויות, אחת 79 ואחת 100, לכן החציון יגדל.

(6) אם נוסיף את הערך 4 לכל התצפויות או סטיית התקן לא תשתנה.

(7) אם נחלק את כל התצפויות בהתפלגות ב-2 אז השונות תקטן פי 2.

(8) אם נגדיל את ממוצע המשכורות של עובדים בחברה או גם השונות תגדל.

(9) מتوוך דירות המיר מחירי דירות מדולר לשקל.
נניח שדולר אחד הוא 3.5₪. אם מتوוך הדירות יחשב את מדד הקשר של פירסון בין מחיר הדירה בשקלים למחיר הדירה בדולרים הוא יקבל 1.

(10) לסדרה של נתונים התקבל: $S_x = S_y = 1$, $\bar{X} = \bar{Y} = 6$, לכן מדד הקשר של פירסון יהיה 1.

(11) בסדרה המונה 13 תצפויות, ידוע כי הממוצע הוא 40 והשונות היא 100.
מוסיפים שתי תצפויות חדשות, שהן 35 ו-45. כתוצאה לכך, הממוצע בסדרה החדשה (הכוללת 15 תצפויות) יקטן והשונות תקטן.

(12) לסדרה סטטיסטית בת 61 תצפויות הממוצע 120 והחציון 110.
לסדרה זו הוסיפו עוד שתי תצפויות: 100, 140.
בקבות כך, הממוצע והחציון של הסדרה בת 63 התצפויות אינם משתנים.

- 13)** לסדרה סטטיסטית בת 100 תצפיות הממוצע 75 וסטיית התקן 10. נוספו לסדרה זו עוד 2 תצפיות: 75, 75. כתואאה מכך, הממוצע החדש (של 103 התצפיות) לא השתנה, אך סטיית התקן קטנה.
- 14)** לסדרת נתונים המונה 10 תצפיות ממוצע 25 וסטיית התקן 2. נתון כי הסדרה סימטרית סביב הממוצע. בשלב מאוחר יותר נוספו שלוש תצפיות לסדרה: 23, 25, 27. לכן סטיית התקן של 13 התצפיות לא השתנה.
- 15)** בהתפלגות אסימטרית חיובית, הערך המתאים למা�ן ה-30, ציון התקן שלו בהכרח שלילי.
- 16)** סטיית התקן של סדרת נתונים תמיד תנגדל אם נוסיף גודל קבוע לכל נתונים הסדרה.

תשובות סופיות:

- 1) נכון. 2) לא נכון. 3) לא נכון. 4) לא נכון. 5) לא נכון.
- 6) נכון. 7) לא נכון. 8) לא נכון. 9) נכון. 10) לא נכון.
- 11) לא נכון. 12) נכון. 13) נכון. 14) לא נכון. 15) נכון.
- 16) לא נכון.