

# פיזיקה 2אא

פרק 13 - תרגילים נוספים לחוק לורנץ


תוכן העניינים

1. הכוח על מטען בודד ותנועה בשדה. .... 1
2. יישומים של הכוח המגנטי ..... (ללא ספר) 2
3. כוח על תיל נושא זרם ובין תילים. .... 3
4. תרגילים נוספים. .... 5

## הכוח על מטען בודד ותנועה בשדה:

### שאלות:

#### (1) דוגמה 1



מטען  $q = 2c$  נע במהירות  $v = 30 \frac{m}{sec}$  בכיוון 30 מעלות

ביחס לציר ה- $x$  החיובי.

במרחב ישנו שדה מגנטי אחיד  $\vec{B} = 4T \hat{y}$ .

מצא את גודל הכוח המגנטי שפועל על המטען.

#### (2) דוגמה 2


מטען  $q = 3c$  נע במהירות  $\vec{v} = 2 \frac{m}{sec} \hat{x} + 4 \frac{m}{sec} \hat{y}$

במרחב ישנו שדה מגנטי אחיד  $\vec{B} = 5T \hat{y}$ .

מצא את גודל הכוח המגנטי שפועל על המטען.


#### (3) דוגמה 3


מצא את כיוון הכוח המגנטי במקרים הבאים:



#### (4) דוגמה 4

מצא את כיוון הכוח המגנטי במקרים הבאים:



**5 דוגמה 5**

מטען  $q = 4c$  נע מ- $y = -\infty$  לאורך הכיוון החיובי של ציר ה- $y$ . בכל התחום  $y > 0$  קיים שדה מגנטי אחיד  $B = 5T$  לתוך הדף. מסת המטען היא  $m = 10gr$  ומהירותו

$$v_0 = 20 \frac{m}{sec}$$

א. שרטט את תנועת המטען.

ב. מצא את המיקום בו יצא המטען מהתחום בו נמצא השדה המגנטי.

**תשובות סופיות:**


$$F_B \approx 207.8N \quad (1)$$

$$F_B = 30N \quad (2)$$

$$\vec{F} \odot \quad \text{א.} \quad \vec{F} \odot \quad \text{ב.} \quad \vec{F} \odot \quad \text{ג.} \quad \vec{F} \uparrow \quad \text{ד.} \quad \vec{F} \swarrow \quad (3)$$

$$\vec{F} \odot \quad \text{א.} \quad \vec{F} \otimes \quad \text{ב.} \quad \vec{F} \odot \quad \text{ג.} \quad (4)$$


$$x = -2cm, y = 0 \quad \text{ב.} \quad \text{א.} \quad (5)$$



## כוח על תיל נושא זרם ובין תיילים:

### שאלות:

#### (1) דוגמה 7




תיל ישר נמצא במאונך לשדה מגנטי אחיד  $B = 10^{-2} \text{ T}$  לתוך הדף. צפיפות המסה של התיל ליחידת אורך

היא  $\lambda = 20 \frac{\text{gr}}{\text{cm}}$ .

מצא מה צריך להיות גודל וכיוון הזרם בתיל, כך שהתיל ירחף באוויר.

#### (2) דוגמה 8



מסגרת מלבנית בעל צלעות  $a, b$  נמצאת במישור של הדף ובתוך שדה מגנטי שכיוונו לתוך הדף.

גודלו של השדה המגנטי אינו אחיד.


המסגרת מונחת כך, שחלק מהמסגרת נמצא

בשדה  $B_1 = 4 \text{ T}$ , והחלק השני נמצא בשדה  $B_2 = 3 \text{ T}$ .

במסגרת זורם זרם  $I = 2 \text{ A}$  עם כיוון השעון.

מצא את הכוח השקול הפועל על המסגרת ( $a = 0.5 \text{ m}$ ).

#### (3) דוגמה 9



תיל ארוך מאוד מונח במקביל לציר ה- $y$  וב- $x = d$ . בתיל זורם זרם  $I_1 = 1 \text{ A}$  בכיוון.

תיל ארוך נוסף מונח גם כן במקביל לציר ה- $y$  וב- $x = d$ .

הזרם בתיל זה הוא  $I_2 = 2 \text{ A}$  בכיוון הפוך לציר ה- $y$ .

מהו הכוח ליחידת אורך על כל תיל, אם  $d = 20 \text{ cm}$ ?

#### (4) דוגמה 10


שלושה תיילים אינסופיים מונחים במקביל, כמתואר באיור.

המרחקים בין התיילים קבועים ושווים ל- $d$ .

הזרם בתיל האמצעי הוא  $2I_0$  החוצה מהדף,

והזרם בתיילים האחרים הוא  $I_0$  לתוך הדף.

מהו הכוח על כל תיל?



### תשובות סופיות:

$$(1) \text{ כיוון : ימינה , גודל : } I = 2 \cdot 10^3 \text{ A}$$

$$(2) \sum F = 1 \text{ N , ימינה.}$$


$$(3) F_1 = 10^{-6} \hat{x} , F_2 = -10^{-6} \hat{x}$$

$$(4) \sum F_1 = \frac{3\mu_0 I_0^2}{4\pi d} \hat{x} , \sum F_2 = 0 , \sum F_3 = -\frac{3\mu_0 I_0^2}{4\pi d} \hat{x}$$

## תרגילים נוספים:

### שאלות:

#### (1) תרגיל 1



פרוטון נכנס לאזור בו ישנו שדה מגנטי אחיד שעוצמתו  $10T$  בכיוון ציר ה- $x$ . מהירות הפרוטון היא  $10^6 \frac{m}{sec}$  וכיוונה בזווית  $30^\circ$  מעלות ביחס לשדה.

א. מהו גודל וכיוון הכוח הפועל על הפרוטון?


ב. מהי תאוצת הפרוטון?

נתון:  $q_p = 1.6 \cdot 10^{-19} C$ ,  $m_p = 1.67 \cdot 10^{-27} kg$

#### (2) תרגיל 2

אלקטרון נמצא בשדה מגנטי אחיד שגודלו  $5T$  וכיוונו לתוך הדף.

לאלקטרון מהירות  $v_0 = 10^5 \frac{m}{sec}$  בכיוון  $30^\circ$  מעלות ביחס לציר ה- $x$ .




א. מהו הכוח הפועל על האלקטרון ברגע זה (גודל וכיוון)?

ב. צייר את תנועת האלקטרון בשדה.

מהו רדיוס הסיבוב?

נתון:  $q_e = -1.6 \cdot 10^{-19} C$ ,  $m_e = 9.1 \cdot 10^{-31} kg$

#### (3) תיל תלוי על שני קפיצים




תחל מוליך נושא זרם תלוי לאורך ציר  $x$  על ידי שני תילים דקים ושני קפיצים זהים.

בכל המרחב קיים שדה מגנטי אחיד לתוך הדף. אורך התיל המוליך הוא  $0.4m$  ומסתו היא  $0.03kg$ . גודל השדה המגנטי הוא  $B = 0.2T$

וקבוע הקפיץ הוא  $k = 10 \frac{N}{m}$ , ניתן להזניח את השדות שיוצרים התילים האנכיים ואת הכוחות שהם מפעילים על התיל האופקי.

א. מהו גודל וכיוון הזרם בתיל אם ידוע שהתיל בשיווי משקל כאשר הקפיצים רפויים (לא מפעילים כוח)?

ב. בכמה יתארכו הקפיצים אם יהפכו את הזרם בתיל? תזכורת: גודל הכוח שמפעיל קפיץ הוא  $F = k\Delta l$  כאשר  $\Delta l$  היא ההתארכות של הקפיץ מהמצב הרפוי.

**(4) שני תילים תלויים**

שני תילים ארוכים מאוד תלויים מהתקרה באמצעות חוטים באורך זהה ולא ידוע. בתילים זורם זרם של 100 אמפר בכיוונים מנוגדים. הזווית בין החוטים היא 45 מעלות ומסתם ליחידת

$$\mu = 2 \frac{\text{gr}}{\text{m}}.$$

אורך היא  $\mu = 2 \frac{\text{gr}}{\text{m}}$ . מצא את המרחק בין התילים.

**תשובות סופיות:**

- (1) א.  $F = 8 \cdot 10^{-13} \text{ N}$ , כיוון: לתוך הדף. ב.  $a = 4.79 \cdot 10^{14} \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$
- (2) א.  $F = 8 \cdot 10^{-11} \text{ N}$ , כיוון  $60^\circ$  מתחת לציר ה-x. ב.  $R = 1.14 \cdot 10^{-7} \text{ m}$
- (3) א.  $I = 3.75 \text{ A}$ , כיוון: חיובי של ציר x. ב.  $\Delta l = 0.03 \text{ m}$
- (4)  $d = 0.241 \text{ m}$